



Exercício 2.1 Determine o domínio das seguintes funções:

a)  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1};$

b)  $f(x) = \sqrt{2 - 3x} + \sqrt{x};$

c)  $f(x) = \sqrt{1 - \cos(3x^3 + x)};$

d)  $f(x) = \frac{\sqrt{4x - 3}}{x^2 - 4}.$

Exercício 2.2 Determine o domínio das funções  $f$ ,  $g$ ,  $f + g$ ,  $f - g$ ,  $fg$ ,  $f/g$  quando:

a)  $f(x) = \sqrt{x + 5}, \quad g(x) = \sqrt{x + 5};$

b)  $f(x) = \frac{x}{x - 2}, \quad g(x) = \frac{3x}{x + 4}.$

Exercício 2.3 Determine  $f \circ g$  e  $g \circ f$  e, em cada caso, o respetivo domínio, quando:

a)  $f(x) = x^2 - 3x, \quad g(x) = \sqrt{x + 2};$

b)  $f(x) = \sqrt{x + 15}, \quad g(x) = x^2 + 2x;$

c)  $f(x) = \sqrt{x - 2}, \quad g(x) = \sqrt{x + 5};$

d)  $f(x) = \sqrt{25 - x^2}, \quad g(x) = \sqrt{x - 3}.$

Exercício 2.4 Para cada uma das funções  $h$  dadas indique duas funções  $f$  e  $g$  (diferentes da identidade) tais que  $h = g \circ f$ :

a)  $h(x) = \sin\left(\frac{x}{x^2 - 3}\right);$

b)  $h(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \frac{2}{x^2 + 1};$

c)  $h(x) = \sqrt{2x - 2} - 4x + 4.$

Exercício 2.5 Verifique se as seguintes funções são limitadas ou monótonas e indique, quando possível, o supremo, o ínfimo, o máximo e o mínimo dos seus contradomínios:

a)  $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \frac{|x|}{x}$

b)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sqrt{x^2} - 1$

c)  $f: ]-1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \frac{x-1}{x+1}$

Exercício 2.6 Estude a paridade da função  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  quando:

- a)  $f(x) = x, \quad D = \mathbb{R};$
- b)  $f(x) = x^2, \quad D = [-2, 5];$
- c)  $f(x) = x^3, \quad D = \mathbb{R};$
- d)  $f(x) = \sqrt{x^2}, \quad D = \mathbb{R};$
- e)  $f(x) = \sin x, \quad D = [-\pi, 2\pi];$
- f)  $f(x) = x^2 \cos x, \quad D = \mathbb{R}.$

Exercício 2.7 Se  $f$  e  $g$  são funções pares, o que se pode dizer de  $f \circ g$ ? E se forem ímpares? E se uma função for par e a outra ímpar?

Exercício 2.8 Considere as seguintes funções:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto -x \end{aligned}$$

$$i(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in ]-1, 2] \\ 2 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus ]-1, 2] \end{cases}$$

- a) Classifique cada uma delas quanto à injetividade e sobrejetividade.
- b) Determine  $f([-1, 1]), i([-1, 0]), i(]-1, 3]), f^{-1}(\{1\}), h^{-1}(\{0\})$  e  $g^{-1}(]-1, 3])$ .

Exercício 2.9 Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, +\infty[$  dada por  $f(x) = x^2 + 4x + 3$ .

- a) Defina uma restrição de  $f$  que admita inversa.
- b) Defina a função inversa da função da alínea (a).
- c) Esboce graficamente a função da alínea (a) e a sua função inversa.

Exercício 2.10 Para cada uma das funções  $f : D \rightarrow E$  que se segue, assuma que  $D$  é o maior conjunto em que a lei faz sentido e que o conjunto de chegada é igual ao contradomínio. Identifique as funções invertíveis e calcule a sua inversa:

- a)  $f(x) = x;$
- b)  $f(x) = x^2;$
- c)  $f(x) = x - 3;$
- d)  $f(x) = x^3;$
- e)  $f(x) = \sqrt{x+2};$
- f)  $f(x) = e^{x-1};$
- g)  $f(x) = \frac{1}{x^2+5};$
- h)  $f(x) = \frac{1}{x^3+2}.$

Exercício 2.11 Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = |x|$ . Esboce o gráfico de  $g$  quando:

- a)  $g(x) = f(x) - 1;$
- b)  $g(x) = f(x+2);$
- c)  $g(x) = \max\{f(x), 1\};$
- d)  $g(x) = \min\{f(x), 2\};$