

Tópicos de Matemática Discreta

folha 9

4. Relações binárias

4.1. Para cada uma das relações seguintes indique o domínio e imagem.

- (a) S é a relação de $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ para $B = \{1, 2, 3\}$ dada por $S = \{(0, 1), (1, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 3)\}$.
- (b) R é a relação em \mathbb{R} dada por $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$.
- (c) \mid é a relação “divide” em $\{2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 20\}$ definida por $a \mid b$ se $\exists_{n \in \mathbb{N}} b = na$.

4.2. Seja $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Considere as seguintes relações em A :

$$R = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (10, 8)\}, \quad S = \{(10, 2), (10, 8)\}, \quad T = \{(6, 2), (6, 4), (8, 10)\}.$$

Determine

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| (a) R^{-1} | (d) $T^{-1} \cap S$ | (g) $S^{-1} \circ S$ | (j) $T^{-1} \circ S^{-1}$ |
| (b) $R^{-1} \cup S^{-1}$ | (e) $S \circ T$ | (h) $(S \circ T)^{-1}$ | (k) $(R \circ S) \circ T$ |
| (c) $T \setminus S^{-1}$ | (f) $R \circ T$ | (i) $S^{-1} \circ T^{-1}$ | (l) $R \circ (S \circ T)$ |

4.3. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{x, y, w, z\}$. Considere as relações binárias R , de A em B , e S , de B em A :

$$\begin{aligned} R &= \{(1, x), (1, z), (2, y), (2, z)\} \\ S &= \{(x, 1), (x, 3), (y, 2), (w, 2), (z, 3)\}. \end{aligned}$$

Sejam $T = S \circ R$ e $U = R \circ S$.

- (a) Determine R^{-1} , S^{-1} , T , $T \circ T$, U e $U \circ U$.
 - (b) Verifique que $T^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.
 - (c) Indique o domínio e a imagem de R .
 - (d) Indique quantas relações binárias de A em B existem.
 - (e) Indique todas as relações binárias de A em B cujo domínio é $\{2, 3\}$ e cuja imagem é $\{x, z\}$.
- 4.4. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Dê exemplo de, ou justifique que não existe:
- (a) uma relação binária R de A em B tal que $R = R^{-1}$;
 - (b) relações binárias R e S em A tais que $R \circ S = S \circ R$ e $R \neq S$;
 - (c) uma relação binária R em A tal que $\text{id}_A \subseteq R$ e $\text{id}_A \not\subseteq R^{-1}$;
 - (d) uma relação binária R de A em B tal que $\text{Dom}(R) = \emptyset$;
 - (e) relações binárias R de A em B e S de B em A tais que $R \circ S = \text{id}_B$ e $S \circ R = \text{id}_A$.

Tópicos de Matemática Discreta

folha 10

4.5. Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e as seguintes relações em A :

$$\begin{aligned} R_1 &= \{(1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}, & R_2 &= \{(2, 3)\}, \\ R_3 &= \{(1, 2), (2, 3), (3, 2), (1, 3), (2, 2), (3, 3)\}, & R_4 &= \{(a, a) \mid a \in A\} = \text{id}_A. \end{aligned}$$

Diga, justificando, se cada uma das relações apresentadas é ou não uma relação

- (a) reflexiva;
- (b) simétrica;
- (c) antissimétrica;
- (d) transitiva.

4.6. Considere o conjunto $A = \{a, b, c\}$. Determine todas as relações de equivalência em A e, para cada uma, indique o conjunto quociente.

4.7. Seja $A = \{-3, -1, 0, 1, 2, 3\}$ e considere a relação de equivalência R em A definida por $x R y$ se e só se $x^2 = y^2$. Indique todos os elementos da classe $[-3]_R$ e determine o conjunto quociente A/R .

4.8. Seja $A = \{1, 2, 4, 6, 7, 9\}$ e considere a relação de equivalência \sim em A definida por $x \sim y$ se e só se $x + y = 2n$, para algum $n \in \mathbb{N}$. Indique todos os elementos da classe $[2]_\sim$ e determine o conjunto quociente A/\sim .

4.9. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Considere as seguintes relações de equivalência em A : R é a menor relação de equivalência em A tal que $(1, 2), (1, 3), (4, 5) \in R$ e S é a relação de equivalência em A cujas classes de equivalência são: $\{1, 3\}$, $\{4\}$ e $\{2, 5\}$. Determine R , indique todos os elementos da classe $[2]_R$ e indique, se existirem, $a, b \in A$ tais que aRb e aSb .

4.10. Considere a relação R em $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definida por $(x, y) R (z, w)$ se e só se $y = w$. Verifique que R é uma relação de equivalência em $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e descreva a classe de equivalência $[(2, 3)]_R$.

4.11. Seja $A = \{2, 3, 4, 6, 7\}$ e sejam

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= \{\{2, 4\}, \{3\}, \{4, 6\}, \{3, 6, 7\}\}, & \Pi_2 &= \{\{2, 4, 6\}, \{3, 7\}\}, \\ \Pi_3 &= \{\{2\}, \{3, 4, 7\}\}, & \Pi_4 &= \{\{2\}, \{3\}, \{4\}, \{6\}, \{7\}\}, \\ \Pi_5 &= \{\{2\}, \emptyset, \{3, 4\}, \{6, 7\}\}, & \Pi_6 &= \{\{2, 6\}, \{3, 7\}, \{4\}\}. \end{aligned}$$

- (a) Diga, justificando, quais dos conjuntos Π_j ($1 \leq j \leq 6$) são partições de A .
- (b) Para os conjuntos Π_j ($1 \leq j \leq 6$) que são partições, determine \mathcal{R}_{Π_j} e indique $[7]_{\mathcal{R}_{\Pi_j}}$.

Tópicos de Matemática Discreta

folha 11

4.12. Seja $A = \{a, b\}$. Indique todas as relações de ordem parcial em A e apresente os correspondentes diagramas de Hasse.

4.13. Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e sejam ρ_1, ρ_2, ρ_3 e ρ_4 as seguintes relações em A :

$$\begin{aligned}\rho_1 &= id_A \cup \{(4, 1), (4, 2)\}, & \rho_2 &= id_A \cup \{(1, 4), (4, 2), (2, 4)\}, \\ \rho_3 &= id_A, & \rho_4 &= id_A \cup \{(2, 3), (2, 1), (3, 1)\}.\end{aligned}$$

Indique se cada uma destas relações é ou não uma ordem parcial e, para cada ordem parcial, apresente o correspondente diagrama de Hasse.


4.14. Mostre que os seguintes pares são cpo:

- (a) $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, onde A é um conjunto;
- (b) $(\mathbb{N}_0, |)$, onde $|$ é a relação “divide” definida por $x|y \leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{N}_0 \ y = kx)$.

4.15. Construa diagramas de Hasse para os seguintes cpo:

- (a) $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, sendo $A = \{1, 2\}$;
- (b) $(A, |)$, sendo $A = \{2, 3, 4, 6, 10, 12, 20\}$ e $|$ a relação dada por $x|y \leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{N}_0 \ y = kx)$.

4.16. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $X = \{1, 2, 6\}$ e $Y = \{2, 3, 4, 8\}$. Considere o cpo (A, \preceq) com o seguinte diagrama de Hasse:



Determine para A , X e Y , caso existam, os majorantes e os minorantes, o supremo e o ínfimo, os elementos maximais e minimais e o máximo e o mínimo. O cpo (A, \preceq) é um reticulado?

4.17. Sejam (A, \leq) um cpo e $X \subseteq A$. Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das seguintes proposições:

- (a) Se X tem um elemento maximal então X tem elemento máximo;
- (b) Se X tem elemento máximo então X tem um elemento maximal;
- (c) Se existe $\sup(X)$ então X tem um elemento maximal;
- (d) Se X tem um elemento maximal então existe $\sup(X)$.

4.18. Considere o cpo $(\mathbb{N}_0, |)$, definido no exercício 4.14.(b).

- (a) Mostre que $(\mathbb{N}_0, |)$ não é uma cadeia.
- (b) Diga, justificando, se $(\mathbb{N}_0, |)$ tem elemento máximo ou elemento mínimo.
- (c) Mostre que $(\mathbb{N}_0, |)$ é um reticulado, indicando $\sup\{a, b\}$ e $\inf\{a, b\}$ para cada $a, b \in \mathbb{N}_0$.