

第一章 概率

§ 1 引言

§ 2 样本空间

§ 3 概率测度

§ 4 概率计算：计数方法

§ 5 条件概率

§ 6 独立性

“抛硬币”、“掷骰子”等随机试验的特征：

- ❶ 只有有限个基本结果
- ❷ 每个基本结果的出现是等可能的

古典概型

设随机试验的样本空间为 Ω , 若

- ❶ Ω 只含有限个样本点, 即

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

- ❷ 每个样本点的出现是等可能的, 即

$$P\{\omega_1\} = P\{\omega_2\} = \dots P\{\omega_n\} = \frac{1}{n}$$

则称该试验为**等可能概型**, 也称为**古典概型**.



怎样计算等可能概型中一般事件的概率 ?

等可能概型的概率计算

设事件 A 含 k 个样本点，即

$$\begin{aligned} A &= \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_k}\} \\ &= \{\omega_{i_1}\} \cup \{\omega_{i_2}\} \cup \dots \cup \{\omega_{i_k}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore P(A) &= P\{\omega_{i_1}\} + P\{\omega_{i_2}\} + \dots + P\{\omega_{i_k}\} \\ &= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n} \\ &= \frac{k}{n} \end{aligned}$$

有利场合

$$P(A) = \frac{\text{导致 } A \text{ 发生的方式个数}}{\text{所有试验结果个数}} = \frac{k}{n}$$

$$P(A) = \frac{A \text{ 的有利场合数}}{\text{样本点总数}} = \frac{k}{n}$$



§ 4 概率计算：计数方法

4

例 抛两枚硬币，求出现一个正面一个反面的概率。

解 该试验的样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$$

这是一个古典概型，事件 A ：“一个正面一个反面”的有利场合是 HT, TH

$$\therefore P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$



小趣闻

18世纪著名的法国数学家达朗贝尔
取样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TT\}$$

这不是等可能概型！

他计算得



$$P(A) = \frac{1}{3} \times$$

§ 4 概率计算：计数方法

5

规则：两个盒子各装红、绿色球若干. 允许先选择一个盒子，然后从选中的盒子里面随机选一个球. 如果选中红球，就得到奖品. 应该从哪个盒子里面选取？

Counterintuitive!



§ 4 概率计算：计数方法

6



一所美国高校的两个学院，分别是法学院和商学院，新学期招生。人们怀疑这两个学院有性别歧视。现作如下统计：

法学院


性别	录取	拒收	总数	录取比例
男生	8	45	53	15.1%
女生	51	101	152	33.6%
合计	59	146	205	

商学院

性别	录取	拒收	总数	录取比例
男生	201	50	251	80.1%
女生	92	9	101	91.1%
合计	293	59	352	


汇总后

性别	录取	拒收	总数	录取比例
男生	209	95	304	68.8%
女生	143	110	253	56.5%
合计	352	205	557	



Vector interpretation

为了避免辛普森悖论出现，就需要斟酌个别分组的权重，以一定的系数去消除由分组资料基数差异所造成的影响，同时必需了解该情境是否存在其他潜在要因而综合考虑。



排列与组合

选排列 从 n 个不同的元素中，任取 $k (\leq n)$ 个元素，按照一定的顺序排成一行，全部排列个数为

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)\cdots(n-k+1)$$

全排列 当 $k = n$ 时，称为全排列，

$$A_n^n = n!$$

排列的特点
取数与次序有关

组 合 从 n 个不同的元素中，任取 $k (\leq n)$ 个元素并成一组，全部组合数为


$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= C_n^k = \frac{A_n^k}{A_k^k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \end{aligned}$$

组合的特点
取数与次序无关

推广形式

一般地，把 n 个球随机地分成 r 组 ($n > r$)，要求第 i 组恰有 n_i 个球 ($i = 1, \dots, r$)，共有分法：

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!} = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_r}$$



加法原理


做一件事共有 n 类方法

第一类方法有 m_1 种方法

第二类方法有 m_2 种方法

.....

第 n 类方法有 m_n 种方法




完成这件事的方法总数

$$N = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$$

乘法原理

做一件事共有 n 个步骤

第一步有 m_1 种方法
第二步有 m_2 种方法
.....
第 n 步有 m_n 种方法




完成这件事的方法总数

$$N = m_1 \cdot m_2 \cdots m_n$$

例 袋中有 a 只红球, b 只白球, 从袋中随机地将球一个取出, 求第 k 次取出的是红球的概率 ($1 \leq k \leq a+b$).

分析 思路一 假设除颜色外球是可区分的, 将取出的球排成一行



样本点总数为 $(a+b)!$


有利场合数为 $C_a^1 \cdot (a+b-1)!$

故所求概率为

$$p_k = \frac{a(a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b} \quad (1 \leq k \leq a+b)$$

例 袋中有 a 只红球, b 只白球, 从袋中随机地将球一个取出, 求第 k 次取出的是红球的概率 ($1 \leq k \leq a+b$).

分析 思路二 假设除颜色外球是不可区分的, 将取出的球排成一行



样本点总数为 C_{a+b}^a

有利场合数为 C_{a+b-1}^{a-1}

故所求概率为

$$p_k = \frac{C_{a+b-1}^{a-1}}{C_{a+b}^a} = \frac{a}{a+b} \quad (1 \leq k \leq a+b)$$

例 袋中有 a 只红球, b 只白球,从袋中随机地将球一个个取出,求第 k 次取出的是红球的概率($1 \leq k \leq a+b$).

注

① **思路一** 假设除颜色外球是可区分的 **排列**

思路二 假设除颜色外球是不可区分的 **组合**

② 确定了样本空间的结构后,有利场合的构造必须与样本空间结构一致

③ **“出人意料”且有意思的结果**

设有 n 个人的班分到 m ($< n$)张音乐会门票,全班采用抽签的方法来分配门票.由上例的结果知,任何人是否抽到门票签与先后次序无关,抽到门票签概率都是 $\frac{m}{n}$.

④ 很多实际问题都可以归结为**(摸或扔)球模型**

例 将 n 只球随机地放入 $N (\geq n)$ 个盒子中去，试求每个盒子至多有一只球的概率。

分析 任一一只球进任一盒子是等可能的，故这是古典概型问题

解 样本点总数为

基本事件

$$N \cdot N \cdots N = N^n$$

“每个盒子至多有一只球”的有利场合数为

$$A_N^n = N(N-1) \cdots [N-(n-1)]$$

故所求概率为

$$p = \frac{A_N^n}{N^n} = \frac{N(N-1) \cdots (N-n+1)}{N^n}$$

例 从数字 $0, 1, 2, \dots, 9$ 中随机地 (可重复) 抽 5 个数字, 则抽出的 5 个数字都不相同的概率是

$$p = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10^5} = 0.3024$$

无理数 e 的随机特征

考虑无理数

$$e = 2.71828 \dots$$

将 e 的前 800 位小数分成 160 组, 每组的 5 个数字视为从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 中随机抽出.

数得 5 个数字都不相同共有 52 组, 其频率为

$$\frac{52}{160} = 0.325 \approx 0.3024$$

例 (生日问题) 参加某次聚会共 n 个人, 求没有两人生日相同的概率.

解 n 个人 $\longleftrightarrow n$ 只球, 365 天 \longleftrightarrow 365 个盒子, 则

$$P\{\text{没有两人生日相同}\} = \frac{A_{365}^n}{365^n}$$


$$\therefore P\{\text{至少有两人生日相同}\} = 1 - \frac{A_{365}^n}{365^n}$$

至少有两人生日相同的概率计算结果

	20	25	30	40	50	55	100
P	0.41	0.57	0.71	0.89	0.97	0.99	0.9999997

在实际应用中, 概率非常接近1的事件可近似地看成必然事件, 称为**几乎必然事件**

例 一个有100人的班级中, 有两个人的生日在同一天是几乎必然的.




例 某接待站在某周接待了12次来访,已知这12次来访都是在周二和周四进行的.问是否可以推断接待站的接待时间是有规定的?

解 假设接待站的接待时间没有规定,且认为来访者每周任一天到达是等可能的.则

$$P\{\text{12次来访都在周二和周四}\} = \frac{2^{12}}{7^{12}} \\ = 0.0000003$$

**既然这个概率非常小,
那么这个事件就不应该发生**



概率非常小的事件,称为**小概率事件**.

实际推断原理:小概率事件在一次试验中是几乎不可能发生的.

由实际推断原理,可推断接待站接待时间是有规定的.

几何概型

古典概型的特点 { 有限个样本点
样本点等可能出现

 怎样将样本空间推广到“无限个样本点”而又有某种“等可能性”？

例 某1万平方米的区域中，有一个大约10平方米的敌碉堡。现用迫击炮随机向该区域发射一发炮弹，问能将敌碉堡摧毁的概率是多少？

分析 由于炮弹发射的随机性，可认为炮弹落在1万平方米的区域中任一点是等可能的。则所求概率为

$$\begin{aligned} p &= \frac{\text{碉堡面积}}{\text{区域总面积}} \\ &= \frac{10}{10000} = 0.001 \end{aligned}$$

几何概型

随机试验 向平面有界区域 Ω 投掷一个点

样本空间 Ω

事件 点落在可测量面积的平面区域 A

事件概率

$$P(A) = \frac{A \text{ 的面积}}{\Omega \text{ 的面积}}$$

则称上述试验为**几何概型**.

注:

- ① 事件 A 发生的概率与位置无关, 只与 A 的面积有关, 这体现了某种“等可能性”
- ② 如果样本空间为有界区间、空间有界区域, 则“面积”改为“长度”、“体积”


例 在一次演习中，某部队A接到命令要赶到某小河D岸为行进中的B部队架设浮桥. 假设A部队将于7点到7点30分之间到达D岸，架桥需要20分钟时间；B部队将于7点30分至8点之间到达D岸. 试求B部队到达D岸时能立即过河的的概率.

解 设7点为零时，记 x, y 分别表示A部队与B部队到达D岸的时间，则B部队到达D岸时能立即过河的充要条件是

$$\begin{cases} x + 20 \leq y \\ 0 \leq x \leq 30 \\ 30 \leq y \leq 60 \end{cases}$$

这是一个几何概型，所求概率是

$$p = \frac{30^2 - 20^2 / 2}{30^2} = \frac{7}{9}$$





课后作业

P21 : 28, 29

补充题：

1、从 n 双尺码不同的鞋子中任取 $2r$ ($2r < n$)只，求下列事件的概率：

- 1) 所取 $2r$ 只鞋子中没有两只成对；
- 2) 所取 $2r$ 只鞋子中只有两只成对；
- 3) 所取 $2r$ 只鞋子恰好配成 r 对。

2、(匹配问题) 将4把能打开4间不同房门的钥匙随机发给4个人,试求至少有一人能打开门的概率。