

A
left-out functional
five-permittivity functional
$\Gamma(k_1)$
$\varepsilon_r = 7.5$
$\varepsilon_r = 5$
$\varepsilon_r = 4$
$\varepsilon_r = 3$
$\varepsilon_r = 2$
$c$
B
MD
model, same difference
left-out functional
five-permittivity functional
network input ($\varepsilon_r = 4$)
modulation ($\varepsilon_r = 4$)
$\partial\Gamma(0)/\partial l_B$ ($\sigma^{-1}$)
$\tilde{n}\sigma^3$
C
MD
functional
$\propto l_B$
$-\Gamma^{\mathrm{corr}}_{ZZ}$
$k = 1\,\sigma^{-1}$
$k = 2\,\sigma^{-1}$
$l_B/\sigma$
D
$c = 0.08$
$c = 0.01$
$\Gamma(k_1)$
$l_B/\sigma$
E
neutral potential, $c = 0.08$
$(n_+ + n_-)/2\tilde{n}$
$z/L$
F
charged potential, $c = 0.08$
$\varepsilon_r = 5$
$\varepsilon_r = 4$
$\varepsilon_r = 3$
$\varepsilon_r = 2$
MD
$(n_+ - n_-)/2\tilde{n}$
$z/L$