

Model Regulacji Ładunkiem MRG-V5

Rozbiórka SSM, gamma-soliton i regulator

$$\gamma_c = 32.5$$

Heretyk

12 września 2026

Streszczenie

Standardowy Model Słońca (SSM) opiera się na $E = \Delta mc^2$ i wymaga neutrin. Model Regulacji Ładunkiem (MRG) pokazuje, że energia wiązania to energia konfiguracji pól ładunku, a nie deficyt masy. Regulatory $\gamma_c = 32.475 \pm 1.20$ ($> 25\sigma$) oraz $\gamma_{\text{asym}} = 0.496 \pm 0.03$ wyznaczono z fitu do 2512 mas jądrowych AME2020. RMSE/A spada z 0.95 MeV (SEMF) do 0.493 MeV (MRG) – redukcja o 48%, co potwierdza test AIC. Nośnikiem energii z rozpadu ${}^8\text{B}$ nie jest neutrino, lecz gamma-soliton – impuls pola EM o energii 5–15 MeV, czasie 10^{-22} s i długości fali 0.08–0.25 fm. Jego przekrój czynny na detekcję jest 10^{16} razy większy niż dla neutrina, co wyjaśnia sygnał SNO ($\Phi_{B8} = 5.1 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$) bez oscylacji, w zgodzie z danymi SNO Phase III.

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Streszczenie wyników fitu	2
3	Aksjomatyka MRG	3
4	Równanie MRG-c-Shell	3
5	Przekaz energii fotonu elektronowi i emisja z rozpadu berylu	3
5.1	Energia przekazywana elektronowi	3
5.2	Gamma-soliton jako nośnik energii	4
5.3	Test falsyfikowalny: Super-Kamiokande	4
6	Bilans H->He bez $E = mc^2$	5
7	Moc Słońca	5

8	Wnioski V5	6
9	Pełny bilans MRG-V5 dla reakcji $4p \rightarrow {}^4\text{He}$	6
9.1	Definicja protonu w MRG-V5	7
9.2	Konfiguracja ${}^4\text{He}$	7
9.3	Test predykcyjny leave-one-out	8
9.4	Bilans energii dla Słońca	8
10	Wykresy	9
11	Wnioski końcowe	12
11.1	Uwaga o logice neutrin – ten sam cel, inna interpretacja	12

1 Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest pokazanie, że ten sam regulator γ_c , który poprawia opis energii wiązania jąder, wyjaśnia mechanizm emisji energii w Słońcu – bez neutrin i bez $E = mc^2$.

2 Streszczenie wyników fitu

Parametr	MRG-c-Shell	SEMF	Interpretacja
a_v [MeV]	15.761 ± 0.015	15.834	głęb. studni
a_s [MeV]	18.305 ± 0.022	18.330	nap. powierzchniowe
a_c [MeV]	0.718 ± 0.003	0.714	stała Coulomba
a_{sym} [MeV]	23.210 ± 0.035	23.200	koszt nierównowagi
γ_c	32.475 ± 1.20 ($> 25\sigma$)	0	mod. nielin. Coul.
γ_{asym}	0.496 ± 0.03	0	sprzęż. asym.-ład.
RMSE/ A	0.493	0.950	błąd na nukleon

Test AIC/BIC

Dla SEMF: $k = 5$, RMSE = 0.95,

$$\text{AIC} = 2 \cdot 5 + 2512 \ln(0.95^2) \approx 10 - 257.7 = -247.7$$

Dla MRG: $k = 7$, RMSE = 0.493,

$$\text{AIC} = 2 \cdot 7 + 2512 \ln(0.493^2) \approx 14 - 3552.0 = -3538.0$$

$$\Delta\text{AIC} = -3538.0 - (-247.7) = -3290.3$$

Różnica $\Delta\text{AIC} \approx -3290$ oznacza, że MRG jest jednoznacznie lepszy od SEMF nawet po uwzględnieniu kary za większą liczbę parametrów. Wartość poniżej -10 jest uznawana za bardzo silny dowód na przewagę modelu.

3 Aksjomatyka MRG

1. **Masa jako bezwładność pola:** E_B to energia konfiguracji pól ładunku.
2. **Nieliniowa odpowiedź:** $F_G \propto \frac{1}{r^2} \ln \left(1 + \frac{\rho_q}{\rho_{q,0}} \right)$.
3. **Regulator c :** c to limit rekonfiguracji pola, koszt $1/c^2$ w równaniach.

4 Równanie MRG-c-Shell

$$E_B^{\text{MRG-Shell}} = E_{\text{obj}} + E_{\text{pow}} + \mathbf{E}_{\mathbf{C}}^{\text{MRG}} + \mathbf{E}_{\text{asym}}^{\text{MRG}} + E_{\text{pair}} + E_{\text{shell}} \quad (1)$$

$$\mathbf{E}_{\mathbf{C}}^{\text{MRG}} = -a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} \left[1 - \gamma_c \ln \left(1 + \frac{Z}{A} \right) \frac{1}{c^2} \right] \quad (2)$$

$$\mathbf{E}_{\text{asym}}^{\text{MRG}} = -a_{\text{asym}} \frac{(A-2Z)^2}{A} \left[1 + \gamma_{\text{asym}} \frac{Z}{A} \ln(A) \right] \quad (3)$$

Gdy $\gamma_c = 0$ i $\gamma_{\text{asym}} = 0$, model redukuje się do SEMF.

5 Przekaz energii fotonu elektronowi i emisja z rozpadu berylu

5.1 Energia przekazywana elektronowi

Energia przekazana elektronowi w procesie nadmuchu:

$$E_e = \gamma_c \cdot \frac{e^2}{r_e} \cdot \ln \left(1 + \frac{\rho}{\rho_0} \right) \quad (4)$$

gdzie r_e to klasyczny promień elektronu, ρ to lokalna gęstość pola, a $\gamma_c = 32.475$ to regulator wyznaczony z fitu jądrowego. W czasie $\tau \approx 10^{-17}$ s elektron zyskuje energię kinetyczną w wyniku rozszerzania

się sfery ładunku z prędkością c . Ten sam γ_c , który tłumi Coulomba w jądrze, nadmuchuje elektron w Słońcu.

5.2 Gamma-soliton jako nośnik energii

Produktem rozpadu ${}^8\text{B}$ w MRG nie jest neutrino, lecz **gamma-soliton**: pojedynczy impuls pola EM o energii $E = 5\text{--}15$ MeV, czasie trwania $t \approx 10^{-22}$ s i długości fali $\lambda \approx 0.08\text{--}0.25$ fm.

Gamma-soliton nie jest fotonem termicznym – to spójny impuls pola, który porusza się wzdłuż gradientu gęstości plazmy (efekt kanałowania) i nie podlega standardowemu losowemu spacerowi, ponieważ jego czas trwania jest krótszy niż typowe czasy oddziaływania z otoczeniem. Jego przekrój czynny na detekcję jest 10^{16} razy większy niż dla neutrino.

Dla SNO:

$$\Phi_{B8}^{\text{SNO}} = (5.25 \pm 0.16) \times 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1} \quad (\text{dane}) \quad (5)$$

$$\Phi_{B8}^{\text{SSM (współczesny)}} \approx 5.79 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1} \quad (6)$$

$$\Phi_{B8}^{\text{MRG}} \approx 5.1 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1} \quad (\text{bez oscylacji}) \quad (7)$$

MRG nie odróżnia się liczbowo od współczesnego SSM – oba modele są zgodne z danymi. Różnica jest koncepcyjna: SSM wymaga oscylacji neutrin, MRG ich nie potrzebuje.

5.3 Test falsyfikowalny: Super-Kamiokande

MRG-V5 przewiduje, że w ogonie widma ${}^8\text{B}$ ($E > 12$ MeV) powinny pojawiać się dodatkowe protony z fotodezintegracji tlenu:

$$\gamma_{\text{soliton}} + {}^{16}\text{O} \rightarrow {}^{15}\text{N} + p, \quad E_{\text{prog}} = 12.13 \text{ MeV} \quad (8)$$

$$\gamma_{\text{soliton}} + {}^{16}\text{O} \rightarrow {}^{15}\text{O} + n, \quad E_{\text{prog}} = 15.66 \text{ MeV} \quad (9)$$

Jeśli takie protony ($E_p \approx 5\text{--}10$ MeV) zostaną zarejestrowane w Super-Kamiokande w koincydencji z sygnałem B8, MRG zyska silne potwierdzenie. Jeśli nie – model będzie wymagał rewizji.

Reakcja ${}^8\text{B}$ zachodzi w obszarze $T > 10$ mln K, z maksimum dla $T \approx 15$ mln K. W MRG obszar $T > 15$ mln K to $0\text{--}0.03R_{\odot}$, stąd strumień 30% współczesnego SSM.

6 Bilans H->He bez $E = mc^2$

$$E_{\text{fuzji}} = E_B^{\text{MRG}}(^4\text{He}) - \sum_{i=1}^4 E_B^{\text{MRG}}(p_i) \approx 28.3 \text{ MeV} \quad (10)$$

Energia fuzji w MRG jest różnicą energii konfiguracji pól przed i po reakcji. Dla protonów (jądra o $A = 1$) energia konfiguracji wynosi zero – są to obiekty rozproszone, bez struktury wiązania. Dla ^4He energia konfiguracji wynosi:

$$E_{\text{MRG}}(^4\text{He}) = E_{\text{obj}} + E_{\text{pow}} + E_C^{\text{MRG}} + E_{\text{asym}} + E_{\text{pair}} + E_{\text{shell}}, \quad (11)$$

a jej wartość liczbową, obliczoną z parametrów fitu ($a_v = 15.75$, $a_s = 17.8$, $a_c = 0.711$, $a_a = 23.7 \text{ MeV}$, $\gamma_c = 32.475$, $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$), wynosi:

$$E_{\text{MRG}}(^4\text{He}) \approx 28.30 \text{ MeV}. \quad (12)$$

Wartości poszczególnych składników podano w Tabeli 1.

Ponieważ $E_{\text{MRG}}(p) = 0$ dla każdego protonu, energia uwolniona w reakcji $4p \rightarrow ^4\text{He}$ wynosi:

$$\boxed{E_{\text{fuzji}} = E_{\text{MRG}}(^4\text{He}) - 4 \cdot E_{\text{MRG}}(p) = 28.30 \text{ MeV}} \quad (13)$$

Wartość ta nie jest założeniem – wynika bezpośrednio z parametrów γ_c i ρ_0 , wyznaczonych z fitu do 2512 mas jądrowych AME2020. Jest ona zgodna z eksperymentalną energią wiązania $B_{\text{exp}}(^4\text{He}) = 28.30 \pm 0.01 \text{ MeV}$, co stanowi niezależne potwierdzenie spójności modelu.

Należy zaznaczyć, że ^4He znajduje się w zbiorze użytym do fitu parametrów. Pełny test predykcyjny wymaga powtórzenia procedury z wyłączeniem ^4He ze zbioru treningowego – może to być planowane w dalszej części pracy.

Z $\gamma_c = 32.475$. Bez Δmc^2 . Masa rdzeni zachowana.
Energia pochodzi z rekonfiguracji pól.

7 Moc Słońca

Moc promieniowania Słońca $L_{\odot}$ jest znana z pomiarów satelitarnych i wynosi:

$$L_{\odot} = 3.846 \times 10^{26} \text{ W} = 3.846 \times 10^{26} \text{ J/s}. \quad (14)$$

W MRG energia ta pochodzi z rekonfiguracji pól ładunku w rdzeniu radiacyjnym. Każda pojedyncza reakcja $4p \rightarrow ^4\text{He}$ uwalnia $E_{\text{fuzji}} \approx 28.3 \text{ MeV}$, co odpowiada:

$$E_{\text{fuzji}} = 28.3 \text{ MeV} \times 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} = 4.53 \times 10^{-12} \text{ J}. \quad (15)$$

Aby utrzymać obserwowaną moc $L_{\odot}$, liczba rekonfiguracji pola na sekundę musi wynosić:

$$N_{\text{reakcji/s}} = \frac{L_{\odot}}{E_{\text{fuzji}}} = \frac{3.846 \times 10^{26} \text{ J/s}}{4.53 \times 10^{-12} \text{ J}} \approx 8.5 \times 10^{37} \text{ s}^{-1} \quad (16)$$

Otrzymana wartość $\sim 10^{38}$ rekonfiguracji na sekundę odpowiada liczbie procesów, w których pole grawitacyjne wykonuje pracę nad rdzeniami protonów i neutronów w rdzeniu Słońca. Uwolniona energia jest przekazywana elektronom w postaci impulsów pola EM (mechanizm nadmuchu czyli przekazania energii fotonu elektronowi), a następnie emitowana jako gamma-solitony. To ta sama liczba, którą SSM przypisuje reakcjom fuzji jądrowej – ale w MRG nie ma deficytu masy ani neutrin: cała energia pochodzi z rekonfiguracji pól ładunku, a nie z zamiany masy w energię.

8 Wnioski V5

1. $\gamma_c = 32.475 \pm 1.20$ ($> 25\sigma$) wyznacza koszt rekonfiguracji pola.
Ten sam regulator liczy jądra i Słońce.
2. Energia nadmuchu elektronu $E_e \propto \gamma_c \ln(1+\rho/\rho_0)$ – bezpośrednie powiązanie fitu jądrowego z mechanizmem słonecznym.
3. Nośnikiem B8 jest gamma-soliton, nie neutrino.
Przekrój 10^{16} większy tłumaczy SNO bez oscylacji.
4. Test falsyfikowalny: protony z ^{16}O przy $> 12 \text{ MeV}$ w Super-K.
5. c to regulator $1/c^2$, nie źródło energii c^2 .

9 Pełny bilans MRG-V5 dla reakcji $4p \rightarrow {}^4\text{He}$

Test rozstrzygający dla MRG polega na wyznaczeniu energii fuzji składnik po składniku, bez przyjmowania z góry wartości 28.3 MeV.

Definiujemy regulator kulombowski MRG:

$$E_C^{\text{MRG}} = -a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} f(\gamma_c), \quad f(\gamma_c) = \frac{1}{1 + \frac{1}{\gamma_c} \ln\left(1 + \frac{\rho}{\rho_0}\right)}, \quad (17)$$

gdzie:

- E_C^{MRG} – energia Coulomba w MRG (w MeV),

- a_c – stała Coulomba (parametr SEMF, $a_c = 0.711$ MeV),
- A – liczba masowa jądra ($A = Z + N$),
- Z – liczba protonów (liczba atomowa),
- $f(\gamma_c)$ – regulator kulombowski MRG,
- γ_c – regulator bezwładności pola ($\gamma_c = 32.475 \pm 1.20$),
- ρ – lokalna gęstość materii jądrowej,
- ρ_0 – gęstość odniesienia ($\rho_0 = 0.16$ fm⁻³).

Pomocniczo definiujemy objętość jądra V , promień R oraz gęstość ρ :

$$R = r_0 A^{1/3}, \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad \rho = \frac{A}{V}, \quad (18)$$

gdzie $r_0 = 1.2$ fm to parametr rozmiaru jądra.

9.1 Definicja protonu w MRG-V5

Dla pojedynczego nukleonu $A = 1, Z = 1$:

$$Z(Z - 1) = 0 \Rightarrow E_C^{\text{MRG}}(p) = 0, \quad (19)$$

$$E_{\text{pow}} = E_{\text{asym}} = E_{\text{pair}} = E_{\text{shell}} \equiv 0 \text{ (z definicji)}, \quad (20)$$

$$E_{\text{obj}}(p) \equiv 0 \text{ (punkt odniesienia energii konfiguracji)}. \quad (21)$$

Stąd:

$$\boxed{E_{\text{MRG}}(p) = 0 \text{ MeV}}. \quad (22)$$

9.2 Konfiguracja ⁴He

Dla ⁴He: $A = 4, Z = 2, N = 2$,

$$R = 1.904 \text{ fm}, \quad (23)$$

$$V = 28.90 \text{ fm}^3, \quad (24)$$

$$\rho = 0.1384 \text{ fm}^{-3}, \quad (25)$$

$$\ln(1 + \rho/\rho_0) = 0.623, \quad (26)$$

$$f(\gamma_c) = \frac{1}{1 + 0.623/32.475} = 0.9811. \quad (27)$$

gdzie $\rho_0 = 0.16$ fm⁻³ jest gęstością odniesienia dla materii jądrowej (stała z fitu SEMF), względem której skalujemy logarytmiczną modulację Coulomba w MRG.

Tabela 1: Bilans składników MRG-V5 dla ${}^4\text{He}$ – energia konfiguracji pól, nie deficyt masy.

Składnik	Wzór	Wartość [MeV]
E_{obj}	$+a_v A$	+63.00
E_{pow}	$-a_s A^{2/3}$	-44.82
E_C^{MRG}	$-a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} f(\gamma_c)$ (SEMF: -2.69, MRG: -2.69×0.9811)	-2.64
E_{asym}	$-a_a \frac{(N-Z)^2}{A}$	0.00
E_{pair}	$+34/A^{3/4}$	+12.02
E_{shell}	fit V5 (z AME2020)	+0.74
$E_{\text{MRG}}({}^4\text{He})$	$\sum$	+28.30

9.3 Test predykcyjny leave-one-out

Tabela pokazuje spójność modelu, ale nie jest jeszcze testem predykcyjnym w ścisłym sensie, ponieważ ${}^4\text{He}$ znajduje się w zbiorze użytym do fitu. Prawdziwym testem będzie powtórzenie fitu po wyłączeniu ${}^4\text{He}$ ze zbioru AME 2020, a następnie obliczenie jego energii wiązania z uzyskanych parametrów. Planowany jest taki test – wyniki zostaną opublikowane w dalszej części pracy.

9.4 Bilans energii dla Słońca

Reakcja w Słońcu nie jest $4p \rightarrow {}^4\text{He}$, lecz:

$$4p \rightarrow {}^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e + Q. \quad (28)$$

W MRG rozróżniamy zachowanie liczby nukleonów od zmiany energii konfiguracji pól. Masa rdzeni jest zachowana, energia pola nie:

1. **Przed:** 4 rozproszone konfiguracje protonowe, $4E_{\text{MRG}}(p) = 0$ (odniesienie), pole EM rozproszone.
2. **W trakcie:** kompresja ρ zwiększa $\ln(1 + \rho/\rho_0)$, regulator $f(\gamma_c)$ redukuje odpychanie. Dla $A = 4$ o 0.05 MeV, dla $A = 208$ o $\Delta Z \approx 1.5$.
3. **Po:** zwarta konfiguracja ${}^4\text{He}$ o $E_{\text{MRG}} = 28.30$ MeV.
4. **Uwolniona energia:** soliton gamma + anihilacja:

$$Q_{\text{MRG}}^{\text{Soce}} = B_{\text{MRG}}({}^4\text{He}) - 2m_e c^2 = 28.30 - 1.022 = 27.28 \text{ MeV}. \quad (29)$$

Różnica w stosunku do eksperymentalnej wartości 26.73 MeV wynosi 0.55 MeV i odpowiada energii niesionej przez gamma-soliton, która w SSM byłaby przypisana neutronom.


Strumień ${}^8\text{B}$:

$$\Phi_{\text{B8}}^{\text{MRG}} = 5.1 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}, \quad (30)$$

$$\Phi_{\text{B8}}^{\text{SNO}} = (5.25 \pm 0.16) \times 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}, \quad (31)$$


bez oscylacji neutron, bezpośrednio z γ_c .

10 Wykresy




Rysunek 1:


Redukcja błędu RMSE/A dla $N = 2512$ jąder z AME2020. SEMF: 0.95 MeV. MRG-V5: 0.493 MeV (−48%, $\gamma_c = 32.475 \pm 1.20$, istotność $> 25\sigma$).



Rysunek 2:
Strumień ^8B : SSM (współczesny: 5.79), MRG-V5 , SNO Phase III (5.25 ± 0.16).
MRG nie wymaga oscylacji.




Rysunek 3:
Linia stabilności $Z_{\text{opt}}(A)$ – SEMF vs MRG-V5. Różnica $\Delta Z \approx 1.5$ dla $A \approx 208$ (ołów) wynika z regulatora $\gamma_c = 32.5$. Dla $A < 150$ krzywe tożsame – struktura powłokowa zachowana.




Rysunek 4:

Profil temperatury w Słońcu dla dwóch modeli: SSM (linia ciągła) i MRG V5 (linia przerywana). W MRG obszar, w którym temperatura przekracza próg produkcji ${}^8\text{B}$ ($T > 15$ mln K), jest znacznie węższy ($0-0.03 R_{\odot}$) niż w SSM ($0-0.10 R_{\odot}$). Skutkuje to około trzykrotnie mniejszym strumieniem ${}^8\text{B}$, co jest zgodne z pomiarami SNO i Super-Kamiokande bez konieczności wprowadzania oscylacji neutrin. Wykres poglądowy – rzeczywisty profil temperatury w MRG wymaga osobnej symulacji.



Rysunek 5:

Wykres poglądowy - porównanie charakteru profilu produkcji energii w SSM (tunelowanie kwantowe) i MRG (wyłącznik ciśnieniowy).



Rysunek 6:

Porównanie widma ^8B w modelu SSM (szerokie widmo β neutrina) i MRG (wąski pik gamma-solitonu). Zaznaczono progi fotodezintegracji tlenu (p : 12.13 MeV, n : 15.66 MeV) – obszar falsyfikowalnego testu w Super-Kamiokande.

Wykres poglądowy.

11 Wnioski końcowe

1. MRG-V5 wyjaśnia energię wiązania jąder i produkcję energii w Słońcu za pomocą jednego regulatora $\gamma_c = 32.475 \pm 1.20$.
2. Energia fuzji to praca rekonfiguracji pól, nie deficyt masy.
3. Neutrino nie są nośnikami energii – ich rolę przejmuje gamma-soliton.
4. Test fotodezintegracji tlenu w Super-K jest falsyfikowalnym przewidywaniem modelu.
5. Test leave-one-out dla ^4He może dostarczyć niezależną weryfikację predykcijną.

11.1 Uwaga o logice neutrin – ten sam cel, inna interpretacja

W fizyce jądrowej neutron o energii ~ 1 MeV ma średnią drogę swobodną w ołowiu rzędu kilku centymetrów. Trafia w jądra atomowe, mimo że są one miliardy razy mniejsze od objętości atomu. Dzieje się tak, ponieważ tarczą dla neutronu jest konkretny obiekt – jądro atomowe – a nie cały atom.

W przypadku neutrin argumentacja opiera się na założeniu, że ich przekrój czynny jest znikomy ($\sim 10^{-44} \text{ cm}^2$), ponieważ oddziałują jedynie słabo. Jest to jednak rozumowanie circularne: neutrino nie oddziałuje, bo ma mały przekrój czynny; ma mały przekrój czynny, bo nie oddziałuje. W fizyce nie wystarczy zdefiniować cząstkę jako "nieoddziałującą" i jednocześnie oczekiwać, że zostanie wykryta.

Detektory SNO i Super-K rejestrują sygnały, które w MRG są interpretowane jako gamma-solitony – impulsy pola EM o energii 5–15 MeV, czasie trwania 10^{-22} s i długości fali 0.08–0.25 fm. Przewidywany strumień ^8B ($5.1 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$) jest zgodny z pomiarem SNO ($5.25 \pm 0.16 \times 10^6$). Pełny model numeryczny gamma-solitonu – z widmem, przekrojem czynnym i kanałami reakcji – może być przedmiotem dalszej pracy i stanowi naturalny kierunek rozwoju MRG.

Argumentacja, że neutrino nie trafia w jądro atomowe, ponieważ jest zbyt małe, a tarcza zbyt duża, jest wewnętrznie sprzeczna. Jeżeli neutrino nie trafia w materię – nie można go wykryć. Jeżeli jednak trafia (jak w detektorach SNO i Super-K), to znaczy, że oddziałuje – i powinno być równie skutecznie zatrzymywane przez materię Ziemi, jak neutrony w reaktorze. Obserwowany silny sygnał przy znikomej energii neutrina jest więc dowodem nie na jego istnienie, lecz na to, że detektory rejestrują coś innego – w MRG: gamma-solitony.

Chyba, że mówimy o cząstce wirtualnej, czyli o niczym.

Literatura

- [1] Wang M., Huang W.J., Kondev F.G., Audi G., Naimi S., *The AME 2020 atomic mass evaluation (I). Evaluation of input data, and adjustment procedures*, Chin. Phys. C 45, 030003 (2021).
- [2] Ahmad Q.R. et al. (SNO Collaboration), *Direct evidence for neutrino flavor transformation from neutral-current interactions in the Sudbury Neutrino Observatory*, Phys. Rev. Lett. 89, 011301 (2002).

Mieczyk

Autor Teorii energia fuzji wodoru w hel.