Bản nháp · chưa phát hành

Duyệt bài luyện 22 câu

Toán 9 · Lớp 9A · Toán

Nội dung và nhãn kỹ năng được giữ nguyên. 12 chọn đáp án · 4 Đúng/Sai · 6 trả lời ngắn. Bạn có thể cập nhật thông tin phát hành; muốn thay nguồn hoặc bộ câu, hãy tạo bản nháp mới từ quá trình học của học sinh.

▼ Căn cứ lựa chọn và phân bố câu hỏi

Vì sao bạn nhận bài luyện này?

Bài luyện kết hợp tìm hiểu phần chưa đủ dữ liệu, củng cố điểm yếu và duy trì kiến thức đã đạt. Phân bố dựa trên câu trả lời đã chấm của bạn.

16	6	0
Câu chưa từng gặp trong lịch sử ghi nhận	Câu ôn lại	Vị trí điều chỉnh so với mục tiêu

▼ Xem căn cứ lựa chọn và phân bố thực tế

Bộ câu minh họa bố cục, dữ liệu và trạng thái. Không phải kết quả đánh giá thuật toán chọn câu.

Mức nhận thức	Mục tiêu	Thực tế
Nhận biết	18	18
Thông hiểu	4	4
Vận dụng	0	0
Vận dụng cao	0	0

Dạng kiến thức	Mục tiêu	Thực tế
Viết không gian mẫu	–	–
Đếm không gian mẫu	–	–

Dạng kiến thức	Mục tiêu	Thực tế
Tung đồng xu	—	—
Gieo xúc xắc	—	—
Vòng quay số	—	—
Rút thẻ	—	—
Viết số tự nhiên	—	—
Chọn đối tượng	—	—

Các mức trên là nhãn nhận thức do giáo viên xác nhận, chưa phải độ khó thống kê đã được hiệu chuẩn.

Nội dung bài luyện

22 câu · 10.0 điểm gốc · Câu hỏi và đáp án chỉ đọc

Phần I · Chọn một đáp án


Câu 1

0.25 điểm

9C8-i-1 · Nhận biết

> Đọc dữ kiện chung và trả lời độc lập từng câu.

Mô tả không gian mẫu. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.



A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 1

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 2

0.25 điểm

9C8-i-2 · Nhận biết

Tính xác suất của biến cố. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 2

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 3

0.25 điểm

9C8-i-3 · Nhận biết

Quy tắc đếm. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 3

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 4

0.25 điểm

9C8-i-4 · Nhận biết

Xác suất khi gieo xúc xắc. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 4

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 5

0.25 điểm

9C8-i-5 · Nhận biết

Xác suất khi rút thẻ. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 5

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 6

0.25 điểm

9C8-i-6 · Nhận biết

Biến cố đối. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 6

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 7

0.25 điểm

9C8-i-7 · Nhận biết

Phép thử nhiều bước. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 7

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 8

0.25 điểm

9C8-i-8 · Nhận biết

Ứng dụng xác suất. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 8

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.


Câu 9

0.25 điểm

9C8-i-1 · Thông hiểu

> Đọc dữ kiện chung và trả lời độc lập từng câu.

Mô tả không gian mẫu. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.



A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 9

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 10

0.25 điểm

9C8-i-2 · Thông hiểu

Tính xác suất của biến cố. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 10

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 11 0.25 điểm

9C8-i-3 · Thông hiểu

Quy tắc đếm. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 11

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 12

0.25 điểm

9C8-i-4 · Thông hiểu

Xác suất khi gieo xúc xắc. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

A $P(A) = 1/2$

Đáp án đúng

B $P(A) = 1/3$

C $P(A^c) = 1/2$

D $P(A) = 1$

▼ Lời giải câu 12

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Phần II · Đúng / Sai

Câu 13

1.0 điểm

9C8-i-1 · Nhận biết

> Đọc dữ kiện chung và trả lời độc lập từng câu.

Mô tả không gian mẫu. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

a. $P(A) = 1/2$

Đúng

b. $P(A) = 1/3$

Sai

c. $P(A^c) = 1/2$

Đúng

d. $P(A) = 1$

Sai

▼ Lời giải câu 13

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 14

1.0 điểm

9C8-i-2 · Nhận biết

Tính xác suất của biến cố. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

a. $P(A) = 1/2$

Đúng

b. $P(A) = 1/3$

Sai

c. $P(A^c) = 1/2$

Đúng

d. $P(A) = 1$

Sai

▼ Lời giải câu 14

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 15

1.0 điểm

9C8-i-3 · Nhận biết

Quy tắc đếm. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

a. $P(A) = 1/2$

Đúng

b. $P(A) = 1/3$

Sai

c. $P(A^c) = 1/2$

Đúng

d. $P(A) = 1$

Sai

▼ Lời giải câu 15

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 16

1.0 điểm

9C8-i-4 · Nhận biết

Xác suất khi gieo xúc xắc. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

a. $P(A) = 1/2$

Đúng

b. $P(A) = 1/3$

Sai

c. $P(A^c) = 1/2$

Đúng

d. $P(A) = 1$

Sai

▼ Lời giải câu 16

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Phần III · Trả lời ngắn

Câu 17

0.5 điểm

9C8-i-1 · Nhận biết

> Đọc dữ kiện chung và trả lời độc lập từng câu.

Mô tả không gian mẫu. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

Đáp án chấp nhận

0.5

▼ Lời giải câu 17

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 18

0.5 điểm

9C8-i-2 · Nhận biết

Tính xác suất của biến cố. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

Đáp án chấp nhận

0.5

▼ Lời giải câu 18

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 19

0.5 điểm

9C8-i-3 · Nhận biết

Quy tắc đếm. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

Đáp án chấp nhận

0.5

▼ Lời giải câu 19

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 20

0.5 điểm

9C8-i-4 · Nhận biết

Xác suất khi gieo xúc xắc. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

Đáp án chấp nhận

0.5

▼ Lời giải câu 20

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 21

0.5 điểm

9C8-i-5 · Nhận biết

Xác suất khi rút thẻ. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

Đáp án chấp nhận

0.5

▼ Lời giải câu 21

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Câu 22

0.5 điểm

9C8-i-6 · Nhận biết

Biến cố đối. Gieo một xúc xắc cân đối. Tính $P(A)$ khi A có ba kết quả thuận lợi.

Đáp án chấp nhận

0.5

▼ Lời giải câu 22

Có ba kết quả thuận lợi trong sáu kết quả: $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.