

# تغذية الأطفال والأمهات

خلال العقدين الماضيين، سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات انخفض إلى النصف تقريباً

نقص التغذية لدى الأطفال ما زال يشكل أكبر عبء صحي متصل بالتغذية على الصعيد العالمي



45% من وفيات الأطفال  
ناتجة عن سوء تغذية  
الأطفال والأمهات




99 مليون  
طفل يعانون من  
نقص الوزن




161 مليون  
طفل مصابون بالتقرُّم  
نتيجة لسوء التغذية  
المزمن

فقر الدم  
الناجم عن نقص الحديد  
يصيب بالضرر  
**50%**  
من النساء الحوامل  
في البلدان النامية




**فقر الدم**  
الناجم عن نقص الحديد  
يزيد من خطر الإصابة  
بمضاعفات الحمل وضعف  
نمو وتطور الإدراك، والموت  
لدى الأطفال والأمهات

الأقاليم النامية لديها أكبر نسبة انتشار للتقرُّم بين الأطفال تحت سن الخامسة



نسبة انتشار التقرُّم لدى الأطفال انخفضت عالمياً من 40% إلى 25%



النظم الغذائية المحسّنة و الرعاية الصحية للنساء قبل وأثناء  
الحمل والرضاعة تقلّصان نقص التغذية لدى الأطفال على نحو ملموس



أول 1000 يوم من حياة الطفل هي الفترة الأكثر حرجاً بالنسبة لنموه وتطوره السليم


24 شهراً

12 شهراً



الحمل

الرضاعة الطبيعية حصرياً للأطفال الرضع خلال أول ستة شهور من حياتهم يتبعها إدخال  
أغذية تكميلية غنية بالمغذيات هي بمثابة مكونات أساسية للتغذية الجيدة



اللحوم والأسماك  
ومنتجات الألبان



الفواكه  
والخضار



البقوليات



الحبوب والجزور  
والدرنات

الأغذية المدعمة بالفيتامينات والأملاح المعدنية الأساسية  
يجب إدخالها هي أيضاً في النظم الغذائية حينما يكون تنوع الأغذية قليلاً

فيتامين أ

الحديد

الزنك

حمض الفوليك

اليود

التعليم التغذوي للأسرة كلها هو مفتاح لضمان تغذيتها الجيدة



إدماج التعليم التغذوي في  
الزراعة القائمة على صغار الحائزين



تعليم الأمهات والآباء والفتيات المراهقات  
والنساء الكيبرات بشأن تغذية الأطفال



زيادة سلطة النساء على الموارد والدخل



تعليم كيفية اختيار وإعداد  
واستهلاك أطعمة مغذية

