


# ما هو قصور القلب؟

ترتبط الإصابة بضعف عضلة القلب، أو ما يعرف بقصور القلب، بعملية الضخ التي يقوم بها قلبك. ولا يعني قصور القلب أن قلبك سيتوقف عن العمل، بل يعني أن عضلة القلب ضعيفة وغير قادرة على ضخ كمية كافية من الدم في جسمك. ويُعتبر قصور القلب مرضاً مزمنًا وقد يُصيب أي فئة عمرية، لكنه غالباً ما يصيب الأشخاص الذين بلغوا الـ 65 من العمر وما فوق. إنه حالة شائعة جداً بحيث تصيب ملايين الناس حول العالم. في أغلب الأحيان لا يمكنك معالجة قصور القلب، لكن يمكنك السيطرة على هذا المرض وأعراضه.

## ماذا يحدث في حال الإصابة بقصور القلب؟

إن القلب عبارة عن عضلة قوية تضخ الدم باستمرار إلى كل أنحاء الجسم مع كل دقة قلب. ويضاهي حجمه تقريباً حجم قبضة اليد.

**يتألف القلب من أربع غرف:**  
غرفتان علويتان تُعرفان بالأذنتين،  
وغرفتان سفليتان تُعرفان بالبطينين.  
يتدفق الدم من الجسم إلى الأذين  
الأيمن، ثم ينتقل إلى البطين الأيمن.  
يضخ البطين الأيمن الدم إلى الرئتين  
اللتين تنظفانه من ثاني أكسيد  
الكربون وتملأانه بالأكسجين. ثم  
يتدفق الدم من الرئتين إلى الأذين  
الأيسر، فإلى البطين الأيسر. يضخ  
البطين الأيسر الدم في كل الجسم،  
وتستمر هذه الدورة وتتواصل.



لدى الإصابة بقصور القلب، يكون القلب ضعيفاً وبالتالي لا يضخ كمية كافية من الدم في جسمك، ما لا يوفر للجسم ما يكفي من الأوكسجين والمواد المغذية. وبدلاً من ضخ الدم، يتدفق الدم باتجاه رجعي في الأوردة والرئتين. هذا ويستجيب الجسم لضعف القلب عبر احتباس السوائل، ما يسبب تورم الساقين (أو ما يسمى بالوذمة). وقد تتجمع السوائل في الرئتين أيضاً، فيؤدي ذلك إلى احتقانهما.


تتعدد أنواع قصور القلب.

#### أ. قصور الجانب الأيسر من القلب


- قصور القلب الانقباضي:  
حيث يكون البطين الأيسر ضعيفاً ولا يضخ الدم في جسمك بالقوة الكافية. وبدلاً من ذلك، يرتجع الدم إلى رئتيك.
- قصور القلب الانبساطي:  
ينقبض البطين الأيسر بشكل طبيعي، لكنّه لا يستطيع أن يسترخي بشكل طبيعي ليمتلئ بالدم الآتي إلى القلب.

#### ب. قصور الجانب الأيمن من القلب

يكون البطين الأيمن ضعيفاً ولا يضخ الدم في رئتيك بالقوة الكافية. وبدلاً من ذلك، يرتجع الدم إلى جسمك، ما يتسبب بوزم في الساقين والبطن.



قلب متضخم



قلب ذو حجم طبيعي

# بماذا أشعر حين أصاب بقصور القلب؟

يواجه بعض الأشخاص الذين يعانون قصور القلب عارضاً أو أكثر من الأعراض التالية:

| الأعراض                          | التجربة التي قد تواجهها                                                                                                                                           | سبب حدوثها                                                                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ضيق في النفس (أو ما يعرف بالزلة) | صعوبة في التنفس أثناء القيام بأي نشاط أو عند الاستراحة أو النوم. تحدث هذه الحالة بشكل خاص عند الاستلقاء في السرير، بحيث تشعر بالحاجة إلى النوم على أكثر من وسادة. | تحدث هذه الأعراض نتيجة تجمع السوائل في الرئتين (الاحتقان الرئوي).                                                           |
| سعال متواصل                      | سعال جاف أو سعال يشوبه بلغم وردي أو أبيض اللون. تتفاقم حدة السعال ليلاً.                                                                                          |                                                                                                                             |
| تورم                             | تورم في الكاحلين أو القدمين أو البطن                                                                                                                              | تحدث هذه الأعراض نتيجة تجمع السوائل في الجسم. تحتجز الكليتان أيضاً الصوديوم والسوائل في جسمك ما يتسبب بالتورم وزيادة الوزن. |
| زيادة في الوزن                   | زيادة غير مبررة في الوزن                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| الإجهاد                          | شعور بالتعب ونقص في الطاقة                                                                                                                                        | نتيجة ضخ القلب لكمية أقل من الدم، تصبح الأولوية للأعضاء الأساسية في الجسم كالدماع ما يعني حصول العضل على كميات أقل من الدم. |
| فقدان الشهية والغثيان            | شعور بالتخمة والغثيان                                                                                                                                             | تحدث هذه الأعراض عند وجود تورم في البطن، أو نظراً لحصول جهازك الهضمي على كمية أقل من الدم.                                  |
| تسارع دقات القلب                 | الشعور بخفقان القلب أو بأن قلبك يدق بوتيرة سريعة، ولا سيما لدى القيام بأي نشاط جسدي                                                                               | يعوّض القلب عن ضعف قدرته على ضخ ما يكفي من الدم عن طريق ضخ الدم بوتيرة أسرع.                                                |
| الدوار (الدوخة) والتشنج          | صعوبة في التركيز وعدم القدرة على التفكير بصفاء                                                                                                                    | تحدث هذه الأعراض عند تلقي الدماغ كمية أقل من الدم.                                                                          |

# ما هي أسباب قصور القلب؟

غالباً ما ينتج قصور القلب من الأسباب التالية:

|                                     |                                         |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| أمراض الصمامات القلبية              | مرض القلب التاجي<br>(تصلب شرايين القلب) | نوبة قلبية سابقة  |
| إلتهاب عضلة القلب                   | تشوه خلقي في القلب                      | ارتفاع ضغط الدم   |
| الإفراط في شرب الكحول               | السكري                                  | مرض في عضلة القلب |
| العلاج الكيميائي/<br>العلاج بالأشعة | الإدمان على المخدرات                    |                   |

## كيف أعرف أنني مصاب بقصور القلب؟

يهدف تشخيص قصور القلب، يجري لك الطبيب فحصاً سريرياً وقد يطلب منك إجراء بعض الفحوصات الطبية:

- فحوصات الدم
- صورة أشعة سينية للصدر (X-ray)
- تخطيط قلبي (تخطيط كهرباء القلب EKG)
- تخطيط صدى القلب (صورة صوتية للقلب Echocardiogram)

يشكل الكسر القذفي (Ejection Fraction) أحد أهم القياسات ذات الصلة بقصور القلب، بحيث يظهر كمية الدم التي يضخها البطين الأيسر مع كل نبضة (إنقباضة). كما ويسمح بالتمييز بين قصور القلب الانتقاضي (الكسر القذفي متدنٍ)، وقصور القلب الانقباضي (معدل الكسر القذفي شبه طبيعي). يتراوح المعدل الطبيعي للكسر القذفي بين 55 و 70 بالمئة. ومن القياسات الأخرى المهمة أيضاً، مستويات فحص BNP في الدم. وترتبط هذه المستويات بوضع قصور القلب، إذ يساعد ارتفاع معدلات الـ BNP على تشخيص قصور القلب ويحدّد ما إذا كان وضعك يتفاقم. عند استقرار قصور القلب، تنخفض مستويات الـ BNP.

الرجاء مراجعة دليل "الصورة الصوتية للقلب" للمزيد من المعلومات.

# كيف أتعامل مع قصور القلب؟

لا تعني الإصابة بقصور القلب أنك لن تتمكن من التمتع بحياتك والقيام بوظائفك الاعتيادية، بل تعني أنه عليك إدخال بعض التعديلات إلى أسلوب حياتك بما يناسب حاجات قلبك. بإمكانك اتباع طرق عديدة لتحسين أداء قلبك وصحتك.

أنت صاحب الدور الأساسي في مواجهة قصور القلب والتكيف مع حالتك.

أ. حدّ من كمية السوائل التي تتناولها بحسب تعليمات الطبيب.

ب. إتبع نظاماً غذائياً صحياً مناسباً لوضع قلبك.

ج. تناول أدويةك كلها وبشكل يومي ملتزماً بتعليمات الطبيب.

د. راقب وزنك يومياً.

هـ. راقب ضغط الدم ومعدّل ضربات القلب.

و. توقّف عن التدخين.

ز. حافظ على حركتك الجسدية.

ح. خذ اللقاح السنوي.

أ. حدّ من كمية السوائل التي تتناولها

يجعل قصور القلب الكلى تحبس الماء والصوديوم، ما يؤدي إلى تزايد نسبة السوائل في جسمك. لذا، وبحسب درجة قصور القلب، يحدّ الطبيب من كمية السوائل التي بإمكانك تناولها. دوّن عدد الأكواب المسموح به يومياً، ولا تتجاوز الكمية القصوى. تذكر أن السوائل تشمل:

- ماء
- مكعبات الثلج
- شاي
- قهوة
- كحول
- مرطبات
- حليب
- بودينغ
- لبن
- مثلجات
- جيلو (هلام)
- حساء
- صلصات
- عصائر
- فاكهة كالبرتقال
- والبطيخ وغيرها
- خضار كالخيار
- والخس والطماطم
- وغيرها



إنتبه لكمية السوائل التي تشربها. مثلاً: يمكنك إحضار كوب عادي، والحرص على شرب ..... كوب/أكواب في اليوم فقط.

### ب. إتبع نظاماً غذائياً صحياً مناسباً لوضع قلبك

1. يُعتبر التخفيف من تناول الملح (الصوديوم) مهماً للتعامل مع قصور القلب. إن الصوديوم يجعل الجسم يحبس المزيد من الماء، ما يسبب تورم الساقين، وقد يجعل السوائل تتسرب إلى الرئتين. وبالتالي، يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر ليتمكن من ضخ الدم في الجسم. حاول أن تحد من كمية الصوديوم التي تتناولها. تذكر أن كل ملعقة صغيرة من الملح تساوي 2400 ميليغرام من الصوديوم.

#### إتخذ التدابير التالية للتخفيف

##### من الصوديوم:

- تخلّص من المملحة.
- إشتري اللحوم والدجاج والسمك والخضار الطازجة أو المجمدة.
- إبتعد عن الأغذية المعلّبة. ولدي استخدام المعلّبات من خضار أو زيتون أو حبوب، إغسلها بالماء جيداً قبل الاستعمال.
- إقرأ جميع الملصقات على علب المواد الغذائية للتحقق من كمية الصوديوم الموجودة فيها.
- تجنّب الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، مثل:
  - المعلّبات
  - الجبنة المطبوخة أو القابلة للدهن
  - البطاطا المملحة
  - صلصة البندورة وعصائر الخضار
  - الكبيس والزيتون
  - صلصة الصويا (العادية أو الخفيفة)
  - صلصات السلطة
  - اللحوم الباردة
  - المكسرات المملّحة والمحمّصة

حد من كمية  
الصوديوم التي  
تتناولها إلى  
..... غرام  
يوميّاً كحد أقصى.

#### حقائق غذائية (لكل 150 غرام)

| السعرات الحرارية 190   | السعرات الحرارية من الدهون 90 |
|------------------------|-------------------------------|
| مجموع الدهون 10 غرام   | 15%                           |
| الدهون المشبعة 2 غرام  | 10%                           |
| صوديوم 65 ميليغرام     | 3%                            |
| كوليستيرول 80 ميليغرام | 26%                           |
| كربوهيدرات 0 غرام      | 0%                            |
| بروتين 23 غرام         | 23%                           |

- إختار الأطعمة التي تحتوي على كمية قليلة من الصوديوم عند شراء البقالة من السوبرماركت مثل المكسرات والجبنة والزبدة واللبننة.
- أضف النكهات التي من شأنها أن تحسّن مذاق طعامك بدلاً من الملح. ومن ضمن هذه النكهات: التوابل، الأعشاب، الخل، عصير الليمون الحامض، الثوم وغيرها.

2. يُسمح بالكافيين باعتدال في حالة القصور القلبي. يجب الحد من كمية الكافيين إلى فنجان أو اثنين في اليوم. تذكر أن مادة الكافيين موجودة في القهوة، الشاي، مرطبات الكولا، الممتّة، الشوكولا وبعض المكسرات.
3. تحقق من الطبيب عن كمية الكحول المسموح لك بتناولها.

### ج. تناول أدويةك

- سيعطيك طبيبك الأدوية اللازمة لتحسين وظيفة قلبك وضبط القصور القلبي ومراقبته، كما سيصف لك أدوية أخرى لمعالجة الأعراض.
- احرص على أخذ الأدوية كاملة وفقاً لوصفة الطبيب.
  - تناول الأدوية في الوقت نفسه يومياً.
  - لا تلغ أي جرعة دواء أو تتناول جرعة إضافية بقرار منك.
  - في حال نسيت أخذ الجرعة، لا تعوّض عنها عبر تناول جرعتين متتاليتين في الوقت نفسه.
  - لا تتوقف عن تناول أي دواء من تلقاء نفسك، حتى وإن شعرت بتحسن وبأنك لست بحاجة للدواء. في حال شعرت بأعراض جانبية بسبب الدواء، إشتش الطبيب قبل إيقافه.
  - لا تأخذ أي دواء إضافي، حتى وإن كان عبارة عن فيتامين أو مسكن للألم، من دون أن تستشير طبيبك.

تشمل الأدوية الرئيسية التي توصف لحالة القصور القلبي الأنواع التالية:

- **دواء مثبط للإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE inhibitor):**  
هو دواء يريح الأوعية الدموية ويسهل على القلب عملية الضخ، كما يخفّض ضغط الدم ويحمي الكليتين. تتضمن الأعراض الجانبية لهذا الدواء: ضعف القوى، ألم في الرأس، دوار، وسعال جاف. من المهم مراقبة مستويات البوتاسيوم في الجسم عند تناول هذا الدواء إذ قد يتسبب بارتفاعها.
- **حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARB):**  
هو دواء يريح الأوعية الدموية ويخفّض ضغط الدم مما يسهل على القلب عملية ضخ الدم إلى الجسم ويخفف من إجهاد القلب. تتضمن الأعراض الجانبية لهذا الدواء: انخفاض ضغط الدم والدوار. من المهم مراقبة مستويات البوتاسيوم في الجسم عند تناول هذا الدواء إذ قد يتسبب بارتفاعها.
- **حاصرات مستقبلات انجيوتنسين ومثبطات نبريليسين (Angiotensin Receptor-Nepirylsin Inhibitor):**  
هو دواء جديد يريح الأوعية الدموية كما يحسّن إزالة السوائل والأملاح عبر الكليتين. تتضمن الأعراض الجانبية المحتملة لهذا الدواء: انخفاض الدم والدوار. من المهم مراقبة مستويات البوتاسيوم في الجسم عند تناول هذا الدواء إذ قد يتسبب بارتفاعها. هذا الدواء هو خيار علاجي لبعض المرضى الذين ما زالوا يعانون من الأعراض حتى لو أخذوا العلاج الأمثل. إسأل طبيبك إذا كنت مؤهلاً لتناوله.

- مضادات مستقبلات بيتا (Beta Blocker):  
يحمي هذا الدواء القلب ويحسن وظيفته، كما وقد يخفّض ضغط الدم ويبطئ نبضات قلبك. ومن الأعراض الجانبية لهذا الدواء: دوار، تعب، ضيق في النفس، وضعف جنسي.
- مثبط العقدة الجيبية (Sinus Node Inhibitor):  
يقلل مثبط العقدة الجيبية الأنفية من معدل ضربات القلب ومن إجهاد القلب. تشمل الآثار الجانبية المحتملة رؤية الأضواء الساطعة (تُعرف بالظواهر المضئية).
- مدرّ البول:  
يُستخدم لإزالة السوائل الزائدة في الجسم. ويساعد على تخفيف الورم (الوذمة) وبالتالي التخفيف من إجهاد القلب. ومن الأعراض الجانبية لهذا الدواء: دوار، تشنّج في عضل الساق، وضعف القوى. إستشر طبيبك حول حاجتك إلى تناول إضافات البوتاسيوم.
- ملاحظة: لا تزد كمية السوائل التي تتناولها في حال أخذ مدرّ البول.

#### د. راقب وزنك يومياً

- يُعتبر قياس الوزن من أفضل الطرق لمتابعة قصور القلب، بحيث يبيّن لك وزنك ما إذا كنت تحتبس كمية إضافية من السوائل في جسمك.
- تحقق من وزنك كل صباح فور استيقاظك من النوم.
- إحرص على قياس وزنك بعد التبوّل وقبل الاستحمام وقبل تناول الطعام أو الشراب.
- قم بقياس وزنك مرتدياً الملابس نفسها وبعد خلع الحذاء.
- قم بتسجيل وزنك يومياً وأحضر الورقة معك في كل موعد مع الطبيب.
- إتصل بطبيبك في حال زيادة وزنك ما بين 1.5 و 2 كلغ في غضون يومين.



#### ه. راقب ضغط الدم ومعدّل ضربات القلب

- يبيّن ضغط الدم كمية الضغط في الشرايين مع كل دقة قلب. ويسجّل برقمين، مثال: 70/120. يشير الرقم الأول إلى الضغط الانقباضي، أي إنه الضغط في الشرايين عند انقباض القلب. أما الرقم الثاني، فيشير إلى الضغط الانبساطي أي الضغط في الشرايين عند ارتخاء القلب بين نبضتين.
- يقيس معدّل ضربات القلب وتيرة خفقان القلب.

**نصيحة:** قم بقياس ضغطك بواسطة آلة يدوية أو إلكترونية. في الإجمال، لا يُنصح باستخدام آلة قياس الضغط التي تقيس ضغط الدم عند المعصم أو الإصبع.



راقب ضغط الدم ومعدّل ضربات القلب جيداً ورتّبها ضمن جدول بشكل يومي. تحقق من طبيبك عن المعدل الطبيعي لديك لكل من ضغط الدم ومعدّل ضربات القلب.

#### و. توقّف عن التدخين

يزيد التدخين من جهد القلب والرئتين ويتعبهما. تسبب جميع منتجات التبغ ضيقاً في الشرايين وانخفاضاً في كمية الدم التي تصل إلى عضلة القلب، الأمر الذي يجهدّه. وفي حالة قصور القلب، يكون هذا الوضع بالغ الخطورة. بعد التوقف عن التدخين، يتدنى خطر إصابتك بمرض قلبي فوراً. عليك التوقف عن تدخين السجائر والرجيلة أيضاً.

بإمكانك استشارة برنامج التوقف عن التدخين في مركزنا الطبي لمساعدتك على التوقف. الرجاء الإتصال على 350000 - 01، رقم داخلي 8030.



#### ز. حافظ على حركتك الجسدية

من الضروري جداً لمريض القصور القلبي أن يبقى نشيطاً ويحافظ على الحركة الجسدية. عليك:

- السماح لنفسك باستراحات قصيرة خلال اليوم.
- عدم الانتظار حتى انقطاع النفس والإنهاك من أجل التوقف والاستراحة.
- ترك فسحة زمنية بين الأنشطة خلال اليوم.
- الاستراحة بعد كل نشاط أو تمرين.

لا تعني إصابتك بقصور القلب أنك ستتوقف عن النشاط الجنسي، بل بإمكانك متابعته. للمزيد من المعلومات، إستشر طبيبك.

#### ح. خذ اللقاح السنوي

إن الإصابة بالتهاب أو مرض يتعب القلب وقد يتسبب بتدهور حالتك. لذا يوصى بأخذ لقاح المكورات الرئوية (pneumococcal vaccine). كما يُنصح بأخذ طعم الإنفلونزا بشكل سنوي. إستفسر من طبيبك عن التطعيم الواجب إتمامه.

تحقق من طبيبك إذا كنت مؤهلاً لإدخال أجهزة صغيرة في جسمك تنظم إيقاع القلب أو تساعد القلب على ضخ المزيد من الدم إلى الجسم. تشمل هذه الأجهزة:

- علاج إعادة مزامنة القلب (cardiac resynchronization therapy)
- مزيل الرجفان (Implantable cardioverter defibrillator)
- الجهاز المساعد للبطين الأيسر (Left ventricular assist device).

الرجاء مراجعة دليل "الجهاز المساعد للبطين الأيسر" للمزيد من المعلومات.

## متى يجب الإتصال بالطبيب لطلب المساعدة؟

### إتصل بالطبيب في حال:

- شعرت بضيق في النفس يتفاقم أكثر فأكثر ولا يزول عند الاستراحة
- إزداد وزنك بوتيرة سريعة: 1 إلى 2 كلغ في يوم واحد، أو 2 إلى 3 كلغ في 5 أيام فقط
- إزداد التورّم في ساقيك أكثر من السابق
- شعرت بالتعب الدائم وعجزت عن القيام بالأنشطة الاعتيادية
- إزداد السعال أو أصبحت تعاني سعالاً قوياً في الليل

**نصيحة:** لا تنتظر تفاقم أعراضك لكي تتصل بالطبيب.

### أطلب المساعدة الفورية أو توجّه إلى غرفة الطوارئ في حال:

- لديك دقات قلب متسارعة أو غير منتظمة (تشعر وكأن فراشة ترفرف في صدرك)
- لديك ألم في الصدر يدوم 10 دقائق على الأقل
- لديك ضيق حاد في النفس عند الراحة
- شعرت بدوار أو بتشوش في الرؤية أو غبتَ عن الوعي

يحتوي هذا المستند على معلومات عامة لا تشكّل نصائح طبية بأي شكل من الأشكال. إستشر المسؤول عن رعايتك الصحية لمعرفة ما إذا كانت المعلومات الواردة هنا تنطبق عليك.