


Dietitian
Leen Osama



التغذية و أمراض القولون

لين أسامة عبد الكريم

أخصائية التغذية السريرية ومثقة مرضى السكري
مؤلفة كتاب لست تفاحة ومدربة لياقة بدنية



@LeenOsama1



@Leen_osama

Dietitian
Leen Osama



أتمنى لك قراءة ممتعة في الكتيب وأن يتم الله عليك بالصحة والعافية تذكر
هذا الكتيب لا يغني أبدا عن استشارة أخصائي التغذية السريرية المشرف
عليك ولا عن متابعة فريقك الطبي.

وأشكر لك حفاظك على حقوق الكتيب وعدم استخدامه بأي شكل كان حيث
أن جميع الحقوق محفوظة تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية في
الدنيا والمحاسبة الدينية في الآخرة. للتواصل على الايميل:

Leenosama93@hotmail.com

تشرفني وتسعدني متابعتك على وسائل التواصل التابعة لي شخصيا



@LeenOsama1



@Leen_osama



Leen.Osama.7

وسائل التواصل المشتركة مع الأخصائية مشاعل الكربي لكتابنا كتاب
لست تفاحة



@Notanapple11



thedietitian1



NotAn Apple



+966591389645



The Dietitians



@LeenOsama1



@Leen_osama

نبذة عن الأخصائية لين عبد الكريم

بكالوريوس تغذية سريرية.

خريجة جامعة الملك سعود ٢٠١٥ م.

خبرة تزيد عن ٤ سنوات عمل في التغذية
السريية.

مؤلفة كتاب (لستُ تفاحة).

حاصلة على شهادة مثقفة للمصابين بالسكري من المركز السكري
التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي ٢٠١٨ م.

حاصلة على شهادة مهارات تدريب المدربين ٢٠٢٠ م.

مدربة لياقة بدنية معتمدة.



@LeenOsama1



@Leen_osama



كتاب لست تفاحة

كتاب باللغة العربية موجه لجميع شرائح المجتمع من
مختصين وغير مختصين بأسلوب علمي سهل لتكون
مصدرك الموثوق على شكل سؤال وجواب



<https://notanapple-sa.com/>



نصائح لقولون وجهاز هضمي صحي (للشخص السليم) يمكن للنظام الصحي المساهمة في الحد من اضطرابات القولون

- احرص على تناول الألياف بنظامك الغذائي ما لم يتم توصيتك بخلاف ذلك، بحال عدم تناولك للألياف بشكل دائم من المهم أن يتم إدخالها للنظام الغذائي تدريجياً لتقبلها بشكل أفضل. (أبرز مصادر الألياف بالنظام الغذائي: الخضار، الفواكه، الحبوب الكاملة).
- الاعتدال في تناول الدهون حيث أن الدهون العالية والأطعمة المقلية قد تهيج الجهاز الهضمي عند البعض.
- اعتدل في تناول اللحوم الحمراء وتجنب تناول اللحوم المصنعة مثل النقانق والمرديلا.
- اعتدل في تناول الكافيين (الشاي والقهوة) ولا بأس بتناول بعض المشروبات العشبية حيث قد تفيد البعض لراحة هضمية أفضل مثل النعناع، الينسون، الكمون، الشومر).
- عند تناولك للبقوليات جرب نقعها بالماء في الليلة السابقة للطهي وتغيير الماء عنها كل ساعتين إلى ثلاث ساعات للتخلص من المادة المسببة للنفخة.
- راقب طعامك، عند أي نوع من الأطعمة أو المشروبات تشعر بعدم الارتياح وناقشه مع أخصائي التغذية العلاجية لتزويدك بالبدائل وإرشادك.
- اشرب كمية كافية من الماء وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات العالية بالسكريات.
- امضغ طعامك بتأني وتجنب بلع الهواء، تجنب الشرب بالمصاص أو تناول العلك.
- كن نشطاً بدنياً ومارس الرياضة بانتظام حيث أن الحركة تقلل من التوتر وتحسن الحالة النفسية.
- تجنب التدخين والمشروبات الكحولية (عدا عن كونها محرمة).



القولون العصبي

IBS (Irritable bowel syndrome)

- احرص على تجنب التوتر والقلق ومارس التأمل و كن نشط بدنيا ومارس الرياضة بانتظام حيث أن الحركة تقلل من التوتر وتحسن الحالة النفسية.
- لا تتجاهل رغبة دخول دورة المياه بشكل طبيعي.
- نظم ساعات نومك في الليل.
- تجنب التدخين والمشروبات الكحولية (عدا عن كونها محرمة).
- اشرب كمية كافية من الماء وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات العالية بالسكريات، تجنب المشروبات المحتوية على كافيين أيضا.
- امضغ طعامك بتأني وتجنب بلع الهواء، تجنب الشرب بالمصاص أو تناول العلك.
- تجنب تناول المليينات بدون استشارة طبية واتبع إرشادات النظام الغذائي للوقاية من الإمساك.
- نظم وجباتك خلال اليوم بمواعيد ثابتة ولا تتجاوز اوقات تناول وجباتك (من الأفضل تناول وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم).
- قم بوضع دفتر أو مذكرة لمراقبة طعامك وتسجيل متى تظهر الأعراض لديك، تذكر قد لا تظهر الأعراض مباشرة قد تظهر في اليوم التالي، وناقشه مع أخصائي التغذية وطبيب الجهاز الهضمي.
- لا تستعجل النتائج أعطي نفسك وقتا لترى نتيجة التغييرات في نظامك الغذائي.



القولون العصبي (تابع) IBS (Irritable bowel syndrome)

• ما هو النظام الغذائي الصحي للحد من إصابة القولون العصبي؟

سبب الإصابة بالقولون العصبي غير معروف قد يكون بسبب اختلاف تعامل جهاز المناعة من جسم إلى آخر، ضغوطات الحياة، أو اختلاف تحسس القولون من جسم لآخر، أو التغيرات الهرمونية. أيضا قد يكون بسبب سوء العادات الغذائية مثل تناول الأطعمة الدهنية بكثرة، وقلة تناول الأطعمة العالية بالألياف الغذائية، أو عدم تناول وجبات الطعام بانتظام. نوصي دائما كمختصين بضرورة تناول الطعام الصحي المتوازن.

• هل ينصح بالعلاج بالأعشاب الطبيعية للمصابين بالقولون العصبي؟

علاج القولون العصبي يختلف من شخص لآخر بناء على الأعراض التي يصاب بها الشخص وبناء على استجابة جسمه للطعام فمثلا قد ينزعج البعض من تناولهم للنعناع أو الزنجبيل مسببا مشاكل لهم والبعض قد يساعدهم بتقليل الغازات وتقليل الآلام المصاحبة للتهيج.

قد تساعد بعض الأعشاب المصابين مثل الكمون واليانسون والنعناع والزنجبيل والشمر والبابونج ولكن ينبغي مناقشتها مع الطبيب ومختص التغذية العلاجية حسب الأعراض التي يعاني منها المريض ولتجنب التعرض لتعارض الأدوية مع الأعشاب بحال استخدام المريض لأدوية معينة.




تذكر أن تستشير فريقك الطبي دائما
وتناقشهم بالأسباب والعلاج



القولون العصبي (تابع) IBS (Irritable bowel syndrome)

ما هي الأغذية المهيجة للقولون؟

- تختلف الأغذية المهيجة للقولون من شخص لآخر.
- يجب على المصاب مراقبة أي نوع من الطعام يسبب له الأعراض.
- لكن بشكل عام الأطعمة المحتوية على كثير من البهارات والفلفل الحار، الأطعمة الدسمة والدهون، الحلويات والأطعمة المصنعة، الأغذية المسببة للغازات مثل البصل والثوم والكرنب وبعض البقوليات والقرنبيط، بعض منتجات الحليب، والمشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي.
- من المهم اتباع نظام غذائي صحي، وشرب الماء بكميات كافية، تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم، وإدخال الألياف تدريجياً إلى النظام الغذائي.





القولون العصبي (تابع) IBS (Irritable bowel syndrome)

التغلب على أعراض النفخة والغازات

- قم بتحديد كمية الفواكه لـ 3 حصص من الفواكه يوميا بما لا يزيد منها عن حصة واحدة من الفواكه المجففة، وبحال تناولك للعصير ما لا يزيد عن كوب صغير من عصير الفواكه.
- قم بالحد من تناول الأطعمة المحتوية على النشاء المقاوم مثل: البقوليات والحبوب الكاملة والذرة الحلوة والموز و النخالة. البطاطس أو الذرة غير المطبوخة جيداً بدلاً من ذلك تناولها مطهية طازجة. الخبز المخبوز جزئياً والمعاد تسخينه ، مثل خبز الثوم ، وقاعدة البيتزا - اختر الخبز الطازج. الأطعمة المصنعة والأطعمة الجاهزة مثل سلطة البطاطس أو المكرونة أو البسكويت والكيك المصنع. المكرونة المجففة - استخدم المكرونة الطازجة بدلاً منها.
- قد يساعد الشوفان وبذور الكتان في التغلب على النفخة والغازات عند بعض الأشخاص.
- تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتك فأیضا قد تساعد على التغلب على النفخة والغازات مثل الزبادي والفطر الهندي أو الكفير والأغذية المخمرة مثل: المخللات، الميسو، الكيمتشي.



القولون العصبي (تابع) IBS (Irritable bowel syndrome)

التعامل مع الإسهال

- شرب الماء والسوائل غير المحتوية على كافيين أو سكريات بكميات كافية كما تتم توصيتك من الفريق الطبي لتجنب الجفاف.
 - تجنب تناول المشروبات الغازية.
 - قم بالحد من تناول الألياف غير الذائبة في الماء مثل: النخالة، المكسرات، الحبوب الكاملة، قشور وبذور الفواكه والخضار. رابط المقطع بالأسفل يوضح الفرق بين الألياف الذائبة في الماء وغير الذائبة
- <https://youtu.be/eDTSVpVTa3c>
- تجنب أغذية الحمية خالية السكر (حيث بعضها تحتوي على محليات كحولية تزيد من الإسهال سوءاً)
 - قلل من كمية الأطعمة والمشروبات المحتوية على السكريات مثل اللاكتوز والفركتوز ومشروب الذرة عالي التركيز.
 - تجنب الأطعمة العالية بالدهون والمحتوية على بهارات حارة.
 - أنظر الصفحتين القادمة للأطعمة المسموحة والممنوعة خلال الإسهال.
 - أيضاً هذا المقطع قد يفيدك عن التعامل مع الإسهال

<https://youtu.be/NSHpE5Qr6hA>



القولون العصبي (تابع) IBS (Irritable bowel syndrome)

تابع التعامل مع الإسهال (الأطعمة المسموحة)
ملاحظة: هذا الجدول المقترح مناسب لأغلب الأشخاص ، ولكن بحال عدم مناسبة بعض الأطعمة لحالتك الصحية لا تتناولها إلى أن تتعافى.

ملاحظات	خيارات الأطعمة	مجموعة الطعام
- إذا كنت تعاني من متلازمة عدم تحمل اللاكتوز، فإن تناولك منتجات الحليب سيزيد من مشكلة الإسهال فالخيار المناسب لك هو تناول منتجات خالية من اللاكتوز. - تجنب الزبادي المحتوي على مكسرات أو قطع فواكه.	لبن. حليب مركز منزوع أو قليل الدسم. حليب الصويا. زبادي مدعم ببكتيريا نافعة مثل أكتيفيا. حليب بودرة. الأجبان.	الحليب ومنتجاته
احرص على قراءة البطاقة الغذائية واختر المحتوية على 2 جم ألياف لكل حصة غذائية.	الدقيق الأبيض. الخبز، البيجال، الكراكرز، والباستا أو المكرونة المصنعين من دقيق أبيض. حبوب الإفطار المصنعة من دقيق أبيض.	الحبوب
أنظر للجدول التالي للأطعمة الممنوعة.	عصير الفواكه بدون لب. موز شديد الاستواء. فواكه معلبة. بطاطس بدون قشر. خس. عصير خضار مصفى.	الخضار والفواكه
_____	اللحوم اللينة المطبوخة جيدا، الأسماك، الدجاج، البيض، أو الصويا المطبوخة بدون إضافة الدهون. زبدة الفول السوداني الناعمة.	البروتينات
قد تحتاج لشرب كمية أكثر من الماء لتعويض كمية السوائل المفقودة.	قهوة منزوعة الكافيين. شاي منزوع الكافيين. مشروبات معدنية.	المشروبات
حدد كمية الدهون المتناولة والمضافة للطعام بأن لا تتجاوز 8 ملاعق شاي صغيرة باليوم.	الزيت النباتي.	الدهون



القولون العصبي (تابع) IBS (Irritable bowel syndrome)

تابع التعامل مع الإسهال (الأطعمة الممنوعة)

مجموعة الطعام	خيارات الأطعمة
الحليب ومنتجاته	الحليب كامل الدسم، القير، القشطة، المتلجات كاملة الدسم. الزبادي المحتوي على مكسرات أو فواكه.
الفواكه	جميع الفواكه الطازجة ما عدا الموز والشمام، الفواكه المجففة، عصير الفواكه المحتوي على لب، الفواكه المعلبة بتركيز شراب عالي، أي منتجات فواكه تحتوي على السوربيتول. عصير البخارى (أو القراصيا).
الحبوب	الخبز البر أو خبز الحبوب الكاملة، الشعير، الشوفان، الرز البني، والحبوب الكاملة. حبوب الإفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة، الباستا أو المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة. الفشار.
البروتينات	اللحوم المقلية، الدجاج المقلي، أو السمك المقلي، لحوم اللانشون أو السلامي، النقانق، اللحوم المحتوية على شحوم، المكسرات، زبدة الفول السوداني الخشنة.
الخضار	جميع الخضار الطازجة ما عدا الخس، الخضار المقلية، الشمندر، البروكولي، الملفوف أو الكرنب، القرنبيط أو الزهرة، اللفت، الخردل، الذرة، قشور البطاطا.
المشروبات	المشروبات الكحولية، المشروبات المحتوية على كافيين مثل الشاي والقهوة. تحديد كمية المشروبات المتناولة المحتوية على نسبة عالية من الفركتوز وشراب الذرة.
الدهون	حدد كمية الدهون المتناولة والمضافة للطعام بأن لا تتجاوز 8 ملاعق شاي صغيرة باليوم.
أخرى	السكريات الكحولية مثل: السوربيتول، زايليتول، العسل.



القولون العصبي (تابع) IBS (Irritable bowel syndrome)

التعامل مع الإمساك

- تناول كمية كافية من الماء كما تتم توصيتك للمساهمة في إخراج الفضلات بالشكل الصحيح.
- تناول الألياف غير الذائبة في نظامك لكن قد تزيد لديك الغازات بسببها وهذا طبيعي، تتواجد في النخالة والحبوب الكاملة وقشور وبذور الفواكه والخضار. رابط المقطع بالأسفل يوضح الفرق بين الألياف الذائبة في الماء وغير الذائبة
- <https://youtu.be/eDTSVpVTa3c>
- من المهم عند تناول الألياف بحال عدم تضمينها بنظامك بشكل كبير أن تتناولها تدريجيا حتى لو كنت تعاني حاليا من الإمساك كي لا تزداد الحالة سوءا عندك، الطريقة الصحيحة أن تزيد حصة غذائية من الأطعمة العالية في الألياف لنظامك كل يومين.
- مارس الرياضة بشكل منتظم وكن نشط بدنيا.
- اذهب لدورة المياه بشكل منتظم ، لا تتجاهل حاجة جسمك بالذهاب لدورة المياه.
- استخدم وضعية صحيحة عند جلوسك لإخراج الفضلات.
- قم بعمل مساج لمنطقة البطن باتجاه عقارب الساعة مع ضغط بسيط ولطيف على منطقة البطن.





فكرة حمية قليلة الفود ماب Low FODMAP diet

- هو اختصار لأول حرف من عدة أنواع من الكربوهيدرات، حمية فود ماب ليست حمية قليلة الكربوهيدرات.
- يقلل الشخص من أنواع كربوهيدرات معينة سواء كانت أحادية السكر، ثنائية السكر أو عديدة السكر. لأنها تتخمر بسرعة بواسطة بكتيريا في الأمعاء الغليظة مسببة غازات، ألم وكذلك إسهال عند بعض الأشخاص.
- لا تسبب هذه الأطعمة مشاكل لمعظم المصابين بمشاكل الجهاز الهضمي إلا إذا تناولوها بكميات كبيرة، لكن يتحسس البعض منها ولو تم تناولها بكمية بسيطة.
- اقطع جميع الأطعمة التي تحتوي على السكريات الممنوعة لمدة ٦ - ٨ أسابيع؛ إن لم تتحسن الأعراض. (تكلنا بالتفصيل عنها في كتاب **لست تفاحة**).

FODMAP= Fermentable Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide, and Polyols.

قد تساعدك حمية قليلة (فود ماب) إذا كنت تعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي مثل التهاب القولون العصبي، الغازات والانتفاخات.

هذه المعلومات مقتبسة
من كتاب **لست تفاحة**

يمكنك الاطلاع على معلومات عن
الكتاب على الرابط

https://youtu.be/p_GWxzAChYQ



@LeenOsama1



@Leen_osama



أمراض التهاب الأمعاء المزمن (التهاب القولون التقرحي وداء كرونز)

- قد لا تستطيع تناول وهضم جميع أنواع الأطعمة.
- تحتاج إلى اهتمام أكثر بزيادة السرعات الحرارية أو تدعيم الفيتامينات كما تتم توصيتك واستشر أخصائي التغذية السريرية المشرف عليك دوماً عند ظهور أي من المشاكل التغذوية
- تناول وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم (وجبة كل 3 إلى 4 ساعات).
- عند وجود أعراض في الجهاز الهضمي التزم بالأغذية بقائمة المسموح التالي ذكرها.
- حتى عند تناولك للطعام المسموح راقب نفسك بحال وجود إسهال، استفراغ، ألم في المعدة. توقف عن تناول الطعام المسبب للمشكلة وعاود استخدامه في يوم آخر.
- تناول السوائل والماء خاصة كما تتم توصيتك لتجنب التعرض للجفاف.
- تناول الأغذية المدعمة بالخمائر النافعة (اسأل أخصائي التغذية المشرف عليك)
- تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية كما تتم توصيتك من قبل الطبيب وأخصائي التغذية العلاجية.
- عند عدم وجود أعراض واستقرار حالتك دعم غذائك بالأغذية العالية بالألياف مثل منتجات الحبوب الكاملة، الخبز المصنوع من الدقيق الكامل، الخضار والفواكه بأنواعها.
- ملاحظة: جرب نوع واحد من الطعام وبكمية بسيطة وراقب نفسك بحال ظهور أعراض توقف عن تناول الطعام المسبب للأعراض.



أمراض التهاب الأمعاء المزمن (تابع) (التهاب القولون التقرحي وداء كرونز)

الأغذية التالية ينصح بتناولها بحال وجود إسهال أو آلام بالمعدة
لدى مرضى التهاب الأمعاء المزمن

المجموعة الغذائية	المسموح	ملاحظات
منتجات الحليب	منتجات الحليب قليلة أو خالية الدسم (حليب، لبن، زبادي، جبن)	اختر منتجات الحليب خالية اللاكتوز إذا كنت تعاني من الأعراض التالية بعد تناول الحليب (الغازات والنفخة، الغثيان، الإسهال، ألم المعدة)
البروتين	اللحم الطري المطبوخ جيدا، البيض، الأسماك، الدجاج، زبدة الفول السوداني الناعمة	تكون مطبوخة بطريقة صحية بدون إضافة دهون وتكون طرية وسهلة التناول
الكربوهيدرات	الخبز، البسكويت، المعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض أو المكرر، الأرز الأبيض، الأرز الابيض-جميع المعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض، البسكويت.	اختر مصادر الكربوهيدرات المحتوية على أقل من 2 جرام ألياف في الحصة الواحدة (اقرأ الملصق الغذائي دائما)
الخضار	الخضار المطهية جيدا يجب أن تكون بدون بذور أو قشور، عصائر الخضار المصفاة جيدا	انظر لقائمة الأطعمة الممنوعة لتجنبها خلال فترة وجود الأعراض
الفواكه	الموز شديد الاستواء، الشمام، التفاح المقشر، أغلب الفواكه المعلبة والمقشرة. عصائر الفواكه المصفاة من البذور (ما عدا عصير البرقوق أو البخاري)	اختر الفاكهة المعلبة في العصير أو عصير مخفف. يحتوي الشراب أو العصير المركز على الكثير من السكر، مما قد يجعل الإسهال أسوأ. انظر لقائمة الأطعمة الممنوعة لتجنبها خلال فترة وجود الأعراض.
الدهون	-----	قلل تناول الدهون والزيوت إلى أقل من 8 ملاعق شاي صغيرة يوميا
السوائل	الماء، القهوة منزوعة الكافيين، الشاي منزوع الكافيين	السكر وشراب الفركتوز يجعل الإسهال أسوأ تجن إضافتهم لمشروباتك. أيضا عصائر الفواكه بكميات عالية قد تزيد من الإسهال.



أمراض التهاب الأمعاء المزمن (تابع) (التهاب القولون التقرحي وداء كرونز)

الأغذية التالية ينصح بتجنبها بحال وجود إسهال أو آلام بالمعدة لدى مرضى التهاب الأمعاء المزمن

المجموعة الغذائية	الممنوع
منتجات الحليب	الزبادي أو اللبن المنكه بالفراولة أو التوت أو الليمون أو البرتقال أو يحتوي على مكسرات، منتجات الحليب كاملة الدسم، القشطة، كريمة الطبخ، المتلجات (ماعدا إذا كانت قليلة السكر والدهون)
البروتين	اللحوم المقلية بجميع أشكالها بما فيها النقانق، اللحوم الباردة مثل اللانشون، السلامي، اللحوم القاسية وصعبة المضغ، البيض المقلي، المكسرات، زبدة الفول السوداني الخشنة، البقوليات بجميع أنواعها (البازلاء، الفول، العدس، الفاصولياء البيضاء والحمراء)
الكربوهيدرات	الحبوب الكاملة والمخبوزات المصنعة منها، الأرز البني والأحمر، أي معجنات أو خبز أو مخبوزات مصنعة من دقيق حبوب كاملة و/أو تحتوي على مكسرات أو بذور
الخضار	البنجر أو الشمندر، البروكلي، براعم بروسلي، الملفوف والمخلل، القرنبيط، الذرة، الخردل، اللفت، الكرنب، الفاصولياء، الفطر، البامية، البصل، الجزر الأبيض، الفلفل، قشر البطاطس، السبانخ، القرع.
الفواكه	جميع الفواكه النية (باستثناء التفاح المقشر والموز والشمام). التوت المعلب، والكرز المعلب، الفواكه المجففة، بما في ذلك الزبيب، عصير البرقوق.
السوائل	المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية وبعض المشروبات الرياضية، المشروبات الكحولية. تجنب عصائر الفاكهة المحتوية على سكريات والمشروبات الغازية أو المشروبات الأخرى المصنوعة من السكر أو شراب الذرة حيث أنها تجعل الإسهال أسوأ.
أخرى	تسبب بعض أنواع السكر (السوربيتول، المانيتول، إكسيليتول) الإسهال لدى بعض الأشخاص. غالبًا ما توجد هذه المكونات في العلك والحلويات الخالية من السكر، بالإضافة إلى بعض الأدوية.



التهاب الرتج Diverticulitis

يتم التدرج حسب توصيات الطبيب المعالج من الصيام طوال فترة وجود الالتهاب والنزيف والإسهال إلى رشقات الماء ثم السوائل الشفافة ثم الأكل اللين قليل الألياف ثم يتم العودة تدريجياً إلى نظام غذائي متوازن وصحي.

يبدأ النظام الغذائي لالتهاب الرتج بتناول سوائل صافية فقط لبضعة أيام. تتضمن أمثلة المشروبات المسموح بها في نظام السوائل الصافية ما يلي:

- المرق الصافي مثل مرق الدجاج أو اللحم أو مرق الخضار
- عصائر الفاكهة دون لب، مثل عصير التفاح
- رقائق الثلج
- مصاصات الثلج دون قطع الفاكهة أو لب الفاكهة
- جيلاتين
- الماء
- شاي أو قهوة بدون رغوة

يمكن أن تؤدي مواصلة النظام الغذائي المعتمد على السوائل الصافية لأكثر من بضعة أيام إلى حدوث وهن ومضاعفات أخرى، حيث إنه لا يوفر العناصر الغذائية الكافية لاحتياجات جسمك. لهذا السبب، سيطلب منك الطبيب المشرف على حالتك العودة إلى النظام الغذائي المعتاد حالما أمكنك تحمله مع إضافة الأكل العالي بالألياف تدريجياً.



التهاب الرتج Diverticulitis

مع بدء شعورك بالتحسن وبحين لم بعد يشكل الالتهاب والنزيف خطراً عليك، سيوصيك طبيبك بإضافة الأطعمة قليلة الألياف تدريجياً دون استعجال لنظامك الغذائي. من أمثلة الأطعمة قليلة الألياف:

- الفاكهة المعلبة أو المطهية دون قشراً أو بذور
- الخضراوات المعلبة أو المطهية مثل الفاصوليا الخضراء والجزر والبطاطا (دون قشر)
- البيض، والسّمك والدواجن
- الخبز الأبيض المنخول
- عصير فاكهة وخضراوات بدون لب أو بذور أو قشور
- الحبوب قليلة الألياف
- الحليب والزبادي والجبنة
- الأرز الأبيض، والمكرونّة والشعرية
- ثم يتم البدء بعلاج غذائي غني بالألياف من 6 جرام إلى 10 جرام بما يتجاوز التوصيات القياسية من 20 جم إلى 35 جم يومياً، مع الحرص على أن تكون إضافة الألياف تدريجياً إلى النظام الغذائي لضمان التقبل.
- مع الحرص على مصادر الألياف غير القابلة للذوبان.

رابط المقطع بالأسفل يوضح الفرق بين الألياف الذائبة في الماء وغير الذائبة

<https://youtu.be/eDTSVpVTa3c>

- استشر أخصائي التغذية السريرية عن مكملات الألياف إذا كان تناولك للألياف غير كافي لتوفير الألياف الكافية في نظامك الغذائي.



مقاطع تهمك من قناتنا في اليوتيوب لها علاقة في
الموضوع: (اضغط على الرابط للانتقال للمقطع)

الحليب خالي اللاكتوز:

<https://youtu.be/YmHSNRs8nTk>

إعداد حليب اللوز في المنزل:

https://youtu.be/AQn_U-Il0es

الألياف الذائبة وغير الذائبة في الماء:

<https://youtu.be/eDTSVpVTa3c>

مشكلة الإسهال:

<https://youtu.be/NSHpE5Qr6hA>

مشكلة الإمساك:

<https://youtu.be/SQfe1pyh3Uo>

معلومات عن كتاب لست تفاحة

الكتاب يحتوي على نبذة بسيطة تعريفية عن تخصص التغذية السريرية من تأليف أخصائيتنا التغذية السريرية مشاعل الكربي ولين عبدالكريم. وهو عبارة عن سؤال وجواب عن معلومات غذائية وشائعات منتشرة تتكرر باستمرار على الأخصائيتين، تم كتابتها بشكل بسيط باللغة العربية وسهل الفهم للقارئ، ويحتوي على صور ورسوم توضيحية بطريقة جذابة. حيث يستهدف الكتاب: المجتمع والمختصين و كافة الطلاب و الممارسين الصحيين. عدد الصفحات: ٣٢٨ صفحة.

تشمل أقسام الكتاب:

- تغذية الحامل
- تغذية الطفل
- السمنة وزيادة الوزن
- التغذية والضغط
- التغذية والكلية
- التغذية للمصابين السكري
- قسم الهرمونات
- قسم المنتجات الغذائية
- قسم الأسئلة المتنوعة
- قسم التغذية والرياضة
- قسم التغذية وعمليات التكميم
- قسم حساسية الطعام
- قسم الفيتامينات
- قسم المعادن



أماكن بيع الكتاب:

● متجر لست تفاحة الإلكتروني (١٠٥ ريال) عبر الرابط:

<https://notanapple-sa.com/products/112ddc67-2c06-4dcd-9887-5b616cd3c95f>

● مكتبة جرير (السعودية) (١١٥ ريال) والكويت والإمارات)

● مركز القويفل للنسخ والتصوير بالرياض (١١٥ ريال)

● قارئ جرير (نسخة إلكترونية) عبر الرابط:

<https://jarirreader.com/book/14467/>لست-تفاحة



@LeenOsama1



@Leen_osama

Dietitian
Leen Osama



قريبا كتاب عن زياد الوزن بطريقة صحية



@LeenOsama1



@Leen_osama



مصادر ومراجع:

- <https://www.rush.edu/news/eating-healthy-colon>
- <https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/nutrition/diet-colon-health>
- <https://www.mydr.com.au/gastrointestinal-health/irritable-bowel-syndrome-what-you-need-to-know>
- National Institution For Health and Clinical Excellence (NICE)
<https://www.nhs.uk/conditions/incontinence-bowel/documents/nice%20guidelines%20ibs.pdf>
- American Dietetics Association