




اخصائية التغذية العلاجية:
رهام وليد شفي


المحاور:

- ❖ امراض الكلى والنظام الغذائي واهميته
- ❖ العناصر الغذائية التي تحتاج الى تحديد كميتها في النظام الغذائي
- ❖ لمرضى غسيل الكلى
- ❖ البروتينات واهميتها لمرضى غسيل الكلى
- ❖ السوائل وكيفية السيطرة على كمياتها

وظائف الكلى:

- ❖ تنشيط انتاج كريات الدم الحمراء
- ❖ انتاج فيتامين د النشط اللازم لبناء العظام
- ❖ ترشيح الدم وتنقيته
- ❖ موازنة السوائل والمعادن في الجسم
- ❖ تنظيم ضغط الدم

- عندما تتناول الطعام الجسم يقوم بعمليات الهضم وينتج عنها مواد ضارة في الدم تقوم الكلى **بتنقية الدم** والتخلص من المواد الضارة عن طريق البول
- عندما تقل او تتوقف وظائف الكلى تتجمع هذه المواد الضارة في الدم



➤ توازن :


الأحماض (حمض اليوريك)
الفوسفور
البوتاسيوم
الصوديوم

➤ التخلص من الفضلات الايضية:

الكرياتينين
اليوريا
الماء

مراحل قصور الكلى:

تصف الخسارة التدريجية في وظائف الكلى



➤ **مرض الفشل الكلوي:** آخر مراحل قصور الكلى فيه تعجز الكلى عن أداء مهامها (إخراج المواد الضارة ، المحافظة على توازن السوائل والمعادن، إنتاج بعض الهرمونات) ، يصبح البول قليل جدا او ينحسر تماما .

➤ أنواع العلاج للفشل الكلوي المزمن:

١. زراعة الكلى
٢. الغسيل الكلوي البريتوني
٣. الغسيل الكلوي الدموي


غسيل الكلى الدموي: هو علاج يتم بشكل مستمر ومنتظم (٣-٤ مرات في الأسبوع) عن طريق جهاز خاص لتنقية الدم من الفضلات الايضية و سحب السوائل الزائدة في الجسم .



➤ لماذا يجب اتباع نظام غذائي لمرضى الغسيل الكلوي الدموي؟

- تقوم الكلى الطبيعية بترشيح الدم ٤٠٠ مرة فاليوم الواحد ، لا يمكن أن يعوّض الغسيل الدموي عن وظائف الكلى بالكامل، بل إنّّه على أقصى تقدير يقوم بـ 10 إلى 15% من وظائف الكلى الطبيعية.
- بين جلسات الغسيل ، المواد الضارة تتجمع في الدم وتعطي إحساس بالتعب والمرض ، الغثيان ، الحكة ، الصداع ، ضيق التنفس.
- في حال تم سحب كمية سوائل عالية من الممكن الإصابة بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم او تشنج في العضلات.
- **ويمكنك تقليل تكون المواد الضارة بالسيطرة على كميات الاكل الذي ينتجها.**

➤ العناصر التي تحتاج الى تحديد كميتها في نظامك الغذائي:



- النظام الغذائي يعتمد على تحديد كميات الاكل و لا يعتمد على الحرمان.

❖ البروتين:

- البروتين يساعد على بناء وإصلاح أنسجة الجسم (يساعد على التئام الجروح ويقوي الجهاز المناعي و الصحة بشكل عام)
- مرضى الغسيل الكلوي بحاجة الى كمية بروتين معتدلة لتعويض المفقود في عملية الغسيل .. لتجنب خسارة العضلات والاحساس بالهزل والضعف الجسدي بشكل عام
- البروتين يوجد في (اللحوم ، البيض ، البقوليات ، منتجات الالبان)




▪ **احتياج البروتين لمريض غسيل الكلوي الدموي =**
١,٢ جرام لكل كيلو جرام من الوزن المثالي

معادلة هماوي لحساب الوزن المثالي :

رجال = $٤٨,١ + (\text{الطول بالسنتيمتر} - ١٥٢) * ١,١$
نساء = $٤٥,٥ + (\text{الطول بالسنتيمتر} - ١٥٢) * ٠,٩$



اللحم (٣٠ جرام)	٧ جرام بروتين
الدجاج (٤/١ صدر) صدر كامل	٧ جرام بروتين ٢٨ جرام بروتين
الدجاج (٢/١ فخد) فخد كامل	٧ جرام بروتين ١٤ جرام بروتين
١ بيضه كامله ، ٢ بياض بيض	٧ جرام بروتين
جبنة بيضاء (٣٠ جرام)	٧ جرام بروتين
حليب ، لبن (نص كوب)	٤ جرام بروتين



❖ الصوديوم:

➤ زيادته: زيادة الشعور بالعطش
و يسبب احتباس السوائل في الجسم
و ارتفاع ضغط الدم.

- لا تقم بإضافة الملح في الطبخ
- ملح البحر يحتوي على نفس كمية الصوديوم الموجودة في ملح الطعام
- بدائل الملح غالبا تحتوي على البوتاسيوم بدلا من الصوديوم وهي غير مناسبة لمرضى الكلى
- قم باختيار المنكهات الغير محتوية على الصوديوم (مثل بودرة الثوم ، بودرة البصل ، الخل ، الليمون ، الكمون ، الزعتر ، اكليل الجبل ، الكاري ، القرفة)
- تجنب الكاتشب ، الخردل ، الزيتون ، المخللات ، صلصه الصويا

- قم باختيار اللحوم الطازجة بدلا من المصنعة
- قم باختيار الخضروات والفواكه الطازجة بدلا من المعلب والمجمد
- قم بشطف المأكولات المعلبة (الخضروات، الفاصوليا، الفول)






❖ البوتاسيوم:

➤ وظيفته في الجسم: يساعد القلب والعضلات الأخرى على العمل بشكل طبيعي.

➤ **زيادته : يسبب اضطرابات القلب.**

- الخضروات والفواكه غنية بالفيتامينات.
- الخضروات والفواكه تحتوي على الالياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.
- التنوع في الخضروات والفواكه ولكن بكميات معتدلة
- الحد من تناول الخضروات والفاكهة المرتفعة في البوتاسيوم.
- تناول الخضروات والفواكه الطازجة بدلا من المعلبة
- لا تشرب السائل الموجود في الخضروات والفواكه المعلبة

▪ الفواكه والخضروات المرتفعة في البوتاسيوم:



البقوليات

الخضروات الورقية
الداكنة


▪ طريقة لتقليل البوتاسيوم:

- قم بتقشير و تقطيع ثم نقع او سلق الخضروات العالية في البوتاسيوم
- لا تستخدم ماء السلق في الطبخ
- لا تعني تناول الخضروات العالية في البوتاسيوم بكمية مفتوحة.




الفسفور:

- يدخل مع الكالسيوم في بناء العظام
- زيادته:



- الشعور بالحكة



- تسارع وعدم انتظام ضربات القلب
- ترسبات الكالسيوم في الأوعية الدموية



- مشاكل في المفاصل
- ألم في العظام
- ضعف العضلات


المأكولات العالية في الفسفور :



+ البان كيك ، الوافل



المكسرات



أعضاء الحيوان: الكبد ، المخ



منتجات الالبان والاجبان



النقت، الهوت دوق



الشوكلاتة



المأكولات البحرية



المأكولات المحتوية على كريمة الطبخ



المشروبات الغازية



الأسماك ، التونة



الايسكريم المحتوي على حليب

Nutrition Facts	
8 servings per container	
Serving size	2/3 cup (55g)
Amount per serving	
Calories	230
	% Daily Value*
Total Fat 8g	10%
Saturated Fat 1g	5%
Trans Fat 0g	
Cholesterol 0mg	0%
Sodium 160mg	7%
Total Carbohydrate 37g	13%
Dietary Fiber 4g	14%
Total Sugars 12g	
Includes 10g Added Sugars	20%
Protein 3g	
Vitamin D 2mcg	10%
Calcium 260mg	20%
Iron 8mg	45%
Potassium 235mg	6%

الحصص في العلبة
حجم الحصة الواحدة

القيمة الغذائية
في الحصة
الواحدة

الصوديوم

البوتاسيوم

جدول الحقائق الغذائية:

الصوديوم (عالي)	اعلى من ١٤٠ ملي جرام
البوتاسيوم (منخفض)	اقل من ١٥٠ ملي جرام
البوتاسيوم (متوسط)	١٥٠ - ٢٥٠ ملي جرام
البوتاسيوم (عالي)	اعلى من ٢٥٠ ملي جرام
الفسفور (عالي)	١٠٠ ملي جرام

السوائل :

➤ تشمل جميع السوائل ف درجة حرارة الغرفة .. بما فيها الشورية، الشاهي، القهوة، العصيرات

➤ خطر زيادة السوائل ف الجسم؟

- الإفراط في شرب السوائل يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم خصوصا القدمين ، والرئتين مما يسبب صعوبة في التنفس.
- اجهاد القلب مما قد يؤدي الى مشاكل خطيرة في القلب
- اضطرابات في ضغط الدم

- تجنب الاكل المالح لتقليل الإحساس بالعطش
- تجنب المشروبات العالية في السكر
- في حالة الإحساس بالعطش يمكنك تناول قطعة لبان او اخذ ثلج مجروش بدلا من الماء
- الكمية المستهلكة الموصى بها لكل 24 ساعة متغيرة بحسب كمية البول التي تخرجها (١٠٠٠ مل + كمية البول)
- قم بقياس الكمية التي تتناولها باستخدام زجاجة (١ لتر يوميا)



٢٤٠ مل




٦٠ مل



١٥٠ مل



٢٤٠ مل



العصائر المنخفضة في البوتاسيوم	العصائر والمشروبات المرتفعة في البوتاسيوم
عصير التوت	عصير البرتقال
عصير التفاح	عصير الرمان
نكتار الخوخ / نكتار الكمثرى	الشاهي، القهوة

الخلاصة:

- النظام الغذائي جزء مهم من العلاج لمرضى الغسيل الكلوي للحصول على أعلى كفاءته ممكنه من العلاج.
- البروتين أهم العناصر الغذائية التي يجب الحرص على تناولها بكمية كافية لتجنب خسارة العضلات و تجنب الضعف الجسدي بشكل عام.
- ينبغي الحرص على تقليل الصوديوم لتجنب زياده احتباس السوائل و ارتفاع ضغط الدم.
- حساب كمية السوائل في اليوم لتجنب مضاعفاته ما قبل وبعد جلسة الغسيل.
- تناول الأطعمة الطازجة افضل من الاطعمة المعلبة او المصنعة والمعالجة التي قد تحتوي على نسب اعلى من الصوديوم والبوتاسيوم والفسفور.
- الحد من تناول الأغذية المرتفعة في البوتاسيوم والفسفور.

