



متلازمة القولون العصبي

نبذة مختصرة

- تعد أحد الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة (القولون).
- يمكن أن تسبب تقلصات في البطن، وتغيرًا في حركة الجهاز الهضمي كالإسهال أو الإمساك أو كلاهما.
- حتى الآن لا يوجد سبب واضح للإصابة به؛ ولكن يُعتقد أن سببه اجتماع عدة عوامل.
- يمكن التحكم بالأعراض عن طريق الأدوية والحماية الغذائية وطرق التعامل مع التوتر والقلق.
- التغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد في السيطرة على أعراض القولون العصبي.

مقدمة

■ هي حالة صحية مزمنة وشائعة تصيب الأمعاء الغليظة (القولون)، وتسبب تقلصات وانتفاخًا في البطن، بالإضافة لتغير في نمط حركة التجويف المعوي، ويمكن أن يؤثر في أي شخص في أي عمر. كما تختلف أعراضها بين المصابين بها، وتصنف ضمن اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية.

مسميات أخرى

- ▶ متلازمة القولون المتهيج
- ▶ القولون العصبي
- ▶ القولون التشنجي
- ▶ القولون
- ▶ متلازمة الأمعاء الهیوجة
- ▶ التهاب القولون المخاطي
- ▶ القولون المنقبض

الأسباب

حتى الآن لا يوجد سبب واضح للإصابة به، ولكن يُعتقد أن سببه اجتماع عدة عوامل معًا، منها:
خلل بين الإشارات العصبية في الجهاز الهضمي والدماغ.

١. مشاكل في حركة الجهاز الهضمي.
٢. تضخم في البكتيريا الطبيعية الموجودة في الأمعاء.
٣. العدوى.
٤. الوراثة.
٥. حساسية الطعام.
٦. بعض المشاكل النفسية مثل: الاكتئاب، القلق وغيرهما

عوامل الخطورة

- العمر: أقل من ٤٥ سنة.
- التاريخ العائلي.
- الجنس: نسبة الإصابة عند النساء أكثر مرتين من الرجال.
- المشاكل النفسية مثل: القلق، الاكتئاب، العنف الأسري، بعض اضطرابات الشخصية كالانفصام واضطراب ثنائي القطب

الأعراض

١. تقلصات وآلام في البطن.
٢. فقدان الشهية.
٣. الشعور بالتخمة.
٤. غازات في البطن.
٥. مخاط في البراز.

متى تجب رؤية الطبيب؟

- عند وجود أعراض قد تدل على وجود مشكلة خطيرة مثل:
 ١. نزيف في المستقيم (الشرج).
 ٢. آلام مستمرة ومنتزعة تحدث في الليل أو وقت النوم.
 ٣. فقدان الوزن غير الطبيعي.

المضاعفات

- البواسير (بسبب كثر الإسهال أو الإمساك).
- سوء التغذية.
- الاكتئاب.

التشخيص

- إن التشخيص يعتمد غالبًا على استبعاد المشاكل أو الأمراض الأخرى المشابهة لها، ومن التحاليل التي قد يتم إجراؤها لفعل ذلك:
- ١. التاريخ الطبي.
- ٢. الفحص السريري.
- ٣. التحاليل المخبرية: تحليل الدم والبراز.
- ٤. اختبارات أخرى: الأشعة السينية، والأشعة المقطعية، منظار القولون، اختبار تحمل اللاكتوز، اختبار التنفس.

العلاج

■ نظرًا لعدم وجود سبب واضح له، فغالبًا ما يعتمد العلاج على التخفيف من الأعراض؛ للتمكن من التعايش معه، حيث يمكن التحكم بأغلب الأعراض في الحالات البسيطة بإجراء بعض التعديلات على نمط الحياة، وفي حال كانت الحالة أصعب وازدادت حدة الأعراض، قد يصف الطبيب بعض الأدوية للتخفيف منها مثل:

١. مكملات الألياف.
٢. مضادات للإسهال.
٣. مضادات تقلصات البطن.
٤. مضادات حيوية.

النظام الغذائي لمتلازمة القولون العصبي

- يمكن أن يساهم اتباع نظام غذائي صحي في تحسين أعراض القولون العصبي ،ومن النصائح التي تساعد على ذلك نذكر ما يأتي :
- **تناول المزيد من الألياف:** حيث يؤدي تناول الألياف إلى زيادة حجم البراز، مما يساعد على حركة الأمعاء، ويجب على البالغين تناول ٢٠-٣٥ غراماً منها يومياً، ومن الجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من أهمية تناول الألياف إلا أن زيادة تناولها قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض إذا كان الشخص يعاني من الغازات، والإسهال المتكرر، لذلك يجب التركيز على مصادر الألياف القابلة للذوبان : مثل التفاح، والتوت، والجزر، وتجنب الألياف غير القابلة للذوبان :مثل الحبوب الكاملة، والمكسرات، والزبيب، والبروكلي، والملفوف.
- **اتباع حمية خالية من الغلوتين:** إذ إنَّ الغلوتين هو نوعٌ من البروتينات يتوفر في منتجات الحبوب؛ مثل الخبز، والمعكرونة، ويمكن لهذا البروتين أن يسبب الضرر للأمعاء عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين، وتجدر الإشارة إلى أنه قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بحساسية أو عدم تحمل الغلوتين من القولون العصبي أيضاً، وقد يساعد اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين على التخفيف من الأعراض.

النظام الغذائي لمتلازمة القولون العصبي

- **اتباع نظام غذائي منخفض الدهون:** حيث تُعدّ الأطعمة الغنية بالدهون منخفضة بالألياف، والتي من الممكن أن تُسبب مشكلة للأشخاص المصابين بالقولون العصبي ويعانون من الإمساك والإسهال؛ ولذلك فإنّ التقليل من الدهون يمكن أن يساعد على تحسين الأعراض، وإعطاء شعور بالراحة، ويمكن التركيز على تناول اللحوم قليلة الدهون، ومنتجات الحليب قليلة الدسم، والخضراوات، والفواكه بدلا من الأطعمة الدسمة.
- **حمية الفودماب:** وهي الكربوهيدرات التي يصعب على الأمعاء هضمها، حيث إنّها تؤدي إلى سحب المزيد من الماء إلى الأمعاء، مما يجعل المصابين بمتلازمة القولون العصبي يعانون من الغازات، والانتفاخ، والإسهال بشكل أكبر بعد تناول هذه الأطعمة، وتتضمن هذه الحمية الحدّ من تناول بعض الأطعمة مدّة ٦-٨ أسابيع لتحسين أعراض القولون العصبي؛ ومن الأطعمة التي يجب تجنبها: اللاكتوز الموجود في الحليب، والمثلجات، والجبن، واللبن الزبادي. الخبز المصنوع من القمح، والحبوب، والمعكرونة. بعض الفواكه؛ مثل البطيخ، والكمثرى، والخوخ، والمانجا، والتفاح. بعض الخضراوات، مثل الهليون، والبروكلي، والبصل، والقرنبيط، والفطر. البقوليات. الكاجو والفستق الحلبي. شراب الذرة عالي الفركتوز.

الوقاية:

(معرفة العوامل المهيجة للقولون وتجنبها)

■ إرشادات للمصابين بمتلازمة القولون العصبي:

- تجنب الأطعمة التي قد تهيج القولون مثل: الكافيين (الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة)، والسكريات، والمشروبات الغازية، والمحليات الصناعية، والأطعمة مرتفعة الدهون، والعلك.
- تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات التي يصعب هضمها.
- تجنب الأطعمة التي تزيد الغازات (القرنبيط، الملفوف).
- الحرص على تناول وجبات الطعام بانتظام.
- الحذر عند تناول منتجات الألبان للمصابين بحساسية اللاكتوز.
- الإكثار من شرب السوائل خاصة الماء.
- ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم للتقليل من التوتر وتحفيز الانقباضات الطبيعية لعضلات الأمعاء.
- الحد من التوتر، وذلك عن طريق التنفس العميق والاسترخاء وغيرهما.
- الإقلاع عن التدخين.
- تناول المزيد من مصادر البروبيوتيك؛ وذلك للمساعدة على تخفيف الغازات والانتفاخ

الأسئلة الشائعة

- هل تؤدي متلازمة القولون العصبي إلى السرطان؟
- القولون العصبي لا يشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة البدنية. كما لا يزيد فرصة الإصابة أو تطور مرض السرطان.
-
- هل يجب على جميع المرضى المصابين بالقولون العصبي الالتزام بنظام غذائي محدد؟
- نعم، يجب الالتزام بنظام غذائي صحي، وتجنب ما يهيج القولون ويحدث تقلصات.
-
- هل تناول الألياف يخفف أعراض القولون؟
- إن تناول الألياف يخفف أعراض القولون العصبي؛ لأنها تؤدي لتخفيف الإمساك، لذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل: الفول، والفاكهة، والخضراوات، والشوفان، وتناول المنتجات التي تحتوي على الحبوب الكاملة.

المفاهيم الخاطئة

- يوجد فرق بين القولون الهضمي والعصبي.
 - الحقيقة: في الواقع هما نفس المرض؛ ولكن البعض يتهيج لديهم القولون بسبب العوامل النفسية أكثر من الهضمية.
- كثرة العصبية تسبب القولون العصبي.
 - الحقيقة: كثرة العصبية تشكل عامل خطر لحدوث القولون العصبي؛ ولكن ليس بالضرورة حدوثه.

وزارة الصحة
Ministry of Health



<https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Gastroenterology/Pages/Irritable-Bowel-Syndrome.aspx>

U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. 2015–2020 Dietary Guidelines for Americans. 8th Edition. <https://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/> [External link](#). Published December 2015. Accessed March 2, 2017.