

متلازمة تكيس المبايض plastic ovary syndrome



اعداد/

- د. نورا محمد حميد.
- د. فراس سويد.
- د. خديجة رمزي.
- د. محمد القرواني.
- د. فاطمة درهم.
- د. علياء خالد.
- د. نوال الريمي.
- د. عهود الحليلى.
- د. نور حامد.
- د. خلود ناصر.
- د. حنان محمد.
- د. خولة العقبى.

المواضيع :

- التاريخ المرضى.
- تعريف متلازمة تكيس المبايض.
- اسباب متلازمة تكيس المبايض.
- اعراض متلازمة تكيس المبايض.
- الوقاية من متلازمة تكيس المبايض.
- كيف نقلل من متلازمة تكيس المبايض من خلال الاعراض.
- هل يوجد أي ادله علمية تشير الى ان بعض الأطعمة او المكملات الغذائية يمكن استخدامها كعلاج.

التاريخ المرضى:

- تم اكتشاف المرض في عام 1990 أشارت ورشة عمل توافقية برعاية المعاهد الوطنية للصحة (معاهد الصحة القومية) الى أن المريضة يمكن اعتبارها بأنها تعاني من متلازمة تكيس المبايض اذا كان لديها كل من علامات على زيادة الاندروجين.
- في عام 2003 بينت ورشة عمل برعاية الآراء الجمعية الأوربية لعلم التكاثر البشري والأجنة في روتردام أن متلازمة تكيس المبايض تكون موجودة اذا اجتمع اثنان من ثلاث معايير:
- اضطرابات الدورة الشهرية.
- انقطاع الاباضة.
- النشاط الزائد للاندروجين.

تعريف متلازمة تكيس المبايض:

- هو عبارة عن اضطراب هرموني شائع بين النساء في سنوات الانجاب.
- تشير متلازمة المبيض المتعدد الكيسات الى تكون عدد كبير من أكياس صغيرة مملوءة بسوائل على الحافة الخارجية للمبيض ويشار الى هذه الاكياس باسم الكيسات تحتوي الاكياس الصغيرة المملوءة بالسوائل على بويضات غير ناضجة.
- وقد تحدث واحدة من بين كل 10 نساء قد تعاني منه و أكثر من 100 مليون امرأة في العالم من متلازمة تكيس المبايض.

اسباب متلازمة تكيس المبايض:

- ان السبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض غير معروف ولكن يعتقد أن العوامل المساهمة هي:

١. الأنسولين الزائد.

٢. الوراثة.

٣. زيادة الأندروجين.

٤. نظام حياة غير صحي.

٥. الوزن الزائد.

أسباب متلازمة تكيس المبايض



< زيادة الوزن

< الإجهاد و القلق

< العوامل الوراثية

< مرض السكري

< أمراض الغدة الدرقية

< أورام المخ

الاعراض الرئيسية المتلازمة تكيس المبايض:

١. عدم انتظام الدورة الشهرية.
٢. ارتفاع مستويات هرمون الأندروجين.
٣. ألم في منطقة الحوض.
٤. عدم توازن الهرمونات.
٥. حب الشباب.
٦. مقاومة الأنسولين.
٧. نمو الشعر الزائد.

ملاحظه/

حبوب الحمل تعالج العرض وليس
السبب الرئيسي.



الوقاية :

- تغيير نمط الحياه.
- انقاص الوزن.
- ممارسة التمارين الرياضية.
- ضبط مستوى السكر في الدم.
- الابتعاد عن الأطعمة المقلية والوجبات السريعة .

كيف يؤثر المرض على الجسم والحياة اليومية:

- كيف يؤثر هرمون الاندروجين بتسبب التكيّسات:
- في حالة متلازمة تكيس المبايض فأن الغده النخامية تفرز كميات مرتفعة من هرمون (LH) والمبيض يفرز ايضا كميات مرتفعة هرمون الذكورة الاندروجين يؤثر:
- يؤدي الى صعوبة الحمل.
- زيادة الشعر في الوجه والجسم.
- ظهور حب الشباب.
- نمط الحياة الخاطئ.

خيارات العلاج:

- **معالجه الهرمونات اذا كان هناك زيادة في معدل هرمون الاندروجين يتم معالجته:**
 ١. بالأعشاب (البردقوش ، كف مريم، الريحان)
 ٢. الابتعاد عن التوتر و الاكتئاب.
 ٣. ضبط مستوي الأنسولين.
 ٤. نظام غذائي ورياضة.
 ٥. الكربوهيدرات المعقدة (الحبوب الكاملة ، الشوفان ، الشعير)
 ٦. البروتينات (الاسماك : السلمون و السردين و المحار، البيض)
 ٧. منتجات الألبان قليلة الدسم (جبن مالح ، جبن فيتا)
 ٨. الابتعاد عن الزيوت وسمن الدهون المشبعة استخدام الدهون الصحية (زيت الزيتون، زيت السمسم ،زيت الوز ، زيت جوز الهند)
 ٩. الخضروات الخضراء (البروكلي ، البقدونس ، الجرجير، البطاطا الحلوة)
 ١٠. الفواكه (اليمن ، الفراولة ،الموز)
 ١١. بعض الفيتامينات و المعادن (زنك، المغنيسيوم ،ميجا٣، اليود،فيتامين C)