


متلازمة القولون العصبي

Irritable Bowel Syndrome



إعداد/

- د. مها حسن
- د. فراس سويد
- د. خديجة رمزي
- د. بندر السامعي
- د. حورية المصلي
- د. نوال الريمي
- د. روان المسخني
- د. نور حامد
- نورا خميد
- امانى أنقع

المواضيع:

1. تاريخ المرض

تاريخ المرض وتاريخ الاكتشاف والتشخيص والعلاج والنتائج التي تم تحقيقها

2. الأسباب

أسباب المرض والعوامل المؤثرة عليه، بما في ذلك العوامل الوراثية والبيئية والنمط الحياتي والتاريخ الصحي

3. الأعراض

الأعراض الرئيسية والفرعية للمرض وكيفية تأثيرها على الجسم والحياة اليومية

4. التشخيص

5. العوامل الغذائية التي يجب مراعاتها عند استخدام الادوية

الموصوفة للمرض

6. طريقة العلاج

الخيارات المتاحة لعلاج المرض، بما في ذلك العلاج الدوائي والجراحي والعلاج التكميلي والبدائل والآثار الجانبية المحتملة والنتائج المتوقعة

7. الوقاية والعلاج الوقائي

الإجراءات الوقائية المتاحة والموصي بها للوقاية من المرض

التاريخ المرضي

تم اكتشاف متلازمة القولون العصبي (IBS) لأول مرة في أوائل القرن العشرين، ولكن لم يتم التعرف عليها رسميًا كمرض حتى عام 1989. لا يزال السبب الدقيق لمتلازمة القولون العصبي غير معروف، ولكن يُعتقد أن مزيجًا من العوامل البيولوجية والنفسية قد يكون له دور.

الأسباب:

سبب التهاب القولون العصبي غير معروف بالضبط، ولكن يُعتقد أنه نتيجة تركيبة من العوامل الوراثية والبيئية.

- **العوامل الوراثية:** يعتبر وجود تاريخ عائلي لالتهاب القولون العصبي عاملاً يزيد من احتمالية تطور المرض. وهذا يشير إلى أنه قد توجد بعض الجينات التي تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون العصبي.
- **البيئة:** تشير بعض العوامل البيئية التي قد تساهم في تطور التهاب القولون العصبي إلى ما يلي:
 - **النظام الغذائي:** يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون العصبي أن بعض الأطعمة تسبب لهم أعراضًا. ومع ذلك، لا يوجد نظام غذائي مناسب للجميع لعلاج التهاب القولون العصبي، وما قد يسبب أعراضًا لشخص واحد قد لا يسبب أعراضًا لشخص آخر.
- **التدخين:** يمكن للتدخين أن يضر بطانة القولون ويضعف جهاز المناعة. هذا يمكن أن يزيد من احتمال مهاجمة الجسم لأنسجته، مما يؤدي إلى الالتهاب والتقرح.
- **العوامل النفسية:** مثل الضغوطات النفسية

بالإضافة إلى هذه العوامل، يمكن أن يثير الإجهاد وبعض الأدوية أيضًا تفاقم التهاب القولون العصبي

الأعراض:

بعض أعراض التهاب القولون العصبي **الأكثر شيوعًا** تشمل:

- ألم في البطن
- الام تشنجات في البطن
- انتفاخ
- تغيرات في عادات الأمعاء (الإسهال أو الإمساك أو كلاهما)

- كثرة التبول
- الغثيان
- لقيء
- قلة الشهية
- التعب

فيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول أعراض التهاب القولون العصبي:

شدة الأعراض قد تختلف من شخص إلى آخر. قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة فقط، بينما يمكن أن يعاني آخرون من أعراض شديدة تعيق نشاطاتهم اليومية. يمكن أن تظهر أعراض التهاب القولون العصبي وتختفي. تتبع الفترات النشطة للمرض، المعروفة بـ "الاندلاعات"، فترات الشفاء، عندما تختفي الأعراض.

التشخيص

بالنسبة للفحوصات لا يوجد فحص للقولون العصبي وإنما هاذي الفحوصات عشان يستبعد الأسباب الأخرى والتشخيص يكون من الأعراض بالإضافة إلى الاستبعاد للأسباب

- **الفحوصات التصويرية:** تتضمن اختبارات التصوير التي قد يتم إجراؤها في هذه الحالة ما يأتي:

- **تنظير القولون:** في هذا الفحص يستخدم الطبيب أنبوب صغير ومرن، لفحص القولون بأكمله.
- **التصوير بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية:** يخضع الأطباء لهذا الفحص من أجل استبعاد الأسباب الأخرى لمُعاناة المريض من هذه الأعراض، خاصة إذا كان الشخص يشكو من آلام البطن

- **التنظير السيني المرن:** يُجرى هذا الفحص بهدف الكشف عن الجزء السفلي من القولون، ويتم عادة باستخدام أنبوب مرن مُضاء. الفحوصات المخبرية تتضمن الفحوصات المخبرية التي قد يتم إجراؤها في هذه الحالة ما يأتي:
- **تحليل البراز:** يتم عمل فحص البراز في الغالب للكشف عن الجراثيم، والطفيليات، أو عن الحمض الصفراوي الذي يُمثل سائل يُنتج الكبد في حال كان المريض يعاني من الإسهال المزمن.
- **اختبارات عدم تحمل اللاكتوز:** يُعد اللاكتاز من الأنزيمات الضرورية لهضم السكر الموجود في منتجات الألبان، وفي حال كان هناك خلل في إنتاج أنزيم اللاكتاز فقد يعاني الشخص من مشاكل شبيهة بتلك التي تسببها متلازمة الأمعاء المتهيجة بما في ذلك ألم في منطقة البطن، والغازات، والإسهال.

- **اختبار التنفس للكشف عن فرط في نمو البكتيريا:** يُمكن أن يساعد هذا الاختبار في تحديد ما إذا كان المريض يُعاني من زيادة في نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة أم لا.

❖ هناك ثلاثة أنواع رئيسية من اختبار التنفس

- اختبار التنفس للحمض الصفراوي:
يستخدم في حالة وجود فرط في نمو البكتيريا في الأمعاء والذي يكون سببه عدم هضم الدهون.
 - اختبار التنفس الزايلوز:
يعدّ هذا الاختبار حسّاس ومُحدّد للغاية، ويختبر النّمو الزائد للبكتيريا في الأمعاء الدقيقة.
 - اختبار التنفس بالهيدروجين:
يستخدم من أجل تقييم ما إذا كان هناك سوء امتصاص للكربوهيدرات أم لا
- **اختبارات الدم:** تجرى في الغالب اختبارات الدم من أجل استبعاد أيّ حالات صحيّة أخرى؛ مثل الداء البطني ومنه حساسية القمح أو الشعير

العوامل الغذائية التي يجب مراعاتها عند استخدام الادوية الموصوفة للمرض

- **امتصاص الدواء:** يمكن أن تتأثر بعض الأدوية بوجود بعض الأطعمة أو العناصر الغذائية في الأمعاء. على سبيل المثال، يمكن لبعض المضادات الحيوية أن ترتبط بالكالسيوم في الأمعاء وتجعلها أقل فعالية.
- **التمثيل الغذائي للدواء:** يتم استقلاب بعض الأدوية عن طريق الكبد أو الكلى. تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو البروتين يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي لهذه الأدوية، والتي يمكن أن تزيد من آثارها الجانبية.
- **إفراز الدواء:** تفرز بعض الأدوية في البول أو البراز. تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف يمكن أن يسرع إفراز هذه الأدوية، والتي يمكن أن تقلل من فعاليتها.

طريقة العلاج:

- **الأدوية:** استخدم أدوية للتحكم في الاعراض وتخفيفها
- **تغييرات نمط الحياة:** هناك عدد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في إدارة التهاب القولون العصبي. تشمل هذه التغييرات:

- **تناول نظام غذائي صحي:** يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في تقليل الالتهاب وتعزيز التئام القولون.
- **إدارة التوتر:** يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفجر التهاب القولون العصبي. يمكن أن تساعد وسائل إدارة التوتر مثل ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء أو الاستشارة في منع التفجر.
- **الحصول على قدر كافٍ من النوم:** الحصول على قدر كافٍ من النوم أمر مهم للصحة والرفاهية العامة. كما يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز التئام القولون.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاتباع نظام غذائي لالتهاب القولون العصبي:

- **طهي جميع الفواكه والخضروات:** سيسهل ذلك هضمها وتجنب الفواكه والخضروات النيئة: فهذه الأطعمة يمكن أن تكون صعبة الهضم وقد تؤدي إلى ظهور الأعراض.
- **تجنب الأطعمة المصنعة:** غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون والمكونات غير الصحية.
- **اقرأ ملصقات الطعام بعناية:** تحتوي العديد من الأطعمة على مصادر خفية من الغلوتين ومنتجات الألبان ومسببات الحساسية الأخرى.
- **تناول وجبات صغيرة ومتكررة:** سيساعد ذلك على تقليل مقدار الضغط الواقع على الجهاز الهضمي.
- **اختر الأطعمة الخفيفة:** غالبًا ما تكون الأطعمة منخفضة الألياف والدهون أسهل في الهضم. تشمل بعض الخيارات الجيدة الأرز الأبيض والخضروات المطبوخة والموز والخبز المحمص.
- **تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين والكحول:** فهذه الأطعمة يمكن أن تهيج بطانة القولون وتزيد الأعراض سوءًا. وتجنب الأطعمة التي تزيد الغازات (القرنبيط، الملفوف، البنجر، البقوليات).
- **تناول البروبيوتيك:** البروبيوتيك هي بكتيريا حية تشبه البكتيريا الجيدة التي تعيش في أمعائك. قد يساعد تناول البروبيوتيك في الحفاظ على صحة أمعائك وتقليل الالتهاب.
- **قم بطحن اللحم:** لأنه سيجعل الهضم أسهل.
- **المشروبات الدافئة:** مثل اليانسون، البابونج، النعناع، الكمون.

هدف العلاج لالتهاب القولون العصبي هو تحقيق الراحة، وهي فترة زمنية يختفي فيها أعراض المرض. بفضل العلاج المناسب، يمكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون العصبي تحقيق الراحة وعيش حياة طبيعية نشطة.

الوقاية والعلاج الوقائي:

لا يوجد طريقة مؤكدة لمنع التهاب القولون العصبي، ولكن هناك بعض الطرق الوقائية التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض. تشمل هذه الطرق:

- **تناول نظام غذائي صحي:** يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في تعزيز جهاز المناعة وتقليل التهيج والالتهابات
- **الحصول على قدر كافٍ من النوم:** الحصول على قدر كافٍ من النوم أمر مهم للصحة العامة والرفاهية. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء في القولون.
- **تجنب التدخين:** التدخين هو عامل خطر رئيسي للإصابة بالتهاب القولون العصبي. إذا كنت تدخن، فالإقلاع عن التدخين هو أفضل ما يمكنك فعله لتقليل خطر الإصابة بالمرض.
- **إجراء فحوصات دورية:** إذا كان لديك تاريخ عائلي بالتهاب القولون العصبي، فمن المهم أن تجري فحوصات دورية لدى طبيبك. سيتيح ذلك لطبيبك مراقبة صحتك والكشف عن أي علامات.

هنا بعض الأساليب الوقائية المحددة التي تمت دراستها:

- **البروبيوتيك:** بعض الدراسات أظهرت أن تناول البروبيوتيك قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهاب القولون العصبي. البروبيوتيك هي بكتيريا حية مشابهة للبكتيريا الجيدة التي تعيش في أمعائك. قد تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتقليل التهابها.
- **تجنب بعض الأطعمة:** يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون العصبي أن بعض الأطعمة تثير أعراضهم. إذا كنت تجد أن بعض الأطعمة تزيد من أعراضك، فمن الأفضل تجنبها. من بين الأطعمة الشائعة المحفزة:
 - الأطعمة الدهنية
 - الأطعمة الحارة
 - منتجات الألبان
 - الفواكه والخضروات النيئة
 - الجلوتين
 - الأطعمة المحتوية على الكافيين (الشاي، القهوة، المشروبات الغازية، الشكولاتة)
- **إدارة الضغوط:** يمكن أن يثير الضغط نوبات التهاب القولون العصبي أبحث عن طرق لإدارة الضغط، مثل:
 - ممارسة التمارين الرياضية
 - تقنيات الاسترخاء
 - الاستشارة النفسية.
- يجب استشارة الطبيب قبل استخدام مضادات الإكتئاب، المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، والأدوية المضادة للإسهال أو المكملات؛ حيث قد تزيد شدة المرض.
- الابتعاد عن الكافيين والأطعمة التي تزيد شدة المرض (مثل: الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة الحارة).
- الحرص على اتباع النظام الغذائي الذي تم وصفه من قبل الطبيب.
- تقسيم الوجبات إلى خمس أو ست وجبات صغيرة.

- الإكثار من شرب السوائل؛ لمنع الإصابة بالجفاف.
- عدم التوقف عن تناول المجموعات الغذائية دون التحدث إلى الطبيب.
- الحرص على السيطرة على الأعراض قبل الحمل
- قلل من الجبن والحليب. يعد عدم تحمل اللاكتوز أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي. تأكد من الحصول على الكالسيوم من مصادر أخرى، مثل البروكلي أو السبانخ أو السلمون أو المكملات الغذائية
- تجنب تناول الطعام أو المشروبات قبل النوم
- رفع رأسك أثناء النوم
- ارتداء الملابس الفضفاضة