

النظام الغذائي لمتلازمة تكيس المبايض



قسم التغذية العلاجية

يحدث عندما تكون مستويات هرمون الاندروجين غير متوازنة ، مما يؤدي إلى نمو الكيس المملوء بالسوائل على المبيض.

وتشمل الآثار الجانبية فترات دورة شهرية غير منتظمة أو غائبة، وفقدان الشعر، ونمو الشعر الزائد، حب الشباب، وزيادة الوزن، والاكتئاب ومشاكل الخصوبة.

ويرتبط متلازمة تكيس المبايض أيضا مع ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والبدانة.

ويعتبر النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة، واحدة من العلاجات الخط الأول ويمكن الحصول على نتائج مرضية بتباع الاستراتيجية التالية:

1. اتباع النظام الغذائي منخفض المؤشر القليسمي.

يساعد النظام الغذائي منخفض المؤشر القليسمي على استعادة فترات الدورة غير المنتظمة، والحد من علامات الالتهابات وتحسين حساسية الأنسولين في النساء مع متلازمة تكيس المبايض .

الأطعمة لإضافة:

- الخضروات العالية بالالياف، مثل البروكلي والسبانخ.
- البروتين الخالية من الدهون مثل السمك.
- الأطعمة المضادة للالتهابات والتوابل مثل الكركم والطماطم.

2. الحرص على وجبة الإفطار.

تناول وجبة إفطار كبيرة ووجبة مسائية أصغر يساعد في تحسين مستويات الهرمون وتحسين الإباضة لدى النساء المصابات بالمتلازمة.

3. تناول ما يكفي من الدهون الصحية.

يساعد توفير كمية كافية من الدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل مستويات الأنسولين في الدم ومستويات التستوستيرون وتحسين مقاومة الأنسولين لدى النساء المصابات. وتشمل الأسماك الزيتية والأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات غير المملحة والبذور.

4. تقليل الكربوهيدرات.

ان انخفاض معتدل في الكربوهيدرات يساعد في خفض مستويات الأنسولين ومستويات التستوستيرون ويحسن من حساسية الأنسولين, ويؤدي أيضًا إلى فقدان وزن أكبر. لذا تجنب هذه الاغذية:

- الوجبات الخفيفة والمشروبات والحلويات السكرية
- الخبز الابيض و الكعك وأي شيء مصنوع من الدقيق الابيض
- البطاطا البيضاء.

5. تناول الكثير من البروتين قليل الدهون.

في النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، يرتبط تناول نظام غذائي غني بالبروتين بانخفاض الشهية وانخفاض الأنسولين وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون مقارنة بالنظام الغذائي العالي الكربوهيدرات. البروتينات الخالية من الدهون ، مثل السمك يفضل ، وتجنب الأطعمة الالتهابية ، مثل اللحوم المصنعة والحمراء.

6. ممارسة الرياضة المنتظمة.

التمارين المنتظمة تحسن مقاومة الأنسولين والإباضة ، وتساعد على حرق الدهون في الجسم وتقليل علامات الالتهاب لدى النساء المصابات ، ولا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع.

7- المكملات الغذائية .

ان تناول فيتامين د ومكملات الكروم يساعد على تحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض ، خاصة إذا كانت المرأة تعاني من نقص وبإشراف طبي.



اعداد اخصائية التغذية العلاجية
باسمة الجارالله