



التغذية العلاجية للكبد الدهني

Non-alcoholic steatohepatitis

NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

وفقا لتوصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد

الكبد الدهني

الصفة الرئيسية لمرض الكبد الدهني هي كمية الدهون الكبيرة المخزنة في خلايا الكبد

اول خط علاجي لهذا المرض هو التغذية العلاجية اللازمة

١- إذا كان لديك **وزن زائد** او سمنة فأفضل علاج هو خسارة الوزن كبدائية لمدة ٦ أشهر بحيث يكون نزول الوزن مع أخصائي تغذية ويكون معدل النزول من ٢ - ٤ كلجم في الشهر فعند نزول ٧% او ١٠% من الوزن فسوف تتحسن نتائج التحاليل لأنزيمات الكبد والحالة الصحية خسارة الوزن تكون عن طريق اتباع حمية و رياضة و قد يكون هنالك تدخل دوائي لبعض الحالات وإذا لم يكن هنالك خسارة وزن كافية خلال ٦ أشهر فخير العمليات الجراحية متوفر

- للتنويه : الأطعمة المذكورة يجب التقليل منها قدر المستطاع **لفترة مؤقتة** حتى يتم علاج الكبد الدهني، وبعد العلاج يمكن تناولها بتوازن و ليس الافراط فيها

٢- **اتباع حمية صحية موزونة** ويتم احتسابها من قبل اخصائي التغذية هي نقطة مهمة جدا، فليس من المهم اتباع حمية صحية ولكن محتويات الحمية مهمة جدا مثلا نسبة الدهون و الكربوهيدرات و البروتين من المهم معرفتها وأيضا محتوى الطعام اهم من كمية الطعام

٣- **تناول حمية منخفضة السعرات** من ٧٥٠ - ١٠٠٠ سعرة حرارية في اليوم خيار جيد يُوصى به ، او تناول حمية ١٢٠٠ - ١٥٠٠ سعرة حرارية باليوم

٤- **تناول حمية البحر الأبيض المتوسط** خيار جيد يُوصى به أيضا تشمل المكونات الرئيسية لحمية البحر الأبيض المتوسط (نظام غذائي متوسطي) ما يلي:

- الاستهلاك اليومي من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية مع كل وجبة
- استهلاك السمك على الأقل مرتين في الأسبوع
- حصص معتدلة من مشتقات الحليب و اللب
- استهلاك محدود من اللحوم الحمراء مرة بالاسبوع او الشهر
- و الدجاج و البيض يكون بكميات متفاوتة من مرتين إلى ٣ مرات في الأسبوع
- والبقول والمكسرات والبذور والاعتماد على زيت الزيتون

٥-الدهون

- تناول كميات قليلة من الدهون المشبعة هو افضل خيار مثل التقليل من الوجبات المقلية
- و اللحوم المصنعة مثل المرتديلا و السجق و غيرها
- و تقليل استخدام الزيت اثناء الطهي (بأن يكون ملعقة صغيرة وليس كميات كبيرة)
- ويفضل التقليل من تناول الأطعمة من المطاعم و الاعتماد على الطهي بالمنزل

٦-الكربوهيدرات

لنوعية الكربوهيدرات في الحمية دور مهم جدا في النظام الغذائي

- التقليل **من شراب الذرة العالي الفركتوز** وهو يدخل في تصنيع اغلب الأطعمة المعلبة مثل (الزبادي بالفواكه او المنكه ،صوص السلطة الجاهز، بعض أنواع الخبز فيفضل قراءة مكونات كل أنواع الخبز للتأكد من خلوها من شراب الذرة ،الفواكه المعلبة ، بعض أنواع البروتين بار، بعض أنواع حبوب الإفطار،مبيض القهوة ،المُربى،)
- التقليل من **المشروبات الغازية** بجميع أنواعها
- التقليل من **العصيرات المعلبة** بجميع أنواعها
- التقليل من أي غذاء يحتوي على **كمية عالية من الفركتوز** مثل: (تفاح ، كمثرى ، مانجو ، كرز ، حبيب ، عسل)

• **التقليل من تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع**

- مؤشر السكر الجلايسيمي glycemic index هو معيار لقياس كيفية تأثير كميات محددة من الطعام على نسبة السكر والأنسولين في الدم مما يدفع الكبد لتخزينها على هيئة دهون فيزيد من تجمع الدهون بالكبد
- بعض الأطعمة ترفع السكر في الدم بسبب احتوائها على مؤشر جلايسيمي عالي و يفضل عدم تناولها خلال فترة العلاج من الكبد الدهني قد تستمر التوصية بالتقليل من هذه الأطعمة لمدة ٦ اشهر
- وهناك أغذية تأخذ فترة طويلة حتى ترفع السكر في الدم وهي آمنة وتحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض.
- وهناك أغذية تعتبر متوسطة ولكن لا يجذب الاكثار منها ولها مؤشر جلايسيمي متوسط.

مرتفع	متوسط	منخفض
شمام	مشمش	موز
حبوب (بطيخ)	تمر	تفاح
جوافة	تين	كرز
الاناناس	مانجو	جريب فروت
البطاطس	بابايا	تفاح
وافل	زبيب	كيوي
الكورن فليكس	عنب	برتقال
ارز ابيض	خبز البرجر	خوخ
الخبز الأبيض	كسكسي	الذرة
اليقطين	Special K حبوب الفطور	كمثرى
الفشار		بخاره (قراصيا)
		فراولة
		جزر
		عدس
		بطاطا حلوة (جزر يمانى)
		الرغيف الصحي (التورتيللا البُر)

**تناول الأغذية التي باللون الأحمر في بعض الأوقات ليس محرما ..
فبالإمكان تناوله بين فترة وأخرى ولكن ليس بشكل يومي**

References :

- The Diagnosis and Management of Nonalcoholic Fatty Liver Disease:Practice Guidance From the American Association for the Study of Liver Diseases
- <https://www.todaysdietitian.com/newarchives/010614p48.shtml>