



DANIYAH ALKHAWTANI

Clinical Dietitian

(التغذية الانبوية للكبار/البالغين في المنزل)

الهدف منها:

١. اعطاء المريض احتياجه الكامل من التغذية عن طريق الانبوب.
٢. المحافظة على صحة المريض وتقليل حدوث نقص التغذية ومضاعفاتها.
٣. تقليل عودة المريض للمستشفى ومعدل حدوث المضاعفات والوفيات.
٤. تغذية أفضل.. مستوى وعي أفضل عند المريض.. صحة بدنية وذهنية أفضل.

الخطوات اللازمة للتغذية الانبوية:

١. يجب أن تكون وضعية المريض على السرير ٤٥ درجة أثناء وبعد اعطاء الحليب (لمدة ٣٠-٦٠ دقيقة)
٢. اغسل يديك بالماء والصابون.
٣. نظف المكان الذي ستحضر فيه الغذاء.
٤. تأكد من أن درجة حرارة الحليب مناسبة؛ في درجة حرارة الغرفة.
٥. احرص على تغيير العبوة البلاستيكية لوضع الحليب (مرة كل يوم).
٦. أوصل العبوة البلاستيكية بالأنبوب المتصل بالمريض. (يمكنك التحكم بسرعة نزول الحليب من العجلة الصغيرة الموجوة على الانبوب المتصل مع العبوة البلاستيكية).
٧. احرص على اعطاء كمية الماء المنصوح فيها من أخصائي التغذية قبل وبعد كل مرة يعطى فيها الحليب.
٨. احرص على اعطاء المريض كمية الحليب المناسبة المنصوح فيها من أخصائي التغذية بدون تقليل او زيادة الكمية.
٩. احرص على اعطاء المريض الحليب في الاوقات المناسبة المنصوح فيها من قبل أخصائي التغذية (كل ٤ ، ٦ ، أو ٨ ساعات)
١٠. يمكنك استخدام عبوة الحليب خلال ٢٤ ساعة من فتح العبوة.



@Dalkhawtani

١١ . المحافظة على نظافة الانف واستخدام القطنه لتنظيف داخل الفم.

١٢ . تحريك/تغيير وضعية جسم المريض مرة واحدة على الأقل كل ساعتين لتقليل حدوث التقرحات السريرية.

١٣ . احرص على المتابعة مع أخصائي التغذية ؛ مع تدوين الأعراض او المضاعفات (استفراغ، مغص..) في حال وجودها.



@Dalkhawtani



@Dalkhawtani