Unique 病例报告表 (CRF)

在健康女性参与者中评价 HS-10542 胶囊对屈螺酮炔雌醇片（优思明®）药代动力学影响的 I 期临床试验

方案编号:HS-10542-113

版本号:final V2.0

研究中心编号	
受试者编号	

江苏豪森药业集团有限公司&上海翰森生物医药科技有限公司

太美智研医药研发（上海）有限公司

目录

访视日期 4
签署知情同意书 5
人口学资料 6
入选/排除标准 7
疫苗接种 9
身高体重 10
既往/现病史 11
手术史 12
过敏史 13
筛选期问诊 14
体格检查 18
生命体征 19
12导联心电图 20
血常规 22
血生化 24
尿常规 26
凝血功能 28
结核感染T细胞干扰素释放试验（TB-IGRA） 29
胸部 X 光片 30
腹部B超 31
妇科彩超 32
乳腺彩超 33
血妊娠检查 34
传染病筛查 35
入院问诊 36
酒精呼气检测 37
尿液药物滥用筛查 38
参与者入组 39
电话随访 40
屈螺酮炔雌醇片给药 41
HS-10542胶囊给药 42
生命体征（屈螺酮炔雌醇片） 43
生命体征（HS-10542） 46
PK血样采集（屈螺酮炔雌醇片） 48
PK血样采集（HS-10542） 50
不良事件 51
既往/合并用药 53
既往/合并非药物治疗 55

提前终止 56
试验总结 57
计划外检查 58
其他检查 60
PK血样采集（非计划） 61

HS-10542-113	访视日期	SV

访视日期	
访视日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

签署知情同意书	
签署日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
方案版本号	○ V1.0 ○ 其他____

人口学资料	
出生日期 (yyyy-MM)	|_|_|_|_|-|_|_|
年龄	|_|_|
年龄单位	周岁
性别	女
民族	○ 汉族 ○ 其他____
种族	○ 亚裔 ○ 其他____

入选/排除标准	
是否符合所有入选标准且不符合任一排除标准？	○ 是 ○ 否

表格行	+ 可添加行
如果否，请选择不满足入选标准/满足排除标准	○ 入选标准 ○ 排除标准
入选标准	○ 入选标准 01 ○ 入选标准 02 ○ 入选标准 03 ○ 入选标准 04 ○ 入选标准 05
排除标准	○ 排除标准 01 ○ 排除标准 02 ○ 排除标准 03 ○ 排除标准 04 ○ 排除标准 05 ○ 排除标准 06 ○ 排除标准 07 ○ 排除标准 08 ○ 排除标准 09 ○ 排除标准 10 ○ 排除标准 11 ○ 排除标准 12 ○ 排除标准 13 ○ 排除标准 14 ○ 排除标准 15 ○ 排除标准 16 ○ 排除标准 17 ○ 排除标准 18 ○ 排除标准 19 ○ 排除标准 20 ○ 排除标准 21 ○ 排除标准 22 ○ 排除标准 23 ○ 排除标准 24 ○ 排除标准 25 ○ 排除标准 26 ○ 排除标准 27 ○ 排除标准 28 ○ 排除标准 29 ○ 排除标准 30 ○ 排除标准 31 ○ 排除标准 32 ○ 排除标准 33

IECAT(如果否，请选择不满足入选标准/满足排除标准):1-入选标准, 2-排除标准

IETEST(入选标准):1-入选标准 01, 2-入选标准 02, 3-入选标准 03, 4-入选标准 04, 5-入选标准 05

HS-10542-113	入选/排除标准	IE

入选/排除标准
IETEST1(排除标准):1-排除标准 01, 2-排除标准 02, 3-排除标准 03, 4-排除标准 04, 5-排除标准 05, 6-排除标准 06, 7-排除标准 07, 8-排除标准 08, 9-排除标准 09, 10-排除标准 10, 11-排除标准 11, 12-排除标准 12, 13-排除标准 13, 14-排除标准 14, 15-排除标准 15, 16-排除标准 16, 17-排除标准 17, 18-排除标准 18, 19-排除标准 19, 20-排除标准 20, 21-排除标准 21, 22-排除标准 22, 23-排除标准 23, 24-排除标准 24, 25-排除标准 25, 26-排除标准 26, 27-排除标准 27, 28-排除标准 28, 29-排除标准 29, 30-排除标准 30, 31-排除标准 31, 32-排除标准 32, 33-排除标准 33

疫苗接种	
是否已接种脑膜炎奈瑟氏菌和肺炎链球菌疫苗？	○ 是 ○ 否

表格行	+ 可添加行
接种日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
接种疫苗类型	○ 脑膜炎奈瑟氏菌（A、C、Y 和 W-135 型）疫苗 ○ 肺炎链球菌疫苗 ○ 其他

MH1TYPE(接种疫苗类型):1-脑膜炎奈瑟氏菌（A、C、Y 和 W-135 型）疫苗, 2-肺炎链球菌疫苗, 99-其他____

身高体重	
是否进行了身高体重测量？	○ 是 ○ 否
测量日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
身高	|_|_|_|.|_|
身高单位	cm
体重	|_|_|_|.|_|
体重单位	kg
BMI	|_|_|.|_|
BMI单位	kg/㎡

既往/现病史	
是否存在既往病史或现病史？	○ 是 ○ 否

表格行	+ 可添加行
疾病名称	____
开始日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
是否持续	○ 是 ○ 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

YN(是否存在既往病史或现病史？|是否持续):1-是, 2-否

手术史	
参与者是否存在既往手术史？	○ 是 ○ 否

表格行	+ 可添加行
手术名称	____
手术日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

过敏史	
是否易发生过敏反应、或是过敏体质（如对花粉、两种或两种以上药物/食物过敏），或已知对试验用药品（HS-10542片或屈螺酮炔雌醇片）组分过敏？	○ 是 ○ 否

表格行	+ 可添加行
过敏原类别	○ 药物 ○ 食物 ○ 环境 ○ 其他____
具体过敏原	____
过敏表现	____

MH2CAT(过敏原类别):1-药物, 2-食物, 3-环境, 99-其他____

筛选期问诊

参与者是否进行了筛选期问诊？	○ 是 ○ 否
问诊日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
1.是否同意自签署知情同意书至末次给药后60天内进行高效避孕并且在此期间无生育或捐卵的计划（试验期间仅可采取非药物避孕措施）？	○ 是 ○ 否
2.既往患有神经系统、精神系统、消化系统、循环系统、呼吸系统、泌尿系统、内分泌及代谢系统、免疫系统、血液系统等严重疾病或现有上述疾病，且经研究者评估不适宜参加本研究？	○ 是 ○ 否
3.是否有胃溃疡、反流性食管炎等胃肠道疾病史？	○ 是 ○ 否
4.是否有荚膜微生物（如脑膜炎球菌或肺炎球菌）感染史或有脑膜炎球菌感染者密切接触？	○ 是 ○ 否
5.是否有结核病史，或筛选时结核感染T细胞干扰素释放试验（TB-IGRA）结果为阳性，或胸部X光片检查发现结核病变或疑似结核病变且经研究者评估不适合入组？	○ 是 ○ 否
6.筛选期前30天内是否曾患有严重感染，如患有蜂窝织炎、肺炎、败血症等？	○ 是 ○ 否
7.筛选前3个月内是否有带状疱疹病史？	○ 是 ○ 否
8.既往或目前是否有肾功能损害、肾上腺功能减退？	○ 是 ○ 否
9.既往或目前是否有未诊断的异常子宫/阴道出血？	○ 是 ○ 否
10.既往或目前是否有深静脉血栓或肺栓塞？	○ 是

筛选期问诊

	○ 否
11.现在或既往是否有乳腺癌或其它雌激素或孕激素敏感的癌症？	○ 是 ○ 否
12.筛选前3个月内是否有手术史，或者在试验期间是否有预期手术计划，或者接受过会影响药物吸收、分布、代谢、排泄的手术，经研究者判断不适合入组？	○ 是 ○ 否
13.筛选前3个月内，是否参加过其他任何临床试验且使用了任何临床研究药物或器械，或者筛选前尚在其他研究药物的7个半衰期以内，以时间长者为准？	○ 是 ○ 否
14.筛选前5年内是否有药物滥用史、药物依赖史或使用过毒品？	○ 是 ○ 否
15.饮酒情况	○ 从不饮酒 ○ 曾经饮酒 ○ 现在饮酒
饮酒年限（年）	____
筛选前3个月内，平均每天饮酒量：白酒（mL/天）	____
筛选前3个月内，平均每天饮酒量：啤酒（mL/天）	____
筛选前3个月内，平均每天饮酒量：葡萄酒（mL/天）	____
筛选前3个月内，平均每天饮酒量：其他（mL/天）	____
16.是否愿意在试验期间停止饮用酒精类产品？	○ 是 ○ 否
17.吸烟情况	○ 从不吸烟 ○ 曾经吸烟 ○ 目前吸烟
吸烟年限（年）	____

筛选期问诊

平均每天吸烟量（支）	____
18.是否愿意在试验期间停止使用任何烟草类产品？	○ 是 ○ 否
19.筛选前3个月是否摄入过量的茶、咖啡和或含咖啡因的饮料（平均每天 8 杯以上，1 杯=200 mL）？	○ 是 ○ 否
20.筛选前3个月内，是否大量失血（＞400 mL）或献血，或在研究期间或研究结束后1个月内有献血计划？	○ 是 ○ 否
21.筛选前30天内，是否使用了任何可以影响 CYP3A、CYP2D6、CYP2C8、UGT 酶或 P-gp 活性或改变胃酸的药物[质子泵抑制剂（PPI）、H2 受体拮抗剂、局部性抗酸药、口服碱性药物等]？	○ 是 ○ 否
22.首次给药前12个月内是否曾使用过长效雌激素或孕激素注射剂或埋植片，或者在本试验入组前3个月内曾使用过外用控释避孕药（透皮避孕贴片）或含激素的宫内节育器？	○ 是 ○ 否
23.筛选前14天内，是否使用过任何处方药、非处方药、中草药或保健品（发挥局部作用的外用制剂除外）或使用任何药物未超过 7 个消除半衰期（以较长者为准）？	○ 是 ○ 否
24.筛选前48 h 内是否摄入葡萄柚或葡萄柚制品，或试验期间需要摄入此类产品？	○ 是 ○ 否
25.筛选前1个月内或试验期间或计划给药结束后1个月内是否接种疫苗[脑膜炎奈瑟氏菌（A、C、Y 和 W-135 型）和肺炎链球菌疫苗接种除外]？；	○ 是 ○ 否
26.在筛选前1个月内或试验期间女性参与者是否处于哺乳期，或妊娠检查结果阳性？	○ 是 ○ 否
27.筛选前14天内是否发生过无保护措施的性行为？	○ 是 ○ 否
28.是否对饮食有特殊要求、不能遵守统一饮食者或有吞咽困难？	

筛选期问诊	
	○ 是 ○ 否
29.是否不能耐受静脉穿刺/留置针采血者或晕针晕血？	○ 是 ○ 否
30.是否可能因为其他原因而不能完成本研究或研究者判断不适宜参加的情况？	○ 是 ○ 否

体格检查	
是否进行了体格检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__

表格行	
检查项目	头颈部 胸部 腹部 脊柱 四肢 神经系统 皮肤黏膜 淋巴结 其他
其他项目，请说明	____
体格检查结果	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
若异常，请描述	____

CLSIGND(体格检查结果):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

PETEST(检查项目) : 1-头颈部,2-胸部,3-腹部,4-脊柱,5-四肢,6-神经系统,7-皮肤黏膜,8-淋巴结,9-其他

生命体征	
是否进行了生命体征检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
表格行	
检查项目	体温（℃） 脉搏（次/分） 收缩压（mmHg） 舒张压（mmHg）
检查结果	|_|_|_|.|_|
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
请选择相关不良事件或既往病史	____

CLSIGND(临床评估):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

CSREAS(若异常有临床意义，请提供详情):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史

VSTEST(检查项目) : 1-体温（℃）,2-脉搏（次/分）,3-收缩压（mmHg）,4-舒张压（mmHg）

12导联心电图	
是否进行了心电图检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
心率	|_|_|_|
心率单位	次/分
PR间期	|_|_|_|
PR间期单位	ms
RR间期	|_|_|_|.|_|_|
RR间期单位	ms
QRS时限	|_|_|_|
QRS时限单位	ms
QT间期	|_|_|_|
QT间期单位	ms
QTcF	|_|_|_|.|_|_|
QTcF单位	ms
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
若异常，请描述	____
若异常有临床意义，请提供详情	

12导联心电图	
	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
请选择相关不良事件或既往病史	____

血常规	
是否进行了样本采集？	○ 是 ○ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
实验室范围名称	____

表格行	
项目	血红蛋白量 红细胞计数 白细胞计数 血小板计数 红细胞比积 中性粒细胞计数 中性粒细胞百分比 淋巴细胞计数 淋巴细胞百分比 单核细胞计数 单核细胞百分比 嗜酸性粒细胞计数 嗜碱性粒细胞计数
结果	____
单位	____
下限	____
上限	____
临床评估	○ 正常

血常规	
	○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
动态链接	____
备注	____

LBCLSIG(血红蛋白量|红细胞计数|白细胞计数|血小板计数|红细胞比积|中性粒细胞计数|中性粒细胞百分比|淋巴细胞计数|淋巴细胞百分比|单核细胞计数|单核细胞百分比|嗜酸性粒细胞计数|嗜碱性粒细胞计数):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

血生化	
是否进行了样本采集？	○ 是 ○ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
肾小球滤过率（ mL/min ）	___.__
实验室范围名称	____

表格行	
项目	丙氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶 γ-谷氨酰转肽酶 乳酸脱氢酶 总胆红素 直接胆红素 总蛋白 白蛋白 碱性磷酸酶 甘油三酯 总胆固醇 低密度脂蛋白胆固醇 高密度脂蛋白胆固醇 尿酸 肌酸激酶 尿素 肌酐 葡萄糖 钾

血生化	
	钠 钙 氯
结果	____
单位	____
下限	____
上限	____
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
动态链接	____
备注	____

LBCLSIG(丙氨酸氨基转移酶|天门冬氨酸氨基转移酶|γ-谷氨酰转肽酶|乳酸脱氢酶|总胆红素|直接胆红素|总蛋白|白蛋白|碱性磷酸酶|甘油三酯|总胆固醇|低密度脂蛋白胆固醇|高密度脂蛋白胆固醇|尿酸|肌酸激酶|尿素|肌酐|葡萄糖|钾|钠|钙|氯):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

尿常规	
是否进行了样本采集？	○ 是 ○ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
实验室范围名称	____

表格行	
项目	尿蛋白质 尿葡萄糖 酮体 尿胆原 尿胆红素 尿白细胞 白细胞镜检 红细胞镜检 pH值 尿潜血 比重
结果	____
单位	____
下限	____
上限	____
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义

HS-10542-113	尿常规	LBURI

尿常规	
	○ 未做
动态链接	____
备注	____

LBCLSIG(尿蛋白质|尿葡萄糖|酮体|尿胆原|尿胆红素|尿白细胞|白细胞镜检|红细胞镜检|pH值|尿潜血|比重):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

凝血功能	
是否进行了样本采集？	○ 是 ○ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
实验室范围名称	____

表格行	
项目	凝血酶原时间 活化部分凝血活酶时间 纤维蛋白原 凝血酶时间 D-二聚体
结果	____
单位	____
下限	____
上限	____
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
动态链接	____
备注	____

LBCLSIG(凝血酶原时间|活化部分凝血活酶时间|纤维蛋白原|凝血酶时间|D-二聚体):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

结核感染T细胞干扰素释放试验（TB-IGRA）	
是否进行了TB-IGRA检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
检查结果	○ 阴性 ○ 阳性 ○ 不确定

胸部 X 光片	
是否进行了胸部X光片检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
若异常，请描述	____

腹部B超	
是否进行了腹部B超检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
若异常，请描述	____

妇科彩超	
是否进行了妇科彩超检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
若异常，请描述	____

乳腺彩超	
是否进行了乳腺彩超检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
若异常，请描述	____

血妊娠检查	
是否进行了样本采集？	○ 是 ○ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
实验室范围名称	____

表格行	
项目	人绒毛膜促性腺激素（β-hCG）
结果	____
单位	____
下限	____
上限	____
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
动态链接	____
备注	____

LBCLSIG1(人绒毛膜促性腺激素（β-hCG）):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义

传染病筛查	
是否进行了样本采集？	○ 是 ○ 否
采样日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
表格行	
检查项目	乙型肝炎病毒表面抗原 丙型肝炎病毒抗体 人免疫缺陷病毒HIV（1+2）型抗体 梅毒螺旋体抗体
结果	○ 阴性 ○ 阳性 ○ 未做

NPND(结果):1-阴性, 2-阳性, 97-未做

LBVTEST(检查项目)：1-乙型肝炎病毒表面抗原,2-丙型肝炎病毒抗体,3-人免疫缺陷病毒HIV（1+2）型抗体,4-梅毒螺旋体抗体

入院问诊	
参与者是否进行了入院问诊？	○ 是 ○ 否
问诊日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
1.自上次访视至今是否有新发疾病？	○ 是 ○ 否
2.自上次访视至今是否进行手术？	○ 是 ○ 否
3.自上次访视至今是否服用过任何药物？	○ 是 ○ 否
4.自上次访视至今是否是否接种过脑膜炎奈瑟氏菌（A、C、Y 和 W-135 型）和肺炎链球菌疫苗除外的任何疫苗？	○ 是 ○ 否
5.自上次访视至今是否发生过敏？	○ 是 ○ 否
6.自上次访视至今是否大量失血（≥400 mL）或献血？	○ 是 ○ 否
7.首次服用试验用药品前24h是否摄入任何含酒精的制品？	○ 是 ○ 否
8.首次服用试验用药品前24h是否吸烟？	○ 是 ○ 否
9.自上次访视至今是否参加过临床试验且使用了临床试验药物或医疗器械？	○ 是 ○ 否

酒精呼气检测	
是否完成酒精呼气检测？	○ 是 ○ 否
检测日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
结果判定	○ 阴性 ○ 阳性

尿液药物滥用筛查	
参与者是否进行药物滥用筛查？	○ 是 ○ 否
检测日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__

表格行	
检查项目	四氢大麻酚酸 吗啡 氯胺酮 甲基安非他明 亚甲二氧基甲基安非他明
检查结果	○ 阴性 ○ 阳性 ○ 未做

NPND(检查结果):1-阴性, 2-阳性, 97-未做

LBDATEST(检查项目) : 1-四氢大麻酚酸,2-吗啡,3-氯胺酮,4-甲基安非他明,5-亚甲二氧基甲基安非他明

参与者入组	
参与者是否入组？	○ 是 ○ 否
未入组原因	○ 不良事件 ○ 研究者认为参与者不再适合继续使用试验用药品（如精神疾病或社会状态可能干扰患者的权利、安全、合作和参与研究等） ○ 参与者要求终止治疗，但同意继续接受随访 ○ 参与者撤回知情同意或主动退出 ○ 死亡 ○ 失访 ○ 妊娠 ○ 试验终止（申办方可随时终止本试验）或中心关闭 ○ 其他____
入组日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
入组编号	R
DSTERM(未入组原因):1-不良事件, 2-研究者认为参与者不再适合继续使用试验用药品（如精神疾病或社会状态可能干扰患者的权利、安全、合作和参与研究等）, 3-参与者要求终止治疗，但同意继续接受随访, 4-参与者撤回知情同意或主动退出, 5-死亡, 6-失访, 7-妊娠, 8-试验终止（申办方可随时终止本试验）或中心关闭, 99-其他____	

HS-10542-113	电话随访	FU

电话随访	
是否进行电话随访？	○ 是 ○ 否

表格行	+ 可添加行
随访日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
随访结果	____

屈螺酮炔雌醇片给药	
是否进行了屈螺酮炔雌醇片给药？	○ 是 ○ 否

表格行	
给药阶段	Day1 Day15
是否给药	○ 是 ○ 否
给药日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
给药时间 (HH:mm)	|_|_|:|_|_|
给药过程异常备注	____

YN(是否进行了屈螺酮炔雌醇片给药？|是否给药):1-是, 2-否

ECCYCLE(给药阶段) : 1-Day1,2-Day15

HS-10542-113	HS-10542胶囊给药	EC1

HS-10542胶囊给药	
是否进行了HS-10542胶囊给药？	○ 是 ○ 否

表格行	
给药阶段	Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20
是否给药	○ 是 ○ 否
给药日期 (yyyy-MM-dd)	_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
给药时间 (HH:mm)	_|_|:|_|_|
给药过程异常备注	____

YN(是否进行了HS-10542胶囊给药？|是否给药):1-是, 2-否

EC1CYCLE(给药阶段) : 1-Day8,2-Day9,3-Day10,4-Day11,5-Day12,6-Day13,7-Day14,8-Day15,9-Day16,10-Day17,11-Day18,12-Day19,13-Day20

生命体征（屈螺酮炔雌醇片）	
是否进行了生命体征检查？	○ 是 ○ 否
表格行	
计划检查时间点	D1_给药前1h内 D1_给药后1h（±0.5h） D1_给药后2h（±1h） D1_给药后4h（±1h） D1_给药后8h（±1h） D1_给药后24h（±2h） D1_给药后48h（±2h） D1_给药后72h（±2h） D1_给药后96h（±2h） D1_给药后120h（±2h） D1_给药后144h（±2h） D15_给药前1h内 D15_给药后1h（±0.5h） D15_给药后2h（±1h） D15_给药后4h（±1h） D15_给药后8h（±1h） D15_给药后24h（±2h） D15_给药后48h（±2h） D15_给药后72h（±2h） D15_给药后96h（±2h） D15_给药后120h（±2h） D15_给药后144h（±2h）
是否检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
检查时间 (HH:mm)	__:__
体温（额温）（℃）	__._
体温（额温）_临床评估	○ 正常

生命体征（屈螺酮炔雌醇片）	
表格行	
	○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
体温（额温）_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
体温（额温）_请选择相关不良事件或既往病史	____
脉搏（次/分）	|_|_|_|
脉搏_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
脉搏_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
脉搏_请选择相关不良事件或既往病史	____
收缩压（mmHg）	|_|_|_|
收缩压_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
收缩压_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
收缩压_请选择相关不良事件或既往病史	____
舒张压（mmHg）	|_|_|_|
舒张压_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
舒张压_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
舒张压_请选择相关不良事件或既往病史	____

YN(是否进行了生命体征检查？|是否检查？):1-是, 2-否

生命体征（屈螺酮炔雌醇片）

CLSIGND(体温（额温）_临床评估|脉搏_临床评估|收缩压_临床评估|舒张压_临床评估):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

CSREAS(体温（额温）_若异常有临床意义，请提供详情|脉搏_若异常有临床意义，请提供详情|收缩压_若异常有临床意义，请提供详情|舒张压_若异常有临床意义，请提供详情):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史

VS2TPT(计划检查时间点) : 1-D1_给药前1h内,2-D1_给药后1h（±0.5h）,3-D1_给药后2h（±1h）,4-D1_给药后4h（±1h）,5-D1_给药后8h（±1h）,6-D1_给药后24h（±2h）,7-D1_给药后48h（±2h）,8-D1_给药后72h（±2h）,9-D1_给药后96h（±2h）,10-D1_给药后120h（±2h）,11-D1_给药后144h（±2h）,12-D15_给药前1h内,13-D15_给药后1h（±0.5h）,14-D15_给药后2h（±1h）,15-D15_给药后4h（±1h）,16-D15_给药后8h（±1h）,17-D15_给药后24h（±2h）,18-D15_给药后48h（±2h）,19-D15_给药后72h（±2h）,20-D15_给药后96h（±2h）,21-D15_给药后120h（±2h）,22-D15_给药后144h（±2h）

生命体征（HS-10542）	
是否进行了生命体征检查？	○ 是 ○ 否
表格行	
计划检查时间点	D8_给药前1h内 D9_给药前1h内 D10_给药前1h内 D11_给药前1h内 D12_给药前1h内 D13_给药前1h内 D14_给药前1h内
是否检查？	○ 是 ○ 否
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
检查时间 (HH:mm)	__:__
体温（额温）（℃）	__._
体温（额温）_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
体温（额温）_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
体温（额温）_请选择相关不良事件或既往病史	____
脉搏（次/分）	___
脉搏_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
脉搏_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
脉搏_请选择相关不良事件或既往病史	____

生命体征（HS-10542）	
表格行	
收缩压（mmHg）	|_|_|_|
收缩压_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
收缩压_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
收缩压_请选择相关不良事件或既往病史	____
舒张压（mmHg）	|_|_|_|
舒张压_临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义 ○ 未做
舒张压_若异常有临床意义，请提供详情	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史
舒张压_请选择相关不良事件或既往病史	____

YN(是否进行了生命体征检查？|是否检查？):1-是, 2-否

CLSIGND(体温（额温）_临床评估|脉搏_临床评估|收缩压_临床评估|舒张压_临床评估):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义, 97-未做

CSREAS(体温（额温）_若异常有临床意义，请提供详情|脉搏_若异常有临床意义，请提供详情|收缩压_若异常有临床意义，请提供详情|舒张压_若异常有临床意义，请提供详情):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史

VS1TPT(计划检查时间点) : 1-D8_给药前1h内,2-D9_给药前1h内,3-D10_给药前1h内,4-D11_给药前1h内,5-D12_给药前1h内,6-D13_给药前1h内,7-D14_给药前1h内

PK血样采集（屈螺酮炔雌醇片）	
是否进行PK样本采集？	○ 是 ○ 否

表格行	
计划采血时间点	D1_给药前1h内 D1_给药后0.5h D1_给药后1h D1_给药后1.5h D1_给药后2h D1_给药后2.5h D1_给药后3h D1_给药后4h D1_给药后6h D1_给药后8h D1_给药后12h D1_给药后24h D1_给药后48h D1_给药后72h D1_给药后96h D1_给药后120h D1_给药后144h D15_给药前1h内 D15_给药后0.5h D15_给药后1h D15_给药后1.5h D15_给药后2h D15_给药后2.5h D15_给药后3h D15_给药后4h D15_给药后6h D15_给药后8h D15_给药后12h D15_给药后24h D15_给药后48h D15_给药后72h

PK血样采集（屈螺酮炔雌醇片）	
表格行	
	D15_给药后96h D15_给药后120h D15_给药后144h
是否采样？	○ 是 ○ 否
如未采样，请提供原因	____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
采样时间 (HH:mm:ss)	|_|_|:|_|_|:|_|_|

YN(是否进行PK样本采集？|是否采样？):1-是, 2-否

PCTPT(计划采血时间点) : 1-D1_给药前1h内,2-D1_给药后0.5h,3-D1_给药后1h,4-D1_给药后1.5h,5-D1_给药后2h,6-D1_给药后2.5h,7-D1_给药后3h,8-D1_给药后4h,9-D1_给药后6h,10-D1_给药后8h,11-D1_给药后12h,12-D1_给药后24h,13-D1_给药后48h,14-D1_给药后72h,15-D1_给药后96h,16-D1_给药后120h,17-D1_给药后144h,18-D15_给药前1h内,19-D15_给药后0.5h,20-D15_给药后1h,21-D15_给药后1.5h,22-D15_给药后2h,23-D15_给药后2.5h,24-D15_给药后3h,25-D15_给药后4h,26-D15_给药后6h,27-D15_给药后8h,28-D15_给药后12h,29-D15_给药后24h,30-D15_给药后48h,31-D15_给药后72h,32-D15_给药后96h,33-D15_给药后120h,34-D15_给药后144h

PK血样采集（HS-10542）	
是否进行PK样本采集？	○ 是 ○ 否
表格行	
计划采血时间点	D13_给药前1h内 D14_给药前1h内 D15_给药前1h内 D15_给药后0.5h D15_给药后1h D15_给药后2h D15_给药后3h D15_给药后4h D15_给药后6h D15_给药后8h D15_给药后12h D15_给药后24h
是否采样？	○ 是 ○ 否
如未采样，请提供原因	____
采样日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
采样时间 (HH:mm:ss)	|_|_|:|_|_|:|_|_|

YN(是否进行PK样本采集？|是否采样？):1-是, 2-否

PC1TPT(计划采血时间点) : 1-D13_给药前1h内,2-D14_给药前1h内,3-D15_给药前1h内,4-D15_给药后0.5h,5-D15_给药后1h,6-D15_给药后2h,7-D15_给药后3h,8-D15_给药后4h,9-D15_给药后6h,10-D15_给药后8h,11-D15_给药后12h,12-D15_给药后24h

不良事件	
参与者是否发生了不良事件？	○ 是 ○ 否

表格行	+ 可添加行
不良事件名称	____
开始日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
开始时间 (HH:mm)	|_|_|:|_|_|
是否持续	○ 是 ○ 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
结束时间 (HH:mm)	|_|_|:|_|_|
严重程度	○ 轻度 ○ 中度 ○ 重度
与屈螺酮炔雌醇片的关系	○ 肯定有关 ○ 很可能有关 ○ 可能有关 ○ 可能无关 ○ 无关
对屈螺酮炔雌醇片的采取措施	○ 剂量不变 ○ 暂停用药 ○ 永久停药 ○ 不适用
与HS-10542胶囊的关系	○ 肯定有关 ○ 很可能有关 ○ 可能有关 ○ 可能无关 ○ 无关
对HS-10542胶囊的采取措施	○ 剂量不变 ○ 暂停用药 ○ 永久停药 ○ 不适用
转归	○ 痊愈 ○ 痊愈伴有后遗症 ○ 好转 ○ 未好转 ○ 致死 ○ 不详

HS-10542-113	不良事件	AE

不良事件	
表格行	+ 可添加行
是否是严重不良事件？	○ 是 ○ 否
导致死亡	○ 是 ○ 否
危及生命	○ 是 ○ 否
导致住院或住院时间延长	○ 是 ○ 否
导致永久或显著的残疾/功能丧失	○ 是 ○ 否
先天性异常或者出生缺陷	○ 是 ○ 否
其他重要的医学事件	○ 是 ○ 否
是否给予了合并药物治疗？	○ 是 ○ 否
是否给予了其他非药物治疗？	○ 是 ○ 否
是否导致参与者因此不良事件退出试验？	○ 是 ○ 否

YN(参与者是否发生了不良事件？|是否持续|是否是严重不良事件？|导致死亡|危及生命|导致住院或住院时间延长|导致永久或显著的残疾/功能丧失|先天性异常或者出生缺陷|其他重要的医学事件|是否给予了合并药物治疗？|是否给予了其他非药物治疗？|是否导致参与者因此不良事件退出试验？):1-是, 2-否

AESEV(严重程度):1-轻度, 2-中度, 3-重度

AEREL(与屈螺酮炔雌醇片的关系|与HS-10542胶囊的关系):1-肯定有关, 2-很可能有关, 3-可能有关, 4-可能无关, 5-无关

AEACN(对屈螺酮炔雌醇片的采取措施|对HS-10542胶囊的采取措施):1-剂量不变, 2-暂停用药, 3-永久停药, 4-不适用

AEOUT(转归):1-痊愈, 2-痊愈伴有后遗症, 3-好转, 4-未好转, 5-致死, 98-不详

既往/合并用药	
是否服用了任何药物？	○ 是 ○ 否

表格行	+ 可添加行
药物名称	____
开始日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
是否持续	○ 是 ○ 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
使用原因	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史 ○ 预防用药或其他____
如果使用原因为不良事件或既往病史，请选择相关不良事件或既往病史	____
单次剂量	____
剂量单位	○ 毫克 ○ 克 ○ 毫升 ○ 升 ○ 胶囊 ○ 片 ○ 丸 ○ 单位 ○ 其他____
给药频率	○ 一次/日 ○ 每日一次 ○ 每日二次 ○ 每日三次 ○ 每日四次 ○ 隔日一次 ○ 每周一次 ○ 按需服用 ○ 其他____ ○ 未知
给药途径	○ 口服 ○ 静脉注射 ○ 皮下注射 ○ 肌肉注射 ○ 吸入

HS-10542-113	既往/合并用药	CM

既往/合并用药

表格行 + 可添加行

○ 鼻内
○ 舌下
○ 直肠
○ 阴道
○ 其他____
○ 未知

YN(是否服用了任何药物？|是否持续):1-是, 2-否

CMINDC(使用原因):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史, 99-预防用药或其他____

CMDOSU(剂量单位):1-毫克, 2-克, 3-毫升, 4-升, 5-胶囊, 6-片, 7-丸, 8-单位, 99-其他____

CMDOSFRQ(给药频率):1-一次/日, 2-每日一次, 3-每日二次, 4-每日三次, 5-每日四次, 6-隔日一次, 7-每周一次, 8-按需服用, 99-其他____ 96-未知

CMROUTE(给药途径):1-口服, 2-静脉注射, 3-皮下注射, 4-肌肉注射, 5-吸入, 6-鼻内, 7-舌下, 8-直肠, 9-阴道, 99-其他____ 98-未知

既往/合并非药物治疗	
是否采取任何非药物治疗？	○ 是 ○ 否

表格行	+ 可添加行
治疗方案	____
开始日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
是否持续	○ 是 ○ 否
结束日期 (yyyy-MM-dd)	|_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
治疗原因	○ 不良事件 ○ 既往/现病史 ○ 不良事件和既往/现病史 ○ 预防治疗或其他____
如果治疗原因为不良事件或既往病史，请选择相关不良事件或既往病史	____

YN(是否采取任何非药物治疗？|是否持续):1-是, 2-否

PRINDC(治疗原因):1-不良事件, 2-既往/现病史, 3-不良事件和既往/现病史, 99-预防治疗或其他

____

提前终止	
参与者是否提前终止治疗	○ 是 ○ 否
提前终止日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
提前终止的原因	○ 不良事件 ○ 研究者认为参与者不再适合继续使用试验用药品（如精神疾病或社会状态可能干扰患者的权利、安全、合作和参与研究等） ○ 参与者要求终止治疗，但同意继续接受随访 ○ 参与者撤回知情同意或主动退出 ○ 死亡 ○ 失访 ○ 妊娠 ○ 试验终止（申办方可随时终止本试验）或中心关闭 ○ 其他____
如果因不良事件提前终止，请选择相关不良事件	____

DSTERM(提前终止的原因):1-不良事件, 2-研究者认为参与者不再适合继续使用试验用药品（如精神疾病或社会状态可能干扰患者的权利、安全、合作和参与研究等）, 3-参与者要求终止治疗，但同意继续接受随访, 4-参与者撤回知情同意或主动退出, 5-死亡, 6-失访, 7-妊娠, 8-试验终止（申办方可随时终止本试验）或中心关闭, 99-其他____

试验总结	
参与者是否根据方案要求完成试验？	○ 是 ○ 否
完成/退出试验日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
退出试验原因	○ 参与者撤回知情同意或主动退出 ○ 试验终止或中心关闭 ○ 参与者失访 ○ 参与者死亡 ○ 其他____
DSTERM1(退出试验原因):1-参与者撤回知情同意或主动退出, 2-试验终止或中心关闭, 3-参与者失访, 4-参与者死亡, 99-其他____	

计划外检查	
身高体重	□
体格检查	□
生命体征	□
12导联心电图	□
血常规	□
血生化	□
尿常规	□
凝血功能	□
结核感染T细胞干扰素释放试验（TB-IGRA）	□
胸部 X 光片	□
腹部B超	□
妇科彩超	□
乳腺彩超	□
血妊娠检查	□
传染病筛查	□
酒精呼气检测	□
尿液药物滥用筛查	□
PK血样采集（非计划）	□
其他检查	□

HS-10542-113	计划外检查	UNS

计划外检查

HS-10542-113	其他检查	LBOTH

其他检查	
表格行	+ 可添加行
检查项目	____
检查日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
检查结果	____
参考范围	____
临床评估	○ 正常 ○ 异常无临床意义 ○ 异常有临床意义
备注	____

CLSIG(临床评估):1-正常, 2-异常无临床意义, 3-异常有临床意义

HS-10542-113	PK血样采集（非计划）	PCU

PK血样采集（非计划）	
是否进行非计划PK样本采集？	○ 是 ○ 否
PK血样类型	○ 屈螺酮炔雌醇片 ○ HS-10542
采样日期 (yyyy-MM-dd)	____-__-__
采样时间 (HH:mm)	__:__