ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ" ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4: «СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП: УХОД, НАБЛЮДЕНИЕ, ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ»

Цель занятия

Сформировать у Вас осознанное отношение к сосудистому доступу как к «линии жизни», научить правилам ежедневного ухода, самоконтроля и распознаванию признаков осложнений.

доступ
— это
«дверь»
для
очистки
крови

«Линия жизни»

= единственный путь для связи
с аппаратом «искусственная почка»

его сохранность



= качество и безопасность процедуры

ВИДЫ ДОСТУПА И ТОЧКИ ОСМОТРА

Рука с Артериовенозной фистулой (АВФ)

«ИЩИТЕ ПУЛЬСАЦИЮ И «ШУМ» КАЖДОЕ УТРО»

место для пальпации пульсации и точка, куда прикладывать палец для ощущения вибрации («шума»), вибрация должна ощущаться только над анастомозом





Центральный венозный катетер

место выхода: осматривайте на предмет покраснения и выделений



«ВАШ ДОСТУП — ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЗНАЙТЕ ЕГО ВИД И ПРАВИЛА УХОДА!»


Норма
Капилляры
Артерия
Вена
Артериовенозная фистула
Артерия
Вена

артерия

+


вена

=


мощный сосуд под кожей

Ежедневный осмотр

Посмотри

Каждое утро осмотрите кожу над доступом. Она должна быть обычного цвета, без покраснений, синяков, припухлостей, ранок или гнойничков.

Послушай

Аккуратно приложите палец или ухо к месту фистулы. Вы должны чувствовать или слышать легкое постоянное «дрожание» (шум, вибрацию). Это звук тока крови — главный признак того, что фистула работает! Его исчезновение — сигнал срочно звонить врачу.

Ощупай

Аккуратно прикоснитесь к области доступа. Кожа должна быть обычной температуры (не горячей). При легком нажатии вы должны чувствовать характерную пульсацию (как слабый пульс) и упругость сосуда. Отсутствие пульсации — тревожный знак!

Гигиена и защита

Правила:

- ✓ мытье с мылом перед диализом,
- ✓ запрет на измерение АД и забор крови на руке с доступом,
- ✓ избегание ударов, сдавлений, ношения тяжестей.



Тревожные сигналы (для АВФ)

- покраснение
- отек
- кровотечение
- вибрация



Тревожные сигналы (для катетера)

- инфекция (боль, покраснение)
- стеноз (сужение вены)
- тромбоз (закупорка катетера или вены)
- кровотечение

Что делать, если вы обнаружили тревожный признак?

1. НЕ ПАНИКОВАТЬ.

2. При кровотечении из места прокола — немедленно наложите чистую салфетку и плотно прижмите пальцами на 10-15 минут.

3. НЕМЕДЛЕННО СВЯЗАТЬСЯ С ОТДЕЛЕНИЕМ ДИАЛИЗА (по телефону, который у вас есть) или, если это невозможно/ситуация тяжелая (нет «шума», сильная боль, отек), ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ (103/112). Четко скажите: «У меня пациент на гемодиализе, проблемы с сосудистым доступом».

Итоги

Итак, ваш сосудистый доступ — это не просто «дырочка для иголок». Это сложно созданная и жизненно важная система. Ее долголетие и безопасность на 90% зависят от вашего ежедневного внимательного ухода и осведомленности. Вы — главный страж своей «линии жизни».

Анонс следующего занятия

Вы — отличные стражи своего доступа! Теперь давайте поговорим о внутренней поддержке организма. На следующем занятии мы разберем лекарственную терапию. До встречи!