Les schémas du chapitre 12 à savoir refaire

20 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. La démarche d'adaptation d'une recette en cinq étapes (12.3.1, figure 12.1 ; exercice 2 (figure 12.6))



L'atelier adapte la prescription, il ne la choisit pas ; variantes discrètes, secret

Dire : quiche contrôlée en sel : cible = lardons, fromage, pâte industrielle, sel ajouté ; techniques = pâte maison, légumes, fromage réduit, herbes ; vérifier le sel par portion ; ajuster les aromates après dégustation.

2. De la préconisation au geste en cuisine (12.3.1)

Préconisation	En cuisine	Contrôle
Contrôlée en sel, 5-6 g/j	pas de cube ; sel mesuré, à la fin	sel par portion calculé
IDDSI 4 (aliments)	mixé lisse, tient sur la cuillère	fourchette et cuillère, chaque lot
IDDSI 2 (boissons)	légèrement épaissies, produit prescrit	seringue de 10 mL
Glucides ≈ 60 g	portion de féculents, dessert compté	glucides affichés
Éviction du gluten	naturellement sans gluten, poste séparé	étiquettes gardées, ordre
Enrichie	lait en poudre, fromage, œuf	gain par portion
Allergie (PAI)	sans l'allergène pour tous	trousse présente


Dire : la préconisation est une information de santé : sur la fiche technique on écrit « variante sans sel : 2 portions », jamais le nom. En cas de doute, on demande au soignant référent.

3. La rubrique « variantes » de la fiche technique (12.3.1)

1	**Recette commune**	velouté potiron-lentilles corail, sans sel ajouté : 148 kcal, 8,5 g de protéines, 0,05 g de sel
2	**Point de prélèvement**	après mixage, avant tout ajout de sel
3	**Sel standard**	+ 0,6 g par portion, en fin de cuisson → 0,65 g
4	**Enrichie**	+ 10 g de lait en poudre + 20 g d'emmental → 258 kcal, 17,5 g
5	**Texture, allergènes**	niveau 4 : mixer plus, test ; sans lait : eau de cuisson
6	**Identification**	couvercle vert = sans sel ; étiquette jaune = enrichie

Dire : la rubrique évite les improvisations le jour du service. Les valeurs sont recalculées pour chaque variante. Coût du velouté : 2,92 € pour 6, soit 0,49 € par portion (potiron brut = 900 / 0,70 = 1 286 g).

4. Mixer sans diluer : protéines pour 100 g (12.3.1)



Dire : au bouillon, la densité baisse de 36 % : il faudrait 157 g de mixé pour égaler 100 g de viande. Trois gestes : le moins de liquide possible, un liquide nourrissant, enrichir. 120 g/j : + 2,1 g, soit 63 g par mois.

5. Les trois temps de la déglutition (12.3.1)

Temps oral (volontaire)

- mastication, bol, langue
- difficulté : dents, bouche sèche
- → aliments tendres, humides
- → sauce pour lubrifier

Temps pharyngé (réflexe)

- l'épiglotte protège
- réflexe retardé
- → boissons épaissies
- → pas de textures mixtes

Temps œsophagien (réflexe)

- descente vers l'estomac
- reflux, obstacle
- → assis pendant le repas
- → et 30 min après

Dire : signes d'alerte : toux, voix mouillée, larmoiement, aliments gardés en bouche, repas très long, fièvres répétées, perte de poids. On signale ; l'équipe (médecin, orthophoniste) évalue et prescrit la texture.

6. Le cadre IDDSI des textures modifiées (12.3.1, figure 12.2 ; exercice 1 (figure 12.5))

Niveau	Nom	Boissons	Aliments
7	facile à mastiquer / normal		oui
6	petits morceaux tendres (≈ 1,5 cm ; enfant 8 mm)		oui
5	haché lubrifié (≤ 4 mm ; enfant 2 mm)		oui
4	très épais / mixé lisse	oui	oui
3	modérément épais / liquidisé	oui	oui
2	légèrement épais	oui	
1	très légèrement épais	oui	
0	fluide	oui	


Dire : IDDSI = International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, lancée en 2013, cadre de 2016, tests mis à jour en 2019 : 8 niveaux, 0 à 7, communs aux boissons et aux aliments pour les niveaux 3 et 4.

7. Les tests IDDSI (12.3.1)

Test	Niveaux	Lecture
Seringue de 10 mL, 10 secondes	boissons 0 à 3	< 1 mL : 0 ; 1-4 : 1 ; 4-8 : 2 ; > 8 : 3
Égouttement à la fourchette	3 et 4	3 : coule en gouttes ; 4 : petit tas au-dessus
Inclinaison de la cuillère	4	tient sa forme, glisse en bloc, peu de résidu
Pression à la fourchette	5 et 6	s'écrase ; 6 : l'ongle du pouce blanchit
Série niveau 2	jus 6, café 5	conformes
	lait 9 / eau 3	trop épais / trop fluide


Dire : on teste chaque lot, à la température de service, on note le résultat (traçabilité), on corrige et on refait le test. Avec la même dose, chaque liquide réagit différemment (le lait épaissit plus).

8. Épaissir les boissons (12.3.1)




Dire : préparer au moment, sinon l'amidon dépasse le niveau prescrit (carafe du matin trop épaisse le soir). Eau : ≈ 30 mL/kg/j chez la personne âgée ; Mme F. (55 kg) n'atteint que 1 055 mL sur 1 650, soit 64 %.

9. Des textures modifiées qui donnent envie (12.3.1)



Dire : un mixé « tout mélangé » se mange mal et favorise la dénutrition. La gélatine fond dans la bouche : texture mixte à éviter sans avis de l'orthophoniste. Restes : 30 % → 13,8 % avec des mixés moulés et nappés.

10. Sel par portion avant et après adaptation (12.3.1, figure 12.3)



Dire : sel = sodium × 2,5 ; OMS < 5 g/j (2012). Pizza − 65,2 % : la pâte apportait la moitié du sel. Sandwich − 47,7 % : le pain reste la première source. Bouillon maison : sel ÷ 5. Données fictives, calculs Ciqual 2025.

11. Les allégations sur le sel (règlement 1924/2006) (12.3.1)

Mention	Seuil pour 100 g ou 100 mL	Ce qu'il faut comprendre
Pauvre en sodium / en sel	≤ 0,12 g de sodium (0,3 g de sel)	convient souvent
Très pauvre en sodium	≤ 0,04 g de sodium	convient
Sans sodium / sans sel	≤ 0,005 g de sodium	eau minérale par exemple
Sans sel ajouté	aucun sel ajouté	sodium naturel possible
Teneur réduite en sel	− 25 % vs produit comparable	peut rester salé (jambon ≈ 1,5 g)

Dire : la consigne de soin « sans sel ajouté » (aucun sel en cuisine ni à table) n'est pas l'allégation d'étiquette. Seul le chiffre « sel pour 100 g », rapporté à la portion, permet de décider.

12. Corriger une hypoglycémie (12.3.1)

1. **Reconnaître** — < 0,70 g/L : tremblements, sueurs, pâleur, faim brutale, malaise
2. **Resucrer** — 15 g : 3 morceaux de sucre n° 4 ou 150 mL de jus ou de soda
3. **Attendre** — 15 minutes au repos, puis recontrôler ; resucrer si encore bas
4. **Prévenir la rechute** — glucides lents si le repas est loin (pain, biscuit)
5. **Urgence** — ne peut pas avaler ou inconscient : 15, rien par la bouche
6. **Signaler** — à la personne et, avec son accord, à son équipe

Dire : pas de chocolat ni de biscuits gras (les lipides ralentissent l'absorption), pas plusieurs sucres à la suite, ne jamais laisser seul. Les personnes sous insuline apportent leur matériel ; sucre dans la trousse.

13. Charge glycémique d'une portion (12.3.1)



Dire : CG = IG × glucides de la portion / 100 ; faible < 10, élevée > 20 (IG : Atkinson et coll., 2008). La purée a un IG de 87 mais peu de glucides. L'IG est une tendance ; le repère principal reste la quantité de glucides fixée par l'équipe.

14. La méthode de l'assiette (12.3.1)

½ légumes

- crus et cuits
- à volonté ou presque
- fibres, volume

¼ féculents ou légumineuses

- pâtes 150 g = 47,1 g
- riz 150 g = 49,8 g
- pain 50 g = 29,2 g
- lentilles 200 g = 32,4 g

¼ protéines

- viande, poisson, œuf
- légumineuses, tofu
- + laitage, fruit
- + un peu de gras


Dire : la méthode s'adapte aux plats uniques (couscous, mafé) en jouant sur les proportions, avec une louche graduée. Exercice : couscous 300 g + pain 50 g = 122,2 g → 200 g sans pain (62 g) ou 150 g + pois chiches (64,2 g).

15. Matières grasses : composition et usage (12.3.1)

Matière grasse	Point fort	Usage	À éviter
Colza	ω-3 (ALA), mono-insaturés	assaisonnement, cuisson douce	friture
Noix, lin	très riches en ω-3	cru, au frais	toute cuisson
Olive	acide oléique	cuisson douce à moyenne	huile qui fume
Tournesol	ω-6	en alternance	usage exclusif
Beurre	goût, vitamine A ; saturés	cru, cuisson douce	cuisson vive (120-130 °C)
Palme, coprah	très riches en saturés	—	usage régulier

Dire : ANSES 2011 : lipides 35-40 % de l'énergie, saturés ≤ 12 %, ω-6/ω-3 < 5, EPA + DHA 500 mg/j. Part des saturés = AGS × 9 / kcal × 100 : gratin dauphinois 32,8 % → 13,4 %.

16. EPA + DHA par portion (Ciqual 2025) (12.3.1)




Dire : repère de 3 500 mg par semaine (500 mg/j, ANSES 2011). Une portion de petit poisson gras couvre l'essentiel ; le thon en boîte en apporte peu. Varier les espèces (méthylmercure, PCB) ; femmes enceintes et jeunes enfants évitent les grands prédateurs.

17. Allergie, intolérance, maladie cœliaque (12.3.1)

Situation	Mécanisme	Gravité	Conduite
Allergie (IgE)	immunitaire, protéine	anaphylaxie possible	éviction stricte, trousse
Maladie cœliaque	auto-immune, gluten	lésions intestinales	éviction à vie, ≤ 20 mg/kg
Intolérance au lactose	manque de lactase	digestive, jamais de choc	≈ 12 g tolérés (EFSA 2010)
Syndrome oral	pollen / fruits crus	souvent bénin	fruits cuits souvent tolérés
Latex-fruits	banane, kiwi, avocat, châtaigne	parfois grave	pas de gants latex

Dire : 14 allergènes (INCO 1169/2011) ; information écrite pour le non préemballé (décret 2015-447). Un bouillon cube peut cacher gluten, céleri et lait. Les mentions « peut contenir » sont volontaires : on suit le PAI.

18. Réaction allergique pendant un atelier (12.3.1)



Dire : on appelle le 15 dans tous les cas après adrénaline (seconde réaction possible). Prévention : recette sans l'allergène pour tous, achats faits soi-même, emballages gardés, aucune denrée apportée de l'extérieur.

19. Diagnostiquer la dénutrition (HAS 2019 et 2021) (12.3.1)

Phénotypique (≥ 1)

- perte ≥ 5 % en 1 mois
- ou ≥ 10 % en 6 mois
- IMC < 18,5 (< 22 à 70 ans et plus)
- baisse musculaire / sarcopénie

Étiologique (≥ 1)

- apports − 50 % > 1 semaine
- ou réduits > 2 semaines
- absorption réduite
- agression : infection, cancer

Sévérité

- IMC ≤ 17 (< 20 après 70 ans)
- − 10 %/1 mois ou − 15 %/6 mois
- albumine ≤ 30 g/L
-

Dire : M. T. : IMC 18,9 mais − 12,1 % en 3 mois et apports ÷ 2 : dénutrition modérée. Une personne en surpoids peut être dénutrie (Mme V., IMC 27,4, − 12,2 %). En atelier, on ne pèse pas : on repère et on oriente.

20. Sept gestes d'enrichissement sur une journée (12.3.1)

Moment	Geste	Énergie	Protéines
Petit-déjeuner	10 g de lait en poudre	36 kcal	3,5 g
Déjeuner	20 g d'emmental + 1 œuf dans la purée	144 kcal	11,9 g
Goûter	10 g de lait en poudre dans le yaourt	36 kcal	3,5 g
Dîner	crème 15 g + lait en poudre 10 g + beurre 10 g	154 kcal	4,0 g
Total	7 gestes, volume inchangé	370 kcal	22,9 g

Dire : enrichir = densité sans volume, avant les CNO (HAS 2007 : + 400 kcal et/ou 30 g/j, à distance des repas). Ne pas enrichir que du gras : beurre + crème = 237 kcal mais 0,8 g de protéines. Fractionner en 5-6 prises, jeûne nocturne ≤ 12 h.