
Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 11

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Culinary techniques, food culture and tasting methods

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 11

Article de synthèse · Review article

Chapitre 11 – Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires, culture culinaire et techniques de dégustation

Culinary techniques, food culture and tasting methods

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cours

Chapitre 11

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Techniques culinaires; Physico-chimie; Choix des aliments; Culture culinaire; Dégustation

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. nommer et mettre en œuvre les principales techniques culinaires (tailles, cuissons, liaisons, préparations de base) et leurs conditions de réussite ; classer les modes de cuisson selon leur principe (concentration, expansion, mixte) et choisir une cuisson adaptée à l'objectif et au public ; expliquer les modifications physico-chimiques des aliments au cours des préparations (amidon, protéines, lipides, glucides, pigments, vitamines, minéraux) ; adapter les pratiques culinaires pour préserver la valeur nutritionnelle et limiter les composés indésirables ; choisir les aliments selon les portions, le coût, la saison, la qualité, l'équité et l'impact environnemental ; situer une recette dans la culture culinaire française, régionale et du monde.

Contenu. 11.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ; 11.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ; 11.3.1 Les techniques culinaires et leurs conditions de réussite ; 11.3.2 Les modifications physico-chimiques au cours des préparations ; 11.3.3 Choisir les aliments : portions, coût, qualité, équité, environnement ; 11.3.4 La culture culinaire ; 11.3.5 Les techniques de dégustation ; 11.3.6 Fil rouge : technique et dégustation dans les ateliers des Tilleuls ; 11.4.1 Réduire le sel, le sucre et le gras sans perdre le plaisir ; 11.4.2 Les légumineuses en cuisine.

Conclusion. Le cours donne les notions exigibles, les méthodes et les situations professionnelles du chapitre.

ABSTRACT

Culinary techniques, food culture and tasting methods. This review belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ Tailles : julienne, brunoise, paysanne, macédoine, jardinière, mirepoix ; régularité = cuisson homogène ; sécurité de la découpe (« griffe »).

■ Cuissons : concentration (rôtir, griller, sauter, frire), expansion (départ à froid, bouillir, pocher), mixte (braiser, ragoût) ; vapeur, étuvée, papillote : cuissons douces.

■ Bases : fonds, liaisons (roux, fécule, œuf), sauces mères, émulsions, pâtes, appareils.

■ Repères : empesage de l'amidon ≈ 60-80 °C ; coagulation du blanc d'œuf ≈ 62-65 °C ; Maillard intense ≈ 140-180 °C ; caramélisation ≈ 160 °C ; point de fumée des huiles ≈ 170-230 °C.

■ Nutriments : vitamines hydrosolubles sensibles à la chaleur, à l'eau, à l'air, à la lumière ; gestes : laver avant de couper, peu d'eau, cuisson courte, réutiliser l'eau de cuisson.

Sommaire

11.1 Compétences mobilisées 4

11.2 Croisement référentiel × précisions × indications 4

11.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4

11.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 5

11.3 Cours 5

11.3.1 Les techniques culinaires et leurs conditions de réussite 5

11.3.2 Les modifications physico-chimiques au cours des préparations 13

11.3.3 Choisir les aliments : portions, coût, qualité, équité, environnement 21

11.3.4 La culture culinaire 27

11.3.5 Les techniques de dégustation 32

11.3.6 Fil rouge : technique et dégustation dans les ateliers des Tilleuls 42

11.4 Approfondissements 43

11.4.1 Réduire le sel, le sucre et le gras sans perdre le plaisir 43

11.4.2 Les légumineuses en cuisine 45

11.4.3 Les textures : gels, mousses, émulsions 46

11.4.4 Analyse sensorielle et restauration collective 47

11.4.5 Le goût, une construction sociale et culturelle 48

11.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 49

11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 50

Ce que le jury attend sur les techniques culinaires, le choix des aliments et la dégustation 54

11.7 L'essentiel à retenir 56

11.8 Entraînement 56

11.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 56

11.8.2 Exercices 57

11.8.3 Questions de réflexion 59

11.8.4 Étude de cas 59

11.8.5 Mises en situation express 59

11.9 Glossaire 60

11.10 Renvois bibliographiques par notion 60

11.12 Bibliographie numérotée 61

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- nommer et mettre en œuvre les principales techniques culinaires (tailles, cuissons, liaisons, préparations de base) et leurs conditions de réussite ;
- classer les modes de cuisson selon leur principe (concentration, expansion, mixte) et choisir une cuisson adaptée à l'objectif et au public ;
- expliquer les modifications physico-chimiques des aliments au cours des préparations (amidon, protéines, lipides, glucides, pigments, vitamines, minéraux) ;
- adapter les pratiques culinaires pour préserver la valeur nutritionnelle et limiter les composés indésirables ;
- choisir les aliments selon les portions, le coût, la saison, la qualité, l'équité et l'impact environnemental ;
- situer une recette dans la culture culinaire française, régionale et du monde ;
- conduire une dégustation : sens mobilisés, vocabulaire, épreuves d'analyse sensorielle, conditions de réalisation ;
- utiliser la dégustation et l'éducation sensorielle en atelier, notamment face à la néophobie alimentaire.

11.1 Compétences mobilisées

Compétence · Ce que le chapitre apporte · Indicateurs du référentiel travaillés

C3.2 — *Ce que le chapitre apporte :* Cœur des savoirs techniques de l'atelier culinaire : techniques, physico-chimie, choix des aliments, culture culinaire, dégustation ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Techniques culinaires adaptées aux objectifs et au contexte ; pratique des techniques culinaires maîtrisée ; techniques de dégustation maîtrisées ; qualité organoleptique adaptée au public ; gestes éco-responsables intégrés

C3.1 — *Ce que le chapitre apporte :* Des recettes économiques, de saison et culturellement adaptées rendent les actions plus pertinentes ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes

C3.3 — *Ce que le chapitre apporte :* L'analyse sensorielle est une méthode de recueil de données (épreuves normalisées, jurys) ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Méthodes et outils de collecte pertinents

C3.5 — *Ce que le chapitre apporte :* Le vocabulaire sensoriel et l'animation d'une dégustation ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Communication adaptée au public

11.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025) · Objectifs pour l'apprenant · Limites et attendus

Techniques culinaires traditionnelles et actuelles — *Objectifs pour l'apprenant :* Nommer, réaliser, justifier une technique ; *Limites et attendus :* Dénominations usuelles ; conditions de réussite

Modifications physico-chimiques — *Objectifs pour l'apprenant :* Expliquer ce qui se passe à la cuisson ; *Limites et attendus :* Lien BPADN : amidon, protéines, lipides, vitamines

Adaptation et valorisation des pratiques — *Objectifs pour l'apprenant :* Proposer des gestes qui préservent la qualité nutritionnelle ; *Limites et attendus :* Cuissons douces, eau de cuisson, matières grasses

Choix des aliments — *Objectifs pour l'apprenant :* Argumenter selon portions, coût, saison, qualité, impact ; *Limites et attendus :* Fait maison ; commerce équitable ; faible impact environnemental

Culture culinaire — *Objectifs pour l'apprenant :* Situer une recette dans un patrimoine ; *Limites et attendus :* Patrimoine français, régions, spécialités du monde

Techniques de dégustation — *Objectifs pour l'apprenant :* Conduire une analyse sensorielle simple ; *Limites et attendus :* Sens, vocabulaire, épreuves, conditions

Éducation sensorielle — *Objectifs pour l'apprenant :* Utiliser les sens en atelier ; *Limites et attendus :* Néophobie, exposition répétée, plaisir

11.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 67 pour les savoirs « Préparations culinaires », « Modifications physico-chimiques », « Culture culinaire » et « Techniques de dégustation » ; p. 58 pour la transition écologique). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 11.2.2.

Texte · Critère ou notion · Où dans ce cours

Guide 2025, p. 67 — *Critère ou notion :* Techniques culinaires traditionnelles et actuelles ; conditions de réussite ; adaptations au public ; *Où dans ce cours :* 11.3.1

Guide 2025, p. 67 — *Critère ou notion :* Conséquences physico-chimiques des techniques ; adaptation et valorisation des pratiques ; *Où dans ce cours :* 11.3.2

Guide 2025, p. 67 — *Critère ou notion :* Choix des aliments ; aliments équitables et à faible impact environnemental ; grammages et portions ; valorisation du fait maison ; critères économiques ; *Où dans ce cours :* 11.3.3

Guide 2025, p. 67 — *Critère ou notion :* Patrimoine gastronomique français et traditions régionales ; spécialités mondiales ; dénominations ; qualités des préparations ; *Où dans ce cours :* 11.3.4

Guide 2025, p. 67 — *Critère ou notion :* Méthodes d'analyse sensorielle ; outils de perception sensorielle ; évaluation de la qualité organoleptique ; *Où dans ce cours :* 11.3.5 (encadré « Repères » du CNED)

Référentiel, C3.2 — *Critère ou notion :* « Choix des techniques culinaires adaptées aux objectifs et au contexte » ; « Pratique des techniques culinaires maîtrisée » ; *Où dans ce cours :* 11.3.1 ; 11.3.2

Référentiel, C3.2 — *Critère ou notion :* « Techniques de dégustation maîtrisées » ; « Qualité organoleptique des préparations réalisées adaptée au public » ; *Où dans ce cours :* 11.3.5

Référentiel, C3.2 — *Critère ou notion :* « Gestes éco-responsables intégrés » ; *Où dans ce cours :* 11.3.3 (gaspillage, saison, impact) ; chapitre 13

11.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Activités technologiques d'alimentation – Module 1* traite l'évaluation sensorielle (séquence 6), les produits alimentaires intermédiaires et les gélifiants (séquence 7) et les critères de présentation et de dégustation de l'épreuve pratique (séquence 1). Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

ATA M1 S1 (p. 4 à 7) — *Contenu CNED :* Présentation des plats (crudités, tartes, braisés, gratins, pâte à choux) ; critères de dégustation (cuisson, assaisonnement, consistance, adaptation au régime) ; *Où dans ce cours :* 11.3.1 ; 11.3.5

ATA M1 S6 (p. 3 à 7) — *Contenu CNED :* Définition de l'évaluation sensorielle ; cinq récepteurs sensoriels ; grilles de dégustation ; *Où dans ce cours :* 11.3.5 (épreuves, vocabulaire ; encadré « Repères » du CNED)

ATA M1 S7 (p. 3) — *Contenu CNED :* Produits alimentaires intermédiaires ; gammes de produits ; *Où dans ce cours :* 11.3.3 (gammes, fait maison) ; encadré « Repères » du CNED

ATA M1 S7 (p. 4) — *Contenu CNED :* Gélatine et agar-agar : doses et mise en œuvre ; *Où dans ce cours :* 11.4 (gélifiants) ; encadré « Repères » du CNED

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **DLUO** (S7, p. 3) : depuis le règlement (UE) n° 1169/2011, applicable le 13 décembre 2014, on parle de **date de durabilité minimale (DDM)**, « à consommer de préférence avant… ».
- **Gélatine** (S7, p. 4) : le fascicule la range parmi les additifs. En droit européen, la gélatine est un **ingrédient**, sans numéro E ; l'agar-agar, lui, est bien un additif (**E406**).
- **Gammes** (S7, p. 3) : la 5e gamme désigne des produits **cuits**, conditionnés sous vide ou sous atmosphère, prêts à réchauffer ; la « 6e gamme » (lyophilisés, ionisés) n'est pas une catégorie reconnue partout.
- **Ultra-transformés** : l'ANSES (30 janvier 2025) constate l'absence de définition consensuelle ; le PNNS 5 (2026-2030) vise à réduire leur consommation de 20 % (le texte citait le PNNS 4).

11.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

11.3.1 Les techniques culinaires et leurs conditions de réussite

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 4 à 7)

Les techniques préliminaires

Avant toute cuisson, les **techniques préliminaires** préparent les aliments : laver, éplucher (ou « éplucher à vif » les agrumes), parer (retirer les parties non consommables), tailler, mariner, blanchir. Elles conditionnent l'hygiène, l'aspect, la cuisson homogène et le rendement (chapitre 10 : grammages bruts et nets).



Figure 11.1 – Les principales tailles de légumes

Comprendre le schéma – Figure 11.1

1. Julienne : bâtonnets très fins (environ 1 à 2 mm de section, 4 à 5 cm de long) ; garnitures, salades, potages.

2. Brunoise : très petits dés (environ 1 à 3 mm), souvent obtenus à partir d'une julienne ; garnitures fines, farces, sauces.

3. Paysanne : fines tranches carrées, rondes ou triangulaires (environ 1 × 1 cm, 1 à 2 mm d'épaisseur) ; potages, poêlées.

4. Macédoine : dés réguliers (environ 4 à 5 mm) ; salades

composées.

5. Jardinière : bâtonnets (environ 4 mm de section, 4 cm de long) ; garnitures de légumes.

6. Mirepoix : gros dés irréguliers de légumes aromatiques (carotte, oignon, céleri) qui parfument fonds, sauces et braisés ; elle n'est généralement pas servie.

7. Les dimensions sont des **ordres de grandeur** : l'essentiel est la **régularité**, qui assure une cuisson homogène. On ajoute : **émincer** (tranches fines), **ciseler** (petits dés d'oignon ou d'échalote, ou lanières d'herbes), **chiffonnade** (fines lanières de feuilles), **tourner** (donner une forme régulière).

Attention – Sécurité de la découpe

Planche stable (un torchon humide dessous), couteau bien aiguisé (un couteau émoussé glisse), position de la main « en griffe » (doigts repliés, ongles vers l'intérieur, la lame guidée par les phalanges), couteau posé à plat après usage, jamais laissé dans l'évier. En atelier, adapter l'outil à l'âge (chapitre 10).

Les techniques préliminaires pas à pas

Chaque technique préliminaire a un but précis. Le tableau donne le geste, ce qu'il apporte et le point de vigilance. Les mots en gras sont ceux que l'on attend dans une fiche technique.

Technique · Geste · But · Point de vigilance

Laver — *Geste :* Passer sous l'eau courante, frotter les légumes racines, changer l'eau des salades ; *But :* Éliminer la terre, les impuretés et une partie des micro-organismes ; *Point de vigilance :* Laver **avant** d'éplucher et de couper ; ne pas laisser tremper

Éplucher — *Geste :* Retirer la peau avec un économe ou un couteau d'office ; *But :* Retirer les parties non comestibles ou abîmées ; *Point de vigilance :* Éplucher **finement** : beaucoup de vitamines et de fibres sont sous la peau

Parer — *Geste :* Retirer les parties abîmées, les fibres dures, la graisse visible ; *But :* Rendre l'aliment présentable et régulier ; *Point de vigilance :* Garder les parures propres pour un bouillon le jour même

Tailler — *Geste :* Couper en formes régulières (11.3.1, Figure 11.1) ; *But :* Cuisson homogène, aspect ; *Point de vigilance :* Couper au **dernier moment**

Ciseler — *Geste :* Tailler finement un oignon, une échalote, ou couper des herbes en lanières ; *But :* Répartir le goût sans gros morceaux ; *Point de vigilance :* Couteau bien aiguisé, sinon l'oignon s'écrase et rend son jus

Émincer — *Geste :* Couper en tranches fines et régulières ; *But :* Cuisson rapide (poêlées, wok) ; *Point de vigilance :* Tranches d'épaisseur égale

Monder — *Geste :* Plonger quelques secondes une tomate ou une pêche dans l'eau bouillante, puis dans l'eau froide, et retirer la peau ; *But :* Retirer une peau fine sans perte de chair ; *Point de vigilance :* Temps très court, sinon le fruit cuit

Blanchir — *Geste :* Plonger brièvement dans l'eau bouillante, puis refroidir ; *But :* Fixer la couleur, attendrir, inactiver des enzymes avant congélation ; *Point de vigilance :* Refroidir aussitôt ; c'est une précuisson

Dégorger — *Geste :* Saupoudrer de sel (concombre, aubergine) ou faire tremper (abats) ; *But :* Faire sortir l'eau ou les impuretés ; *Point de vigilance :* Le sel ajouté augmente l'apport en sel : rincer et ne pas resaler

Mariner — *Geste :* Laisser l'aliment dans un mélange aromatique (huile, acide, épices, herbes) ; *But :* Parfumer, attendrir légèrement ; *Point de vigilance :* Toujours au **réfrigérateur** ; ne pas réutiliser une marinade crue sans la cuire

L'ordre des opérations et l'hygiène

En cuisine collective comme en atelier, on applique le principe de la **marche en avant** : les produits passent du « sale » (légumes terreux, emballages) au « propre » (légumes lavés, épluchés, taillés), puis au « cuit », sans retour en arrière. En atelier, on l'organise avec des zones sur le plan de travail et des bacs différents.

1. **Déballer** les produits dans une zone dédiée et jeter les emballages.
2. **Laver** les légumes et les fruits entiers.
3. **Éplucher** et **parer** sur une planche réservée aux produits non lavés ou bruts.
4. **Rincer** rapidement si nécessaire, puis **tailler** sur une planche propre.
5. **Conserver au froid** les préparations qui attendent la cuisson.

Attention – Les planches et les couteaux

Une même planche ne sert pas successivement à la viande crue et aux légumes qui seront mangés crus, sans être lavée entre les deux. En atelier, on prévoit des planches de couleurs différentes ou on les lave systématiquement. On se lave les mains après avoir manipulé de la viande, du poisson, des œufs crus ou des légumes terreux.

Rendement et taux de perte

Les techniques préliminaires font perdre du poids : épluchures, trognons, fanes, parures. Pour commander juste, on distingue le **poids brut** (acheté) et le **poids net** (utilisé). Les deux indicateurs se calculent ainsi :

- **Taux de perte** = (poids brut − poids net) / poids brut × 100.
- **Rendement** = poids net / poids brut (un nombre entre 0 et 1).
- **Poids brut à acheter** = poids net voulu / rendement.

Les rendements varient selon le produit, la saison, le calibre et la technique d'épluchage. Le plus fiable est de **peser soi-même** une fois, comme on le fait pour établir une fiche technique (chapitre 10).

Exemple – Calcul détaillé : commander les pommes de terre et les poireaux d'un atelier

Une cuisinière a pesé 5,0 kg de pommes de terre brutes : il reste 4,1 kg après épluchage. Elle a aussi pesé 3,0 kg de poireaux : il reste 1,62 kg après parage (données fictives).

- Rendement des pommes de terre : 4,1 / 5,0 = **0,82** ; taux de perte : 0,9 / 5,0 × 100 = **18 %**.
- Rendement des poireaux : 1,62 / 3,0 = **0,54** ; taux de

perte : **46 %**.

- Pour 30 portions de 150 g nets de pommes de terre : net = 30 × 0,150 = 4,5 kg ; brut = 4,5 / 0,82 = **5,49 kg**.
- Pour 24 portions de 50 g nets de poireaux : net = 1,2 kg ; brut = 1,2 / 0,54 = **2,22 kg**.

Lecture : on ne peut pas commander « au net ». Avec un rendement de 0,54, il faut acheter presque deux fois le poids de poireaux utilisé. Le vert du poireau, bien lavé, peut aller dans une soupe : le rendement augmente et le gaspillage diminue.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.1

Un atelier prépare une soupe pour 20 personnes avec 70 g nets de carottes par portion. Une pesée a donné 2,0 kg de carottes brutes pour 1,68 kg nettes. Calculez le rendement, le taux de perte et le poids brut à acheter. Dites ensuite ce qui change si l'on garde la peau des carottes, bien brossées.

Corrigé

Rendement : 1,68 / 2,0 = **0,84** ; taux de perte : 0,32 / 2,0 × 100 = **16 %**. Net : 20 × 0,070 = 1,4 kg ; brut : 1,4 / 0,84 = **1,67 kg**. Si l'on garde la peau des carottes bien brossées, on ne retire plus que les extrémités : le rendement se rapproche de 0,95, on achète moins, on jette moins et l'on garde les fibres et les vitamines situées sous la peau. On lave alors soigneusement les carottes à l'eau courante en les frottant.

Adapter les techniques préliminaires au public

En éducation pour la santé, l'objectif n'est pas de former des cuisiniers professionnels, mais de rendre les participants capables de refaire chez eux. On adapte donc les outils, les gestes et la répartition des tâches. Les adaptations ci-dessous sont des exemples ; elles se discutent avec l'équipe de la structure.

Public · Adaptations des outils · Adaptations des gestes

Jeunes enfants (3 à 6 ans) — *Adaptations des outils :* Couteaux à bout rond pour aliments tendres, ciseaux à herbes adaptés, essoreuse à salade ; *Adaptations des gestes :* Laver, effeuiller, déchirer, verser, mélanger, rouler ; découpe par l'adulte

Enfants de 7 à 11 ans — *Adaptations des outils :* Couteaux adaptés aux enfants, économes, râpes avec protège-doigts ; *Adaptations des gestes :* Éplucher, couper des aliments tendres, peser, mesurer ; adulte à proximité

Adolescents — *Adaptations des outils :* Couteaux d'office, planches stables ; *Adaptations des gestes :* Toutes les techniques simples, avec démonstration préalable de la « griffe »

Personnes âgées — *Adaptations des outils :* Couteaux légers et bien aiguisés, planches antidérapantes, travail assis ; *Adaptations des gestes :* Gestes connus valorisés ; temps laissé ; pas de précipitation

Personnes ayant des difficultés motrices — *Adaptations des outils :* Planches à picots, épluche-légumes à large manche, couverts ergonomiques ; *Adaptations des gestes :* Tâches réparties selon les capacités ; aide technique proposée, jamais imposée

Personnes malvoyantes — *Adaptations des outils :* Contraste de couleurs (planche foncée pour un oignon blanc), repères tactiles ; *Adaptations des gestes :* Verbaliser chaque geste ; guider la main seulement avec accord

Personnes qui lisent peu — *Adaptations des outils :* Outils montrés et nommés ; *Adaptations des gestes :* Démonstration, puis reproduction ; fiche avec photos des gestes

Le poste de travail et l'ergonomie

Un atelier se passe mieux quand chaque participant dispose d'un poste clair. On vérifie la **hauteur** du plan de travail (un plan trop bas fatigue le dos ; un tabouret haut permet de travailler assis), l'**éclairage**, la **place** (au moins un mètre de plan de travail par personne), et la **proximité** d'un évier et d'une poubelle. On prépare la **mise en place** avant l'arrivée du groupe : ingrédients pesés ou à peser, ustensiles, torchons, bacs à déchets.

Méthode pas à pas – Démontrer une technique préliminaire en atelier

1. Nommer la technique et dire à quoi elle sert (« on cisèle l'oignon pour qu'il fonde dans la sauce »).

2. Montrer lentement, face au groupe ou à côté de chacun, en décomposant le geste (position de la planche, de la main, de la lame).

3. Faire reproduire immédiatement, sur une petite quantité.

4. Observer et corriger avec bienveillance, en valorisant ce qui est réussi.

5. Faire verbaliser : « Qu'est-ce qui est important pour ne pas se couper ? »

6. Laisser pratiquer sur la quantité réelle de la recette.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.2

Un institut d'éducation motrice (structure fictive) accueille six adolescents dont trois se déplacent en fauteuil roulant et deux ont des difficultés de préhension. Vous préparez une salade de lentilles aux carottes et aux herbes. Proposez, pour chaque technique préliminaire de la recette (laver, éplucher, râper, ciseler les herbes), une adaptation des outils ou de l'organisation qui permette à chaque jeune de participer.

Corrigé

Laver : bac posé sur une table à hauteur accessible depuis un fauteuil, plutôt que l'évier ; carottes lavées une à une. **Éplucher** : économe à large manche, carotte maintenue par une planche à picots ou un étau de cuisine ; ou carottes simplement brossées. **Râper** : râpe rotative à manivelle, posée sur un plateau antidérapant, ou robot à râper actionné par un bouton. **Ciseler les herbes** : ciseaux à herbes à ressort, ou herbes effeuillées à la main puis coupées dans un verre avec des ciseaux. Organisation : plans de travail à hauteur adaptée (tables sans tiroir pour passer les genoux), tâches réparties selon les envies et les capacités, temps suffisant, et chaque jeune participe

à au moins une étape de chaque préparation.

Les modes de cuisson




Figure 11.2 – Les trois principes de cuisson

Comprendre le schéma – Figure 11.2

1. Cuisson par concentration : une chaleur vive saisit la surface (coagulation des protéines, réactions de Maillard) ; il se forme une croûte ou une coloration et les sucs restent concentrés à l'intérieur : rôtir, griller, sauter, poêler, frire.

2. Cuisson par expansion : l'aliment, plongé dans un liquide **froid** porté progressivement à frémissement, cède une partie de ses sucs au liquide (bouillon, fond) : pot-au-feu, légumes secs, potages.

3. Cuisson mixte : on colore d'abord (concentration), puis on cuit lentement dans un liquide (expansion) : braiser, ragoûts, blanquette (sans coloration), sautés en sauce.

4. La **cuisson à la vapeur**, à **basse température** et **sous vide** limite les pertes par dissolution et par oxydation : on peut les rattacher aux cuissons douces.

Mode · Principe · Exemples · Conditions de réussite

Rôtir — *Principe :* Chaleur sèche du four, avec matière grasse et arrosage ; *Exemples :* Rôti, poulet, légumes rôtis ; *Conditions de réussite :* Four préchauffé ; repos de la viande après cuisson ; ne pas piquer

Griller — *Principe :* Chaleur rayonnante ou contact d'une plaque très chaude ; *Exemples :* Poissons, légumes grillés ; *Conditions de réussite :* Plaque très chaude, aliment sec, retourner une seule fois

Sauter, poêler — *Principe :* Matière grasse très chaude, petite quantité, aliment en mouvement ; *Exemples :* Légumes sautés, escalope ; *Conditions de réussite :* Ne pas surcharger la poêle (sinon l'aliment « bout »)

Frire — *Principe :* Immersion dans un bain d'huile chaude ; *Exemples :* Beignets, frites ; *Conditions de réussite :* Huile adaptée, température contrôlée (sans dépasser le point de fumée), égoutter

Pocher — *Principe :* Liquide frémissant, départ à froid ou à chaud ; *Exemples :* Œufs pochés, fruits, poisson ; *Conditions de réussite :* Frémissement et non ébullition

Bouillir, cuire à l'eau — *Principe :* Grand volume d'eau bouillante salée ou non ; *Exemples :* Pâtes, riz, légumes verts ; *Conditions de réussite :* Eau bouillante, juste cuisson ; refroidir les légumes verts pour fixer la couleur

Vapeur — *Principe :* Vapeur d'eau, sans contact avec le liquide ; *Exemples :* Légumes, poissons, semoule ; *Conditions de réussite :* Couvercle, eau en quantité suffisante ; aliments en couche fine

Braiser — *Principe :* Coloration puis cuisson lente couverte avec peu de liquide ; *Exemples :* Viandes, endives, légumes racines ; *Conditions de réussite :* Récipient fermé, petit feu, temps long

Étuver — *Principe :* Cuisson à couvert dans son eau de végétation, peu de matière grasse ; *Exemples :* Légumes, fruits ; *Conditions de réussite :* Feu doux, couvercle, remuer

Cuisson à basse température — *Principe :* Températures modérées et temps longs ; *Exemples :* Viandes, poissons ; *Conditions de réussite :* Thermomètre, maîtrise de l'hygiène (température à cœur)

Comment la chaleur arrive jusqu'à l'aliment

Toute cuisson consiste à faire entrer de la chaleur dans l'aliment. Il existe plusieurs façons de transmettre cette chaleur, et chaque appareil en combine souvent plusieurs. Les comprendre aide à expliquer pourquoi une cuisson réussit ou échoue.

Mode de transfert · Principe · Exemples · Conséquence pratique

Conduction — *Principe :* La chaleur passe par contact, de proche en proche, du récipient à l'aliment puis de la surface au cœur ; *Exemples :* Poêle, plancha, gril en fonte ; *Conséquence pratique :* Le cœur chauffe plus lentement que la surface : les gros morceaux demandent un feu plus doux et plus long

Convection — *Principe :* Un fluide chaud (eau, air, huile, vapeur) circule autour de l'aliment ; *Exemples :* Cuisson à l'eau, four à chaleur tournante, friture, vapeur ; *Conséquence pratique :* L'eau et la vapeur transmettent la chaleur plus vite que l'air : un légume cuit plus vite à la vapeur qu'au four à la même température

Rayonnement — *Principe :* La chaleur est émise par une source très chaude (braises, résistance du gril) ; *Exemples :* Gril du four, barbecue, salamandre ; *Conséquence pratique :* Coloration rapide de la surface, risque de brûler l'extérieur avant que le cœur soit cuit

Micro-ondes — *Principe :* Les ondes agitent les molécules d'eau de l'aliment, qui chauffent ; *Exemples :* Four à micro-ondes ; *Conséquence pratique :* Chauffage inégal (zones froides) : remuer, laisser reposer ; peu de coloration

Induction — *Principe :* Un champ magnétique chauffe directement le fond du récipient (qui doit être compatible) ; *Exemples :* Plaques à induction ; *Conséquence pratique :* Montée en température très rapide ; la plaque reste peu chaude, ce qui limite les brûlures

Astuce – Le couvercle et l'énergie

Un couvercle réduit la perte de chaleur et le temps pour porter l'eau à ébullition. L'autocuiseur cuit plus vite, car la pression permet à l'eau de dépasser 100 °C. Ces gestes économisent de l'énergie, ce qui compte pour un budget serré. Pour les légumes verts, on ôte toutefois le couvercle au début de la cuisson pour garder la couleur (11.3.2).

Choisir une cuisson selon l'aliment

La bonne cuisson dépend surtout de la **structure** de l'aliment : quantité d'eau, de collagène, d'amidon, taille des morceaux. Le tableau donne des repères ; ils seront justifiés en 11.3.2.

Aliment · Cuissons adaptées · Pourquoi · Erreur fréquente

Légumes verts (haricots, brocoli) — *Cuissons adaptées :* Vapeur, cuisson courte à l'eau bouillante, poêlée ; *Pourquoi :* Garder la couleur, le croquant et les vitamines ; *Erreur fréquente :* Cuisson longue à couvert : légume gris et mou

Légumes racines (carotte, navet) — *Cuissons adaptées :* Étuvée, rôtie, vapeur, en soupe ; *Pourquoi :* Ils supportent des cuissons plus longues et prennent du goût en dorant ; *Erreur fréquente :* Morceaux de tailles différentes : cuisson inégale

Viandes tendres (filet, escalope, steak) — *Cuissons adaptées :* Griller, sauter, rôtir ; *Pourquoi :* Peu de collagène : cuisson courte ; *Erreur fréquente :* Cuisson trop longue : viande sèche

Viandes riches en collagène (paleron, joue, jarret) — *Cuissons adaptées :* Braiser, mijoter, pot-au-feu ; *Pourquoi :* Le collagène se transforme en gélatine en cuisson longue et humide ; *Erreur fréquente :* Griller : viande dure

Poissons — *Cuissons adaptées :* Pocher, vapeur, papillote, four doux, poêle ; *Pourquoi :* Chair fragile, peu de collagène ; *Erreur fréquente :* Feu trop fort : chair sèche qui s'effrite

Œufs — *Cuissons adaptées :* Coque, mollet, dur, poché, brouillé, omelette ; *Pourquoi :* Les protéines coagulent à basse température ; *Erreur fréquente :* Cuisson trop forte : œuf caoutchouteux, cercle vert autour du jaune

Féculents (pâtes, riz, pommes de terre) — *Cuissons adaptées :* Cuisson à l'eau, vapeur, four, sauté ; *Pourquoi :* L'amidon doit gonfler dans l'eau ; *Erreur fréquente :* Pâtes trop cuites : index glycémique plus élevé, texture molle

Légumes secs — *Cuissons adaptées :* Cuisson à l'eau (expansion), autocuiseur ; *Pourquoi :* Ils doivent se réhydrater et s'attendrir ; *Erreur fréquente :* Saler au départ, eau très calcaire : légumes secs durs

La température à cœur

Pour certaines viandes, la cuisson est aussi une question de **sécurité sanitaire**. La **volaille**, le **porc** et la **viande hachée** doivent être cuits à cœur. Pour la viande hachée servie à de jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées ou fragiles, les autorités sanitaires recommandent une cuisson **à cœur**, sans partie rosée au centre, en raison du risque lié à certaines bactéries (*Escherichia coli* productrices de shigatoxines). Le seul moyen fiable de vérifier est un **thermomètre à sonde**, que l'on peut utiliser en atelier pour montrer le principe.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.3

Pour un atelier dans une maison de quartier, choisissez une cuisson adaptée et justifiez en une phrase pour : a) des haricots verts frais ; b) un jarret de bœuf ; c) un filet de cabillaud pour des personnes âgées ; d) des pois chiches secs ; e) des steaks hachés pour un groupe parents-enfants.

Corrigé

a) **Vapeur** ou cuisson **courte à l'eau bouillante**, sans couvercle au début : couleur et croquant préservés. b) **Braiser** ou **mijoter** (pot-au-feu) : le jarret est riche en collagène, qui devient fondant en cuisson longue et humide. c) **Vapeur** ou **papillote** : cuisson douce qui garde le poisson moelleux et facile à mastiquer. d) **Cuisson à l'eau** après trempage, départ à froid, sel en fin de cuisson (ou autocuiseur) : réhydratation et attendrissement. e) **Sauter** à la poêle jusqu'à une cuisson **à cœur** (plus de rose au centre), vérifiée au thermomètre ou en coupant un steak : sécurité des enfants.

Organiser les cuissons dans le temps d'un atelier

Dans un atelier, la difficulté n'est pas seulement de bien cuire, mais de tout servir **au bon moment**. On part de l'heure de la dégustation et on remonte le temps (rétroplanning, chapitre 10). Quatre règles aident à organiser les cuissons.

1. **Commencer par les cuissons longues** (braisés, légumes secs, plats au four) et finir par les cuissons minute (poêlées, vapeur, sauces émulsionnées).
2. **Regrouper les cuissons au four** qui demandent la même température, pour partager le four.
3. **Compter le préchauffage** (souvent 10 à 15 minutes) et les temps de repos (une viande rôtie, un riz, des lasagnes).
4. **Prévoir ce que fait le groupe** pendant les cuissons : préparer la suite, ranger, observer, dresser la table.

Exemple – Calcul détaillé : un atelier avec un seul four

Dégustation à 12 h 00. Le menu comprend des lasagnes de légumes (four à 180 °C, 40 minutes, puis 10 minutes de repos), un crumble aux pommes (four à 180 °C, 30 minutes, servi tiède) et une soupe de lentilles corail (25 minutes de cuisson, puis 5 minutes de mixage). Le four se préchauffe en 15 minutes.

- Lasagnes : repos 10 min et cuisson 40 min, soit 50 min

avant 12 h 00 → enfournement à **11 h 10**.

- Crumble : 30 min de cuisson → enfournement à **11 h 30**, à côté des lasagnes (même température).
- Four allumé à **10 h 55** (11 h 10 – 15 min).
- Soupe : mixage 5 min et cuisson 25 min → mise en cuisson à **11 h 30**.

Lecture : les deux plats au four partagent la même température, ce qui évite d'attendre. Les lasagnes doivent être montées avant 11 h 10 : c'est la tâche prioritaire de la première partie de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.4

Un atelier se termine par une dégustation à 16 h 00. On prépare des muffins aux myrtilles (four à 180 °C, 22 minutes, puis 15 minutes de refroidissement), une compote de pommes (20 minutes de cuisson à couvert, puis 20 minutes de refroidissement) et une boisson aux fruits mixés (10 minutes, servie aussitôt). Établissez les heures de début de chaque préparation et de mise en route du four (préchauffage de 15 minutes).

Corrigé

Muffins : refroidissement 15 min et cuisson 22 min, soit 37 min avant 16 h 00 → enfournement à **15 h 23** ; four allumé à **15 h 08** ; la pâte doit être prête et les moules garnis à 15 h 23. Compote : refroidissement 20 min et cuisson 20 min → mise en cuisson à **15 h 20** (les pommes sont épluchées et coupées avant). Boisson : préparation à **15 h 50**. Pendant les cuissons, le groupe prépare la boisson, range et dresse la table de dégustation.

Une même céréale, trois techniques : l'exemple du riz

Le riz montre bien qu'une technique de cuisson change la texture, le goût et parfois l'intérêt nutritionnel d'un aliment. Les trois techniques suivantes partent du même riz cru.

Technique · Comment faire · Texture obtenue · Remarques

Riz à la créole (cuisson à l'eau) — *Comment faire :* Cuire dans un grand volume d'eau bouillante, puis égoutter ; *Texture obtenue :* Grains séparés, peu collants ; *Remarques :* Une partie de l'amidon et des vitamines du groupe B part dans l'eau jetée

Riz pilaf — *Comment faire :* Faire revenir le riz dans un peu de matière grasse avec de l'oignon (« nacrer »), puis ajouter une quantité mesurée de liquide chaud (environ 1,5 fois le volume de riz) et cuire à couvert ; *Texture obtenue :* Grains séparés et parfumés ; *Remarques :* Tout le liquide est absorbé : rien n'est jeté ; le nacrage limite le collage

Risotto — *Comment faire :* Nacrer un riz rond, puis ajouter le bouillon louche par louche en remuant ; *Texture obtenue :* Crémeux, grains encore fermes au centre ; *Remarques :* L'amidon libéré par l'agitation lie le plat ; souvent enrichi en beurre et en fromage

Ces techniques se retrouvent dans de nombreuses cuisines : le riz pilaf est proche des pilaws d'Asie centrale et du Moyen-Orient ; le riz cuit par absorption est la règle dans une grande partie de l'Asie. Pour un atelier, la cuisson par **absorption** (pilaf ou cuiseur à riz) a deux avantages : elle ne jette pas l'eau de cuisson et elle demande une mesure simple, que l'on peut faire avec un verre.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.5

1) Expliquez pourquoi un risotto est crémeux alors qu'un riz pilaf a des grains séparés, en utilisant le vocabulaire de la physico-chimie. 2) Un participant prépare son riz à la créole et jette l'eau de cuisson. Proposez une technique qui limite les pertes de nutriments sans changer le goût pour sa famille.

Corrigé

1) Dans le risotto, on utilise un riz rond riche en amylopectine et on remue en ajoutant le liquide petit à petit : les frottements détachent l'amidon de la surface des grains, qui empèse dans le bouillon et forme une liaison crémeuse. Dans le pilaf, le nacrage enrobe les grains de matière grasse, on ne remue pas et le riz est souvent long et plus riche en amylose : les grains restent séparés. 2) Cuire le riz par absorption : mesurer un volume de riz et environ 1,5 à 2 volumes d'eau selon le riz, porter à ébullition, couvrir et cuire à feu doux jusqu'à absorption complète. Le riz reste séparé si on le rince avant cuisson et qu'on ne le remue pas.

Les préparations de base

Famille · Exemples · Principe et condition de réussite

Fonds et fumets — *Exemples :* Fond blanc de volaille, fumet de poisson, bouillon de légumes ; *Principe et condition de réussite :* Expansion, départ à froid, écumer ; aromates (mirepoix, bouquet garni)

Liaisons — *Exemples :* Roux, beurre manié, fécule (amidon de maïs), jaune d'œuf et crème, purée de légumes ; *Principe et condition de réussite :* Amidon : délayer à froid, porter à ébullition ; œuf : ne pas faire bouillir (il coagule)

Sauces mères — *Exemples :* Béchamel (roux blanc + lait), velouté (roux + fond blanc), sauce tomate, sauce brune ; *Principe et condition de réussite :* Roux cuit sans coloration pour la béchamel ; liquide versé progressivement en remuant

Émulsions — *Exemples :* Mayonnaise (froide, stable), vinaigrette (instable), hollandaise (chaude) ; *Principe et condition de réussite :* Ingrédients à même température, huile versée progressivement ; l'œuf apporte un émulsifiant (lécithine)

Pâtes — *Exemples :* Brisée, sablée, feuilletée, à choux, à crêpes, levée ; *Principe et condition de réussite :* Respecter les proportions ; repos au froid pour les pâtes friables ; ne pas trop travailler

Appareils — *Exemples :* Appareil à crème prise (œufs + lait), à flan, à quiche ; *Principe et condition de réussite :* Cuisson douce (four modéré, bain-marie) pour éviter la synérèse (« grainage »)

Les liaisons en détail

Lier, c'est épaissir un liquide pour obtenir une sauce, une soupe veloutée ou une crème. On distingue les liaisons par l'**amidon**, par les **protéines** et par la **matière végétale**. Les doses du tableau sont des ordres de grandeur pour un litre de liquide ; elles varient selon la texture voulue.

Liaison · Composition · Technique · Usage · Point de vigilance

Roux blanc, blond ou brun — *Composition :* Matière grasse + farine, cuites ensemble (environ 50 à 60 g de chaque pour une sauce nappante) ; *Technique :* Cuire le roux, puis verser le liquide progressivement en fouettant, porter à ébullition ; *Usage :* Béchamel, velouté, sauces brunes ; *Point de vigilance :* Roux brun : coloré, moins épaississant (amidon en partie dextrinisé)

Beurre manié — *Composition :* Beurre + farine mélangés à froid ; *Technique :* Ajouter par petits morceaux dans un liquide bouillant ; *Usage :* Rectifier une sauce trop liquide ; *Point de vigilance :* Bien fouetter pour éviter les grumeaux

Fécule (maïs, pomme de terre) — *Composition :* Amidon pur (environ 20 à 40 g selon la texture) ; *Technique :* Délayer à froid, verser dans le liquide chaud, porter à ébullition ; *Usage :* Sauces légères, crèmes, soupes ; *Point de vigilance :* Elle perd son pouvoir épaississant si l'on fait bouillir trop longtemps

Jaune d'œuf et crème — *Composition :* Jaunes délayés dans la crème ; *Technique :* Ajouter hors du feu, chauffer doucement sans bouillir ; *Usage :* Blanquette, velouté « à l'ancienne » ; *Point de vigilance :* Au-delà d'environ 80 °C, les jaunes coagulent et la sauce « tranche »

Purée de légumes — *Composition :* Pomme de terre, légumes cuits, lentilles corail ; *Technique :* Cuire puis mixer dans le liquide ; *Usage :* Soupes, sauces sans crème ; *Point de vigilance :* Change le goût et la couleur ; apporte des fibres

Réduction — *Composition :* Évaporation d'une partie du liquide ; *Technique :* Faire bouillir à découvert ; *Usage :* Jus, coulis ; *Point de vigilance :* Concentre aussi le sel : saler à la fin

Lien diététique – Choisir une liaison selon l'objectif

Pour **alléger** une sauce, la fécule ou une purée de légumes remplace le roux et la crème. Pour **enrichir** l'alimentation d'une personne qui mange peu (personne âgée, convalescence), on choisit au contraire une liaison riche (roux, jaune d'œuf, fromage), qui apporte de l'énergie et des protéines sous un petit volume (chapitre 12). La même technique sert deux objectifs opposés : c'est le public qui décide.

Les émulsions

Une **émulsion** est une dispersion de fines gouttelettes d'un liquide dans un autre avec lequel il ne se mélange pas, en général de l'huile dans de l'eau. Pour qu'elle tienne, il faut un **émulsifiant**, une molécule qui a une partie attirée par l'eau et une partie attirée par l'huile : la **lécithine** et certaines protéines du jaune d'œuf, la moutarde, le lait.

Émulsion · Type · Stabilité · Règle de réussite

Vinaigrette — *Type :* Froide ; *Stabilité :* **Instable** : elle se sépare en quelques minutes ; *Règle de réussite :* Émulsionner juste avant de servir ; la moutarde aide à la stabiliser

Mayonnaise — *Type :* Froide ; *Stabilité :* **Stable** ; *Règle de réussite :* Ingrédients à la même température ; huile versée en filet au début

Hollandaise, béarnaise — *Type :* Chaude ; *Stabilité :* Fragile ; *Règle de réussite :* Bain-marie, température modérée : les jaunes ne doivent pas coaguler

Beurre blanc — *Type :* Chaude ; *Stabilité :* Fragile ; *Règle de réussite :* Beurre froid incorporé petit à petit dans une réduction chaude

Sauce au yaourt — *Type :* Froide ; *Stabilité :* Stable ; *Règle de réussite :* Les protéines du yaourt stabilisent ; moins de matières grasses

Les pâtes

Les **pâtes** de base reposent sur des proportions que l'on retient facilement. Les quantités ci-dessous sont des proportions de référence couramment utilisées.

Pâte · Proportions de référence · Technique · Usage

Brisée — *Proportions de référence :* 250 g de farine, 125 g de beurre, 5 cL d'eau, une pincée de sel ; *Technique :* Sabler le beurre froid avec la farine, ajouter l'eau, ne pas trop travailler, repos au froid ; *Usage :* Tartes, quiches

Sablée — *Proportions de référence :* 250 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre, 1 œuf ; *Technique :* Sabler, ajouter l'œuf, repos au froid ; *Usage :* Tartes sucrées, biscuits

À choux — *Proportions de référence :* 25 cL d'eau, 100 g de beurre, 150 g de farine, 4 œufs ; *Technique :* Panade cuite (eau, beurre, farine) desséchée, puis œufs incorporés un à un ; *Usage :* Choux, gougères

À crêpes — *Proportions de référence :* 250 g de farine, 3 œufs, 50 cL de lait ; *Technique :* Mélanger farine et œufs, délayer progressivement au lait, repos ; *Usage :* Crêpes, galettes

Levée (pain) — *Proportions de référence :* 500 g de farine, 300 à 325 g d'eau, 10 g de levure de boulanger fraîche, 9 à 10 g de sel ; *Technique :* Pétrir pour développer le gluten, pointage, façonnage, apprêt, cuisson ; *Usage :* Pain, pizza

Feuilletée — *Proportions de référence :* Détrempe (farine, eau, sel) et beurre en couches ; *Technique :* Tourages successifs, repos au froid ; *Usage :* Feuilletés ; technique longue, rarement faite en atelier

Le **gluten**, réseau formé par certaines protéines du blé quand on travaille la pâte avec de l'eau, rend la pâte à pain élastique. Pour une pâte brisée, on veut au contraire éviter de le développer, sinon la pâte devient élastique et se rétracte à la cuisson : on la travaille peu et on la laisse reposer.

Les appareils

Un **appareil** est un mélange prêt à être cuit ou à garnir. L'appareil à **crème prise** (environ 4 œufs pour 50 cL de lait, sucré pour un flan, salé pour une quiche) cuit grâce à la coagulation des protéines de l'œuf. Il demande une cuisson **douce** (four modéré, bain-marie) : trop chauffé, il se resserre et rend de l'eau, c'est la **synérèse** (11.3.2).

Exemple – Calcul détaillé : la pâte à crêpes pour un goûter de 36 crêpes

La recette de référence (250 g de farine T65, 3 œufs de 50 g, 500 g de lait demi-écrémé, 20 g de beurre fondu) donne environ 15 crêpes. Coefficient : 36 / 15 = **2,4**.

- Farine : 250 × 2,4 = **600 g** ; œufs : 3 × 2,4 = 7,2, soit **7 œufs** ; lait : 0,5 × 2,4 = **1,2 L** ; beurre : 20 × 2,4 = **48 g**.
- Apports de la recette de base (Ciqual 2025 : farine T65 code 9435, œuf cru 22000, lait demi-écrémé UHT 19041, beurre doux 16400) : 1 464 kcal, 61,7 g de protéines, 204,0 g de glucides, 41,6 g de lipides. Par crêpe (un quinzième), sans garniture : **98 kcal**, **4,1 g** de protéines, **13,6 g** de glucides et **2,8 g** de lipides.

Lecture : une crêpe nature est peu énergétique ; c'est la garniture (pâte à tartiner, sucre, confiture, ou au contraire fruits frais, compote, fromage blanc) qui fait la différence. C'est un bon support pour un atelier « goûter » où l'on compare les garnitures.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.6

Un atelier prépare une quiche aux légumes dans un moule de 8 parts, avec un appareil de 3 œufs pour 25 cL de lait. Le groupe veut faire trois quiches. Calculez les quantités d'œufs et de lait. Expliquez ensuite pourquoi la quiche sortie d'un four à 220 °C a rendu du liquide, et ce qu'il faut changer.

Corrigé

Trois quiches : **9 œufs** et 3 × 25 = **75 cL** de lait. Le liquide vient de la **synérèse** : à 220 °C, les protéines de l'œuf coagulent trop vite et trop fort, le réseau se resserre et expulse l'eau du lait. Il faut cuire à four modéré (environ 170 à 180 °C) et arrêter la cuisson quand le centre est juste pris, encore légèrement tremblotant.

Techniques actuelles

Les **techniques actuelles** élargissent les possibilités en atelier : cuisson **sous vide** et à **basse température** (précision, tendreté), **wok** (cuisson rapide, peu de matière grasse), **papillote** (vapeur dans une enveloppe), **mixeur plongeant** (veloutés sans crème), **siphon** (mousses légères), **déshydrateur** (chips de fruits), **robots** multifonctions. En éducation pour la santé, on privilégie toutefois les techniques **reproductibles à la maison** avec un matériel simple : une poêle, une casserole, un four, un mixeur.

Attention – Sécurité sanitaire des cuissons douces

La cuisson à basse température et sous vide exige une **maîtrise** des couples temps-température et des règles d'hygiène (chaîne du froid, refroidissement rapide) : elle relève de professionnels formés et n'est pas à reproduire à la maison sans précaution. En atelier familial, préférer la vapeur, l'étuvée et la papillote (chapitre 13).

Les appareils du quotidien en atelier

Les participants ont rarement l'équipement d'une cuisine professionnelle. En revanche, beaucoup possèdent un four à micro-ondes, un autocuiseur, une bouilloire, parfois une friteuse à air chaud ou un mixeur. Savoir utiliser ces appareils comme de vrais modes de cuisson élargit ce que l'on peut cuisiner chez soi.

Appareil · Principe · Intérêt en éducation pour la santé · Limite ou vigilance

Four à micro-ondes — *Principe :* Agitation des molécules d'eau ; *Intérêt en éducation pour la santé :* Légumes « vapeur » en quelques minutes, compotes, pommes de terre en robe des champs, peu d'énergie ; *Limite ou vigilance :* Chauffage inégal ; récipients adaptés ; pas de coloration

Autocuiseur — *Principe :* Cuisson sous pression, au-delà de 100 °C ; *Intérêt en éducation pour la santé :* Légumes secs et viandes à braiser en un temps réduit, économie d'énergie ; *Limite ou vigilance :* Respect du mode d'emploi, de la soupape et du remplissage maximal

Cuiseur vapeur — *Principe :* Vapeur d'eau ; *Intérêt en éducation pour la santé :* Légumes, poissons, céréales sans matière grasse ; vitamines mieux préservées qu'à grande eau ; *Limite ou vigilance :* Temps à adapter à la taille des morceaux

Mijoteuse — *Principe :* Cuisson lente à basse température ; *Intérêt en éducation pour la santé :* Plats mijotés prêts au retour du travail ; *Limite ou vigilance :* Ne pas y mettre d'aliments surgelés ; respecter les temps

Friteuse à air chaud — *Principe :* Convection d'air très chaud ; *Intérêt en éducation pour la santé :* Pommes de terre, légumes rôtis avec peu d'huile ; *Limite ou vigilance :* Ce n'est pas de la friture : texture différente ; cuire doré, pas brun (acrylamide)

Mixeur plongeant — *Principe :* Broyage ; *Intérêt en éducation pour la santé :* Veloutés sans crème, compotes, sauces aux légumes ; *Limite ou vigilance :* Mixer hors du feu, lame dangereuse

Bouilloire — *Principe :* Eau bouillante rapide ; *Intérêt en éducation pour la santé :* Semoule, boulgour fin, nouilles, thé, réhydratation de légumes secs déjà cuits ; *Limite ou vigilance :* Ne cuit pas un plat entier

Lien diététique – Partir du matériel réel

Avant de choisir une recette, on demande aux participants de quoi ils disposent chez eux. Proposer une recette au four à des personnes qui n'ont pas de four, c'est les mettre en échec. Une recette réussie avec le matériel de la maison a plus de chances d'être refaite (chapitre 10, faisabilité pédagogique).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.7

Une personne vivant seule dans un studio dispose d'un micro-ondes, d'une bouilloire et d'une plaque électrique à un feu. Proposez un repas complet (entrée ou légumes, plat, dessert) réalisable en 30 minutes avec ce matériel, en indiquant pour chaque élément l'appareil et la technique.

Corrigé

Exemple : **semoule** de couscous réhydratée avec l'eau de la **bouilloire** (5 minutes, à couvert) ; **légumes** (courgette et carotte en rondelles) cuits au **micro-ondes** dans un récipient couvert avec deux cuillères d'eau (6 à 8 minutes, en remuant à mi-cuisson) ; **pois chiches** en conserve rincés et **œufs brouillés** ou **pois chiches sautés au cumin** à la **poêle** sur la plaque ; **compote** de pomme minute au micro-ondes (pomme en dés, cannelle, 3 minutes). Le repas associe un féculent, des légumes, une source de protéines et un fruit.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.1 – Les techniques culinaires

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi lave-t-on les légumes avant de les éplucher et de les couper ?
2. Donnez la formule du poids brut à acheter à partir du poids net et du rendement.
3. Citez les trois principes de cuisson et un exemple de chacun.
4. Quel mode de transfert de chaleur domine dans une poêle ? Dans un four à chaleur tournante ?
5. Pourquoi délaye-t-on la fécule à froid ?
6. Qu'est-ce que la synérèse d'un appareil à crème prise, et comment l'éviter ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.1

1. Pour éliminer la terre sans que les vitamines hydrosolubles et les minéraux des surfaces coupées passent dans l'eau de lavage.
2. Poids brut = poids net / rendement.
3. Concentration (rôtir, griller, sauter, frire) ; expansion (pot-au-feu, légumes secs cuits à l'eau) ; mixte (braiser, ragoût, blanquette).
4. La poêle : conduction ; le four à chaleur tournante : convection.
5. Pour séparer les grains d'amidon avant qu'ils gonflent : versée dans un liquide chaud, la fécule forme des grumeaux.
6. Les protéines de l'œuf, trop chauffées, se resserrent et expulsent l'eau (flan troué, liquide au fond) ; on cuit à four modéré, au bain-marie, et on arrête quand le centre est juste pris.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 11.3.2.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les tableaux des cuissons et des liaisons.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 11.3.1 et je refais les exercices d'application.

11.3.2 Les modifications physico-chimiques au cours des préparations

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : pas de passage correspondant (voir 11.2.2)

Lien diététique – Lien avec les bases physiopathologiques de l'alimentation (BPADN)

Les cuissons et préparations modifient la **structure** des aliments (texture, couleur, goût), leur **digestibilité** et leur **valeur nutritionnelle**. Les connaissances de biochimie alimentaire permettent d'expliquer les résultats en atelier et de proposer des **gestes** qui préservent la qualité nutritionnelle.




Figure 11.3 – Quelques températures repères en cuisine

Comprendre le schéma – Figure 11.3

1. Empesage (ou gélatinisation) de l'amidon : en présence d'eau et de chaleur (environ 60 à 80 °C selon l'amidon), les grains d'amidon gonflent, absorbent l'eau et épaississent le milieu (sauce, crème pâtissière, riz cuit).

2. Coagulation des protéines de l'œuf : le blanc commence à coaguler vers 62-65 °C, le jaune vers 65-70 °C ; au- delà, les protéines se resserrent et expulsent l'eau (œuf caoutchouteux, flan « grainé »).

3. Ébullition de l'eau : 100 °C au niveau de la mer ; une cuisson à l'eau ne dépasse pas cette température, d'où l'absence de coloration.

4. Réactions de Maillard : entre sucres réducteurs et acides aminés, elles produisent couleurs brunes et arômes de grillé (croûte du pain, viande saisie) ; elles sont intenses à haute température (environ 140 à 180 °C) et en milieu peu humide.

5. Caramélisation : transformation des sucres seuls sous l'effet de la chaleur (à partir d'environ 160 °C pour le saccharose), donnant couleur et goût de caramel puis d'amertume.

6. Point de fumée des matières grasses : au-delà, l'huile se dégrade (fumée, composés irritants) ; il varie selon l'huile et son raffinage (souvent entre 170 et 230 °C).

7. Les valeurs sont des **ordres de grandeur** qui dépendent de la composition, du pH, de la teneur en eau et de la durée.

Constituant · Modifications à la préparation et à la cuisson · Conséquences pratiques en atelier

Amidon — *Modifications à la préparation et à la cuisson :* Empesage (gonflement, épaississement) ; dextrinisation à sec (pain grillé, roux coloré) ; rétrogradation au refroidissement (pain rassis, riz qui durcit) ; *Conséquences pratiques en atelier :* Délayer la fécule à froid ; le riz et les pâtes refroidis contiennent davantage d'amidon résistant ; réchauffer les restes à cœur

Protéines — *Modifications à la préparation et à la cuisson :* Dénaturation et coagulation par la chaleur, l'acide, l'agitation (blancs en neige) ; attendrissement du collagène en gélatine par cuisson longue et humide ; *Conséquences pratiques en atelier :* Cuisson douce pour les œufs et poissons ; cuisson longue pour les morceaux riches en collagène (bourguignon) ; mariner avec un acide pour attendrir

Lipides — *Modifications à la préparation et à la cuisson :* Fusion, émulsion, oxydation ; dégradation au-delà du point de fumée ; *Conséquences pratiques en atelier :* Choisir l'huile selon l'usage ; ne pas réutiliser indéfiniment l'huile de friture ; préférer cuissons sans ajout important

Glucides simples — *Modifications à la préparation et à la cuisson :* Caramélisation ; participation aux réactions de Maillard ; *Conséquences pratiques en atelier :* Surveiller la coloration ; limiter le sucre ajouté (épices, vanille, fruits mûrs)

Fibres et parois végétales — *Modifications à la préparation et à la cuisson :* Ramollissement des parois (pectines, hémicelluloses) à la cuisson ; l'eau calcaire et l'acide retardent l'attendrissement des légumes secs ; *Conséquences pratiques en atelier :* Ne pas saler l'eau des légumes secs dès le début (selon les pratiques) ; trempage des légumes secs entiers ; cuire « al dente » pour préserver la texture

Pigments — *Modifications à la préparation et à la cuisson :* Chlorophylle : vert vif puis vert olive en milieu acide ou cuisson longue ; anthocyanes : rouge en milieu acide, bleu-violet en milieu basique ; caroténoïdes : stables, liposolubles ; *Conséquences pratiques en atelier :* Cuire les légumes verts peu de temps, sans couvercle au début, puis les refroidir ; un filet de citron sur le chou rouge ; un peu de matière grasse avec les carottes

Brunissement enzymatique — *Modifications à la préparation et à la cuisson :* Oxydation des polyphénols par des enzymes (pomme, banane, avocat, pomme de terre coupés) ; *Conséquences pratiques en atelier :* Citron (acide), eau froide, cuisson (inactive l'enzyme)

L'eau, le sel et le sucre : les phénomènes d'osmose

Les aliments contiennent beaucoup d'eau (souvent plus de 90 % pour les légumes). Quand on met en contact un aliment avec du sel ou du sucre, l'eau traverse les membranes des cellules et va du milieu le moins concentré vers le plus concentré : c'est l'**osmose**. Ce phénomène explique plusieurs gestes de cuisine.

Geste · Ce qui se passe · Exemple · Conséquence pratique

Saler un concombre ou une aubergine (dégorger) — *Ce qui se passe :* Le sel attire l'eau hors des cellules ; *Exemple :* Concombre à la crème, aubergines frites ; *Conséquence pratique :* Le légume perd de l'eau et de son croquant ; il absorbe moins d'huile ; penser à rincer et à ne pas resaler

Saler une viande longtemps avant la cuisson — *Ce qui se passe :* Le sel fait d'abord sortir du jus, puis une partie est réabsorbée ; *Exemple :* Saumure, salaison ; *Conséquence pratique :* En atelier, saler juste avant ou après la cuisson

Sucrer des fruits coupés (macérer) — *Ce qui se passe :* Le sucre attire le jus des fruits ; *Exemple :* Salade de fruits, fraises au sucre ; *Conséquence pratique :* Un sirop se forme ; on peut réduire le sucre et utiliser le jus d'un agrume

Saler une salade trop tôt — *Ce qui se passe :* Les feuilles perdent leur eau ; *Exemple :* Salade verte assaisonnée à l'avance ; *Conséquence pratique :* Assaisonner au dernier moment

Saler l'eau de cuisson des légumes secs dès le départ — *Ce qui se passe :* Le sel et le calcaire freinent l'attendrissement des parois ; *Exemple :* Haricots, pois chiches ; *Conséquence pratique :* Saler en fin de cuisson

La texture des légumes et des fruits

Les végétaux tiennent grâce aux **parois** de leurs cellules, faites de cellulose, d'hémicelluloses et de **pectines**, qui collent les cellules entre elles. La cuisson dissout en partie les pectines : le légume s'attendrit. Plusieurs facteurs modifient cette évolution.

- L'**acidité** (tomate, vin, vinaigre, citron) freine le ramollissement : des carottes cuites dans une sauce tomate restent plus fermes.
- Le **calcium** de l'eau calcaire renforce les pectines : les légumes secs cuisent plus lentement.
- Le **bicarbonate de soude** rend le milieu basique et accélère le ramollissement, mais il dégrade certaines vitamines (thiamine, vitamine C) et donne une texture pâteuse : on ne le conseille pas.
- Le **sucre** raffermit les fruits cuits : des quartiers de pomme cuits dans un sirop gardent leur forme, alors que cuits sans sucre ils deviennent compote.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.8

Expliquez à l'aide de l'osmose ou de la structure des parois végétales : a) pourquoi une salade de concombres préparée la veille baigne dans l'eau ; b) pourquoi des haricots blancs cuits avec des tomates dès le début restent fermes ; c) pourquoi une tarte aux pommes garde des quartiers entiers alors qu'une compote se défait.

Corrigé

a) Le sel et la vinaigrette attirent l'eau des cellules du concombre par **osmose** : le légume se vide de son eau et baigne dedans. On assaisonne au dernier moment. b) L'**acidité** de la tomate freine la dissolution des pectines des parois : les haricots s'attendrissent mal. On les cuit d'abord à l'eau, puis on ajoute la tomate. c) Dans la tarte, les pommes cuisent peu de temps, au four, souvent avec un peu de sucre qui **raffermit** les parois ; dans la compote, la cuisson dans l'eau, plus longue, dissout les pectines et les cellules se séparent.

L'amidon en pratique

L'amidon est la réserve d'énergie des céréales, des tubercules et des légumes secs. Il se présente en grains, formés de deux molécules : l'**amylose**, en chaînes linéaires, et l'**amylopectine**, ramifiée. Leur proportion change selon l'aliment, ce qui explique des comportements différents en cuisine.

Aliment · Comportement à la cuisson · Usage conseillé

Pommes de terre à chair farineuse — *Comportement à la cuisson :* Riches en amidon, se défont à la cuisson ; *Usage conseillé :* Purées, soupes, frites

Pommes de terre à chair ferme — *Comportement à la cuisson :* Gardent leur forme ; *Usage conseillé :* Vapeur, salades, pommes sautées

Riz rond — *Comportement à la cuisson :* Libère de l'amidon, devient crémeux ; *Usage conseillé :* Riz au lait, risotto

Riz long, basmati — *Comportement à la cuisson :* Grains séparés, plus riches en amylose ; *Usage conseillé :* Accompagnements

Pâtes de blé dur — *Comportement à la cuisson :* Le réseau de protéines retient l'amidon si la cuisson est courte ; *Usage conseillé :* Cuisson « al dente »

Farine — *Comportement à la cuisson :* Épaissit en cuisant ; développe du gluten quand on la travaille avec de l'eau ; *Usage conseillé :* Roux, pâtes, pains

Fécules (maïs, pomme de terre) — *Comportement à la cuisson :* Amidon pur, épaississement net et translucide ; *Usage conseillé :* Liaisons légères, crèmes

Légumes secs — *Comportement à la cuisson :* Amidon protégé par des parois épaisses ; libéré après une cuisson longue ; *Usage conseillé :* Soupes, purées (houmous)

Cuisson, refroidissement et réponse glycémique

La façon de cuire un féculent modifie la vitesse à laquelle son amidon est digéré, et donc la montée du glucose dans le sang après le repas (l'**index glycémique**). Trois repères sont utiles en atelier, notamment pour des publics concernés par le diabète (lien avec le BC1).

1. Une cuisson **courte** (pâtes al dente) garde l'amidon plus compact : il est digéré plus lentement qu'après une cuisson longue.
2. Une préparation **en purée** ou **très cuite** libère l'amidon : il est digéré plus vite.
3. Un féculent cuit puis **refroidi** (salade de pâtes, de riz ou de pommes de terre) contient davantage d'**amidon résistant**, issu de la rétrogradation, qui se comporte en partie comme une fibre.

Ces repères ne doivent pas faire oublier l'essentiel : la **quantité** de féculents, leur association avec des légumes, des protéines et des fibres, et la régularité des repas. On les présente comme des astuces, pas comme des règles strictes.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.9

Dans un atelier pour des adultes diabétiques de type 2 organisé par une association de patients (structure fictive), une participante demande : « Les pommes de terre, c'est interdit ? ». À partir des repères ci-dessus, proposez une réponse en trois phrases et deux façons de les préparer.

Corrigé

Exemple : « Non, les pommes de terre ne sont pas interdites : ce sont des féculents, comme le pain ou les pâtes, et ce qui compte surtout, c'est la quantité dans l'assiette. La façon de les cuire change un peu la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang : en purée, elles sont digérées plus vite qu'en morceaux. Associées à des légumes et à une source de protéines, elles ont toute leur place dans un repas. » Préparations : **pommes de terre vapeur en robe des champs**, servies avec des légumes et un filet d'huile ; **salade de pommes de terre** refroidies, avec haricots verts, œuf dur et vinaigrette. Les conseils individuels relèvent de l'équipe soignante de la participante.

Les protéines en pratique

Les protéines changent de forme sous l'effet de la **chaleur**, de l'**acidité**, du **sel** ou de l'**agitation** : elles se déplient (dénaturation), puis s'associent entre elles (coagulation). Ce phénomène donne la texture de nombreux plats.

Les œufs

Les temps ci-dessous s'entendent pour des œufs de calibre moyen, à température ambiante, plongés dans une eau déjà frémissante.

Préparation · Temps · Résultat · Usage en atelier

Œuf à la coque — *Temps :* Environ 3 minutes ; *Résultat :* Blanc à peine pris, jaune liquide ; *Usage en atelier :* Petit déjeuner (pas pour les publics fragiles : jaune non cuit)

Œuf mollet — *Temps :* Environ 6 minutes ; *Résultat :* Blanc pris, jaune coulant ; *Usage en atelier :* Salades, soupes

Œuf dur — *Temps :* 9 à 10 minutes, puis eau froide ; *Résultat :* Blanc et jaune pris ; *Usage en atelier :* Salades, sandwichs ; plus long : cercle vert et goût soufré

Œufs brouillés — *Temps :* Feu doux, en remuant ; *Résultat :* Crémeux ; *Usage en atelier :* Cuisson douce, adaptée aux personnes âgées

Omelette — *Temps :* Poêle chaude, cuisson rapide ; *Résultat :* Moelleuse ; *Usage en atelier :* Recette de base à transmettre

Attention – Les œufs et les publics fragiles

Les préparations à base d'œufs crus ou peu cuits (mayonnaise maison, mousse au chocolat, œuf à la coque, tiramisu) présentent un risque de salmonellose. Pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, on préfère des œufs bien cuits, ou des préparations sans œuf cru. En atelier, on conserve les œufs au frais et on se lave les mains après les avoir cassés.

Les viandes et les poissons

La couleur rouge de la viande vient d'une protéine, la **myoglobine**, qui devient brune à la cuisson : c'est pourquoi la couleur à cœur renseigne sur la cuisson. Les fibres musculaires se contractent et expulsent du jus quand la température monte : une viande trop cuite est sèche. Le **collagène** du tissu conjonctif, au contraire, a besoin d'une cuisson longue et humide pour devenir gélatine (11.3.1). Après une cuisson courte, on laisse **reposer** la viande quelques minutes : le jus se répartit et coule moins à la découpe. Les poissons ont peu de collagène et des fibres courtes : ils cuisent vite et à température modérée.

Les produits laitiers

Les protéines du lait (surtout les **caséines**) coagulent sous l'effet de l'**acidité** : c'est le principe du **yaourt** (des bactéries lactiques transforment le lactose en acide lactique) et du fromage blanc. Dans une sauce, un lait chaud mélangé à un ingrédient acide (citron, tomate, vin) peut « trancher » : on ajoute l'acide hors du feu, ou on lie d'abord la sauce avec un amidon, qui protège les protéines.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.10

Pour un atelier « Petit déjeuner salé » dans un foyer de jeunes, expliquez avec la coagulation des protéines : a) pourquoi des œufs brouillés cuits à feu vif deviennent granuleux et rendent de l'eau ; b) pourquoi l'on refroidit un œuf dur dans l'eau froide ; c) pourquoi un velouté de tomate au lait a tranché.

Corrigé

a) À feu vif, les protéines coagulent brutalement, se resserrent et expulsent l'eau (synérèse) : les œufs deviennent granuleux et baignent dans un liquide ; on cuit à feu doux en remuant et on arrête un peu avant la fin, car la cuisson continue hors du feu. b) Le refroidissement arrête la cuisson : on évite la formation du cercle verdâtre (réaction du soufre du blanc avec le fer du jaune) et l'œuf s'écale plus facilement. c) L'acidité de la tomate, à chaud, a fait coaguler les caséines du lait ; on ajoute le lait hors du feu, ou on lie d'abord la soupe (fécule, pomme de terre) avant d'ajouter le lait.

Les matières grasses en cuisine

Les matières grasses jouent plusieurs rôles : elles **transmettent la chaleur** (poêle, friture), **portent les arômes** (beaucoup d'arômes se dissolvent dans les graisses), donnent de l'**onctuosité** et du **fondant**, et participent aux **émulsions**. Leur choix dépend de l'usage et de leur composition en acides gras.

Usage · Matières grasses adaptées · Pourquoi

Assaisonnement à froid — *Matières grasses adaptées :* Huiles de colza, de noix, d'olive ; *Pourquoi :* Elles apportent des acides gras insaturés ; le colza et la noix apportent de l'acide alpha-linolénique (oméga 3)

Cuisson douce (étuvée, poêlée modérée) — *Matières grasses adaptées :* Huile d'olive, huile de colza, un peu de beurre ; *Pourquoi :* Températures modérées, sans fumée

Cuisson vive, friture — *Matières grasses adaptées :* Huiles stables à la chaleur, comme l'huile d'arachide ou les huiles de tournesol riches en acide oléique ; *Pourquoi :* Elles supportent mieux les hautes températures

Pâtisserie — *Matières grasses adaptées :* Beurre, parfois huile ; *Pourquoi :* Le beurre donne la texture friable des pâtes brisées et sablées

Attention – Ce qu'il faut éviter

Les huiles très riches en acides gras polyinsaturés (noix, lin) ne doivent pas être chauffées : elles s'oxydent vite. Une huile qui **fume** a dépassé son point de fumée : on l'arrête et on aère. Une huile de friture se renouvelle régulièrement : quand elle fonce, épaissit, mousse ou sent fort, elle est dégradée. On conserve les huiles à l'abri de la lumière et de la chaleur, bouchées.

Le **beurre** contient de l'eau et des protéines du lait qui brunissent vite : on le chauffe à feu moyen, ou on ajoute un filet d'huile. Le beurre clarifié, débarrassé de l'eau et des protéines, supporte mieux la chaleur.

Lien diététique – La quantité avant tout

Le repère du PNNS (Santé publique France, 2019) conseille de privilégier les huiles de colza, de noix et d'olive et de limiter les matières grasses d'origine animale. En atelier, on montre la quantité réelle : une **cuillère à soupe d'huile pèse environ 10 g** et apporte environ 90 kcal (Ciqual 2025, huile de colza, 900 kcal pour 100 g). Une poêle antiadhésive, une papillote, une cuisson à la vapeur ou au four avec un pinceau permettent d'en utiliser moins.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.11

Un participant prépare chaque soir une poêlée de légumes avec 4 cuillères à soupe d'huile pour deux personnes. Calculez l'énergie apportée par l'huile pour une personne (une cuillère à soupe = 10 g, 900 kcal pour 100 g), puis proposez deux techniques pour réduire de moitié la quantité d'huile sans perdre le goût.

Corrigé

Par personne : 2 cuillères à soupe, soit 20 g d'huile ; 20 × 900 / 100 = **180 kcal**. Avec une seule cuillère à soupe par personne : 90 kcal, soit 90 kcal de moins chaque soir. Techniques : **étuver** les légumes à couvert avec un fond d'eau et une cuillère d'huile, puis découvrir pour les colorer ; utiliser une **poêle antiadhésive** bien chaude et mettre l'huile au **pinceau** ou avec un vaporisateur ; parfumer avec de l'ail, des herbes, des épices et un filet d'huile crue au moment de servir, qui donne plus de goût que l'huile cuite.

Les réactions de Maillard et la caramélisation en pratique

Les **réactions de Maillard** et la **caramélisation** donnent aux aliments leurs couleurs brunes et leurs arômes de grillé, de rôti, de caramel. Elles sont recherchées (croûte du pain, légumes rôtis, oignons dorés), mais leur excès produit de l'amertume et des composés indésirables (11.3.2, acrylamide).

Facteur · Effet sur les réactions de Maillard · Geste en cuisine

Température — *Effet sur les réactions de Maillard :* Elles sont lentes sous 100 °C, rapides au-delà d'environ 140 °C ; *Geste en cuisine :* Poêle bien chaude, four chaud pour colorer

Eau — *Effet sur les réactions de Maillard :* L'eau empêche la surface de dépasser 100 °C ; *Geste en cuisine :* Sécher la viande ou les légumes avant de les saisir ; ne pas surcharger la poêle

Sucres et acides aminés — *Effet sur les réactions de Maillard :* Il faut des sucres réducteurs et des acides aminés ; *Geste en cuisine :* Le lait ou un jaune d'œuf au pinceau dore une pâte

pH — *Effet sur les réactions de Maillard :* Un milieu légèrement basique les accélère ; *Geste en cuisine :* C'est pourquoi on ne dore pas avec du citron, qui acidifie

Durée — *Effet sur les réactions de Maillard :* La couleur fonce avec le temps ; *Geste en cuisine :* Surveiller : viser doré, pas brun

La **caramélisation** ne concerne que les sucres, chauffés seuls, à partir d'environ 160 °C pour le saccharose. Elle donne un caramel blond puis brun ; au-delà, le sucre brûle et devient amer.

Exemple – Une démonstration simple : trois façons de cuire un oignon

Dans un atelier, on cuit trois oignons émincés de la même façon, mais de trois manières, pendant 15 minutes : a) dans une casserole d'eau bouillante ; b) à la poêle à feu moyen avec une cuillère d'huile, à couvert ; c) à la poêle à feu moyen avec une cuillère d'huile, à découvert, en remuant.

- a) Oignon translucide, mou, goût doux : la température ne dépasse pas 100 °C, il n'y a pas de coloration.
- b) Oignon fondant, peu coloré : la vapeur d'eau, retenue par le couvercle, garde la surface humide.
- c) Oignon doré, goût sucré et grillé : l'eau s'évapore, la surface dépasse 100 °C, les réactions de Maillard se produisent.

Lecture : le même aliment donne trois goûts différents selon la cuisson. On fait goûter et décrire, puis on relie au plat : la soupe à l'oignon et beaucoup de sauces commencent par des oignons dorés, qui donnent du goût sans ajouter de sel.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.12

Un participant dit : « Mes légumes au four ne dorent jamais, ils sont tout mous ». Il les lave, les coupe en petits morceaux, les entasse sur une petite plaque et les enfourne à 160 °C. Expliquez l'échec et donnez trois conseils.

Corrigé

Les légumes encore humides et entassés rendent leur eau, qui ne s'évapore pas : la surface reste autour de 100 °C et les réactions de Maillard ne se produisent pas, d'autant que le four à 160 °C est peu chaud. Conseils : **sécher** les légumes après lavage ; les étaler **en une seule couche**, sur une grande plaque ou deux plaques ; cuire à **200 °C** environ, avec un filet d'huile, en les retournant à mi-cuisson ; tailler des morceaux réguliers, pas trop petits.

Quand une préparation rate : comprendre pour corriger

Les ratés de cuisine sont des occasions d'apprendre. Le tableau relie les erreurs fréquentes en atelier à leur explication physico-chimique et à la correction possible.

Ce que l'on observe · Explication · Comment corriger ou prévenir

La mayonnaise « tranche » (l'huile se sépare) — *Explication :* L'huile a été versée trop vite ou les ingrédients étaient trop froids : les gouttelettes ne sont plus entourées d'émulsifiant ; *Comment corriger ou prévenir :* Repartir d'un jaune d'œuf ou d'une cuillère de moutarde et incorporer la mayonnaise ratée petit à petit

La béchamel fait des grumeaux — *Explication :* Le liquide a été versé d'un coup sur le roux : l'amidon a empesé en boules avant de se disperser ; *Comment corriger ou prévenir :* Verser le lait froid sur le roux chaud, ou le lait chaud sur le roux froid, en fouettant ; mixer si besoin

La crème anglaise « graine » — *Explication :* Le jaune d'œuf a dépassé 85 °C : ses protéines ont coagulé en petits grains ; *Comment corriger ou prévenir :* Cuire à feu doux « à la nappe », sans bouillir ; mixer aussitôt pour rattraper un début de grainage

La viande est sèche et dure — *Explication :* Cuisson trop forte ou trop longue pour un morceau maigre : les fibres se contractent et expulsent l'eau ; *Comment corriger ou prévenir :* Choisir la cuisson selon le morceau ; laisser reposer la viande après cuisson

Les légumes verts sont gris — *Explication :* Cuisson trop longue ou à couvert : la chlorophylle s'est transformée ; *Comment corriger ou prévenir :* Cuire peu de temps, dans beaucoup d'eau bouillante, refroidir rapidement

Le caramel durcit en sable — *Explication :* Le sucre a recristallisé, souvent parce qu'on a remué ou qu'un cristal est tombé dans le sirop ; *Comment corriger ou prévenir :* Ne pas remuer, nettoyer les bords au pinceau humide, ajouter quelques gouttes de citron

Les blancs en neige retombent — *Explication :* Une trace de jaune ou de graisse empêche les protéines de stabiliser la mousse ; *Comment corriger ou prévenir :* Utiliser un bol propre et sec, séparer les œufs avec soin, ajouter une pincée de sucre en fin de montage

Lien diététique – Dédramatiser l'échec

En atelier, une préparation ratée n'est pas un échec du participant. L'animateur explique ce qui s'est passé, montre comment rattraper et rappelle que le plat reste souvent mangeable. Cette attitude renforce la confiance des personnes qui cuisinent peu, ce qui est l'un des buts des ateliers culinaires (chapitre 10).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.13

Lors d'un atelier, une participante prépare une crème pâtissière qui forme des grumeaux et une autre une vinaigrette qui se sépare en deux couches au bout de quelques minutes. 1) Expliquez chaque phénomène. 2) Proposez une correction pour chacun. 3) Dites pourquoi la vinaigrette se sépare alors que la mayonnaise reste stable.

Corrigé

1) Crème pâtissière : la farine ou la fécule a été mal dispersée dans le lait chaud, ou la crème n'a pas été fouettée pendant la cuisson ; l'amidon a empesé en amas. Vinaigrette : c'est une émulsion instable, les gouttelettes d'huile se regroupent et remontent car

l'huile est moins dense que le vinaigre. 2) Fouetter vivement ou mixer la crème pâtissière, puis la passer au chinois ; pour la vinaigrette, ajouter une cuillère de moutarde et fouetter, ou secouer dans un bocal juste avant de servir. 3) La mayonnaise contient un émulsifiant puissant, la lécithine du jaune d'œuf, qui entoure chaque gouttelette d'huile ; une vinaigrette simple n'en contient pas, sauf si l'on ajoute de la moutarde.

Vitamines et minéraux : limiter les pertes

Les vitamines **hydrosolubles** (vitamine C, vitamines du groupe B, dont les folates) sont sensibles à la **chaleur**, à l'**eau** (elles s'y dissolvent), à l'**oxygène** et à la **lumière** ; les **minéraux** passent dans l'eau de cuisson. Les vitamines **liposolubles** (A, D, E, K) et les caroténoïdes résistent mieux à la chaleur mais sont sensibles à l'oxydation ; leur absorption est favorisée par un peu de matière grasse.

Méthode pas à pas – Préserver la valeur nutritionnelle : les bons gestes

1. Acheter frais et de saison, consommer rapidement ; les surgelés sont une alternative intéressante (blanchis puis congelés rapidement).

2. Laver avant d'éplucher et de couper, sans laisser tremper.

3. Éplucher finement (les vitamines sont souvent sous la peau) ; garder la peau des produits bien lavés quand c'est possible.

4. Couper au dernier moment et en morceaux pas trop petits (moins de surface exposée).

5. Cuire dans peu d'eau, à couvert, à la vapeur ou à l'étouffée, le moins longtemps possible (« al dente »).

6. Réutiliser l'eau de cuisson (soupes, sauces, cuisson des légumes secs) pour récupérer minéraux et vitamines.

7. Servir rapidement : le maintien au chaud prolongé et les réchauffages successifs augmentent les pertes.

8. Associer un peu de matière grasse aux légumes riches en caroténoïdes (carottes, potiron).

Exemple – Calcul détaillé : estimer la part de vitamine C conservée

Données d'exemple (ordres de grandeur pédagogiques, à ne pas généraliser) : 200 g de brocoli cru contiennent environ 180 mg de vitamine C (soit environ 90 mg pour 100 g, ordre de grandeur de la table Ciqual). On compare deux cuissons. Cuisson longue à grande eau : pertes estimées à 50 %. Cuisson courte à la vapeur : pertes estimées à 20 %.

- Grande eau : 180 × (1 − 0,50) = **90 mg** conservés.
- Vapeur : 180 × (1 − 0,20) = **144 mg** conservés.
- Différence : 144 − 90 = **54 mg**, soit 54 / 90 × 100 = **+ 60 %** de vitamine C avec la vapeur par rapport à la cuisson longue à l'eau.

Lecture : le mode de cuisson change fortement la quantité de vitamine C apportée par une même portion ; les pourcentages de pertes réels varient selon le légume, la taille des morceaux, la durée et l'étude : on les présente comme des **ordres de grandeur**.

Lire la table Ciqual pour comparer des cuissons

La table Ciqual de l'ANSES donne, pour de nombreux légumes, des valeurs à l'état **cru** et après différentes **cuissons**. On peut s'en servir pour estimer l'effet d'une cuisson, à condition de respecter trois précautions.

1. Les valeurs sont données **pour 100 g d'aliment tel qu'il est consommé** : un légume cuit a perdu ou gagné de l'eau, ce qui modifie les teneurs.
2. Chaque ligne vient d'analyses différentes (échantillons, variétés, durées de cuisson) : un **petit écart** entre deux lignes ne permet pas de conclure.
3. Certaines teneurs sont **absentes** (tiret) ou notées « < » : on le signale et on ne les remplace pas par une valeur inventée.

Exemple – Calcul détaillé : le chou-fleur cru, cuit à l'eau ou à la vapeur

Table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g : chou-fleur cru (code 20016) : vitamine C 48,2 mg, potassium 270 mg ; chou-fleur bouilli/cuit à l'eau (20017) : 9,7 mg et 238 mg ; chou-fleur cuit à la vapeur (20312) : 21,4 mg et 300 mg. Référence nutritionnelle pour la population en vitamine C : 110 mg par jour pour l'adulte (ANSES, 2021). Portion de 150 g.

- Vitamine C d'une portion : cru 48,2 × 1,5 = **72,3 mg** (65,7 % de la référence) ; cuit à l'eau 9,7 × 1,5 = **14,6 mg** (13,2 %) ; vapeur 21,4 × 1,5 = **32,1 mg** (29,2 %).
- Variation de la vitamine C pour 100 g par rapport au cru : à l'eau (9,7 − 48,2) / 48,2 = **− 79,9 %** ; vapeur **− 55,6 %**.
- Potassium : à l'eau **− 11,9 %** ; vapeur **+ 11,1 %** (le légume a perdu un peu d'eau, ce qui concentre les minéraux).

Lecture : ici, la vapeur garde plus de deux fois plus de vitamine C que la cuisson à l'eau, et le potassium n'est pas perdu. Le cru reste le plus riche : on peut proposer le chou-fleur cru, en petits bouquets, avec une sauce au yaourt.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.14

Table Ciqual 2025, pour 100 g : haricot vert cru (20061) : vitamine C 12,2 mg ; haricot vert bouilli/cuit à l'eau (20320) : 1,16 mg ; carotte crue (20009) : bêta-carotène 13 200 µg ; carotte cuite à la vapeur (20307) : 8 930 µg. Calculez la variation de chaque nutriment par rapport au cru. Expliquez pourquoi la perte est plus forte pour la vitamine C des haricots que pour le bêta-carotène des carottes.

Corrigé

Vitamine C des haricots verts : (1,16 − 12,2) / 12,2 = **− 90,5 %**. Bêta-carotène des carottes : (8 930 − 13 200) / 13 200 = **− 32,3 %**. La vitamine C est **hydrosoluble** et sensible à la chaleur et à l'oxygène : elle est détruite et passe dans l'eau de cuisson. Le bêta-carotène est **liposoluble** : il ne se dissout pas dans l'eau et résiste mieux à la chaleur. De plus, la cuisson ramollit les parois de la carotte, ce qui rend le bêta-carotène restant plus facile à absorber, surtout avec un peu de matière grasse.

Du fourneau à l'assiette : maintien au chaud, liaison chaude et liaison froide

En restauration collective et dans les ateliers qui servent un repas, le temps entre la fin de la cuisson et la consommation compte, pour la sécurité sanitaire comme pour la qualité nutritionnelle. Deux organisations existent, encadrées par l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail.

Organisation · Principe · Règle de température · Effet sur la qualité

Liaison chaude — *Principe :* Le plat est cuit et servi le jour même, maintenu chaud ; *Règle de température :* Maintien à + 63 °C au moins jusqu'au service ; *Effet sur la qualité :* Le maintien prolongé détériore la texture, la couleur et les vitamines sensibles

Liaison froide — *Principe :* Le plat est cuit, refroidi rapidement, stocké au froid, puis remis en température ; *Règle de température :* Refroidissement de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; stockage à + 3 °C au plus ; remise en température rapide à + 63 °C au moins ; *Effet sur la qualité :* Permet de cuire à l'avance ; la remise en température doit être rapide et unique

Pour limiter les pertes, on **réduit la durée** de maintien au chaud plutôt que la température : cuisson en plusieurs fournées, légumes verts cuits au dernier moment, sauces servies à part. On ne réchauffe un plat qu'**une seule fois**.

Attention – En atelier, les restes

Les restes d'un atelier peuvent être emportés par les participants si la chaîne du froid est respectée : refroidissement rapide (petites boîtes, réfrigérateur), étiquette avec la date, conseil de consommer dans les 24 à 48 heures et de réchauffer jusqu'à ce que le plat soit très chaud. On ne laisse pas un plat cuit plusieurs heures à température ambiante, surtout le riz et les plats en sauce.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.15

Une association prépare le mercredi un repas pour 40 personnes, servi de 12 h 00 à 13 h 30. Les haricots verts sont cuits à 11 h 00 et maintenus au chaud jusqu'à 13 h 30. Proposez une organisation qui améliore leur couleur et leur valeur nutritionnelle, en respectant les règles de température.

Corrigé

Exemple : blanchir les haricots verts à l'avance (cuisson courte à l'eau bouillante), les **refroidir aussitôt** dans l'eau glacée et les garder au froid ; puis les **réchauffer par petites quantités** à la poêle ou à la vapeur, à 11 h 55, 12 h 30 et 13 h 00, selon l'affluence ; maintenir chaque fournée à + 63 °C au moins pendant moins de 30 minutes. Les haricots restent verts et croquants, et les pertes de vitamines liées au maintien au chaud sont réduites. On adapte les quantités à la fréquentation habituelle de chaque créneau pour limiter les restes.

Frais, surgelé ou en conserve ? Les gammes de produits

Les produits végétaux sont classés en **gammes** selon leur mode de conservation. Chaque gamme a des avantages, et toutes ont leur place dans une alimentation équilibrée et économique.

Gamme · Produits · Avantages · Limites

1re gamme — *Produits :* Produits frais bruts ; *Avantages :* Goût, saison, prix en pleine saison ; *Limites :* Préparation, épluchures, conservation courte

2e gamme — *Produits :* Conserves (appertisés) ; *Avantages :* Longue conservation à température ambiante, prêts à l'emploi, peu chers ; *Limites :* Cuisson longue lors de l'appertisation : pertes de vitamines sensibles ; souvent salés (rincer)

3e gamme — *Produits :* Surgelés ; *Avantages :* Blanchis puis surgelés rapidement, pratiques, sans épluchures ; *Limites :* Chaîne du froid à respecter ; texture parfois plus molle

4e gamme — *Produits :* Végétaux frais crus, lavés, prêts à l'emploi (salades en sachet) ; *Avantages :* Gain de temps ; *Limites :* Prix élevé, conservation courte au froid, emballages

5e gamme — *Produits :* Végétaux cuits, sous vide ou pasteurisés, prêts à l'emploi ; *Avantages :* Gain de temps ; *Limites :* Prix, emballages

Exemple – Calcul détaillé : les petits pois sous quatre formes

Table Ciqual 2025, vitamine C pour 100 g : petits pois crus (code 20072) : 40 mg ; surgelés, crus (20084) : 18 mg ; surgelés, cuits (20124) : 9,9 mg ; appertisés, égouttés (20036) : 4,2 mg.

- Par rapport aux petits pois frais crus : surgelés crus **− 55,0 %** ; surgelés cuits **− 75,2 %** ; conserve **− 89,5 %**.

Lecture : la transformation et la cuisson réduisent la vitamine C, et la conserve en garde le moins. Mais les petits pois frais se trouvent peu de semaines par an, demandent du temps (écossage) et sont rarement mangés crus. Les surgelés et les conserves restent des **alliés** : ils apportent des fibres, des protéines végétales et des minéraux, à petit prix et toute l'année. On rince les conserves pour réduire le sel. Les écarts entre lignes viennent aussi d'échantillons différents : ce sont des ordres de grandeur.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.16

Une mère de trois enfants vous dit : « Je n'achète que des légumes en conserve, je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas le temps. » Rédigez votre réponse en quatre

phrases, sans la culpabiliser, en valorisant ses choix et en proposant une piste.

Corrigé

Exemple : « Les légumes en conserve, c'est bien : ils apportent des fibres et des minéraux, ils se gardent longtemps et ils sont prêts tout de suite. Vous faites déjà un vrai effort en servant des légumes à vos enfants. Pensez juste à les rincer pour enlever une partie du sel, et à garder le jus des légumes peu salés pour une soupe. Si vous en avez envie, les légumes surgelés nature sont aussi rapides et gardent un peu plus de vitamines : on pourrait en essayer ensemble à l'atelier. »

Limiter la formation de composés indésirables

Composé · Formation · Gestes de prévention

Acrylamide — *Formation :* Réaction de Maillard à haute température dans les aliments riches en amidon (frites, chips, pain grillé, biscuits) ; *Gestes de prévention :* Cuire jusqu'à une couleur dorée et non brune ; ne pas stocker les pommes de terre au réfrigérateur ; tremper les frites crues ; le règlement (UE) 2017/2158 impose des mesures d'atténuation aux professionnels

Composés de dégradation des huiles — *Formation :* Chauffage au-delà du point de fumée, réutilisation répétée ; *Gestes de prévention :* Huile adaptée, température contrôlée, renouvellement

Composés issus des grillades très colorées — *Formation :* Contact de la graisse avec la flamme, carbonisation ; *Gestes de prévention :* Éviter les parties brûlées, distance de la source de chaleur, marinade

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Acrylamide** : le règlement (UE) 2017/2158 fixe des mesures d'atténuation et des niveaux de référence ; des discussions européennes portent sur d'éventuelles teneurs maximales : vérifier les évolutions sur les sites de la Commission européenne et de l'ANSES.
- **Table Ciqual** (ANSES) : la version en vigueur est Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025) ; toutes les teneurs de ce chapitre en viennent.

Les composés indésirables : comprendre pour prévenir sans affoler

La cuisson à haute température peut former des composés indésirables. Le message de santé publique n'est pas de renoncer aux cuissons qui colorent, mais d'en **maîtriser l'intensité**. Le tableau complète celui du cours.

Composé · Où le trouve-t-on ? · Ce que l'on sait · Gestes à la maison

Acrylamide — *Où le trouve-t-on ? :* Frites, chips, pain grillé, biscuits, café torréfié ; *Ce que l'on sait :* Formé par réaction de Maillard (asparagine et sucres réducteurs) au-delà d'environ 120 °C ; classé cancérogène probable (groupe 2A) par le CIRC en 1994 ; l'Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé en 2015 qu'il pouvait augmenter le risque de cancer ; *Gestes à la maison :* Cuire doré et non brun ; ne pas garder les pommes de terre au réfrigérateur ; tremper les frites crues ; griller le pain jusqu'à une couleur claire

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) — *Où le trouve-t-on ? :* Grillades au barbecue, aliments fumés ; *Ce que l'on sait :* Formés quand la graisse tombe sur les braises et que la fumée remonte, ou par carbonisation ; *Gestes à la maison :* Éviter le contact direct avec la flamme, cuire à distance des braises, retirer les parties brûlées, privilégier les marinades et les viandes maigres

Composés de dégradation des huiles — *Où le trouve-t-on ? :* Huiles surchauffées ou réutilisées ; *Ce que l'on sait :* Formés au-delà du point de fumée et lors des fritures répétées ; *Gestes à la maison :* Huile adaptée, température maîtrisée, renouvellement

Lien diététique – Rester proportionné

En atelier, on présente ces risques sans dramatiser : ils dépendent de la dose et de la fréquence. Le message utile est concret (« visez le doré », « pas de noir sur la grillade ») et il rejoint d'autres repères du PNNS : moins de produits frits, plus de légumes, des cuissons variées. On évite de transformer un moment de plaisir en source d'angoisse.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.17

Un comité d'entreprise organise un barbecue d'été pour 60 salariés. Rédigez cinq consignes pour les cuisiniers bénévoles, qui associent sécurité sanitaire et prévention des composés indésirables.

Corrigé

1) Garder les viandes au froid jusqu'à la cuisson et ne sortir que de petites quantités. 2) Allumer le barbecue à l'avance et cuire sur des **braises** sans flammes, à bonne distance, en évitant que la graisse coule sur les braises. 3) Cuire **à cœur** les saucisses, les volailles et les viandes hachées, sans les carboniser ; retirer les parties brûlées. 4) Utiliser des ustensiles et des plats **différents** pour la viande crue et la viande cuite. 5) Proposer des légumes grillés et des brochettes de légumes marinés, et des viandes marinées, plus maigres, pour limiter les fumées.

Une expérience en atelier : cuire des haricots verts de quatre façons

Une expérience simple permet aux participants de **voir** les effets de la cuisson au lieu de les entendre. Elle convient à un atelier « science en cuisine » avec des collégiens ou à une formation de cuisiniers.

Méthode pas à pas – Conduire l'expérience des haricots verts

1) Préparer quatre lots de 100 g de haricots verts frais, équeutés, de même calibre. 2) Lot A : cuisson à l'eau bouillante, sans couvercle, 8 minutes. Lot B : même cuisson, avec un couvercle, 8 minutes. Lot C : cuisson à l'eau bouillante, 20 minutes. Lot D : cuisson dans une eau additionnée d'une cuillère de vinaigre, 8 minutes. 3) Égoutter, placer chaque lot sur une assiette blanche numérotée et observer la couleur. 4) Goûter et décrire la texture (croquant, fondant,

filandreux) et la saveur. 5) Noter les observations dans un tableau, puis demander aux participants de proposer une explication.

Résultats attendus et explications :

Lot · Couleur observée · Texture · Explication

A, 8 min sans couvercle — *Couleur observée :* Vert vif ; *Texture :* Tendre et encore croquant ; *Explication :* Les acides volatils libérés par le légume s'échappent avec la vapeur

B, 8 min avec couvercle — *Couleur observée :* Vert un peu terne ; *Texture :* Tendre ; *Explication :* Les acides volatils restent dans la casserole et dégradent une partie de la chlorophylle

C, 20 min — *Couleur observée :* Vert olive ; *Texture :* Fondant, parfois mou ; *Explication :* La chlorophylle se transforme en phéophytine ; les pectines se dissolvent

D, eau vinaigrée — *Couleur observée :* Vert olive ; *Texture :* Plus ferme ; *Explication :* Le milieu acide transforme la chlorophylle et ralentit le ramollissement des pectines

On remarque une contradiction utile : le couvercle limite les pertes d'énergie et de vitamines, mais il ternit un peu la couleur des légumes verts. En pratique, pour une cuisson courte, on peut laisser le couvercle pendant la montée en ébullition puis le retirer. L'expérience montre aussi que la **durée** compte plus que le reste. Pour la vitamine C, l'observation ne suffit pas : il faudrait un dosage en laboratoire ; on renvoie alors aux valeurs de la table Ciqual et à leurs limites.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.18

1) Dans l'expérience, quelles conditions doivent rester identiques entre les lots pour que la comparaison soit juste ? 2) Un élève propose d'ajouter du bicarbonate de soude pour garder la couleur verte. Que se passe-t-il, et pourquoi ne le conseille-t-on pas ?

Corrigé

1) La variété et le calibre des haricots, la masse de chaque lot, le volume d'eau, la source de chaleur et le moment où l'on commence à chronométrer. On ne change qu'un facteur à la fois. 2) Le milieu basique garde la chlorophylle d'un vert très vif, mais il ramollit fortement les légumes (dégradation des pectines) et augmente la destruction de la vitamine C et de certaines vitamines du groupe B. Le gain de couleur se paie en texture et en vitamines.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.2 – Les modifications physico-chimiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un concombre salé à l'avance rend-il de l'eau ?

2. Citez deux facteurs qui retardent l'attendrissement des légumes secs.

3. Pourquoi des pâtes al dente ont-elles un index glycémique plus bas que des pâtes très cuites ?

4. Pourquoi faut-il sécher des légumes avant de les rôtir ?

5. Pourquoi la vitamine C est-elle plus perdue que le bêta-carotène à la cuisson ?

6. Quelles sont les trois règles de température de la liaison froide ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.2

1. Par osmose : le sel attire l'eau hors des cellules du concombre.

2. Le sel ajouté au début de la cuisson, l'eau calcaire, l'acidité (tomate ajoutée trop tôt).

3. L'amidon reste plus compact et entouré du réseau de protéines : il est digéré plus lentement.

4. L'eau maintient la surface autour de 100 °C et empêche les réactions de Maillard : les légumes ne dorent pas.

5. Elle est hydrosoluble (elle passe dans l'eau) et sensible à la chaleur et à l'oxygène ; le bêta-carotène est liposoluble et plus stable.

6. Refroidir de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; stocker à + 3 °C au plus ; remettre en température rapidement à + 63 °C au moins.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 11.3.3.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les tableaux sur l'amidon, les protéines et la conservation.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 11.3.2 et je refais les exercices d'application.

11.3.3 Choisir les aliments : portions, coût, qualité, équité, environnement

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S7 (p. 3)

Grammages et portions

Le **grammage** est la quantité d'un aliment prévue par personne ; la **portion** est la quantité servie. En restauration collective, les grammages de référence pour chaque catégorie d'âge figurent dans la recommandation nutrition du GEM-RCN (BC2). En atelier, on raisonne en **portions réalistes** pour le public et en **mesures familières** pour la fiche recette.

Repère · Application en atelier

Une portion de fruits ou de légumes ≈ 80 à 100 g (repère du PNNS) — *Application en atelier :* Une pomme moyenne, une poignée de tomates cerises, deux cuillères à soupe pleines de légumes cuits

Légumes secs : au moins 2 fois par semaine (repère adultes, Santé publique France, 2019) — *Application en atelier :* Environ 40 à 60 g crus par personne dans un plat complet

Féculents : à chaque repas, en privilégiant les produits complets — *Application en atelier :* Pâtes ou riz : environ 60 à 80 g crus par adulte selon l'appétit et le reste du repas

Adapter à l'âge et à l'appétit — *Application en atelier :* Enfants : portions plus petites ; personnes âgées : petites portions enrichies (chapitre 10)

Les grammages chiffrés ci-dessus sont des ordres de grandeur pour l'atelier ; pour la restauration collective, se référer aux grammages officiels par catégorie de convives.

Des grammes aux mesures de la maison

Une fiche technique s'écrit en grammes ; une fiche recette destinée au public s'écrit souvent en **mesures ménagères**, plus faciles à utiliser chez soi. Les équivalences ci-dessous sont des **ordres de grandeur** : elles varient selon la cuillère, la façon de la remplir et la densité de l'aliment. On les vérifie en pesant une fois avec le groupe, ce qui est aussi un bon exercice.

Mesure · Équivalence approximative · Exemples d'usage

1 cuillère à café rase — *Équivalence approximative :* Environ 5 g de sucre ou de sel ; 3 g de farine ; *Exemples d'usage :* Sel d'une recette, épices

1 cuillère à soupe rase — *Équivalence approximative :* Environ 10 g d'huile ou de farine ; 15 g de sucre ; *Exemples d'usage :* Huile d'une poêlée, sucre d'un dessert

1 pincée — *Équivalence approximative :* Moins de 1 g de sel ; *Exemples d'usage :* Assaisonnement

1 verre (type verre à moutarde) — *Équivalence approximative :* Environ 20 cL de liquide ; *Exemples d'usage :* Lait, eau, bouillon

1 bol — *Équivalence approximative :* Environ 35 cL de liquide ; *Exemples d'usage :* Soupe

1 poignée — *Équivalence approximative :* Environ 30 g de pâtes ou de riz crus, selon la main ; *Exemples d'usage :* Repère pour une portion

1 œuf moyen — *Équivalence approximative :* Environ 50 g sans coquille ; *Exemples d'usage :* Pâtisserie

1 pomme, 1 orange moyenne — *Équivalence approximative :* Environ 150 g avec la peau ; *Exemples d'usage :* Une portion de fruit

Lien diététique – La portion juste

En atelier, montrer une portion en vrai vaut mieux qu'un chiffre : une assiette dressée avec la moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines, un fruit de la taille du poing pour une portion de fruits. Les grammages officiels par âge pour la restauration collective (recommandation nutrition du GEM-RCN, BC2) ne sont pas des quantités imposées à la maison : chacun adapte à sa faim et à son activité.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.19

La fiche technique d'un gâteau au yaourt indique : 120 g de farine, 45 g de sucre, 30 g d'huile de colza, 2 œufs, 1 yaourt nature de 125 g. Pour la fiche recette d'un public qui n'a pas de balance, traduisez ces quantités en mesures ménagères avec le tableau, puis proposez une autre façon de mesurer, utilisée traditionnellement pour ce gâteau.

Corrigé

Farine : 120 / 10 = **12 cuillères à soupe** rases ; sucre : 45 / 15 = **3 cuillères à soupe** rases ; huile : 30 / 10 = **3 cuillères à soupe** ; 2 œufs ; 1 yaourt. Autre façon : la recette traditionnelle utilise le **pot de yaourt** vide comme mesure (par exemple 2 pots de farine, un demi-pot de sucre, un demi-pot d'huile), ce qui ne demande aucune balance. On vérifie en pesant une fois en atelier, car un pot de farine ne pèse pas comme un pot d'huile.

Le fait maison

Cuisiner soi-même des produits bruts permet de **maîtriser** la composition (sel, sucre, matières grasses), de réduire le **coût** et les **emballages**, et de valoriser des **compétences**. En restauration commerciale, la mention « fait maison » est encadrée (décret n° 2015-505 du 6 mai 2015) : un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits crus, certains produits transformés étant admis par la réglementation. En atelier, le fait maison est présenté sans opposer « bons » et « mauvais » produits : un légume surgelé nature ou une conserve de légumes secs sont des alliés de la cuisine rapide et économique.

Fait maison, produits transformés et lecture des étiquettes

On classe souvent les aliments selon leur **degré de transformation**. La classification **NOVA**, proposée par l'équipe de Carlos Monteiro à l'université de São Paulo à partir de 2009, distingue quatre groupes : les aliments **bruts** ou peu transformés (légumes, œufs, lait, légumes secs), les **ingrédients culinaires** (huile, sel, sucre, farine), les aliments **transformés** (conserves de légumes, pain, fromage) et les aliments **ultra-transformés**, fabriqués industriellement avec des ingrédients et des additifs qu'on n'utilise pas à la maison (émulsifiants, arômes, édulcorants…). Plusieurs études observationnelles associent une forte consommation d'aliments ultra-transformés à un risque plus élevé de certaines maladies chroniques, mais l'ANSES (30 janvier 2025) constate qu'il n'existe pas encore de définition consensuelle ; le PNNS 5 (2026-2030) vise à réduire leur consommation de 20 %. Les mécanismes sont encore discutés.

En atelier, on ne cherche pas à classer les participants ni à interdire, mais à donner des **repères** pour choisir et à montrer que cuisiner des produits bruts est possible, rapide et économique.

Méthode pas à pas – Lire une étiquette en atelier

1. La dénomination : « préparation à base de… », « saveur… » renseigne sur la composition réelle.

2. La liste des ingrédients, classés par ordre décroissant de poids : le premier ingrédient est le plus abondant. Une liste longue, avec des noms que l'on n'a pas dans sa cuisine, signale un produit très transformé.

3. Les allergènes, mis en évidence dans la liste (gras, couleur, souligné), selon le règlement (UE) n° 1169/2011.

4. Le tableau nutritionnel pour 100 g : énergie, matières grasses dont acides gras saturés, glucides dont sucres, protéines, sel.

5. Le Nutri-Score, s'il est affiché, pour comparer des produits d'une même catégorie.

6. Les dates : « à consommer jusqu'au » (date limite de consommation, à respecter) ou « à consommer de préférence avant » (date de durabilité minimale : le

produit reste consommable après, s'il a été bien conservé).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.20

Dans un atelier, deux participants comparent deux produits : a) des lentilles cuisinées en conserve dont la liste est « lentilles, eau, carottes, oignons, sel, huile de tournesol, aromates » ; b) un plat préparé dont la liste compte 24 ingrédients, dont « amidon modifié, arômes, émulsifiant, sirop de glucose ». Classez les deux produits selon NOVA et rédigez le message à retenir pour le groupe, sans juger ceux qui achètent le second.

Corrigé

a) Les lentilles cuisinées sont un aliment **transformé** (groupe 3) : des ingrédients connus, ceux d'une recette maison. b) Le plat préparé est **ultra-transformé** (groupe 4) : il contient des ingrédients et des additifs industriels que l'on n'utilise pas à la maison. Message : « Les conserves simples, comme ces lentilles, sont de bons alliés pour cuisiner vite et pas cher. Pour les plats tout prêts, regardez la liste des ingrédients : plus elle est courte et ressemble à une recette, mieux c'est. Il ne s'agit pas de tout faire soi-même, mais de savoir choisir et de garder une ou deux recettes rapides à faire à la maison. »

Les critères économiques

Méthode pas à pas – Comparer des aliments du point de vue économique

1. Comparer les **prix au kilo** (ou au litre) affichés en rayon, pas les prix des emballages.
2. Tenir compte du **rendement** (épluchures, os, eau de cuisson perdue) et du **gonflement** (légumes secs, riz, pâtes) : raisonner **par portion consommée**.
3. Pour comparer des sources de protéines, calculer le **coût pour 10 g de protéines**.
4. Tenir compte des **conditionnements** et du risque de **gaspillage** (chapitre 10, 10.3.3).

Exemple – Calcul détaillé : lentilles ou viande hachée ?

Données d'exemple : lentilles vertes à 3,20 €/kg, 40 g crus par portion, environ 24 g de protéines pour 100 g crus ; viande hachée de bœuf à 10,90 €/kg, 100 g crus par portion, environ 20 g de protéines pour 100 g (teneurs arrondies d'après la table Ciqual ; prix fictifs).

- Coût d'une portion : lentilles 0,040 × 3,20 = **0,128 €** ; viande 0,100 × 10,90 = **1,09 €**.
- Protéines par portion : lentilles 40 × 0,24 = **9,6 g** ; viande 100 × 0,20 = **20 g**.
- Coût pour 10 g de protéines : lentilles 0,128 / 9,6 × 10 = **0,13 €** ; viande 1,09 / 20 × 10 = **0,55 €** ; rapport : 0,545 / 0,133 = **4,1**.

Lecture : pour un même apport en protéines, la viande hachée coûte environ 4 fois plus cher que les lentilles. Associées à une céréale et à un produit laitier, les légumineuses constituent une base de plat complet économique (chapitre 10).

Le coût réel d'une recette maison

Le prix est l'un des premiers freins à une alimentation favorable à la santé, surtout pour les publics à petit budget. Calculer avec le groupe le coût d'une recette maison et le comparer à un produit tout prêt est un exercice concret qui change souvent les représentations (« manger équilibré, c'est cher »).

Exemple – Calcul détaillé : lasagnes de légumes maison ou barquette du commerce

Lasagnes de légumes maison pour 8 portions (quantités achetées et prix fictifs) : pâtes à lasagnes 250 g à 2,40 €/kg ; courgettes 800 g à 2,40 €/kg ; aubergine 400 g à 3,20 €/kg ; tomates concassées 800 g à 1,80 €/kg ; oignons 200 g à 1,80 €/kg ; lait 0,5 L à 1,05 €/L ; farine 40 g à 1,10 €/kg ; huile de colza 30 g à 3,20 €/kg ; emmental râpé 100 g à 10,50 €/kg ; épices et sel : forfait 0,40 €. Barquette de lasagnes de légumes du commerce : 3,49 € les 300 g (une portion).

- Coûts : pâtes 0,60 € ; courgettes 1,92 € ; aubergine 1,28 € ; tomates 1,44 € ; oignons 0,36 € ; lait 0,53 € ; farine 0,04 € ; huile 0,10 € ; emmental 1,05 € ; forfait 0,40 €. Total : **7,72 €**, soit 7,715 / 8 = **0,96 €** par portion.
- Barquette : **3,49 €** par portion, soit 11,63 € le kilo.
- Rapport : 3,49 / 0,964 = **3,6** : la barquette coûte plus de trois fois et demie plus cher par portion.

Lecture : le fait maison est nettement moins cher, mais il demande du **temps** (environ 1 heure, dont 40 minutes de cuisson) et de l'**énergie** pour le four, que l'on peut discuter avec le groupe. On peut proposer de cuisiner une grande quantité et d'en congeler une partie, ce qui réduit le temps par repas.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.21

Un participant objecte : « Chez moi, je n'ai pas de four et pas le temps. » Proposez, à partir de l'exemple, deux idées qui gardent l'avantage économique du fait maison avec ces contraintes.

Corrigé

Exemple : une **poêlée de pâtes aux légumes** (courgettes, aubergine, tomates concassées, oignons) réalisée à la poêle en 20 minutes, avec un peu de fromage râpé : mêmes ingrédients, même coût par portion, sans four. Ou des **lasagnes « en casserole »** : pâtes cassées cuites directement dans la sauce tomate aux légumes, sur la plaque. On peut aussi cuisiner une grande quantité le week-end et la congeler en portions, ce qui réduit le temps de préparation les jours de travail.

Acheter et conserver sans gaspiller

Le **gaspillage alimentaire** pèse sur le budget des familles et sur l'environnement. La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a établi une hiérarchie des actions : prévention du gaspillage, utilisation des invendus pour la consommation humaine (don, transformation), puis pour l'alimentation animale, enfin valorisation en compost ou en énergie. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC) a renforcé ces obligations. En atelier, on agit surtout sur la **prévention**.

Étape · Gestes anti-gaspillage

Avant les courses — *Gestes anti-gaspillage :* Vérifier le réfrigérateur et les placards ; prévoir les menus ; faire une liste

Au magasin — *Gestes anti-gaspillage :* Choisir les conditionnements adaptés au nombre de personnes ; préférer le vrac pour les petites quantités ; se méfier des promotions sur des produits frais en grande quantité

Au rangement — *Gestes anti-gaspillage :* Placer devant les produits dont la date est la plus proche ; ranger au bon endroit du réfrigérateur

En cuisine — *Gestes anti-gaspillage :* Cuisiner les fanes et les épluchures propres (soupes, pestos) ; cuisiner les restes (gratins, soupes, salades composées) ; congeler les surplus

À table — *Gestes anti-gaspillage :* Servir des portions adaptées ; proposer de se resservir plutôt que de trop servir

Définition – DLC et DDM

La **date limite de consommation** (« à consommer jusqu'au… ») concerne les produits très périssables (viande, poisson, produits laitiers frais) : au-delà, le produit peut présenter un risque et ne doit pas être consommé. La **date de durabilité minimale** (« à consommer de préférence avant… », ou « … de préférence avant fin… ») concerne des produits secs ou stables (pâtes, riz, conserves, biscuits) : après cette date, le produit peut perdre de ses qualités (goût, texture), mais il reste consommable s'il a été correctement conservé et si l'emballage est intact.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.22

Dans une épicerie solidaire, on vous montre un paquet de pâtes avec la mention « à consommer de préférence avant » dépassée de deux mois, et un yaourt dont la date « à consommer jusqu'au » est dépassée de deux jours. Dites ce que l'on peut faire de chaque produit et justifiez.

Corrigé

Le paquet de **pâtes** porte une **date de durabilité minimale** : si l'emballage est intact et qu'il a été stocké au sec, il reste consommable ; il peut être distribué ou cuisiné (les règles de la structure et de la loi AGEC encadrent le don de ces produits). Le **yaourt** porte une **date limite de consommation** dépassée : il ne doit pas être distribué ni utilisé dans l'atelier, par précaution sanitaire.

Le prix des protéines : comparer à apport égal

Comparer des prix au kilo ne suffit pas, car les aliments n'apportent pas les mêmes nutriments. Pour les sources de protéines, on peut comparer le **coût de 20 g de protéines**, soit environ la quantité apportée par une portion de viande. La méthode est simple : on calcule la masse d'aliment qui apporte 20 g de protéines (20 ÷ teneur pour 100 g × 100), puis son coût.

Exemple – Calcul détaillé : le coût de 20 g de protéines

Teneurs en protéines : Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026). Prix au kilo **fictifs**, octobre 2026, pour la partie comestible (pour les œufs, la coquille est retirée ; pour les sardines, l'huile est égouttée).

Aliment (code Ciqual) · Protéines (g pour 100 g) · Prix (€ le kilo, fictif) · Masse pour 20 g de protéines · Coût de 20 g de protéines

Lentille verte sèche (20585) — *Protéines (g pour 100 g) :* 25,1 ; *Prix (€ le kilo, fictif) :* 3,00 ; *Masse pour 20 g de protéines :* 80 g ; *Coût de 20 g de protéines :* 0,24 €

Fromage blanc 0 % (19644) — *Protéines (g pour 100 g) :* 7,3 ; *Prix (€ le kilo, fictif) :* 2,40 ; *Masse pour 20 g de protéines :* 272 g ; *Coût de 20 g de protéines :* 0,65 €

Emmental (12115) — *Protéines (g pour 100 g) :* 27,9 ; *Prix (€ le kilo, fictif) :* 11,00 ; *Masse pour 20 g de protéines :* 72 g ; *Coût de 20 g de protéines :* 0,79 €

Œuf cru (22000) — *Protéines (g pour 100 g) :* 12,8 ; *Prix (€ le kilo, fictif) :* 6,00 ; *Masse pour 20 g de protéines :* 156 g ; *Coût de 20 g de protéines :* 0,94 €

Sardine à l'huile, égouttée (26034) — *Protéines (g pour 100 g) :* 23,3 ; *Prix (€ le kilo, fictif) :* 12,00 ; *Masse pour 20 g de protéines :* 86 g ; *Coût de 20 g de protéines :* 1,03 €

Filet de poulet cru (36017) — *Protéines (g pour 100 g) :* 23,4 ; *Prix (€ le kilo, fictif) :* 13,00 ; *Masse pour 20 g de protéines :* 85 g ; *Coût de 20 g de protéines :* 1,11 €

Steak haché 5 % cru (6250) — *Protéines (g pour 100 g) :* 21,9 ; *Prix (€ le kilo, fictif) :* 14,50 ; *Masse pour 20 g de protéines :* 91 g ; *Coût de 20 g de protéines :* 1,32 €

Tofu nature (20904) — *Protéines (g pour 100 g) :* 13,4 ; *Prix (€ le kilo, fictif) :* 9,50 ; *Masse pour 20 g de protéines :* 149 g ; *Coût de 20 g de protéines :* 1,42 €

Les lentilles sont de loin la source de protéines la moins chère : 20 g de protéines y coûtent environ cinq fois moins que dans le steak haché. Elles apportent en plus des fibres (16,4 g pour 100 g de lentilles sèches) et du fer non héminique. Il faut cependant lire ce tableau avec prudence. Les protéines des légumineuses sont pauvres en un acide aminé indispensable (la méthionine) : on les associe à des céréales sur la journée. L'emmental est peu cher pour ses protéines, mais il apporte aussi 28,8 g de lipides pour 100 g et beaucoup de sel. Enfin, les prix varient selon les magasins et les saisons : on refait le calcul avec les prix réels relevés par le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.23

Un groupe relève un prix de 2,20 € le kilo pour des pois chiches secs, qui contiennent 20,5 g de protéines pour 100 g (valeur à vérifier dans Ciqual). 1) Calculez la masse de

pois chiches secs qui apporte 20 g de protéines, puis son coût. 2) Comparez avec le filet de poulet du tableau. 3) Formulez un message pour le groupe en une phrase, sans culpabiliser les personnes qui mangent de la viande.

Corrigé

1) 20 ÷ 20,5 × 100 = 97,6 g de pois chiches secs ; coût : 0,0976 × 2,20 = 0,21 €. 2) Le filet de poulet coûte 1,11 € pour la même quantité de protéines, soit environ 5,2 fois plus. 3) « Remplacer la viande par des pois chiches ou des lentilles un ou deux repas par semaine permet de faire des économies, tout en gardant un repas rassasiant et riche en fibres. » Le message propose un changement modeste et ne juge pas les habitudes.

Qualité, équité et impact environnemental

Critère · Repères · En atelier

Saison — *Repères :* Produits récoltés à leur période naturelle de production, souvent moins chers et plus savoureux ; *En atelier :* Calendrier de saison ; recettes adaptées au mois

Signes officiels de qualité et d'origine — *Repères :* AOP, IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique (logos officiels contrôlés) ; *En atelier :* Faire reconnaître les logos ; distinguer signes officiels et mentions commerciales

Commerce équitable — *Repères :* Défini en droit français (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, article 60, modifié par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) : rémunération juste des producteurs, engagement dans la durée ; *En atelier :* Chocolat, café, bananes, riz ; parfois plus chers : à discuter selon le budget

Impact environnemental — *Repères :* Le type d'aliment pèse davantage que le transport : produits animaux (surtout viande de ruminants) à impact plus élevé que les végétaux ; base de données Agribalyse (ADEME) ; *En atelier :* Plats à base de légumineuses ; viande en plus petite quantité ; limiter le gaspillage et les emballages

Restauration collective (BC2) — *Repères :* Loi EGalim (2018) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur ; *En atelier :* Lien avec les menus de la cantine des enfants

Attention – Ne pas culpabiliser

Les produits biologiques, équitables ou sous signe de qualité sont souvent plus chers. Pour un public à petit budget, le message principal reste : **plus de légumes, de légumes secs et de produits de saison, moins de gaspillage** ; les produits labellisés sont présentés comme des choix possibles, non comme des obligations morales (chapitre 6).

Les signes officiels et les mentions : ce qu'ils garantissent

En France, les **signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine** (SIQO) sont gérés par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Ils reposent sur un **cahier des charges** et sur des **contrôles** réalisés par des organismes indépendants. Ils se distinguent des **mentions valorisantes**, définies par la réglementation pour certains produits, et des **allégations commerciales**, qui n'engagent que le fabricant.

Signe ou mention · Ce qui est garanti · Exemples

Appellation d'origine protégée (AOP) et appellation d'origine contrôlée (AOC) — *Ce qui est garanti :* Toutes les étapes de production dans une même zone, avec un savoir-faire reconnu ; *Exemples :* Comté, roquefort, lentille verte du Puy

Indication géographique protégée (IGP) — *Ce qui est garanti :* Au moins une étape de production dans la zone, et un lien entre le produit et le territoire ; *Exemples :* Volailles de Loué, jambon de Bayonne

Spécialité traditionnelle garantie (STG) — *Ce qui est garanti :* Une recette ou une composition traditionnelle, sans lien avec une origine ; *Exemples :* Moules de bouchot, pizza napoletana

Label Rouge — *Ce qui est garanti :* Une qualité supérieure à celle des produits courants de même type ; *Exemples :* Volailles fermières élevées en plein air

Agriculture biologique — *Ce qui est garanti :* Un mode de production sans produits chimiques de synthèse ni OGM, avec des règles de bien-être animal ; *Exemples :* Logo européen « Eurofeuille », logo AB

Mentions valorisantes : « produit de montagne », « fermier », « produit pays » (outre-mer), « issu d'une exploitation de haute valeur environnementale » — *Ce qui est garanti :* Des conditions définies par la réglementation, selon les produits ; *Exemples :* Fromage fermier, miel de montagne

Commerce équitable — *Ce qui est garanti :* Un prix rémunérateur et un engagement durable avec les producteurs (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, article 60, modifiée en 2014) ; plusieurs labels privés le certifient ; *Exemples :* Café, chocolat, bananes, riz

Attention – Ne pas confondre qualité et santé

Les signes officiels portent sur l'**origine**, la **tradition**, le **mode de production** ou la **qualité gustative**, pas sur la qualité **nutritionnelle**. Un fromage AOP reste riche en matières grasses et en sel. Pour la composition, on regarde le tableau nutritionnel et, s'il est affiché, le Nutri-Score.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.24

Dans un atelier de lecture d'étiquettes, une participante choisit un saucisson « recette artisanale, goût authentique » plutôt qu'un saucisson sous IGP, « parce que c'est plus naturel ». Expliquez-lui la différence entre les deux mentions, puis ce que ni l'une ni l'autre ne dit sur la santé.

Corrigé

« Recette artisanale » et « goût authentique » sont des **allégations commerciales** : aucun cahier des charges ni contrôle indépendant ne les encadre de façon générale. L'**IGP** est un signe officiel : le produit respecte un cahier des charges contrôlé, avec un lien à un territoire. Ni l'une ni l'autre ne dit que le produit est meilleur pour la santé : un saucisson reste riche en sel et en matières grasses ; on le consomme en petite quantité, quel que soit le logo.

Saison et environnement : des repères pour l'atelier

Choisir des produits de **saison** est souvent le levier le plus simple : ils sont plus savoureux, souvent moins chers et ne demandent pas de culture sous serre chauffée. Le calendrier ci-dessous donne des repères pour la France métropolitaine ; les dates varient selon les régions et les années.

Saison	Légumes (exemples)	Fruits (exemples)
Hiver	Poireau, chou, carotte, navet, endive, céleri-rave, courges, betterave	Pomme, poire, agrumes, kiwi
Printemps	Asperge, radis, petits pois, épinard, carotte nouvelle, laitue	Fraise (fin du printemps), rhubarbe
Été	Tomate, courgette, aubergine, poivron, haricot vert, concombre	Abricot, pêche, melon, cerise, prune, fruits rouges
Automne	Potiron, champignons, chou-fleur, brocoli, épinard	Pomme, poire, raisin, figue, châtaigne

Pour l'impact environnemental, les études de cycle de vie (base de données **Agribalyse** de l'ADEME) montrent que le **type d'aliment** compte plus que le transport : les produits animaux, surtout la viande de ruminants, ont un impact plus élevé que les produits végétaux. Les leviers les plus efficaces en atelier sont donc : plus de **légumineuses**, de céréales et de légumes de saison ; de la **viande en plus petite quantité** ; moins de **gaspillage** ; moins d'**emballages** (vrac, contenants réutilisables).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.25

En janvier, un atelier prévoit une salade de tomates, une ratatouille et une salade de fraises. Expliquez pourquoi ce menu pose problème, puis proposez un menu de saison équivalent (une entrée, un plat, un dessert).

Corrigé

En janvier, tomates, courgettes, aubergines, poivrons et fraises ne sont pas de saison en France métropolitaine : ils sont importés ou cultivés sous serre chauffée, plus chers et souvent moins savoureux. Menu de saison : **salade de carottes râpées et de chou rouge** à la vinaigrette ; **gratin de poireaux et de pommes de terre**, ou **potée de légumes d'hiver aux lentilles** ; **compote ou crumble de pommes et de poires**, ou salade d'oranges à la cannelle.

La restauration collective : EGalim et loi Climat et résilience

Les ateliers rejoignent souvent les repas de la cantine ou du restaurant d'entreprise : connaître les règles de la restauration collective permet de faire le lien (BC2).

Texte	Mesure	Date
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim)	Au moins **50 %** de produits durables et de qualité (dont signes officiels), dont au moins **20 %** de produits biologiques, en valeur d'achat	Depuis le 1er janvier 2022
Loi EGalim	Un **menu végétarien** au moins une fois par semaine en restauration scolaire, d'abord à titre expérimental	Depuis le 1er novembre 2019
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)	Menu végétarien hebdomadaire **pérennisé** en restauration scolaire ; extension des objectifs aux restaurants collectifs privés ; au moins 60 % de viandes et de poissons durables et de qualité (100 % dans la restauration collective de l'État)	Échéances progressives, dont le 1er janvier 2024 pour les viandes et poissons
Loi EGalim	Information des convives sur la part de produits durables ; plan de diversification des protéines pour les restaurants servant plus de 200 couverts par jour	Depuis 2019-2020

Lien diététique – De la cantine à l'atelier

Un atelier « menu végétarien » avec des parents permet de montrer comment la cantine construit un repas sans viande équilibré (légumineuses et céréales, œufs, produits laitiers), et de donner des idées pour la maison. L'analyse sensorielle (11.3.5) aide aussi à faire accepter ces plats par les enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.26

Le restaurant d'une maison de retraite (structure fictive) dépense 200 000 € par an en denrées, dont 62 000 € de produits durables et de qualité (dont 18 000 € de produits biologiques). Calculez les deux parts en valeur et dites si les objectifs de la loi EGalim sont atteints. Proposez deux pistes.

Corrigé

Produits durables et de qualité : 62 000 / 200 000 = **31 %** (objectif : 50 %, non atteint). Produits biologiques : 18 000 / 200 000 = **9 %** (objectif : 20 %, non atteint). Pistes : passer en bio des produits dont le surcoût est faible (pâtes, riz, légumes secs, produits laitiers) ; acheter des produits sous signe officiel ou de saison auprès de producteurs locaux ; financer ce surcoût par la réduction du gaspillage (pesée des restes, portions ajustées) et par des plats à base de légumineuses, moins chers que la viande.

Cuisiner les restes et les parties souvent jetées

Le gaspillage alimentaire ne se joue pas seulement au moment des achats : il se joue aussi en cuisine. Des techniques simples permettent d'utiliser les restes et des parties que l'on jette souvent, à condition de respecter les règles d'hygiène.

Ce que l'on jette souvent · Technique pour l'utiliser · Exemple de recette

Pain rassis — *Technique pour l'utiliser :* Réhydrater dans un liquide, puis cuire ; ou sécher et mixer ; *Exemple de recette :* Pain perdu, chapelure, pudding, croûtons

Fanes de radis, de carottes, feuilles de chou-fleur — *Technique pour l'utiliser :* Laver soigneusement, cuire à l'eau ou mixer cru ; *Exemple de recette :* Soupe de fanes, pesto de fanes

Tiges de brocoli — *Technique pour l'utiliser :* Éplucher la partie dure, tailler en bâtonnets ou en paysanne ; *Exemple de recette :* Poêlée, potage, crudités

Légumes cuits de la veille — *Technique pour l'utiliser :* Mixer ou lier avec un appareil à base d'œufs ; *Exemple de recette :* Velouté, gratin, flan de légumes, quiche

Fruits très mûrs — *Technique pour l'utiliser :* Cuire ou mixer ; *Exemple de recette :* Compote, smoothie, gâteau à la banane

Riz ou pâtes cuits — *Technique pour l'utiliser :* Réchauffer avec un liquide ou une sauce ; *Exemple de recette :* Riz sauté aux légumes, gratin de pâtes

Viande ou poisson cuits — *Technique pour l'utiliser :* Hacher et mélanger avec des légumes ; *Exemple de recette :* Parmentier, farce, rillettes de poisson

Attention – Les restes et l'hygiène

Un reste doit être **refroidi rapidement** (en portions, dans des boîtes peu profondes), placé au réfrigérateur et consommé vite, en général dans les deux jours. On le réchauffe une seule fois, à cœur, jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Le riz cuit est un cas particulier : laissé à température ambiante, il peut permettre le développement de *Bacillus cereus*, dont certaines toxines résistent à la chaleur. Il faut donc le refroidir rapidement et ne pas le laisser traîner sur le plan de travail.

Lien diététique – Un message double

Cuisiner les restes permet d'économiser de l'argent et de réduire l'impact environnemental de l'alimentation. En atelier, on présente ces techniques comme des **astuces de cuisinier**, pas comme une contrainte liée au manque d'argent : le pain perdu ou la soupe de fanes sont des recettes à part entière.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.27

À la fin d'un atelier, il reste 400 g de légumes rôtis, 300 g de riz cuit et une demi-baguette. 1) Proposez une recette pour chaque reste. 2) Rédigez trois consignes d'hygiène à donner aux participants qui veulent emporter les restes chez eux.

Corrigé

1) Légumes rôtis : velouté mixé avec un peu de bouillon, ou flan de légumes avec des œufs et du lait. Riz cuit : riz sauté avec un œuf et des légumes, ou riz au lait. Baguette : pain perdu au lait et à l'œuf pour le goûter, ou croûtons pour une soupe. 2) Mettre les restes dans des boîtes fermées dès la fin de l'atelier et les transporter dans un sac isotherme ; les placer au réfrigérateur dès l'arrivée et les manger dans les deux jours ; les réchauffer une seule fois, jusqu'à ce qu'ils soient bien chauds au cœur.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.3 – Choisir les aliments

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien pèse environ une cuillère à soupe d'huile, et combien d'énergie apporte-t-elle ?

2. Qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé selon la classification NOVA ?

3. Quelle est la différence entre une date limite de consommation et une date de durabilité minimale ?

4. Citez les cinq signes officiels de la qualité et de l'origine.

5. Quel levier pèse le plus sur l'impact environnemental d'un repas ?

6. Quels sont les deux objectifs chiffrés de la loi EGalim pour les produits de qualité ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.3

1. Environ 10 g, soit environ 90 kcal.

2. Un aliment fabriqué industriellement avec des ingrédients et des additifs que l'on n'utilise pas en cuisine à la maison (émulsifiants, arômes, sirop de glucose…).

3. La date limite de consommation (« à consommer jusqu'au ») doit être respectée pour des raisons sanitaires ; après la date de durabilité minimale (« de préférence avant »), le produit reste consommable s'il a été bien conservé.

4. AOP (ou AOC), IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique.

5. Le type d'aliment, en particulier la part de produits animaux (viande de ruminants), plus que le transport.

6. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur d'achat.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 11.3.4.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les tableaux des signes officiels et de la restauration collective.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 11.3.3 et je refais les exercices d'application.

11.3.4 La culture culinaire

Module · Guide 2025 : p. 67 · CNED : pas de passage correspondant (voir 11.2.2)

Le patrimoine gastronomique français

Le **repas gastronomique des Français** a été inscrit en **2010** par l'UNESCO sur la liste représentative du **patrimoine culturel immatériel de l'humanité** : c'est une pratique sociale (célébrer un moment important autour d'un repas) qui associe le choix des produits, l'accord mets-vins, l'ordre des plats (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) et l'art de la table. La France compte aussi de nombreux produits sous **appellation d'origine** (fromages, vins, volailles, fruits) et une grande diversité de **traditions régionales**.

Région (exemples) · Spécialités emblématiques

Alsace — *Spécialités emblématiques :* Choucroute garnie, baeckeoffe, kouglof, tarte flambée

Bretagne — *Spécialités emblématiques :* Crêpes et galettes de sarrasin, cotriade, kouign-amann

Provence — *Spécialités emblématiques :* Ratatouille, bouillabaisse (Marseille), soupe au pistou, tapenade

Sud-Ouest — *Spécialités emblématiques :* Cassoulet, garbure, piperade (Pays basque)

Lyonnais, Bourgogne — *Spécialités emblématiques :* Quenelles, bœuf bourguignon, œufs en meurette

Savoie — *Spécialités emblématiques :* Tartiflette, fondue, gratin savoyard

Lorraine — *Spécialités emblématiques :* Quiche lorraine, potée, madeleines

Nord — *Spécialités emblématiques :* Carbonade flamande, potjevleesch, waterzooi

Antilles, La Réunion — *Spécialités emblématiques :* Colombo, accras, rougail, cari

Le modèle alimentaire français

Au-delà des plats, la culture culinaire française se caractérise par une **façon de manger** : trois repas principaux à heures assez régulières, pris le plus souvent **assis** et **à plusieurs**, avec une structure (entrée, plat, fromage ou dessert) et une attention au **plaisir**. Les sociologues parlent de **modèle alimentaire** : un ensemble de règles partagées sur ce que l'on mange, quand, comment et avec qui.

Caractéristique · Ce qu'on observe en France · Intérêt pour la santé

Rythme — *Ce qu'on observe en France :* Trois repas à des heures assez proches pour une grande partie de la population (forte synchronisation) ; *Intérêt pour la santé :* Limite le grignotage, structure la journée

Durée — *Ce qu'on observe en France :* D'après l'enquête Emploi du temps de l'Insee de 2010, les Français consacrent en moyenne 2 h 22 par jour aux repas (Insee, 2012) ; *Intérêt pour la santé :* Manger lentement favorise le rassasiement

Commensalité — *Ce qu'on observe en France :* Les repas sont souvent pris en famille ou entre collègues ; *Intérêt pour la santé :* Lien social, transmission, plaisir

Structure — *Ce qu'on observe en France :* Entrée, plat, fromage ou dessert ; pain ; *Intérêt pour la santé :* Diversité des aliments au cours du repas

Plaisir — *Ce qu'on observe en France :* Le goût et la convivialité sont des valeurs centrales ; *Intérêt pour la santé :* Le PNNS associe santé et plaisir

Ce modèle **évolue** : repas plus simples en semaine (plat unique), déjeuners pris seul ou rapidement au travail, livraison de repas, alimentation hors domicile. Il varie aussi selon l'âge, le milieu social, la région et l'origine. En atelier, on ne l'impose pas comme une norme : on le présente comme un **repère** qui a des atouts pour la santé, et on s'intéresse aux modèles des participants.

Lien diététique – Les repas et l'isolement

Manger seul est fréquent chez les personnes âgées, les personnes vivant seules et certains travailleurs. Le repas partagé, en atelier ou dans une structure, redonne une dimension sociale au repas : il est souvent associé à une meilleure prise alimentaire chez les personnes âgées. C'est une raison de terminer un atelier par une dégustation **à table**, ensemble (chapitre 10).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.28

Dans un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive), la plupart des résidents disent manger « devant un écran, quand j'ai faim, souvent seul ». Proposez deux actions inspirées du modèle alimentaire français, sans faire la morale, et dites ce qu'elles peuvent apporter.

Corrigé

1) Un **repas partagé mensuel** préparé par les résidents dans la cuisine commune, assis à table, avec un menu choisi ensemble : lien social, plaisir, découverte de recettes simples. 2) Un atelier « **repas complet en 20 minutes** » qui montre comment composer un plat avec un féculent, des légumes et une protéine, à prendre à heure régulière : moins de grignotage, repas plus variés. On présente ces actions comme des propositions conviviales, pas comme des règles, et on respecte les rythmes de travail des résidents (horaires décalés).

Transmettre une recette : de la tradition orale à la fiche recette

Beaucoup de recettes familiales se transmettent **oralement** et **par le geste** : « une poignée de », « jusqu'à ce que ce soit doré », « comme ma mère faisait ». Les recueillir en atelier valorise les participants et enrichit le répertoire du groupe. Pour les partager, il faut ensuite les **standardiser** sans les trahir.

Méthode pas à pas – Recueillir une recette familiale avec un participant

1. Écouter le participant raconter la recette et son histoire (occasion, région, personne qui la préparait), sans interrompre.

2. Observer la réalisation, en notant les gestes, les ustensiles, l'ordre des étapes.

3. Peser discrètement les ingrédients au moment où le participant les utilise (on transforme « une poignée » en grammes).

4. Chronométrer les étapes et noter les signes de cuisson (« quand les oignons sont dorés », « quand la sauce nappe la cuillère »).

5. Faire relire la fiche par le participant, qui valide qu'elle correspond à sa recette.

6. Proposer, si le groupe le souhaite, une variante (moins de sel, plus de légumes), présentée à côté de la recette d'origine et non à sa place.

7. Citer le nom du participant sur la fiche, s'il l'accepte.

Attention – Respecter la propriété d'une recette

Une recette familiale appartient d'abord à celui qui la partage. On lui demande son accord avant de la diffuser, de la photographier ou de la publier dans un livret, et l'on respecte son choix d'être nommé ou non.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.29

Une participante décrit ainsi son colombo de poulet : « Tu fais revenir le poulet, tu mets ta poudre à colombo, un bon morceau d'oignon, de l'ail, tu mouilles à hauteur, tu mets tes légumes, et tu laisses compoter jusqu'à ce que ce soit bon. » Relevez les informations manquantes pour rédiger une fiche recette utilisable par le groupe, et nommez la technique de cuisson.

Corrigé

Informations manquantes : le **nombre de portions** ; les **quantités** de poulet, de poudre à colombo, d'oignon, d'ail, de liquide et de légumes ; la **nature des légumes** (souvent christophine, aubergine, pomme de terre, giraumon) et leur taille ; le **type de matière grasse** et sa quantité ; la **durée** de chaque étape et le signe de fin de cuisson (« jusqu'à ce que ce soit bon ») ; l'**assaisonnement** (sel, piment, citron vert) ; le liquide (eau, bouillon). Technique : **cuisson mixte** (on fait revenir, puis on mijote dans un liquide), comme un ragoût. On observe la réalisation et on pèse avec elle pour compléter la fiche.

Lire les plats du patrimoine avec la table Ciqual

Les plats du patrimoine sont souvent jugés « trop riches ». La table Ciqual permet de nuancer ce jugement, à condition de comparer des portions réalistes. Le tableau donne les apports de 300 g de plats préparés vendus dans le commerce (Ciqual 2025, ANSES, consultée en octobre 2026). Une version faite maison peut être très différente.

Plat (Ciqual 2025), pour 300 g · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Part des 5 g de sel

Pot-au-feu, préemballé (25013) — *Énergie (kcal) :* 233 ; *Protéines (g) :* 32,7 ; *Lipides (g) :* 6,1 ; *Fibres (g) :* 4,5 ; *Sel (g) :* 1,0 ; *Part des 5 g de sel :* 19 %

Bœuf bourguignon, préemballé (25033) — *Énergie (kcal) :* 253 ; *Protéines (g) :* 30,9 ; *Lipides (g) :* 7,8 ; *Fibres (g) :* 4,5 ; *Sel (g) :* 2,6 ; *Part des 5 g de sel :* 53 %

Blanquette de veau, préemballée (25001) — *Énergie (kcal) :* 339 ; *Protéines (g) :* 46,2 ; *Lipides (g) :* 12,0 ; *Fibres (g) :* 2,4 ; *Sel (g) :* 2,2 ; *Part des 5 g de sel :* 44 %

Choucroute garnie, préemballée (25003) — *Énergie (kcal) :* 327 ; *Protéines (g) :* 15,2 ; *Lipides (g) :* 24,2 ; *Fibres (g) :* 8,1 ; *Sel (g) :* 4,2 ; *Part des 5 g de sel :* 83 %

Cassoulet, appertisé (25002) — *Énergie (kcal) :* 387 ; *Protéines (g) :* 24,2 ; *Lipides (g) :* 17,3 ; *Fibres (g) :* 10,6 ; *Sel (g) :* 2,9 ; *Part des 5 g de sel :* 58 %

Couscous au mouton (25029) — *Énergie (kcal) :* 447 ; *Protéines (g) :* 24,9 ; *Lipides (g) :* 21,6 ; *Fibres (g) :* 3,9 ; *Sel (g) :* 2,4 ; *Part des 5 g de sel :* 49 %

Couscous de légumes, préemballé (25150) — *Énergie (kcal) :* 324 ; *Protéines (g) :* 13,0 ; *Lipides (g) :* 6,8 ; *Fibres (g) :* 6,7 ; *Sel (g) :* 2,2 ; *Part des 5 g de sel :* 44 %

Ratatouille cuisinée, préemballée (25018) — *Énergie (kcal) :* 171 ; *Protéines (g) :* 3,7 ; *Lipides (g) :* 9,4 ; *Fibres (g) :* 6,1 ; *Sel (g) :* 2,8 ; *Part des 5 g de sel :* 56 %

Plusieurs leçons se dégagent. D'abord, les plats mijotés à l'eau comme le **pot-au-feu** sont peu gras et très riches en protéines : la cuisson par expansion et le dégraissage du bouillon y contribuent. Ensuite, le **cassoulet** apporte beaucoup de fibres grâce aux haricots blancs. Enfin, le point faible commun est souvent le **sel** : une portion de choucroute garnie apporte à elle seule plus de 80 % du repère de moins de 5 g de sel par jour (OMS). Même la ratatouille, plat de légumes, est assez salée dans sa version du commerce.

Lien diététique – Valoriser un plat plutôt que l'interdire

Face à un plat du patrimoine, le diététicien ne l'interdit pas. Il propose des **leviers techniques** : dégraisser un bouillon refroidi, augmenter la part de légumes, choisir des saucisses moins grasses, rincer la choucroute crue avant cuisson, saler en fin de cuisson et goûter avant de rajouter du sel. Il propose aussi des **leviers de fréquence et d'accompagnement** : un plat riche à midi, un dîner plus léger avec des légumes et un fruit.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.30

Un résident d'un foyer logement demande une choucroute garnie une fois par semaine. 1) Calculez la part du repère de 5 g de sel apportée par une portion de 350 g de la choucroute préemballée (1,39 g de sel pour 100 g). 2) Proposez trois gestes culinaires pour réduire le sel d'une choucroute faite maison. 3) Proposez une réponse au résident qui respecte son envie.

Corrigé

1) 350 × 1,39 ÷ 100 = 4,87 g de sel, soit 97 % du repère de 5 g par jour. 2) Rincer la choucroute crue à l'eau froide et l'égoutter ; cuire les pommes de terre à part, sans sel ; choisir une ou deux charcuteries au lieu de quatre et ajouter une viande non salée (rôti de porc) ; parfumer avec des baies de genièvre, du laurier et de l'oignon. 3) « Vous pouvez garder votre choucroute. Nous allons la préparer un peu moins salée, avec moins de charcuterie, et le dîner de ce jour-là sera

léger et sans fromage. » On respecte le plaisir et l'histoire du résident ; on agit sur la recette et sur le reste de la journée.

Les cuisines du monde

Plusieurs traditions culinaires sont reconnues par l'UNESCO : la **diète méditerranéenne** (inscrite en 2010, élargie en 2013), la **cuisine traditionnelle mexicaine** (2010), le **washoku** japonais (2013), la préparation du **kimchi** (kimjang, Corée, 2013), les savoirs et pratiques liés à la production et à la consommation du **couscous** (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, 2020). En atelier, ces cuisines sont des ressources : nombre d'entre elles reposent sur les **céréales**, les **légumineuses** et les **légumes**, avec des épices qui relèvent le goût sans excès de sel.

Lien diététique – La culture culinaire comme levier d'éducation pour la santé

Proposer aux participants de faire découvrir **leurs** recettes (échange de savoirs, chapitre 10) valorise les identités, crée du lien et permet des **adaptations** discutées ensemble (un peu moins de sel ou d'huile, plus de légumes) plutôt que l'imposition d'un modèle unique. Le diététicien veille à ne pas hiérarchiser les cuisines et à reconnaître la diversité des modèles alimentaires (chapitre 4).

Des cuisines du monde, des bases communes

Les cuisines du monde sont très diverses, mais beaucoup reposent sur une même architecture : une **base de céréales ou de tubercules**, souvent des **légumineuses**, des **légumes**, une petite quantité de produits animaux, et des **épices** ou des aromates qui donnent l'identité du plat. Le tableau donne des exemples ; chaque région a de nombreuses variantes.

Aire culinaire (exemples) · Bases · Techniques fréquentes · Aromates et épices · Plats connus

Maghreb — *Bases :* Semoule, pois chiches, lentilles, légumes ; *Techniques fréquentes :* Cuisson à la vapeur (couscoussier), tajine (mijoté à l'étouffée) ; *Aromates et épices :* Cumin, coriandre, cannelle, ras el hanout, citron confit ; *Plats connus :* Couscous, harira, tajines

Afrique de l'Ouest — *Bases :* Riz, mil, manioc, igname, arachide ; *Techniques fréquentes :* Mijotés, sauces ; *Aromates et épices :* Piment, gingembre, oignon, poisson séché ; *Plats connus :* Mafé, yassa, thiéboudienne

Antilles et La Réunion — *Bases :* Riz, légumes pays, haricots rouges, tubercules ; *Techniques fréquentes :* Mijotés, cari, colombo ; *Aromates et épices :* Colombo, piment, citron vert, cives, curcuma ; *Plats connus :* Colombo, cari, rougail

Inde — *Bases :* Riz, galettes de blé, lentilles (dahl), légumes ; *Techniques fréquentes :* Cuissons mijotées, tempérage des épices dans la matière grasse ; *Aromates et épices :* Curcuma, cumin, coriandre, gingembre, cardamome ; *Plats connus :* Dahl, currys, biryani

Asie de l'Est — *Bases :* Riz, nouilles, soja (tofu), légumes ; *Techniques fréquentes :* Wok (sauté rapide), vapeur ; *Aromates et épices :* Sauce soja, gingembre, ail, sésame ; *Plats connus :* Riz sauté, soupes de nouilles, raviolis

Amérique latine — *Bases :* Maïs, haricots, riz, pommes de terre ; *Techniques fréquentes :* Mijotés, galettes ; *Aromates et épices :* Piment, coriandre, citron vert ; *Plats connus :* Chili, feijoada, tortillas

Méditerranée du Nord — *Bases :* Pain, pâtes, légumes, huile d'olive, légumineuses ; *Techniques fréquentes :* Rôtis, mijotés, crus ; *Aromates et épices :* Ail, herbes, citron ; *Plats connus :* Soupe au pistou, ratatouille, minestrone

Lien diététique – Les épices et le sel

Les épices et les aromates permettent de donner du goût avec **moins de sel**, de sucre et de matières grasses. Certains mélanges vendus tout prêts contiennent toutefois du sel (bouillons cubes, certains mélanges d'épices) : on lit la liste des ingrédients. En atelier, on fait sentir et goûter les épices une à une, ce qui sert aussi l'éducation sensorielle (11.3.5).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.31

Pour un atelier « Le tour du monde des légumes secs », choisissez trois plats de trois aires culinaires différentes du tableau. Pour chacun, indiquez la légumineuse, la céréale ou le tubercule qui l'accompagne, la technique et les épices.

Corrigé

Exemples : **harira** (Maghreb) : pois chiches et lentilles, avec des vermicelles ou du riz, cuisson mijotée en soupe, cumin, coriandre, cannelle, gingembre ; **dahl** (Inde) : lentilles corail avec du riz, mijoté et tempérage des épices dans un peu d'huile, curcuma, cumin, gingembre ; **feijoada sans viande** (Brésil) : haricots noirs avec du riz, mijotée, ail, oignon, laurier, piment doux ; ou **chili sin carne** (Amérique latine) : haricots rouges et maïs avec du riz, mijoté, cumin, paprika, piment. Chaque plat associe une légumineuse et une céréale, ce qui complète les protéines.

Cuisine, convictions et pratiques religieuses

Les pratiques alimentaires liées aux convictions sont nombreuses et vécues de façon très différente d'une personne à l'autre. Le diététicien ne suppose rien à partir d'un nom ou d'une origine : il **demande**, de façon ouverte et confidentielle, et il adapte l'atelier pour que chacun puisse goûter.

Pratique (exemples) · Ce qui peut être concerné · Adaptation en atelier

Alimentation halal (islam) — *Ce qui peut être concerné :* Pas de porc ni d'alcool ; viande abattue selon un rite ; *Adaptation en atelier :* Recettes sans porc ni alcool ; viande halal ou plat végétarien

Alimentation casher (judaïsme) — *Ce qui peut être concerné :* Pas de porc ni de fruits de mer ; séparation de la viande et du lait ; viande abattue selon un rite ; *Adaptation en atelier :* Plats végétariens ou à base de poisson à écailles ; pas de mélange viande et lait

Végétarisme (convictions éthiques, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme…) — *Ce qui peut être concerné :* Pas de viande ni de poisson ; parfois pas d'œuf ; parfois pas d'ail ni d'oignon ; *Adaptation en atelier :* Version végétarienne prévue ; demander les limites de chacun

Végétalisme — *Ce qui peut être concerné :* Aucun produit animal (ni œuf, ni lait, ni miel) ; *Adaptation en atelier :* Légumineuses, céréales, oléagineux ; vigilance sur la vitamine B12, à orienter vers un professionnel

Jeûnes (ramadan, carême, Yom Kippour…) — *Ce qui peut être concerné :* Jeûne sur une période ou certains jours ; *Adaptation en atelier :* Adapter les horaires, proposer des plats à emporter

La posture interculturelle

La travailleuse sociale et formatrice **Margalit Cohen-Émerique** a décrit une **approche interculturelle** en trois temps (*Pour une approche interculturelle en travail social*, Presses de l'EHESP, 2011), utile en atelier.

1. **La décentration** : prendre conscience de ses propres normes (« pour moi, un repas, c'est… ») pour ne pas les imposer.
2. **La découverte du cadre de référence de l'autre** : s'intéresser à ce que la pratique signifie pour la personne, sans la réduire à un cliché.
3. **La négociation** : trouver ensemble une solution acceptable pour chacun (une recette commune, une variante, un horaire).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.32

Lors de l'inscription à un cycle d'ateliers, une collègue propose d'ajouter une case « religion » au formulaire « pour savoir quoi cuisiner ». Expliquez pourquoi ce n'est pas une bonne idée, et proposez une autre formulation.

Corrigé

Une case « religion » est **intrusive**, elle n'est pas nécessaire (on n'a pas besoin de connaître la religion pour cuisiner) et elle peut **enfermer** les personnes dans une identité supposée : deux personnes de même religion n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Elle recueille en outre une donnée sensible au sens du règlement général sur la protection des données. Formulation : « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas (par choix, conviction ou santé) ? Avez-vous une allergie ou une intolérance ? » La question est ouverte, facultative pour les préférences, et elle suffit pour adapter les recettes.

Une recette du monde faite maison : l'exemple du houmous

Le houmous, purée de pois chiches et de crème de sésame (tahin), est un plat du Proche-Orient devenu courant en France. Il se prête bien à un atelier : il demande peu de matériel, ne se cuit pas si l'on utilise des pois chiches déjà cuits, et permet de comparer une version maison avec un produit du commerce.

Exemple – Calcul détaillé : houmous maison ou houmous du commerce

Recette maison : 400 g de pois chiches cuits égouttés, 60 g de tahin, 30 g d'huile d'olive, 40 g de jus de citron, 10 g d'ail, 3 g de sel et 40 g d'eau, soit 583 g de houmous. On calcule les apports de chaque ingrédient avec Ciqual 2025 (pois chiche bouilli 20507, tahin 15203, huile d'olive vierge extra 17270, jus de citron fait maison 2007, ail cru 11000, sel iodé 11058), on les additionne, puis on ramène à 100 g en divisant par 5,83.

Pour 100 g · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Houmous maison (calculé) — *Énergie (kcal) :* 217 ; *Protéines (g) :* 7,7 ; *Lipides (g) :* 12,7 ; *Fibres (g) :* 6,5 ; *Sel (g) :* 0,54

Houmous préemballé, Ciqual 25621 — *Énergie (kcal) :* 258 ; *Protéines (g) :* 8,1 ; *Lipides (g) :* 19,9 ; *Fibres (g) :* 5,2 ; *Sel (g) :* 1,08

La version maison contient environ 36 % de lipides en moins et deux fois moins de sel. Ces chiffres dépendent de la recette : avec 60 g d'huile au lieu de 30 g, l'écart de lipides diminuerait fortement. Le calcul montre donc surtout qu'en cuisinant soi-même, **on choisit** la quantité d'huile et de sel.

Attention – Le sésame est un allergène

Le sésame fait partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire (règlement INCO n° 1169/2011). En atelier, on l'annonce avant la dégustation et l'on propose une version sans tahin (pois chiches, huile, citron, cumin) si un participant est allergique.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.33

1) Expliquez pourquoi l'eau ajoutée au houmous ne change pas l'apport en lipides de la recette entière, mais change l'apport pour 100 g. 2) Un participant veut réduire encore les lipides. Proposez deux modifications et dites ce qu'elles changent pour le goût et la texture.

Corrigé

1) L'eau n'apporte ni énergie ni lipides : la quantité totale de lipides de la recette reste la même. En revanche, elle augmente la masse totale, donc elle dilue les nutriments : l'apport pour 100 g diminue. Sans les 40 g d'eau, la recette pèserait 543 g et contiendrait environ 13,6 g de lipides pour 100 g. 2) Remplacer une partie de l'huile par l'eau de cuisson des pois chiches : le houmous reste onctueux mais il est moins parfumé. Réduire le tahin de moitié : le goût de sésame et la texture crémeuse diminuent ; on peut compenser par du cumin et du citron. On garde une petite quantité d'huile d'olive en filet au moment de servir, pour l'arôme.

Le calendrier des fêtes : une ressource pour l'atelier

Les fêtes rythment l'année et donnent aux ateliers des thèmes motivants. Elles permettent aussi de reconnaître la diversité culturelle d'un groupe. Le tableau donne quelques repères ; les dates des fêtes religieuses qui suivent un

calendrier lunaire changent chaque année et doivent être vérifiées.

Période · Fête · Plats ou aliments souvent associés · Idée d'atelier

Janvier — *Fête :* Épiphanie ; *Plats ou aliments souvent associés :* Galette des rois (frangipane), gâteau des rois en brioche dans le Sud ; *Idée d'atelier :* Comparer les deux versions et leur coût

Janvier ou février — *Fête :* Nouvel An lunaire ; *Plats ou aliments souvent associés :* Raviolis, nouilles longues, agrumes ; *Idée d'atelier :* Façonner des raviolis aux légumes

2 février — *Fête :* Chandeleur ; *Plats ou aliments souvent associés :* Crêpes ; *Idée d'atelier :* Une pâte à crêpes avec moitié farine complète

Mois lunaire, date variable — *Fête :* Ramadan, puis Aïd el-Fitr ; *Plats ou aliments souvent associés :* Dattes, soupes (chorba, harira), pâtisseries ; *Idée d'atelier :* Un repas de rupture du jeûne équilibré, sans excès de friture

Mars ou avril — *Fête :* Pâques ; *Plats ou aliments souvent associés :* Agneau, œufs, chocolat ; *Idée d'atelier :* Des œufs colorés avec des colorants végétaux (oignon, betterave)

Date variable — *Fête :* Aïd el-Kébir ; *Plats ou aliments souvent associés :* Viande d'agneau ou de mouton ; *Idée d'atelier :* Les morceaux et leurs modes de cuisson

Octobre ou novembre — *Fête :* Diwali ; *Plats ou aliments souvent associés :* Douceurs à base de lait et de sucre, beignets ; *Idée d'atelier :* Des douceurs moins sucrées, servies en petites portions

Décembre — *Fête :* Hanoukka ; *Plats ou aliments souvent associés :* Beignets et galettes de pommes de terre frits dans l'huile ; *Idée d'atelier :* Une version au four comparée à la version frite

Décembre — *Fête :* Noël ; *Plats ou aliments souvent associés :* Volaille, bûche, chocolat ; *Idée d'atelier :* Un menu de fête accessible pour un petit budget

Attention – Une fête n'appartient pas à un groupe supposé

On ne suppose pas qu'une personne fête Diwali ou Hanoukka en fonction de son nom ou de son origine. On demande au groupe quelles fêtes comptent pour chacun et comment elles se célèbrent dans sa famille. Les participants deviennent alors les experts de leur propre culture.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.34

Un centre social veut organiser en mars un atelier qui coïncide avec la fin du Ramadan pour certaines familles et avec Pâques pour d'autres. 1) Proposez un thème qui rassemble les deux groupes sans mélanger les rituels. 2) Citez deux précautions d'organisation.

Corrigé

1) Thème « Les douceurs de fête au printemps » : chaque famille apporte une recette de fête (pâtisserie aux dattes, brioche de Pâques, gâteau aux amandes) ; le groupe les compare, les goûte et cherche ensemble comment réduire un peu le sucre ou la friture sans dénaturer la recette. 2) Choisir un horaire compatible avec le jeûne pour les personnes qui jeûnent (par exemple réaliser l'atelier l'après-midi et emporter les préparations à la maison) ; vérifier les ingrédients (gélatine de porc, alcool) pour que chacun puisse goûter.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.4 – La culture culinaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. En quelle année le repas gastronomique des Français a-t-il été inscrit par l'UNESCO, et qu'est-ce qui est inscrit ?

2. Citez trois caractéristiques du modèle alimentaire français.

3. Citez deux étapes pour transformer une recette orale en fiche recette.

4. Quelle architecture commune retrouve-t-on dans beaucoup de cuisines du monde ?

5. Quels sont les trois temps de l'approche interculturelle de Margalit Cohen-Émerique ?

6. Comment demander les pratiques alimentaires d'un participant sans le mettre dans une case ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.4

1. En 2010 ; c'est une pratique sociale (célébrer un moment important autour d'un repas), pas une liste de plats.

2. Trois repas à heures régulières, pris assis et à plusieurs, avec une structure (entrée, plat, fromage ou dessert) et une place centrale du plaisir.

3. Peser les ingrédients pendant la réalisation, chronométrer et noter les signes de cuisson, faire relire la fiche par le participant.

4. Une base de céréales ou de tubercules, des légumineuses, des légumes, peu de produits animaux et des épices ou aromates.

5. La décentration, la découverte du cadre de référence de l'autre, la négociation.

6. Par une question ouverte et confidentielle (« Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? »), sans demander la religion.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la partie 11.3.5.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les tableaux des cuisines du monde et des pratiques alimentaires.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 11.3.4 et je refais les exercices d'application.

11.3.5 Les techniques de dégustation

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 4 à 7) ; ATA 9623 M1 S6 (p. 3 à 7)

Les sens mobilisés




Figure 11.4 – Les sens mobilisés lors d'une dégustation

Comprendre le schéma – Figure 11.4

1. Vue : couleur, forme, brillance, homogénéité ; elle crée des **attentes** (une purée verte « devrait » avoir un goût de légume vert).

2. Odorat : les **odeurs** perçues par le nez (voie directe ou orthonasale) et les **arômes** perçus en bouche par la voie **rétronasale** ; une grande partie de ce que l'on appelle « goût » est en réalité olfactive (on le constate en se bouchant le nez).

3. Goût (gustation) : les **saveurs** perçues par la langue : **sucré, salé, acide, amer** et **umami** (saveur décrite par Kikunae Ikeda en 1908, associée au glutamate).

4. Toucher en bouche (somesthésie) : texture (croquant, fondant, onctueux), température, sensations **trigéminales** (piquant du piment, fraîcheur de la menthe, pétillant), astringence (thé, vin rouge).

5. Ouïe : les bruits de mastication (croquant d'une carotte, craquant d'une biscotte) participent à l'appréciation de la fraîcheur.

6. La **flaveur** désigne l'ensemble des sensations olfactives, gustatives et trigéminales perçues en bouche.

Attention – La « carte de la langue » est une idée fausse

Le schéma qui attribue une saveur à chaque zone de la langue (sucré à la pointe, amer au fond) ne correspond pas aux connaissances actuelles : toutes les saveurs peuvent être perçues sur l'ensemble des zones qui portent des bourgeons gustatifs, avec des sensibilités qui varient peu. Ne pas l'utiliser dans les supports d'atelier.

Comment nous percevons : un peu de physiologie

La dégustation mobilise des récepteurs différents, dont les informations sont rassemblées par le cerveau en une perception unique, la **flaveur**. Connaître ces récepteurs aide à comprendre pourquoi un rhume « enlève le goût » ou pourquoi une personne âgée trouve les plats fades.

Sens · Récepteurs · Où ? · Ce qu'ils perçoivent

Goût (gustation) — *Récepteurs :* Cellules gustatives regroupées en **bourgeons du goût**, surtout dans les papilles de la langue, mais aussi sur le palais et dans la gorge ; *Où ? :* Bouche ; *Ce qu'ils perçoivent :* Les cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, umami ; d'autres pistes sont étudiées (gras)

Odorat (olfaction) — *Récepteurs :* **Neurones olfactifs** de l'épithélium olfactif, en haut des fosses nasales ; plusieurs centaines de types de récepteurs ; *Où ? :* Nez ; *Ce qu'ils perçoivent :* Les odeurs (voie orthonasale, en flairant) et les arômes (voie rétronasale, en mâchant et en avalant)

Sensibilité trigéminale — *Récepteurs :* Terminaisons du **nerf trijumeau** ; *Où ? :* Bouche, nez, yeux ; *Ce qu'ils perçoivent :* Piquant (piment, moutarde), fraîcheur (menthe), pétillant, brûlant

Toucher en bouche — *Récepteurs :* Récepteurs de la pression et de la température ; *Où ? :* Langue, palais, dents ; *Ce qu'ils perçoivent :* Texture, consistance, température, astringence

Vue — *Récepteurs :* Rétine ; *Où ? :* Yeux ; *Ce qu'ils perçoivent :* Couleur, forme, brillance

Ouïe — *Récepteurs :* Oreille interne, par l'air et par les os de la mâchoire ; *Où ? :* Oreilles ; *Ce qu'ils perçoivent :* Croquant, craquant, pétillant

Ce qui modifie la perception

- **L'âge** : la sensibilité olfactive diminue souvent avec l'âge, plus que le goût ; les plats paraissent fades, ce qui peut réduire l'appétit.
- **Un rhume** bloque la voie rétronasale : on ne perçoit plus les arômes.
- **Certains médicaments et traitements** (chimiothérapie, radiothérapie de la tête et du cou,

certains antibiotiques) peuvent modifier le goût (goût métallique, aliments « sans goût ») ou l'odorat.

- **Le tabac** diminue la sensibilité olfactive et gustative.
- **La génétique** : la sensibilité à certaines amertumes (comme celle du PROP) varie d'une personne à l'autre, ce qui explique en partie le rejet de certains légumes (choux, endives).
- **La faim et la satiété** : un aliment paraît moins agréable quand on en a beaucoup mangé (rassasiement sensoriel spécifique), ce qui favorise la variété au cours du repas.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.35

Dans une résidence pour personnes âgées, plusieurs résidents salent beaucoup leurs plats « parce que tout est fade ». À partir de la physiologie de la perception, expliquez ce phénomène, puis proposez trois gestes culinaires qui relèvent le goût sans ajouter de sel.

Corrigé

Avec l'âge, la sensibilité olfactive diminue souvent : les arômes, perçus par la voie rétronasale, sont moins bien perçus, et les plats paraissent fades ; la sensibilité au salé peut aussi baisser, et certains médicaments modifient le goût. Les résidents compensent avec le seul goût qu'ils perçoivent bien, le salé. Gestes : utiliser des **herbes fraîches**, des **épices** et des aromates (ail, oignon, échalote) ; ajouter une note **acide** (jus de citron, vinaigre) qui réveille les saveurs ; faire **dorer** les aliments (réactions de Maillard) pour plus d'arômes ; soigner la **couleur** et la **présentation**, et varier les **textures** et les **températures**.

Ce que l'on voit, entend et croit change ce que l'on goûte

La perception d'un aliment ne dépend pas seulement de l'aliment : elle dépend aussi du contexte. Plusieurs expériences classiques en psychologie de l'alimentation le montrent, et c'est pourquoi les épreuves sensorielles cherchent à contrôler ce contexte.

Facteur · Effet observé · Conséquence pour une dégustation

La couleur — *Effet observé :* Une boisson colorée en rouge paraît plus fruitée ou plus sucrée ; un vin blanc coloré en rouge a été décrit avec le vocabulaire du vin rouge par des étudiants en œnologie (Morrot, Brochet et Dubourdieu, 2001) ; *Conséquence pour une dégustation :* Présenter les échantillons de même couleur, ou sous un éclairage qui masque la couleur si elle n'est pas étudiée

Le nom et l'étiquette — *Effet observé :* Un produit présenté comme « allégé » ou « végétarien » est souvent moins bien noté que le même produit sans étiquette ; *Conséquence pour une dégustation :* Coder les échantillons par trois chiffres au hasard

L'ordre — *Effet observé :* Le premier échantillon est souvent jugé différemment ; *Conséquence pour une dégustation :* Faire varier l'ordre de présentation entre les dégustateurs

Le groupe — *Effet observé :* Les avis des autres influencent le sien ; *Conséquence pour une dégustation :* Réponses individuelles et silencieuses

L'environnement — *Effet observé :* Bruit, odeurs, inconfort modifient l'attention ; *Conséquence pour une dégustation :* Lieu calme, aéré, sans odeurs

Les attentes — *Effet observé :* On perçoit ce que l'on s'attend à percevoir ; *Conséquence pour une dégustation :* Consignes neutres, sans annoncer le résultat attendu

Lien diététique – Utiliser ces effets en éducation pour la santé

Ces effets ne sont pas seulement des biais à éviter : on peut aussi les utiliser pour **donner envie**. Un plat coloré, bien présenté, avec un nom attractif (« purée arc-en-ciel » plutôt que « purée de légumes ») est plus volontiers goûté par les enfants. Une table dressée et un repas pris ensemble rendent le moment plus agréable.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.36

Un collège veut savoir si sa nouvelle recette de « nuggets de poisson » est aussi appréciée que l'ancienne. Le chef propose de présenter les deux plats côte à côte, avec deux étiquettes : « ancienne recette » et « nouvelle recette maison ». Expliquez le biais et proposez la présentation correcte.

Corrigé

Les étiquettes créent des **attentes** : « maison » peut être jugé meilleur, ou au contraire « nouveau » peut inquiéter certains élèves ; la note reflète alors l'étiquette et non le goût. Présentation correcte : deux échantillons de même taille, à la même température, dans des contenants identiques, codés par trois chiffres au hasard (par exemple 418 et 273), présentés dans un ordre qui change d'un élève à l'autre ; chaque élève note seul sur une échelle de smileys. On révèle les codes après la dégustation.

Les épreuves d'analyse sensorielle

L'**analyse sensorielle** est l'examen des propriétés organoleptiques d'un produit par les organes des sens, selon des méthodes normalisées (normes ISO et AFNOR : vocabulaire ISO 5492, conception des locaux ISO 8589, essai triangulaire ISO 4120…). Elle est utilisée en industrie, en restauration collective (tests de nouvelles recettes) et en recherche.




Figure 11.5 – Les trois familles d'épreuves d'analyse sensorielle

Comprendre le schéma – Figure 11.5

1. Épreuves discriminatives : répondre à la question « y a-t-il une différence perceptible ? » ; exemple : l'**essai triangulaire** (trois échantillons, dont deux identiques : trouver l'intrus), le **duo-trio**, la **comparaison par paires** (lequel est le plus salé ?).

2. Épreuves descriptives : décrire et mesurer l'**intensité** des caractéristiques (profil sensoriel : sucré 6/10, croquant 8/10) ; elles nécessitent un **jury entraîné** et un vocabulaire partagé.

3. Épreuves hédoniques : mesurer l'**appréciation** ou la **préférence** des consommateurs (échelle hédonique, souvent à 9 points dans sa version classique ; échelles à smileys pour les enfants).

4. Le choix de l'épreuve dépend de la question : savoir si une réduction de sel est perçue (discriminative), décrire une nouvelle recette (descriptive), savoir si elle plaît (hédonique).

Méthode pas à pas – Conduire une dégustation dans de bonnes conditions

1. Lieu calme, aéré, sans odeurs parasites, éclairage homogène ; idéalement des postes séparés pour les épreuves individuelles.

2. Dégustateurs : ni à jeun ni juste après un repas, pas de tabac, café ou parfum juste avant ; informés des allergènes.

3. Échantillons : même quantité, même température, même présentation, **codés par 3 chiffres** au hasard (pour ne pas induire de jugement), servis dans un **ordre** qui varie d'un dégustateur à l'autre.

4. Rinçage de la bouche entre deux échantillons (eau, pain neutre ou pomme).

5. Fiche de dégustation claire ; consignes données avant ; pas de discussion pendant l'épreuve individuelle.

6. Analyse des réponses (calculs simples), puis **échanges** et restitution.

Exemple – Calcul détaillé : un essai triangulaire pour une soupe moins salée

Une cuisine centrale veut savoir si une réduction de 25 % du sel d'une soupe est perçue. 12 dégustateurs reçoivent chacun trois échantillons codés (deux identiques, un différent) et doivent désigner l'échantillon différent. **7** dégustateurs donnent la bonne réponse.

- Si aucune différence n'était perçue, chacun aurait **1 chance sur 3** de trouver l'intrus au hasard ; on attendrait 12 × 1/3 = **4** bonnes réponses.
- La table de l'essai triangulaire (norme ISO 4120) indique qu'avec 12 dégustateurs, il faut au moins **8** bonnes réponses pour conclure à une différence significative au risque de 5 %.
- 7 < 8 : la différence **n'est pas démontrée** (la probabilité d'obtenir 7 bonnes réponses ou plus au hasard est d'environ 6,6 %, supérieure à 5 %).

Conclusion : la réduction de sel de 25 % n'a pas été perçue de façon significative par ce panel : elle peut être adoptée, en vérifiant ensuite l'appréciation par une épreuve hédonique auprès des convives.

Exemple – Calcul détaillé : une épreuve hédonique en atelier

10 participants notent deux versions d'une compote sur une échelle de 1 (je n'aime pas du tout) à 9 (j'aime énormément). Version A (sans sucre ajouté, cannelle) : 7, 8, 6, 9, 7, 8, 5, 7, 8, 6. Version B (sans sucre ajouté, nature) : 5, 6, 4, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 6 (données fictives).

- Moyenne A : 71 / 10 = **7,1** ; moyenne B : 54 / 10 = **5,4** ; écart : **1,7 point**.
- Médiane A : valeurs classées 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9 → (7 + 7) / 2 = **7** ; médiane B : 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7 → (5 +

6. / 2 = **5,5**.

- Part des notes ≥ 7 (« j'aime ») : A : 8 / 10 = **80 %** ; B : 1 / 10 = **10 %**.

Lecture : la cannelle rend la compote sans sucre ajouté beaucoup plus appréciée : un argument concret pour

réduire le sucre en jouant sur les arômes.

Les épreuves discriminatives en détail

Les épreuves **discriminatives** répondent à la question « Les dégustateurs perçoivent-ils une différence ? ». Elles reposent toutes sur le même raisonnement : on compare le nombre de bonnes réponses obtenu à ce que donnerait le **hasard**, avec la **loi binomiale**. Si le résultat a moins de 5 chances sur 100 d'être dû au hasard, on conclut à une différence perçue (risque de 5 %).

Épreuve · Déroulement · Chance de réussir au hasard · Usage

Essai triangulaire (norme ISO 4120) — *Déroulement :* Trois échantillons codés, dont deux identiques : trouver l'intrus ; *Chance de réussir au hasard :* 1 sur 3 ; *Usage :* Savoir si une modification (sel, sucre, fournisseur) est perçue

Duo-trio (norme ISO 10399) — *Déroulement :* Un échantillon de référence, puis deux échantillons codés : trouver celui qui est identique à la référence ; *Chance de réussir au hasard :* 1 sur 2 ; *Usage :* Plus simple que le triangulaire, utile avec des publics peu entraînés

Comparaison par paires orientée — *Déroulement :* Deux échantillons : lequel est le plus salé (sucré, croquant) ? ; *Chance de réussir au hasard :* 1 sur 2 ; *Usage :* Comparer l'intensité d'une caractéristique

Comparaison par paires de préférence — *Déroulement :* Deux échantillons : lequel préférez-vous ? ; *Chance de réussir au hasard :* 1 sur 2, test bilatéral ; *Usage :* Préférence (c'est en fait une épreuve hédonique)

Le tableau suivant donne le nombre minimal de bonnes réponses pour conclure au risque de 5 %, calculé avec la loi binomiale.

Nombre de dégustateurs · 12 · 15 · 18 · 20 · 24 · 30

Essai triangulaire — *12 :* 8 ; *15 :* 9 ; *18 :* 10 ; *20 :* 11 ; *24 :* 13 ; *30 :* 15

Duo-trio ou paires orientée — *12 :* 10 ; *15 :* 12 ; *18 :* 13 ; *20 :* 15 ; *24 :* 17 ; *30 :* 20

Paires de préférence (bilatéral) — *12 :* 10 ; *15 :* 12 ; *18 :* 14 ; *20 :* 15 ; *24 :* 18 ; *30 :* 21

Exemple – Calcul détaillé : un duo-trio pour un nouveau fournisseur de compote

Une cuisine centrale change de fournisseur de compote. 20 agents goûtent d'abord la compote habituelle (référence), puis deux échantillons codés, dont l'un est la compote habituelle et l'autre la nouvelle. 14 agents retrouvent la compote habituelle.

- Au hasard, on attendrait 20 × 1/2 = **10** bonnes réponses.
- Seuil du tableau pour 20 dégustateurs : **15**. 14 < 15 : la différence **n'est pas démontrée**.
- La probabilité d'obtenir 14 bonnes réponses ou plus par hasard est de **5,8 %**, juste au-dessus de 5 %.

Lecture : le panel ne perçoit pas de différence de façon significative, mais le résultat est proche du seuil. On peut refaire l'essai avec plus de dégustateurs avant de conclure, et faire en parallèle une épreuve hédonique auprès des convives.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.37

Un essai triangulaire sur une baguette contenant 20 % de sel en moins est réalisé avec 15 dégustateurs ; 8 trouvent l'intrus. Calculez le nombre de bonnes réponses attendu au hasard et concluez avec le tableau. La probabilité d'obtenir au moins 8 bonnes réponses sur 15 au hasard est de 8,8 % : expliquez le lien avec votre conclusion.

Corrigé

Au hasard : 15 × 1/3 = **5** bonnes réponses. Seuil pour 15 dégustateurs : **9**. 8 < 9 : la différence **n'est pas démontrée** au risque de 5 %. La probabilité de 8,8 % est supérieure à 5 % : le résultat peut s'expliquer par le hasard, d'où la conclusion. On peut adopter la baguette moins salée et vérifier ensuite l'appréciation des consommateurs.

Les épreuves hédoniques en détail

Les épreuves **hédoniques** mesurent ce que les consommateurs **aiment** ou **préfèrent**. Elles s'adressent à des personnes non entraînées, représentatives du public visé (les enfants pour un menu scolaire, les résidents pour un menu d'établissement), et en nombre suffisant.

Outil · Description · Public · Exploitation

Échelle hédonique à 9 points — *Description :* De 1 « je n'aime pas du tout » à 9 « j'aime énormément », avec un point neutre (5) ; *Public :* Adolescents, adultes ; *Exploitation :* Moyenne, médiane, part des notes de 7 ou plus

Échelle de smileys — *Description :* 3 à 5 visages, du très triste au très content ; *Public :* Jeunes enfants, personnes qui lisent peu ; *Exploitation :* Répartition des réponses, part des deux visages les plus contents

Préférence par paires — *Description :* « Lequel préférez-vous ? » ; *Public :* Tous publics ; *Exploitation :* Nombre de préférences, comparé au seuil bilatéral

Classement — *Description :* Ranger plusieurs produits du préféré au moins aimé ; *Public :* Adolescents, adultes ; *Exploitation :* Rang moyen de chaque produit

Échelle « juste comme il faut » — *Description :* Pour une caractéristique : « pas assez », « juste comme il faut », « trop » ; *Public :* Tous publics ; *Exploitation :* Part de chaque réponse : oriente l'ajustement d'une recette

Exemple – Calcul détaillé : une échelle « juste comme il faut » pour le sel d'un velouté

40 convives d'un restaurant d'entreprise goûtent un nouveau velouté et répondent à la question « Pour le sel, ce velouté est… » : 6 répondent « pas assez salé », 22 « juste comme il faut », 12 « trop salé » (données fictives).

- Pas assez : 6 / 40 = **15 %** ; juste comme il faut : 22 / 40 = **55 %** ; trop : 12 / 40 = **30 %**.

Lecture : un peu plus de la moitié des convives trouvent le sel juste, mais 30 % le trouvent trop salé, deux fois plus que ceux qui le trouvent fade. L'ajustement va dans le sens d'une **réduction** du sel, avec une salière à disposition pour ceux qui le souhaitent.

Exemple – Calcul détaillé : des smileys pour une soupe de potiron en maternelle

25 enfants ont choisi un visage sur une échelle de 5 (de 5, très content, à 1, très triste) : 9 enfants ont choisi 5, 8 ont choisi 4, 4 ont choisi 3, 3 ont choisi 2 et 1 a choisi 1.

- Score moyen : (9 × 5 + 8 × 4 + 4 × 3 + 3 × 2 + 1 × 1) / 25 = 96 / 25 = **3,84 sur 5**.
- Part des deux visages les plus contents : (9 + 8) / 25 = **68 %**.

Lecture : la soupe est appréciée par plus des deux tiers des enfants. Avec de jeunes enfants, on présente plutôt la répartition et la part des visages contents que la moyenne, qui suppose que les écarts entre visages sont égaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.38

30 adolescents comparent deux pizzas (une classique, une aux légumes) avec la question « Laquelle préférez-vous ? » : 19 préfèrent la pizza classique et 11 la pizza aux légumes. Avec le tableau des épreuves discriminatives (paires de préférence, 21 pour 30 dégustateurs), dites si la préférence est significative. Proposez une suite.

Corrigé

Il faudrait au moins **21** préférences sur 30 pour conclure à une préférence significative au risque de 5 % (test bilatéral). 19 < 21 : la préférence pour la pizza classique **n'est pas démontrée** (la probabilité d'un écart au moins aussi grand par hasard est d'environ 20 %). La pizza aux légumes est donc acceptable. Suite : une échelle hédonique sur chaque pizza pour savoir si les deux sont aimées, et une question « juste comme il faut » sur les légumes ou les épices pour ajuster la recette.

Les épreuves descriptives et le profil sensoriel

Les épreuves **descriptives** décrivent un produit avec précision : quelles caractéristiques, avec quelle intensité. Elles demandent un **jury entraîné** (en général 8 à 12 personnes), qui partage un **vocabulaire** et des **références** (par exemple, une solution de sucre pour fixer ce que vaut « sucré 5 sur 10 »).

Méthode pas à pas – Établir un profil sensoriel simple

1. Générer le vocabulaire : le jury goûte les produits et propose des descripteurs (sucré, acide, croquant, fruité…).

2. Sélectionner 6 à 10 descripteurs pertinents, compris de tous, sans termes hédoniques (« bon », « agréable » sont exclus).

3. Définir chaque descripteur et ses références (ce qui vaut 0, ce qui vaut 10).

4. Entraîner le jury sur quelques séances, vérifier qu'il note de façon cohérente.

5. Évaluer les produits codés, chaque juge seul, chaque descripteur sur une échelle de 0 à 10.

6. Calculer la moyenne de chaque descripteur et représenter le profil (tableau ou graphique en toile d'araignée).

Le profil sert à **comparer** des recettes (une version moins sucrée garde-t-elle son fruité ?), à **caractériser** un produit pour une fiche technique, ou à **suivre** une qualité dans le temps. Il ne dit pas si le produit plaît : il complète une épreuve hédonique.

Lien diététique – Le profil au service de la réduction du sucre

Quand on réduit le sucre d'un dessert, on craint qu'il perde son goût. Un profil montre souvent que le **fruité**, la **vanille** ou l'**acidité** prennent plus de place : on peut alors les mettre en avant (fruits bien mûrs, épices) pour compenser. C'est un argument concret pour convaincre une équipe de cuisine.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.39

Un jury entraîné de 8 personnes compare deux compotes. Moyennes sur 10 : compote A (habituelle) : sucré 7,1 ; acide 2,4 ; fruité 5,2 ; cannelle 0,3 ; texture lisse 6,0. Compote B (sans sucre ajouté, cannelle) : sucré 4,8 ; acide 3,5 ; fruité 6,3 ; cannelle 4,9 ; texture lisse 6,1. Décrivez les deux profils et dites ce que vous pouvez conclure, et ce que vous ne pouvez pas conclure.

Corrigé

A est nettement plus **sucrée** (7,1 contre 4,8), un peu moins **acide** et moins **fruitée** ; elle n'a presque pas de goût de cannelle. B est moins sucrée, plus acide et plus fruitée, avec une note de **cannelle** marquée ; les textures sont identiques. On peut conclure que la suppression du sucre ajouté a fait ressortir le fruité et l'acidité, et que la cannelle donne une identité au produit. On ne peut pas conclure que B plaît autant que A : il faut une **épreuve hédonique** auprès du public visé.

Organiser une dégustation en atelier : le matériel et le plan

Une dégustation réussie se prépare comme une recette. Le matériel et l'organisation dépendent de l'épreuve, mais quelques règles valent pour toutes.

Élément · À prévoir · Pourquoi
Codes — *À prévoir :* Trois chiffres tirés au hasard pour chaque échantillon (éviter 123, 111, 666) ; *Pourquoi :* Ne pas suggérer d'ordre ou de qualité
Plan de présentation — *À prévoir :* Liste qui indique, pour chaque dégustateur, l'ordre des échantillons ; toutes les combinaisons utilisées autant de fois ; *Pourquoi :* Équilibrer l'effet d'ordre
Contenants — *À prévoir :* Identiques, neutres (gobelets blancs, cuillères), en nombre suffisant ; *Pourquoi :* Éviter les indices visuels ; hygiène

Quantités — *À prévoir :* Identiques, suffisantes pour goûter deux fois (une à deux cuillères) ; *Pourquoi :* Comparaison équitable, sans rassasier

Température — *À prévoir :* Identique pour tous les échantillons, adaptée au produit ; *Pourquoi :* La température change la perception (le froid atténue le sucré)

Rinçage — *À prévoir :* Eau plate à température ambiante, pain neutre ou crackers non salés ; *Pourquoi :* Effacer le goût du précédent

Fiche — *À prévoir :* Une fiche par personne, consignes écrites et lues à voix haute, pictogrammes si besoin ; *Pourquoi :* Réponses individuelles et compréhensibles

Sécurité — *À prévoir :* Liste des ingrédients et des allergènes affichée ; recueil des allergies avant ; *Pourquoi :* Prévenir un accident allergique

Pour un essai triangulaire, il existe six ordres possibles avec deux produits A et B : AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA. On les répartit également entre les dégustateurs (par exemple 4 fois chaque ordre pour 24 dégustateurs).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.40

Vous organisez un essai triangulaire avec 18 parents pour comparer un pain blanc et un pain semi-complet. Indiquez combien de fois chaque ordre de présentation sera utilisé, proposez trois codes, et listez le matériel nécessaire pour 18 dégustateurs.

Corrigé

Six ordres pour 18 dégustateurs : 18 / 6 = **3 fois** chaque ordre (AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA). Codes, par exemple : **584**, **217**, **930** (on attribue un code différent à chaque échantillon d'un même trio). Matériel : 54 petites assiettes ou gobelets identiques (3 par dégustateur), des morceaux de pain de même taille sans croûte visible ou avec une croûte comparable, coupés au dernier moment ; 18 verres d'eau ; 18 fiches et stylos ; le plan de présentation ; une liste des ingrédients et des allergènes (gluten, éventuellement graines) ; un lieu calme avec des places séparées.

Le vocabulaire de la dégustation

Dimension · Exemples de descripteurs

Aspect — *Exemples de descripteurs :* Couleur (vert vif, doré, terne), brillance, homogénéité, forme, taille des morceaux

Odeur et arômes — *Exemples de descripteurs :* Fruité, herbacé, grillé, épicé, lacté, caramélisé, fermenté

Saveurs — *Exemples de descripteurs :* Sucré, salé, acide, amer, umami ; intensité (faible, moyenne, forte)

Texture — *Exemples de descripteurs :* Croquant, fondant, onctueux, granuleux, ferme, élastique, juteux, sec, collant

Sensations trigéminales — *Exemples de descripteurs :* Piquant, brûlant, frais, pétillant, astringent

Persistance — *Exemples de descripteurs :* Courte, longue ; arrière-goût

Appréciation — *Exemples de descripteurs :* Plaisir, envie d'en reprendre (hédonique)

Faire décrire selon les publics

Le vocabulaire de la dégustation s'apprend. On l'adapte à l'âge et au niveau de langue des participants, en partant de leurs mots et en proposant des **supports visuels**.

Public · Supports · Exemples de consignes

Enfants de 3 à 6 ans — *Supports :* Images (visages, objets), gestes, comparaisons concrètes ; *Exemples de consignes :* « Est-ce que ça croque comme une carotte ou c'est doux comme une banane ? »

Enfants de 7 à 11 ans — *Supports :* Cartes de mots (croquant, fondant, sucré, acide, amer), « roue des sens » simplifiée ; *Exemples de consignes :* « Choisis deux cartes qui décrivent ce que tu as dans la bouche. »

Adolescents — *Supports :* Fiches de dégustation, défis, comparaison à l'aveugle ; *Exemples de consignes :* « Décris sans dire si tu aimes : couleur, odeur, goût, texture. »

Adultes — *Supports :* Fiche à cinq rubriques (aspect, odeur, saveurs, texture, appréciation) ; *Exemples de consignes :* « Quelles saveurs reconnaissez-vous ? Quelle intensité ? »

Personnes qui lisent peu ou apprennent le français — *Supports :* Pictogrammes, photos, mots écrits et dits à voix haute, échelles de couleurs ; *Exemples de consignes :* « Montrez la carte qui correspond. »

Personnes âgées — *Supports :* Grandes polices, contrastes, évocation de souvenirs ; *Exemples de consignes :* « À quoi ce goût vous fait-il penser ? »

Astuce – Passer du jugement à la description

Quand un participant dit « c'est bon » ou « c'est mauvais », on accueille son avis et on l'aide à décrire avec une question ouverte : « Qu'est-ce qui vous plaît, ou vous déplaît ? Le goût, l'odeur, la texture ? » On ne corrige pas un ressenti : on enrichit le vocabulaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.41

Concevez une fiche de dégustation d'une salade de fruits pour des enfants de 8 ans qui lisent encore difficilement. Indiquez les rubriques, la façon de répondre et la dernière question.

Corrigé

Exemple de fiche, une ligne par sens avec des pictogrammes : **Je regarde** (œil) : entourer les couleurs vues (pastilles de couleur) ; **Je sens** (nez) : entourer « ça sent fort » ou « ça sent peu » ; **Je goûte** (langue) : entourer les images sucré (sucre), acide (citron), amer (chocolat noir) ; **Je touche avec ma bouche** (dent) : entourer « croquant », « fondant », « juteux » ; **J'entends** (oreille) : « ça fait du bruit » ou non. Dernière question : « Est-ce que j'aime ? », avec trois visages (content, moyen, pas content). Les mots sont lus à voix haute par l'animateur.

Les familles d'odeurs et le loto des odeurs

L'odorat est le sens le plus difficile à mettre en mots : on reconnaît une odeur familière, mais on ne trouve pas toujours son nom. Pour aider les participants, on regroupe les odeurs en **familles**. Le tableau propose une classification

simple, inspirée des roues des arômes utilisées en œnologie et en analyse sensorielle.

Famille · Exemples d'odeurs · Aliments ou objets pour un atelier

Fruitée — *Exemples d'odeurs :* Pomme, fraise, banane, agrumes, fruits secs ; *Aliments ou objets pour un atelier :* Zeste d'orange, banane mûre, abricot sec

Florale — *Exemples d'odeurs :* Rose, fleur d'oranger, violette ; *Aliments ou objets pour un atelier :* Eau de fleur d'oranger, thé au jasmin

Végétale — *Exemples d'odeurs :* Herbe coupée, poivron vert, champignon ; *Aliments ou objets pour un atelier :* Persil, poivron, champignon de Paris

Épicée — *Exemples d'odeurs :* Cannelle, clou de girofle, poivre, vanille ; *Aliments ou objets pour un atelier :* Bâton de cannelle, gousse de vanille

Grillée ou torréfiée — *Exemples d'odeurs :* Pain grillé, café, cacao, noisette grillée ; *Aliments ou objets pour un atelier :* Café moulu, cacao, noisettes torréfiées

Lactée — *Exemples d'odeurs :* Beurre, crème, yaourt ; *Aliments ou objets pour un atelier :* Beurre, lait chaud

Animale — *Exemples d'odeurs :* Viande cuite, bouillon, poisson ; *Aliments ou objets pour un atelier :* Bouillon de volaille, sardine

Fermentée — *Exemples d'odeurs :* Fromage, levure, vinaigre ; *Aliments ou objets pour un atelier :* Pâte à pain crue, vinaigre de cidre

Méthode pas à pas – Organiser un loto des odeurs

1) Préparer 8 à 12 petits pots opaques, fermés par une gaze ou un couvercle percé, contenant chacun un aliment odorant ; numéroter les pots. 2) Distribuer une grille avec des images ou des noms d'aliments (selon l'âge et la lecture). 3) Faire sentir chaque pot sans regarder à l'intérieur ; chacun note ou montre l'aliment reconnu. 4) Révéler les réponses, puis demander à quelle famille appartient chaque odeur et quels souvenirs elle évoque. 5) Prévoir une pause ou une odeur « neutre » (sentir sa propre peau du poignet) après quatre ou cinq pots, car l'odorat se fatigue vite.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.42

Une animatrice organise un loto des odeurs avec des résidents d'EHPAD. 1) Expliquez pourquoi cette activité peut être plus difficile pour ce public et comment l'adapter. 2) Expliquez en quoi elle peut aussi soutenir l'appétit.

Corrigé

1) L'odorat diminue avec l'âge, et certains médicaments ou maladies (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson) l'altèrent encore. On choisit des odeurs fortes et familières (café, cannelle, orange, chocolat, lavande), on limite le nombre de pots, on propose des images plutôt qu'une liste écrite et l'on valorise les souvenirs plus que la bonne réponse. 2) Les odeurs alimentaires stimulent la salivation et l'envie de manger ; les souvenirs évoqués (cuisine familiale, fêtes) créent un moment agréable autour de l'alimentation. Placer l'activité avant le goûter ou le repas peut en renforcer l'effet.

L'éducation sensorielle et la néophobie

Définition – Néophobie alimentaire

Réticence ou refus de goûter des aliments **nouveaux** ou peu familiers. Elle est fréquente et considérée comme une étape normale du développement, surtout entre 2 et 10 ans environ, avec un pic vers 2-6 ans. Elle se distingue de la **sélectivité** (refus d'aliments pourtant connus) et des troubles alimentaires pédiatriques qui relèvent d'une prise en charge.

Levier · Application en atelier

Exposition répétée — *Application en atelier :* Proposer plusieurs fois un même aliment, sous des formes variées : l'acceptation augmente souvent après plusieurs expositions (de l'ordre de 8 à 10 dans plusieurs études chez l'enfant)

Absence de pression — *Application en atelier :* Inviter à goûter sans obliger ni récompenser par un dessert ; accepter le refus

Manipulation et préparation — *Application en atelier :* Toucher, sentir, couper, cuisiner l'aliment avant de le goûter

Modèle — *Application en atelier :* Adultes et pairs qui goûtent avec plaisir

Vocabulaire sensoriel — *Application en atelier :* Décrire plutôt que juger (« c'est croquant et un peu acide » plutôt que « c'est bon / pas bon »)

Associations — *Application en atelier :* Associer le nouvel aliment à un aliment apprécié (dip, sauce, gratin)

Lien diététique – Les « classes du goût »

L'œnologue **Jacques Puisais** a développé à partir des années 1970 les **classes du goût** : des séances d'éducation sensorielle pour les enfants, qui apprennent à utiliser leurs cinq sens, à décrire leurs perceptions et à exprimer leurs préférences. Cette approche inspire de nombreux programmes d'éducation au goût en milieu scolaire et en atelier.

Néophobie, sélectivité et troubles : savoir distinguer

Tous les refus alimentaires de l'enfant ne relèvent pas de la même situation. Le diététicien doit savoir reconnaître ce qui fait partie du développement normal et ce qui demande une **orientation** vers un professionnel de santé.

Situation · Ce que l'on observe · Conduite en éducation pour la santé

Néophobie alimentaire — *Ce que l'on observe :* Refus de goûter des aliments nouveaux, fréquent entre 2 et 10 ans environ, avec un pic vers 2 à 6 ans ; l'enfant mange une variété suffisante d'aliments connus ; *Conduite en éducation pour la santé :* Exposition répétée, sans pression ; c'est une étape normale

Sélectivité alimentaire — *Ce que l'on observe :* Refus d'aliments pourtant connus, répertoire limité, souvent selon la texture ou la couleur ; *Conduite en éducation pour la santé :* Mêmes leviers, avec patience ; vigilance si le répertoire se réduit beaucoup

Trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion d'aliments (décrit dans le DSM-5, 2013) — *Ce que l'on observe :* Restriction importante, avec perte de poids ou cassure de la croissance, carences, ou retentissement important sur la vie sociale ; *Conduite en éducation pour la santé :* Orientation vers le médecin ; prise en charge spécialisée, hors du champ de l'atelier

Ce que disent les études sur l'exposition répétée

Des études menées chez l'enfant montrent que l'**acceptation** d'un aliment augmente avec le nombre de fois où il est **goûté** : l'enfant apprend à aimer ce qui devient familier. Dès 1982, Leann Birch et Diane Marlin ont montré chez de jeunes enfants que la préférence pour des aliments nouveaux augmentait avec le nombre d'expositions. En 2003, l'équipe de Jane Wardle a montré, dans un essai randomisé, que des parents qui proposaient chaque jour un petit morceau d'un légume peu aimé pendant environ deux semaines augmentaient l'acceptation de ce légume par leur enfant. Les études donnent souvent un ordre de grandeur de **8 à 10 expositions**, avec de grandes différences d'un enfant à l'autre.

Trois conditions favorisent l'effet : **goûter** (regarder ne suffit pas toujours), **sans pression** ni récompense (« si tu goûtes, tu auras un dessert » associe l'aliment à une corvée), et dans un **contexte agréable**, avec des adultes et des pairs qui servent de **modèles**.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.43

Une maman vous dit : « Mon fils de 4 ans refuse tous les légumes verts. J'ai essayé deux fois les haricots verts, il a recraché, donc je n'en fais plus. » Rédigez votre réponse en quatre phrases, en vous appuyant sur l'exposition répétée, et dites dans quel cas vous l'orienteriez vers son médecin.

Corrigé

Exemple : « C'est très fréquent à cet âge : beaucoup d'enfants se méfient des aliments nouveaux, c'est une étape normale. Deux essais, c'est encore peu : il faut souvent proposer un aliment huit à dix fois, sous des formes différentes, avant qu'un enfant l'accepte. Mettez-en une petite quantité dans son assiette, sans l'obliger, mangez-en vous-même avec plaisir, et essayez d'autres préparations (en purée avec des pommes de terre, en petits bâtonnets à tremper). Félicitez-le s'il goûte, mais sans récompense. » Orientation vers le médecin si l'enfant mange de moins en moins d'aliments, perd du poids, ne grandit plus comme avant, ou si les repas deviennent très difficiles pour la famille.

Une séance d'éducation sensorielle type

L'éducation sensorielle s'inspire des **classes du goût** de Jacques Puisais (11.3.5). Une séance alterne la découverte par un sens, la description, la dégustation et l'échange. Voici un exemple de séance d'une heure pour une classe d'école élémentaire, sur le thème de l'**odorat**.

Temps · Durée · Activité · Méthode

Ouverture — *Durée :* 5 min ; *Activité :* « Qu'est-ce qui sent bon ou mauvais pour vous ? » ; *Méthode :* Interrogative

Jeu des pots à flairer — *Durée :* 15 min ; *Activité :* Six pots opaques (cannelle, menthe, orange, vanille, café, thym) : les élèves sentent et cherchent le nom ; *Méthode :* Ludique, active

Le nez bouché — *Durée :* 10 min ; *Activité :* Goûter deux bonbons de couleur identique, nez pincé puis nez libre ; *Méthode :* Expérimentale

Mise en mots — *Durée :* 10 min ; *Activité :* Trouver des mots pour décrire les odeurs (fruité, épicé, frais, sucré…) ; *Méthode :* Coopérative

Dégustation — *Durée :* 15 min ; *Activité :* Trois légumes crus (carotte, céleri, fenouil) : sentir, goûter, décrire ; *Méthode :* Active

Bilan — *Durée :* 5 min ; *Activité :* « Ce que j'ai appris sur mon nez » ; fiche à colorier ; *Méthode :* Réflexive

Attention – Sécurité et allergies

Avant toute séance sensorielle en milieu scolaire, on vérifie les allergies (projets d'accueil individualisés), on n'utilise pas d'allergènes majeurs dans les pots à flairer, et l'on respecte les règles d'hygiène (aliments préparés dans de bonnes conditions, lavage des mains). Les odeurs fortes (piment, ail cru) sont présentées avec précaution.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.44

Adaptez la séance type à un groupe de six résidents d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, sur le thème « Les odeurs de notre enfance ». Proposez trois modifications et justifiez-les.

Corrigé

1) Choisir des odeurs **évocatrices** pour cette génération (pain grillé, confiture de fruits, lavande, café, chocolat chaud, herbes du jardin) : la réminiscence stimule l'échange et l'appétit. 2) Allonger le temps de **parole** et réduire les consignes : un sens à la fois, une question simple, des pots faciles à saisir, des étiquettes en gros caractères ; la séance dure 45 minutes au plus, assis. 3) Terminer par une **dégustation** d'un goûter qui reprend une odeur (pain d'épices, compote à la cannelle), adapté aux textures de chacun (mixé ou tendre si besoin) : on relie le plaisir des odeurs au plaisir de manger.

Rédiger le compte rendu d'une dégustation

Une dégustation n'a de valeur que si ses résultats sont présentés clairement. Le compte rendu sert à l'équipe (cuisine, direction, commission menus), au dossier de stage et parfois aux participants eux-mêmes. Il doit permettre à un lecteur absent de comprendre ce qui a été fait et ce que l'on peut en conclure.

Méthode pas à pas – Les six parties d'un compte rendu de dégustation

1) L'objectif : la question posée, en une phrase (« La baisse de 20 % du sel du potage est-elle perçue ? »). 2) **Les produits** : ce qui a été comparé, avec les recettes ou les références, les quantités servies et la

température. 3) **Les dégustateurs** : leur nombre, leur profil (âge, résidents ou personnel), et les personnes exclues (allergie, refus). 4) **La méthode** : l'épreuve choisie, le codage des échantillons, l'ordre de présentation, la question exacte posée. 5) **Les résultats** : les chiffres bruts, puis les pourcentages ou les moyennes, comparés au seuil statistique si l'épreuve en comporte un. 6) **La conclusion et ses limites** : ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, et la décision proposée.

Astuce – Séparer les résultats et l'interprétation

Dans la partie « résultats », on écrit seulement ce qui a été mesuré : « 9 dégustateurs sur 18 ont trouvé l'échantillon différent. » L'interprétation vient ensuite : « Le seuil étant de 10, la différence n'est pas significative au risque de 5 %. » Cette séparation évite de présenter une opinion comme un fait.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.45

Voici les notes prises par une stagiaire après une dégustation : « On a fait goûter les deux compotes aux enfants du centre de loisirs. Ils ont presque tous préféré la nouvelle, sauf quelques-uns. Donc on peut changer de fournisseur. » 1) Relevez quatre informations qui manquent pour que ce compte rendu soit exploitable. 2) Réécrivez la partie « résultats et conclusion » avec les données suivantes, **fictives** : 30 enfants de 6 à 10 ans, comparaison par paires de préférence, 21 préfèrent la nouvelle compote, 9 l'ancienne.

Corrigé

1) L'objectif précis de la dégustation ; le nombre et l'âge des enfants ; l'épreuve utilisée, avec le codage et l'ordre de présentation ; les chiffres exacts des réponses ; le seuil de décision. On pourrait aussi ajouter les critères autres que le goût (prix, teneur en sucres, conditionnement). 2) « Résultats : sur 30 enfants, 21 ont préféré la nouvelle compote (70 %) et 9 l'ancienne (30 %). Interprétation : pour 30 dégustateurs, le seuil bilatéral de la comparaison par paires de préférence est de 21 au risque de 5 %. Le nombre de préférences atteint ce seuil : la préférence pour la nouvelle compote est significative. Limites : un seul groupe, une seule séance, des enfants qui se connaissent et peuvent s'influencer. Proposition : changer de fournisseur si le prix et la teneur en sucres sont au moins équivalents, puis suivre les restes pendant un mois. »

Repères – Sens, produits alimentaires intermédiaires et gélifiants (CNED)

- **Évaluation sensorielle** (CNED, *Activités technologiques d'alimentation*, M1 S6, p. 3) : ce n'est pas une simple dégustation ; on mobilise les cinq sens. La **vue** (forme, couleur, aspect), l'**odorat** (arômes volatils), le **goût** (cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, umami, et des sensations comme le piquant ou le froid), le **toucher** en bouche (croustillant, fondant, pâteux…) et l'**ouïe** (le croustillant d'une baguette).
- **Produits alimentaires intermédiaires** (M1 S7, p. 3) : produits élaborés ou semi-élaborés qui entrent dans une autre fabrication (praliné, mayonnaise, génoise, pâte feuilletée, ovoproduits). On respecte les dates, la température de stockage et les dosages du fabricant. Intérêts : sécurité microbiologique (ovoproduits) et gain de main-d'œuvre. Si une cuisine en utilise beaucoup, on parle de **cuisine d'assemblage**.
- **Gélifiants** (M1 S7, p. 4) : en moyenne **8 g de gélatine** pour 500 mL de liquide (feuilles ramollies 5 minutes dans l'eau froide, dissoutes à chaud sans bouillir) ; environ **2 g d'agar-agar** pour 500 mL (poudre ajoutée avant ébullition ; il **doit bouillir** pour agir). Les deux gels prennent au froid positif ; ils sont utiles pour le « manger-main » (chapitre 12).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.5 – Les techniques de dégustation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel nerf transmet le piquant du piment et la fraîcheur de la menthe ?

2. Pourquoi code-t-on les échantillons par trois chiffres ?

3. Quelle est la probabilité de réussir au hasard un duo-trio ? Un essai triangulaire ?

4. Avec 24 dégustateurs, combien faut-il de bonnes réponses dans un essai triangulaire pour conclure au risque de 5 % ?

5. À quoi sert une échelle « juste comme il faut » ?

6. Citez trois conditions qui favorisent l'effet de l'exposition répétée chez l'enfant.

Corrigé – Point d'étape 11.3.5

1. Le nerf trijumeau (sensibilité trigéminale).

2. Pour que le nom ou un numéro « logique » n'influence pas le jugement.

3. 1 chance sur 2 ; 1 chance sur 3.

4. 13 bonnes réponses.

5. À savoir dans quel sens ajuster une caractéristique d'une recette (sel, sucre, cuisson) : pas assez, juste, trop.

6. Goûter réellement, sans pression ni récompense, dans un contexte agréable, avec des modèles (adultes, pairs).

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe au fil rouge et aux approfondissements.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les tableaux des épreuves et des seuils.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 11.3.5 et je refais les exercices d'application.

11.3.6 Fil rouge : technique et dégustation dans les ateliers des Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 11.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 11.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les techniques choisies par Inès

Pour les 6 ateliers du projet des Tilleuls (chapitre 10), Inès retient des techniques **simples et reproductibles** avec le matériel des familles : cuisson à l'eau et à l'étouffée (légumes secs, soupes), poêlée (légumes de saison), four (parmentier, crumble, légumes rôtis), émulsion simple (vinaigrette), pâte à crumble (sablage). Elle explique à chaque fois **ce qui se passe** : « les lentilles corail n'ont pas besoin de trempage et cuisent en 15 à 20 minutes ; elles se défont et épaississent la soupe grâce à leur amidon ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Préserver les nutriments : les gestes transmis

Légumes lavés avant d'être épluchés finement ; cuisson courte des légumes verts ; **eau de cuisson** des lentilles réutilisée pour la purée du parmentier (chapitre 1) ; carottes associées à un peu de matière grasse ; restes refroidis rapidement et conservés au froid.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La dégustation à l'atelier n° 3

Grille simple pour 10 participants : aspect, odeur, goût, texture, appréciation de 1 à 5. Résultats : parmentier **4,3**, crumble **4,7**, salade de chou cru **3,3** (chapitre 1, fiche F9). Les commentaires (« le chou cru est dur », « un peu fade ») orientent l'ajustement : à l'atelier 5, Inès propose une **comparaison** chou cru / chou tiède aux pommes et au cumin : la version tiède obtient 4,1 (données fictives). La dégustation devient un outil d'**éducation sensorielle** (décrire), d'**évaluation** (noter) et d'**ajustement** (modifier la recette).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le crumble moins sucré de l'atelier n° 6

Pour le dernier atelier, Inès veut vérifier qu'un crumble aux pommes avec 30 % de sucre en moins dans la pâte reste apprécié. Elle prépare la recette habituelle (A) et la recette réduite (B). Elle organise d'abord un essai triangulaire avec les 12 participants et des proches présents : 7 personnes trouvent l'échantillon différent. Le seuil pour 12 dégustateurs au risque de 5 % est de 8 : la différence n'est pas significative. Elle demande ensuite à chacun de noter la recette B de 1 à 5 : moyenne 4,4 (données fictives). Inès conclut prudemment : « La baisse de sucre n'a pas été perçue de façon nette par notre groupe et la recette réduite plaît. Je la mets dans le livret de recettes du projet. » Elle note une limite dans son bilan : le groupe était petit et les dégustateurs savaient qu'une version était moins sucrée.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.46

1) Pourquoi Inès commence-t-elle par l'essai triangulaire avant de demander une note ? 2) Le fait que les dégustateurs « savaient qu'une version était moins sucrée » peut-il influencer les résultats ? Expliquez. 3) Proposez une façon d'organiser la dégustation pour limiter ce biais lors d'un prochain cycle.

Corrigé

1) L'essai triangulaire répond à la question « la différence est-elle perçue ? ». Si l'on demandait d'abord une note, les participants sauraient qu'il y a deux versions et chercheraient la moins sucrée. 2) Oui : une personne qui s'attend à un produit moins sucré peut le percevoir comme moins bon, ou au contraire le juger plus favorablement pour « bien faire ». C'est un effet d'attente (voir la partie sur ce que l'on voit et ce que l'on croit). 3) Annoncer seulement « nous allons goûter trois échantillons de crumble » sans parler de sucre ; coder les échantillons par trois chiffres ; tirer au sort l'ordre ; ne révéler la différence qu'après la dégustation.

Exercices de synthèse sur le chapitre

Ces trois exercices mobilisent plusieurs parties du cours à la fois : techniques, calculs avec la table Ciqual, coût et dégustation. Ils préparent aux questions longues de l'épreuve E5. Les situations et les prix sont **fictifs** ; les valeurs nutritionnelles viennent de Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.47

Une soupe de potiron maison pour un foyer de jeunes travailleurs. Recette : 1 000 g de potiron net, 200 g de pommes de terre nettes, 100 g d'oignon net, 15 g d'huile d'olive, 200 g de lait demi-écrémé, 4 g de sel et 600 g d'eau. On estime que 200 g d'eau s'évaporent pendant la cuisson. Les apports de la recette entière, calculés avec Ciqual, sont : 630 kcal, 22,6 g de protéines, 19,9 g de lipides, 11,1 g de fibres et 4,21 g de sel. 1) Calculez la masse de soupe obtenue et le nombre de bols de 250 g. 2) Calculez les apports d'un bol en énergie, en lipides, en fibres et en sel. 3) Comparez avec un bol de 250 g de soupe au potiron du commerce (Ciqual 25945 : 36,2 kcal, 1,51 g de lipides, 0,99 g de fibres et 0,62 g de sel pour 100 g). 4) Le potiron s'achète 1,50 € le kilo brut, avec un rendement de 0,75. Calculez la quantité brute de potiron à acheter et son coût. 5) Proposez deux techniques pour que la soupe reste onctueuse sans crème.

Corrigé

1) Masse crue : 1 000 + 200 + 100 + 15 + 200 + 4 + 600 = 2 119 g ; après évaporation : 2 119 − 200 = **1 919 g**, soit 1 919 ÷ 250 = 7,7 bols, donc 7 bols complets. 2) Pour un bol : 630 × 250 ÷ 1 919 = **82 kcal** ; lipides 19,9 × 250 ÷ 1 919 = **2,6 g** ; fibres 11,1 × 250 ÷ 1 919 = **1,4 g** ; sel 4,21 × 250 ÷ 1 919 = **0,55 g**. 3) Bol du commerce : 90 kcal, 3,8 g de lipides, 2,5 g de fibres et 1,55 g de sel. La soupe maison contient près de trois fois moins de sel (11 % du repère de 5 g contre 31 %). En revanche, elle contient moins de fibres selon ce calcul : la valeur de fibres du potiron cru dans Ciqual (0,5 g pour 100 g) est basse, et la soupe du commerce peut contenir d'autres légumes. Il faut le dire honnêtement plutôt que d'affirmer que le fait maison est meilleur sur tous les points. 4) Brut = 1 000 ÷ 0,75 = 1 333 g, soit 1,33 kg ; coût : 1,333 × 1,50 = **2,00 €**. 5) Mixer finement avec la pomme de terre, dont l'amidon épaissit et donne de l'onctuosité ; ajouter le lait en fin de cuisson ; faire revenir l'oignon au départ pour développer les arômes et compenser la réduction du sel.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.48

Une baisse de sucre dans le flan de la cuisine centrale. Une cuisine centrale réduit de 25 % le sucre de son flan. Avant de changer la recette, elle organise un essai triangulaire avec 15 convives adultes : 8 trouvent l'échantillon différent. Elle mesure aussi les restes sur deux semaines : 14 % de flan non consommé avec l'ancienne recette, 15 % avec la nouvelle. 1) Le seuil de l'essai triangulaire pour 15 dégustateurs au risque de 5 % est de 9. Concluez. 2) Interprétez l'écart de restes. 3) Rédigez la conclusion du compte rendu en trois phrases, avec une limite.

Corrigé

1) 8 bonnes réponses est inférieur au seuil de 9 : la différence **n'est pas significative** au risque de 5 %. On ne peut pas dire que la baisse de sucre est perçue par ce panel. 2) L'écart de 1 point de pourcentage est faible ; les restes varient aussi selon le menu, la météo, les effectifs. Il ne montre pas de rejet de la nouvelle recette. 3) « La baisse de 25 % du sucre du flan n'a pas été perçue de façon significative par 15 convives lors d'un essai triangulaire. Les restes sont restés stables sur deux semaines (14 % puis 15 %). Le panel est petit et une partie des convives a pu percevoir la différence : on propose de garder la nouvelle recette et de refaire une mesure des restes dans deux mois. »

À vous de jouer – Exercice d'application 11.49

Choisir un dessert pour un goûter d'enfants. Une animatrice de centre de loisirs hésite entre quatre desserts pour le goûter d'enfants de 8 ans. Valeurs pour 100 g (Ciqual 2025) :

Dessert (code Ciqual) · Énergie (kcal) · Sucres (g) · Lipides (g) · Protéines (g) · Calcium (mg)

Salade de fruits crue (13134) — *Énergie (kcal) :* 79,3 ; *Sucres (g) :* 14,2 ; *Lipides (g) :* 0,24 ; *Protéines (g) :* 0,61 ; *Calcium (mg) :* 14,5

Riz au lait, rayon frais (39212) — *Énergie (kcal) :* 121 ; *Sucres (g) :* 10,8 ; *Lipides (g) :* 3,4 ; *Protéines (g) :* 3,0 ; *Calcium (mg) :* 73,9

Crème dessert à la vanille, rayon frais (39229) — *Énergie (kcal) :* 103 ; *Sucres (g) :* 13,8 ; *Lipides (g) :* 2,88 ; *Protéines (g) :* 2,98 ; *Calcium (mg) :* 107

Petit suisse nature 4 % (19664) — *Énergie (kcal) :* 88 ; *Sucres (g) :* 3,11 ; *Lipides (g) :* 3,9 ; *Protéines (g) :* 9,71 ; *Calcium (mg) :* 103

1) Classez les desserts selon leur teneur en sucres. 2) Expliquez pourquoi la salade de fruits, pourtant la plus sucrée après la crème dessert, reste un bon choix. 3) Proposez un goûter qui associe deux de ces aliments et justifiez-le en tenant compte du goût des enfants.

Corrigé

1) Du moins sucré au plus sucré : petit suisse nature (3,1 g), riz au lait (10,8 g), crème dessert à la vanille (13,8 g), salade de fruits crue (14,2 g). 2) Les sucres de la salade de fruits sont ceux des fruits entiers : ils sont accompagnés de fibres, de vitamines et d'eau, et ne sont pas des sucres ajoutés. La table Ciqual ne distingue pas les sucres ajoutés : il faut lire la liste des ingrédients des desserts du commerce. 3) Petit suisse nature servi avec la salade de fruits : on obtient un produit laitier riche en calcium et en protéines, adouci par les fruits, sans sucre ajouté. Les enfants peuvent mélanger eux-mêmes, ce qui augmente l'acceptation. On évite de présenter la crème dessert comme « interdite » : elle peut rester un dessert occasionnel.

11.4 Approfondissements

11.4.1 Réduire le sel, le sucre et le gras sans perdre le plaisir

Les recommandations de santé publique invitent à limiter le sel, les sucres ajoutés et certaines matières grasses. En cuisine, on agit par **substitution d'arômes** (herbes, épices, ail, oignon, agrumes, vinaigres), par **techniques** (cuissons qui concentrent les saveurs : rôtir les légumes, réduire un jus), par **textures** (purée de légumes pour lier une sauce au lieu de crème) et par **réduction progressive** (le goût s'habitue à une baisse graduelle du sel). L'essai triangulaire permet de vérifier si une réduction est perçue (11.3.5).

Les repères chiffrés et la méthode des petits pas

Les repères de santé publique donnent la direction : l'Organisation mondiale de la santé recommande pour l'adulte moins de **5 g de sel par jour** (OMS, 2012) ; l'ANSES a

fixé une limite de **100 g de sucres totaux par jour**, hors lactose et galactose, pour l'adulte (ANSES, 2016). Le goût s'habitue à une baisse **progressive** : une baisse de 10 à 15 % à la fois passe souvent inaperçue, et plusieurs baisses successives aboutissent à une réduction importante.

Pour réduire… · Techniques culinaires · Exemples

Le sel — *Techniques culinaires :* Aromates, épices, herbes, acidité, cuissons qui colorent, bouillon maison ; *Exemples :* Soupe aux herbes et au citron, légumes rôtis au cumin

Le sucre — *Techniques culinaires :* Fruits bien mûrs, épices douces (cannelle, vanille), réduction progressive, acidité moindre ; *Exemples :* Compote sans sucre ajouté à la cannelle, gâteau avec 30 % de sucre en moins

Les matières grasses — *Techniques culinaires :* Cuissons douces (vapeur, papillote, étuvée), liaisons sans crème, poêles antiadhésives ; *Exemples :* Velouté lié à la pomme de terre, papillote de poisson

Exemple – Calcul détaillé : réduire le sel d'une soupe par paliers de 15 %

Une association prépare 4 litres de soupe avec 8 g de sel, soit 2 g par litre et **0,50 g** par bol de 250 mL. Elle réduit le sel de 15 % à chaque préparation mensuelle.

- Palier 1 : 8 × 0,85 = **6,80 g** (0,43 g par bol) ; baisse de 15 %.
- Palier 2 : 6,80 × 0,85 = **5,78 g** (0,36 g par bol) ; baisse cumulée 1 − 0,85 × 0,85 = **27,8 %**.
- Palier 3 : 5,78 × 0,85 = **4,91 g** (0,31 g par bol) ; baisse cumulée **38,6 %**.

Lecture : trois petites baisses aboutissent à près de 40 % de sel en moins. On vérifie à chaque palier que la soupe reste appréciée, et l'on compense par des aromates. Les baisses se multiplient : trois baisses de 15 % ne font pas 45 %.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.50

Un gâteau de 8 parts contient 150 g de sucre. Calculez le sucre par part avant et après une réduction de 30 %. Proposez deux techniques pour garder le plaisir, et l'épreuve de dégustation qui permettra de vérifier que la réduction est acceptée.

Corrigé

Avant : 150 / 8 = **18,8 g** de sucre ajouté par part. Après : 150 × 0,70 = 105 g, soit 105 / 8 = **13,1 g** par part (5,6 g de moins). Techniques : ajouter des **fruits** bien mûrs (pommes râpées, banane) qui apportent une douceur naturelle et du moelleux ; parfumer avec de la **vanille**, de la **cannelle** ou un zeste d'orange, qui renforcent la perception du sucré. Épreuve : un **essai triangulaire** pour savoir si la réduction est perçue, puis une **épreuve hédonique** auprès du public pour vérifier l'appréciation.

Herbes, épices et condiments : un guide pour saler moins

Pour réduire le sel sans perdre le goût, il faut proposer d'autres sources de saveur. Le tableau donne des associations simples, faciles à retenir et à utiliser en atelier.

Aliment · Herbes et épices qui s'y associent bien · Autres exhausteurs de goût

Légumes verts (haricots, courgettes) — *Herbes et épices qui s'y associent bien :* Ail, persil, basilic, menthe ; *Autres exhausteurs de goût :* Zeste de citron, huile d'olive en filet

Carottes, potiron, patate douce — *Herbes et épices qui s'y associent bien :* Cumin, cannelle, gingembre, muscade ; *Autres exhausteurs de goût :* Jus d'orange, graines torréfiées

Pommes de terre — *Herbes et épices qui s'y associent bien :* Romarin, thym, ciboulette, paprika ; *Autres exhausteurs de goût :* Oignon rôti, moutarde

Légumineuses — *Herbes et épices qui s'y associent bien :* Cumin, coriandre, laurier, curcuma ; *Autres exhausteurs de goût :* Oignon revenu, tomate, vinaigre

Poissons — *Herbes et épices qui s'y associent bien :* Aneth, fenouil, estragon, baies roses ; *Autres exhausteurs de goût :* Citron, câpres rincées

Volailles — *Herbes et épices qui s'y associent bien :* Estragon, thym, curry, paprika ; *Autres exhausteurs de goût :* Ail rôti, jus de cuisson réduit

Viandes rouges — *Herbes et épices qui s'y associent bien :* Poivre, romarin, thym, laurier ; *Autres exhausteurs de goût :* Échalote, vin réduit en cuisine

Desserts aux fruits — *Herbes et épices qui s'y associent bien :* Vanille, cannelle, cardamome, menthe ; *Autres exhausteurs de goût :* Zeste d'agrumes, fruits mûrs

Quelques conseils pratiques complètent ce tableau. Les **herbes fraîches** fragiles (basilic, ciboulette, persil) s'ajoutent en fin de cuisson ; les **herbes sèches** et les épices entières (laurier, thym, cumin) supportent une cuisson longue. Faire **torréfier** les épices à sec quelques secondes dans une poêle libère leurs arômes. Attention aux mélanges du commerce : certains bouillons cubes, sels aromatisés et mélanges d'épices contiennent beaucoup de sel ; on lit la liste des ingrédients.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.51

Un cuisinier d'EHPAD veut réduire le sel de trois plats : une purée de carottes, un filet de poisson poché et une poêlée de haricots verts. Pour chaque plat, proposez une herbe ou une épice et un autre exhausteur de goût, puis indiquez à quel moment les ajouter.

Corrigé

Purée de carottes : cumin ou une pointe de muscade, ajoutés dans la purée en fin de préparation, avec un peu de jus d'orange. Filet de poisson poché : aneth ou fenouil dans le court-bouillon pendant la cuisson, puis un trait de citron au moment du service. Poêlée de haricots verts : ail haché ajouté deux minutes avant la fin pour qu'il ne brûle pas, persil frais au dernier moment, et un filet d'huile d'olive. On veille à ce que les saveurs restent douces : les résidents âgés perçoivent moins bien les saveurs, mais certains n'aiment pas les goûts nouveaux ou trop forts.

Réduire le sucre d'un gâteau : ce que dit le calcul

Le sucre n'apporte pas seulement une saveur. Dans un gâteau, il retient l'eau et garde le moelleux, il participe à la coloration de la croûte par caramélisation et par réactions de Maillard, et il aide à incorporer de l'air lors du mélange avec le beurre ou les œufs. On peut le réduire, mais il faut le faire par étapes et observer le résultat.

Exemple – Calcul détaillé : un quatre-quarts avec 30 % de sucre en moins

Recette classique : 250 g de beurre doux, 250 g d'œufs, 250 g de sucre et 250 g de farine T45, soit 1 000 g de pâte. On fait l'hypothèse d'une perte d'eau de 10 % à la cuisson, donc 900 g de gâteau cuit. Version réduite : 175 g de sucre au lieu de 250 g, soit 925 g de pâte et 832,5 g de gâteau cuit. Valeurs Ciqual 2025 : beurre 16400, œuf cru 22000, sucre blanc 31016, farine T45 9440.

Pour une tranche de 50 g · Énergie (kcal) · Sucres (g) · Lipides (g)

Quatre-quarts classique (calculé) — *Énergie (kcal) :* 229 ; *Sucres (g) :* 14,0 ; *Lipides (g) :* 13,0

Quatre-quarts avec 30 % de sucre en moins (calculé) — *Énergie (kcal) :* 229 ; *Sucres (g) :* 10,7 ; *Lipides (g) :* 14,1

Quatre-quarts artisanal, Ciqual 23080 (pour 50 g) — *Énergie (kcal) :* 220 ; *Sucres (g) :* 13,4 ; *Lipides (g) :* 12,8

Contrôle : la recette classique calculée (28,0 g de sucres pour 100 g) est proche du quatre-quarts artisanal de Ciqual (26,8 g), ce qui rend le calcul plausible. Lecture : la tranche contient 24 % de sucres en moins, mais **l'énergie ne baisse pas**. En retirant du sucre, on augmente la part relative du beurre dans le gâteau. Réduire le sucre est utile pour habituer le palais à une saveur moins sucrée, mais ce n'est pas une façon de rendre un gâteau « léger ».

Lien diététique – Le bon message

Un gâteau reste un aliment plaisir. Le message utile porte sur la **taille de la part** et la **fréquence**, plus que sur une recette « allégée ». Réduire le sucre de 20 à 30 % passe souvent inaperçu, ce que l'on peut vérifier par un essai triangulaire avec le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.52

Un animateur veut réduire aussi le beurre du quatre-quarts en remplaçant 50 g de beurre par 50 g de compote de pommes. 1) Citez deux rôles du beurre dans ce gâteau. 2) Prévoyez l'effet de ce remplacement sur la texture et la conservation. 3) Proposez une méthode pour vérifier si le goût change de façon perceptible.

Corrigé

1) Le beurre apporte des arômes, il donne une texture fondante et il enrobe les grains de farine, ce qui limite la formation du réseau de gluten et rend le gâteau tendre. 2) La compote apporte de l'eau et des fibres : le gâteau sera plus humide et plus dense, un peu moins fondant ; il risque de se conserver moins longtemps, car l'eau favorise le développement des moisissures. 3) Faire un essai triangulaire avec au moins 12 dégustateurs, échantillons codés, ordre tiré au sort ; conclure à une différence perçue seulement si le nombre de bonnes réponses atteint le seuil (8 sur 12 au risque de 5 %).

11.4.2 Les légumineuses en cuisine

Lentilles, pois chiches, haricots secs, pois cassés et fèves sont riches en protéines végétales et en fibres, économiques et à faible impact environnemental. Le **trempage** des légumineuses entières (sauf lentilles et pois cassés) réduit le temps de cuisson et peut améliorer la digestibilité ; l'eau de trempage est jetée et les légumineuses rincées. Les conserves, déjà cuites, permettent une cuisine rapide (bien rincer pour réduire le sel). L'**aquafaba** (eau de cuisson des pois chiches) se monte en neige et remplace le blanc d'œuf dans certaines recettes (utile pour les allergies à l'œuf).

Cuire les légumineuses : repères pratiques

Les temps ci-dessous sont des ordres de grandeur pour une cuisson à la casserole ; ils varient selon la fraîcheur des légumineuses (plus elles sont anciennes, plus elles sont longues à cuire) et la dureté de l'eau. L'autocuiseur divise en général les temps par deux à trois.

Légumineuse · Trempage · Cuisson à la casserole · Usages

Lentilles corail — *Trempage :* Non ; *Cuisson à la casserole :* 15 à 20 minutes ; elles se défont ; *Usages :* Soupes, dahl, purées

Lentilles vertes et blondes — *Trempage :* Non (un rinçage suffit) ; *Cuisson à la casserole :* 20 à 30 minutes ; *Usages :* Salades, plats mijotés

Pois cassés — *Trempage :* Non, ou 1 à 2 heures ; *Cuisson à la casserole :* 45 minutes à 1 heure ; *Usages :* Soupes, purées

Pois chiches — *Trempage :* 12 heures environ ; *Cuisson à la casserole :* 1 h 30 à 2 heures ; *Usages :* Houmous, couscous, salades

Haricots secs (blancs, rouges, noirs) — *Trempage :* 12 heures environ ; *Cuisson à la casserole :* 1 h 30 à 2 heures ; *Usages :* Chili, cassoulet, salades

Fèves sèches — *Trempage :* 12 heures environ, souvent pelées ; *Cuisson à la casserole :* 1 à 2 heures ; *Usages :* Purées, soupes

Attention – Les haricots rouges crus

Les haricots secs, en particulier les haricots rouges, contiennent des lectines qui peuvent provoquer des troubles digestifs s'ils sont consommés crus ou insuffisamment cuits. On jette l'eau de trempage, et on les cuit complètement, à ébullition franche. Les conserves sont déjà cuites.

Exemple – Calcul détaillé : le coût d'une portion de légumes secs

500 g de pois chiches secs à 2,40 € le kilo coûtent 0,500 × 2,40 = **1,20 €**. Ils donnent environ 500 × 2,5 = **1,25 kg** de pois chiches cuits (ordre de grandeur), soit 1,25 / 0,150 = **8 portions** de 150 g (8,3 exactement). Coût par portion :

1,20 / 8,33 = **0,14 €**.

Lecture : une portion de légumes secs cuits à la maison coûte quelques centimes. C'est un argument fort pour un public à petit budget, à condition de lever les freins : temps de trempage, inconfort digestif, manque de recettes.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.53

Dans un atelier, un participant dit : « Les légumes secs, c'est trop long, et ça ne plaît pas aux enfants. » Proposez trois recettes rapides à base de légumineuses, adaptées aux enfants, avec pour chacune la légumineuse et le temps de préparation.

Corrigé

Exemples : **soupe de lentilles corail** aux carottes et au lait de coco (lentilles sans trempage, 25 minutes) ; **houmous** de pois chiches en conserve rincés, à tartiner sur du pain ou à tremper avec des bâtonnets de légumes (10 minutes, sans cuisson) ; **galettes de lentilles** et de flocons d'avoine cuites à la poêle (lentilles corail cuites, 30 minutes) ; **chili doux** aux haricots rouges en conserve et au maïs, servi avec du riz (25 minutes). Les formes « à tartiner », « à tremper » ou en galettes sont souvent bien acceptées par les enfants.

Faire tremper, germer, fermenter : d'autres techniques de préparation

Certaines techniques traditionnelles modifient les aliments avant même la cuisson. Elles sont utilisées dans de nombreuses cultures et peuvent intéresser les participants d'un atelier.

Le trempage. Il réhydrate les légumineuses entières et les céréales complètes. Il réduit le temps de cuisson et diminue une partie des composés qui gênent la digestion (certains sucres responsables des flatulences) ou l'absorption des minéraux (phytates). On jette l'eau de trempage et l'on rince.

La germination. Des graines (lentilles, pois chiches, haricots mungo) maintenues humides pendant quelques jours commencent à germer. Leur teneur en vitamine C augmente et une partie des phytates est dégradée. Les graines germées se mangent crues ou à peine cuites, mais elles présentent un **risque microbiologique** : l'humidité et la chaleur favorisent aussi les bactéries. Elles sont déconseillées crues aux femmes enceintes, aux jeunes enfants, aux personnes âgées et aux personnes immunodéprimées.

La fermentation. Des micro-organismes transforment une partie des sucres de l'aliment. La fermentation **lactique** produit de l'acide lactique : yaourt, choucroute, légumes lacto-fermentés, pain au levain. La fermentation **alcoolique** produit de l'alcool et du gaz carbonique : pâte à pain levée. L'acidité obtenue aide à conserver l'aliment et crée des saveurs nouvelles. Les légumes lacto-fermentés maison demandent une hygiène rigoureuse et une quantité de sel adaptée.

La torréfaction. Faire griller à sec des graines (sésame, noisettes, sarrasin) ou des épices développe des arômes par réactions de Maillard. Cette technique permet de donner du goût à un plat sans ajouter de sel ni de matière grasse.

Attention – Rester prudent sur les promesses

On lit souvent que les aliments fermentés ou germés ont des effets extraordinaires sur la santé. Les connaissances sur le microbiote progressent, mais les effets démontrés chez l'humain restent limités et dépendent des produits. En atelier, on présente ces techniques pour leur **intérêt culinaire et culturel**, sans promesse de santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.54

Un participant veut faire germer des lentilles pour sa fille de 3 ans, « parce que c'est plein de vitamines ». 1) Reconnaissez l'intérêt de sa démarche. 2) Expliquez le risque. 3) Proposez une solution qui garde l'idée.

Corrigé

1) La germination augmente la teneur en vitamine C et rend les lentilles plus faciles à digérer ; l'envie de varier l'alimentation de sa fille est positive. 2) Les graines germées crues peuvent contenir des bactéries pathogènes, car la germination se fait dans des conditions chaudes et humides ; les jeunes enfants y sont plus sensibles. 3) Faire cuire les lentilles germées, par exemple dans une soupe ou une poêlée, ce qui détruit les bactéries ; ou proposer des lentilles corail cuites, simples et rapides.

11.4.3 Les textures : gels, mousses, émulsions

Les **gels** sont obtenus avec la gélatine (origine animale), l'agar-agar (algue, gélifie à chaud et tient à température ambiante), les pectines (confitures) ou l'amidon. Les **mousses** emprisonnent de l'air dans un liquide grâce à des protéines (blanc d'œuf, crème). Les **émulsions** dispersent des gouttelettes de matière grasse dans de l'eau (ou l'inverse) grâce à des émulsifiants (lécithine du jaune d'œuf, moutarde). Ces notions servent aussi pour les **textures modifiées** (chapitre 12).

Gels, mousses et textures adaptées

La maîtrise des textures sert le plaisir (une mousse légère, une gelée de fruits) et la santé : pour les personnes qui ont des troubles de la déglutition, on adapte la texture des aliments et des boissons (chapitre 12).

Agent de texture · Origine · Technique · Particularités

Gélatine — *Origine :* Animale (collagène de porc ou de bœuf, parfois de poisson) ; *Technique :* Ramollir à froid, dissoudre à chaud sans bouillir ; *Particularités :* Gel fondant, fond vers 35 °C ; ne convient pas aux végétariens

Agar-agar — *Origine :* Algues rouges ; *Technique :* Délayer à froid, faire bouillir 1 à 2 minutes ; *Particularités :* Gel ferme et cassant, tient à température ambiante ; s'utilise en petite quantité

Pectine — *Origine :* Fruits (pomme, agrumes) ; *Technique :* Avec du sucre et de l'acidité ; *Particularités :* Confitures, gelées de fruits

Amidons et fécules — *Origine :* Céréales, tubercules ; *Technique :* Délayer à froid, porter à ébullition ; *Particularités :* Crèmes, sauces, flans

Blanc d'œuf, aquafaba — *Origine :* Œuf ; eau de cuisson des pois chiches ; *Technique :* Fouetter ; *Particularités :* Mousses, meringues

Épaississants alimentaires (gomme xanthane, amidons modifiés) — *Origine :* Divers ; *Technique :* Ajouter selon le mode d'emploi ; *Particularités :* Boissons et aliments épaissis pour les troubles de la déglutition

Pour les textures modifiées, de nombreux établissements utilisent le cadre **IDDSI** (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative), qui décrit huit niveaux, de 0 (liquide fin) à 7 (aliments normaux), avec des tests simples (écoulement à la seringue, test de la fourchette). La prescription de la texture relève de l'équipe soignante ; le diététicien et la cuisine la mettent en œuvre.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.55

Pour un goûter dans un accueil de loisirs où trois enfants sont végétariens et un enfant est allergique à l'œuf, on voulait servir une mousse au chocolat (œufs) et une panna cotta (gélatine). Proposez une version pour chaque dessert qui convient à tous les enfants, et nommez la technique utilisée.

Corrigé

Mousse au chocolat à l'aquafaba : l'eau des pois chiches en conserve, montée en neige, remplace les blancs d'œufs ; technique : **mousse** (de l'air emprisonné grâce aux protéines de l'aquafaba). **Panna cotta à l'agar-agar** : la gélatine animale est remplacée par l'agar-agar, délayé à froid dans la crème ou une boisson végétale, puis porté à ébullition ; technique : **gel**. On vérifie l'absence d'œuf dans tous les ingrédients (chocolat, biscuits) et l'on affiche la liste des allergènes.

11.4.4 Analyse sensorielle et restauration collective

En restauration collective, des **commissions menus** et des tests sensoriels (dégustation de nouvelles recettes par un panel de convives) aident à faire accepter des plats végétariens ou moins salés. Les résultats sont croisés avec la **pesée des restes** (gaspillage) et les enquêtes de satisfaction (BC2). Le diététicien peut organiser des épreuves hédoniques simples avec des élèves (échelle de smileys) avant d'introduire une recette au menu.

Dégustation et pesée des restes : un duo d'indicateurs

En restauration collective, l'appréciation d'un plat se mesure de deux façons complémentaires : ce que les convives **disent** (épreuves hédoniques, enquêtes de satisfaction, commission menus) et ce qu'ils **laissent** (pesée des restes). Les deux ne disent pas toujours la même chose : un plat peut être jugé « bon » et peu mangé (portion trop grande, heure, texture), ou peu apprécié mais fini (faim).

Méthode pas à pas – Mesurer les restes d'un plat

1. Choisir le plat et les jours de mesure (au moins trois à cinq services comparables).

2. Peser la quantité servie (ou compter les portions servies).

3. Peser les restes dans les assiettes, séparés par composante si possible (plat, légumes, féculent).

4. Calculer les restes par convive (restes / nombre de convives) et la part des restes (restes / quantité servie).

5. Croiser avec une épreuve hédonique et les commentaires des convives.

6. Ajuster la recette, la portion ou la présentation, puis mesurer de nouveau.

Exemple – Calcul détaillé : un gratin de légumes avant et après ajustement

Dans un restaurant scolaire, 58 élèves ont laissé 1 856 g de gratin de légumes, soit 1 856 / 58 = **32 g** par élève. Après une dégustation avec la commission menus, la recette est modifiée (légumes moins cuits, fromage gratiné, nom « gratin du potager ») : 58 élèves laissent 1 120 g, soit **19,3 g** par élève (données fictives).

- Baisse des restes : (32,0 − 19,3) / 32,0 = **39,7 %**.

Lecture : l'ajustement a réduit les restes de près de 40 %. Il faut confirmer sur plusieurs services, car les restes varient selon le jour, le menu et la météo.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.56

Un plat de poisson obtient une note moyenne de 3,9 sur 5 à une épreuve de smileys, mais la pesée montre que 45 % du poisson servi est jeté. Proposez trois hypothèses pour expliquer cet écart et une action pour chacune.

Corrigé

1) Portion trop grande pour l'âge : ajuster le grammage à la catégorie de convives. 2) **Contexte du service** différent de la dégustation (poisson servi tiède, sec après le maintien au chaud, temps de repas trop court) : cuire par petites quantités, vérifier le temps disponible pour manger. 3) Les élèves interrogés à la dégustation **ne sont pas représentatifs** (volontaires, déjà amateurs de poisson), ou la note reflète l'effet de la nouveauté : élargir le panel. On peut aussi vérifier la présence d'arêtes, qui fait souvent rejeter le poisson par les enfants.

Faire accepter un plat végétarien : le nom, la présentation, la dégustation

L'introduction d'un menu végétarien en restauration collective (voir la loi EGalim, 11.3.3) se heurte parfois au refus

des convives. Le goût n'est pas seul en cause : le **nom du plat** et sa **présentation** changent aussi le choix. Une étude menée dans un restaurant universitaire de Stanford a comparé plusieurs façons de nommer les mêmes légumes : avec un nom gourmand (« carottes caramélisées au miel et à l'orange »), les légumes ont été choisis par environ 25 % de convives de plus qu'avec un nom simple, et par davantage encore qu'avec un nom qui insiste sur la santé (Turnwald et coll., *JAMA Internal Medicine*, 2017). Ce résultat porte sur un seul restaurant et sur le choix du plat, pas sur la quantité mangée : il demande à être confirmé, mais il donne une piste simple.

Plusieurs leviers peuvent être combinés en restauration collective :

Levier	Exemple
Un nom qui parle du goût	*Exemple :* « Curry doux de pois chiches au lait de coco » plutôt que « plat végétarien »
Une présentation soignée	*Exemple :* Couleurs variées, garniture fraîche, portion généreuse en apparence
Une recette déjà connue, adaptée	*Exemple :* Lasagnes aux lentilles, chili sans viande, hachis parmentier végétal
Une dégustation préalable	*Exemple :* Commission menus, test auprès d'un groupe de convives avec une échelle hédonique
Une information positive	*Exemple :* Affichage du producteur local, des saisons, plutôt que des interdits
Un suivi	*Exemple :* Pesée des restes et ajustement de la recette (11.4.4)

À vous de jouer – Exercice d'application 11.57

Un collège sert chaque semaine un « plat végétarien » que beaucoup d'élèves laissent. Le plat de la semaine est un gratin de légumes et de lentilles. 1) Proposez deux noms plus attractifs. 2) Proposez une organisation de dégustation avec un groupe d'élèves avant de modifier la recette. 3) Citez l'indicateur qui permettra de savoir si les changements ont fonctionné.

Corrigé

1) « Gratin doré lentilles et potiron au fromage fondant » ; « Crumble salé de légumes du marché et lentilles ». 2) Réunir une quinzaine d'élèves volontaires de plusieurs classes ; faire goûter la recette actuelle et une version ajustée (plus de fromage râpé gratiné, potiron rôti, herbes), codées et présentées dans un ordre tiré au sort ; recueillir une note sur une échelle de visages et des descripteurs. 3) Le taux de restes du plat, mesuré par pesée avant et après le changement sur plusieurs services, complété par la part d'élèves qui choisissent le plat si un choix existe.

11.4.5 Le goût, une construction sociale et culturelle

Les préférences ne sont pas seulement biologiques : elles se construisent dans la **famille**, la **culture**, la **classe sociale** (Bourdieu, *La Distinction*, 1979) et les expériences. La préférence innée pour le sucré et le rejet initial de l'amer sont modulés par l'exposition et l'apprentissage. En atelier, cette perspective invite à respecter les goûts, à élargir le répertoire par la découverte et à ne pas imposer une norme gustative (chapitres 3 et 4).

Les goûts, entre biologie, culture et société

Trois auteurs aident à comprendre que le goût ne se réduit pas à la physiologie.

Auteur et ouvrage	Idée principale	Ce que cela change en atelier
Pierre Bourdieu, *La Distinction*, 1979	Les goûts, y compris alimentaires, sont liés à la position sociale : « goût de nécessité » (nourrissant, copieux) dans les milieux populaires, recherche de la légèreté et de la forme dans d'autres milieux	Ne pas juger les préférences ; partir des goûts du groupe ; ne pas imposer les normes d'un milieu
Claude Fischler, *L'Homnivore*, 1990	Le « paradoxe de l'omnivore » : l'être humain a besoin de variété (néophilie) mais se méfie de l'inconnu (néophobie) ; la cuisine et les règles culturelles rendent les aliments nouveaux « mangeables »	Présenter un aliment nouveau dans une recette familière ; associer découverte et sécurité
Jean-Pierre Poulain, *Sociologies de l'alimentation*, 2002	L'« espace social alimentaire » : ce qui est mangeable, la façon de cuisiner, les temps et les lieux des repas, les manières de table varient selon les cultures	Analyser le contexte de vie (temps, lieux, rythmes) autant que les aliments

À vous de jouer – Exercice d'application 11.58

En vous appuyant sur le paradoxe de l'omnivore, expliquez pourquoi il est plus facile de faire goûter du quinoa à un groupe en le servant en « taboulé de quinoa » qu'en « quinoa nature », et proposez un autre exemple.

Corrigé

Le quinoa nature est un aliment **inconnu** : il suscite la méfiance (néophobie). Présenté en taboulé, il prend la place de la semoule dans une recette **familière**, avec des saveurs connues (tomate, menthe, citron) : la nouveauté est rassurante, ce qui satisfait le besoin de variété sans inquiéter. Autre exemple : faire découvrir les lentilles corail dans une **soupe de carottes** veloutée, ou le tofu dans un **riz sauté** aux légumes bien assaisonné.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.4 – Les approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois façons de donner du goût à un plat sans ajouter de sel.
2. Pourquoi un quatre-quarts avec 30 % de sucre en moins n'est-il pas moins énergétique par tranche ?
3. Quelles légumineuses n'ont pas besoin de trempage ?
4. Quel gélifiant d'origine végétale tient à température ambiante ?
5. Quels deux indicateurs associe-t-on pour juger un nouveau plat en restauration collective ?
6. Pourquoi faut-il refroidir rapidement le riz cuit ?

Corrigé – Point d'étape 11.4

1. Herbes et épices, agrumes ou vinaigre, cuissons qui concentrent les saveurs (rôtir, réduire, torréfier).
2. Parce qu'en retirant du sucre, la part relative du beurre augmente ; l'énergie par tranche reste presque la même.
3. Les lentilles et les pois cassés.
4. L'agar-agar, extrait d'algues.
5. Les résultats d'une dégustation (échelle hédonique) et la pesée des restes.
6. Parce que *Bacillus cereus* peut s'y développer et produire des toxines dont certaines résistent à la chaleur.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe au niveau L3 et aux situations professionnelles.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les exemples chiffrés des approfondissements.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 11.4 et je refais les exercices d'application.

11.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La chimie des réactions de Maillard

La réaction débute par la condensation d'un **sucre réducteur** (glucose, fructose, lactose) avec un **groupement amine** (acides aminés, protéines), formant une base de Schiff puis des produits d'Amadori ; leur dégradation produit des centaines de composés aromatiques (pyrazines, furanes) et des pigments bruns (**mélanoïdines**). La réaction est favorisée par la chaleur, une activité de l'eau intermédiaire et un pH neutre à légèrement basique. L'asparagine libre, en présence de sucres réducteurs, peut former de l'**acrylamide**, classé « cancérogène probable pour l'homme » (groupe 2A) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en 1994.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Amidon : gélatinisation, rétrogradation et amidon résistant

L'amidon est constitué d'**amylose** (chaînes linéaires) et d'**amylopectine** (ramifiée). Chauffé dans l'eau, il perd sa structure cristalline et gonfle (gélatinisation) ; au refroidissement, l'amylose se réorganise (**rétrogradation**), formant une fraction d'**amidon résistant** moins digestible, qui se comporte en partie comme une fibre. Les pâtes « al dente » et les légumineuses ont un **index glycémique** plus bas que les féculents très cuits ou en purée : la cuisson et la forme modifient la réponse glycémique (lien BC1).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Statistiques de l'analyse sensorielle

L'essai triangulaire repose sur la **loi binomiale** : avec n dégustateurs et une probabilité de 1/3 de réussite au hasard, on calcule la probabilité d'obtenir au moins k bonnes réponses ; on conclut à une différence si cette probabilité est inférieure au risque choisi (5 %). Exemple : n = 12, k = 8 : $P(X \geq 8) \approx 0{,}019 < 0{,}05$; k = 7 : $P(X \geq 7) \approx 0{,}066 > 0{,}05$. Les épreuves hédoniques sont analysées par comparaison de moyennes (test t apparié si les mêmes personnes notent deux produits) ou par tests non paramétriques (Wilcoxon) pour de petits échantillons.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La perception : seuils et variabilité individuelle

On distingue le **seuil de détection** (concentration à partir de laquelle on perçoit « quelque chose ») et le **seuil de reconnaissance** (on identifie la saveur). Les seuils varient selon les personnes, l'âge (diminution de la sensibilité olfactive avec l'âge), certains médicaments et pathologies, et des facteurs génétiques (sensibilité à l'amertume de certains composés, comme le PROP). Ces différences expliquent en partie les préférences et doivent être prises en compte pour les personnes âgées (assaisonnement, présentation).

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

Pour aller plus loin – niveau L3 – La puissance d'un essai triangulaire

Ne pas trouver de différence significative ne prouve pas qu'il n'y en a pas : un panel trop petit peut passer à côté d'une différence réelle. On appelle **puissance** la probabilité de détecter une différence quand elle existe. Supposons qu'une part réelle de la population perçoive la différence (on note cette part pd) ; les autres répondent au hasard. La probabilité de bonne réponse est alors pd + (1 − pd) / 3. Si 30 % des dégustateurs perçoivent réellement la baisse de sel (pd = 0,3), la probabilité de bonne réponse vaut 0,53. Le calcul binomial donne une puissance d'environ **27 %** avec 12 dégustateurs, **55 %** avec 24 et **92 %** avec 60. Avec un petit panel, on conclut souvent « pas de différence perçue » alors qu'une part du public la perçoit. Les normes recommandent donc de fixer à l'avance le risque accepté de ne pas voir une différence, et d'en déduire le nombre de dégustateurs. En atelier, on présente les résultats d'un petit panel avec prudence.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La loi de Weber et la réduction progressive

Au XIXe siècle, Ernst Heinrich Weber a observé que la plus petite différence perceptible entre deux stimulations est à peu près **proportionnelle** à l'intensité de départ : on perçoit une variation relative, pas une variation absolue. Appliquée au goût, cette idée explique pourquoi

on raisonne en **pourcentage** de réduction (baisser de 10 % le sel d'une soupe) plutôt qu'en grammes. Elle n'est qu'une approximation, moins valable pour les intensités très faibles ou très fortes. Par ailleurs, l'exposition prolongée à un aliment moins salé modifie la préférence elle-même : après quelques semaines d'un régime moins salé, des aliments salés comme avant paraissent souvent trop salés. Les deux mécanismes justifient la stratégie des petits pas.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le plaisir alimentaire change au cours du repas

Le plaisir que l'on prend à manger un aliment n'est pas fixe. Michel Cabanac a montré qu'une même solution sucrée paraît agréable à jeun et beaucoup moins agréable après avoir avalé du glucose : il a appelé ce phénomène **alliesthésie** (Cabanac, *Science*, 1971). Le plaisir dépend donc de l'état interne du mangeur. Quelques années plus tard, Barbara Rolls et ses collègues ont décrit le **rassasiement sensoriel spécifique** : après avoir mangé un aliment, l'agrément de cet aliment diminue davantage que celui des aliments non consommés (Rolls et coll., *Physiology and Behavior*, 1981). C'est pourquoi on trouve encore de la place pour le dessert après un plat copieux. Les mêmes équipes ont montré qu'un repas varié conduit à manger davantage qu'un repas composé d'un seul aliment. Ces travaux ont deux conséquences pratiques. Chez les personnes qui mangent trop peu, comme certaines personnes âgées dénutries, varier les saveurs, les couleurs et les textures au cours du repas peut aider à manger plus. À l'inverse, dans un contexte de surconsommation, une offre très variée d'aliments denses en énergie favorise les excès. La variété est donc un outil, à utiliser selon l'objectif.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Mesurer l'intensité : les échelles et leurs pièges

Les échelles structurées en catégories (de 1 à 9, par exemple) sont simples, mais les dégustateurs évitent souvent les extrémités : c'est l'**effet de tendance centrale**. Les échelles linéaires non structurées (un segment de 10 cm avec deux ancres verbales) donnent des mesures plus fines, mais elles sont plus difficiles pour les enfants et les personnes âgées. Un autre piège est l'**effet de contraste** : un échantillon peu sucré paraît encore moins sucré s'il est goûté juste après un échantillon très sucré. On le limite en variant l'ordre de présentation (plans équilibrés, où chaque échantillon apparaît autant de fois à chaque rang) et en faisant rincer la bouche entre deux échantillons. Ces précautions sont décrites dans les normes d'analyse sensorielle de l'AFNOR et de l'ISO (par exemple la norme NF ISO 6658, lignes directrices générales).

11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Une recette moins salée

Une épicerie solidaire veut proposer une soupe maison moins salée. Le diététicien organise avec les bénévoles un essai triangulaire (soupe habituelle / soupe réduite de 25 % en sel) puis une épreuve hédonique ; la nouvelle recette est adoptée.

Situation bc2 – Introduire un plat végétarien au self

Avant d'inscrire un chili sans viande au menu d'un collège, le diététicien organise une dégustation avec la commission menus : échelle de smileys, commentaires ; la recette est ajustée (épices plus douces, maïs ajouté).

Situation bc1 – Adapter les techniques à une pathologie

Pour un atelier destiné à des patients diabétiques, le diététicien explique l'effet de la cuisson et du refroidissement sur l'amidon (pâtes « al dente », salade de pâtes), en lien avec l'index glycémique.

Situation bc3 – Valoriser les cuisines familiales

Dans un centre social multiculturel, le diététicien propose un cycle « cuisines d'ici et d'ailleurs » : chaque séance, une famille présente une recette ; le groupe discute d'adaptations possibles (moins d'huile, plus de légumes) sans dénaturer le plat.

Situation bc3 – Éducation au goût à l'école

Dans une classe de CE1, le diététicien anime quatre séances sensorielles (vue, odorat, goût, toucher) avec dégustation de légumes sous différentes formes ; il mesure l'évolution du nombre de légumes goûtés.

D'autres situations professionnelles

Situation bc3 – Un marché de producteurs et une dégustation de variétés

Le diététicien d'une communauté de communes organise sur le marché hebdomadaire un stand « Les variétés anciennes de légumes » avec les maraîchers : dégustation de trois variétés de tomates (épreuve de préférence), fiche recette de saison, et calcul du coût d'une portion. Les habitants découvrent des légumes locaux et les producteurs recueillent des avis.

Situation bc2 – Valider une nouvelle recette avec la commission menus

Dans un lycée, la commission menus teste un curry de légumes et de pois chiches. Un essai « juste comme il faut » sur le piquant montre que 40 % des élèves le trouvent trop épicé : la recette est ajustée avant d'être inscrite au plan alimentaire, puis les restes sont pesés pendant trois semaines.

Situation bc1 – Enrichir sans augmenter le volume

Dans un service de soins de suite, le diététicien travaille avec la cuisine des préparations de base enrichies (purées au lait en poudre, potages avec du fromage fondu, crèmes aux œufs) pour des patients dénutris, et vérifie leur acceptabilité par une épreuve hédonique au lit du patient.

Situation bc3 – Un atelier « Science en cuisine » dans un collège

Avec le professeur de physique-chimie, le diététicien anime une séance où les élèves de 4e mesurent la température d'empesage de l'amidon et observent les pigments du chou rouge, puis préparent une soupe liée à la fécule et une salade de chou rouge au vinaigre.

Cas guidé : un atelier pommes et compote dans une ferme pédagogique

Ce cas guidé reprend les étapes du chapitre sur une situation complète : choisir un aliment, le transformer avec une technique adaptée, calculer un coût, faire déguster et analyser les résultats. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis lisez la réponse commentée. La ferme, la classe et les résultats de dégustation sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

La ferme pédagogique fictive « Les Vergers du Plateau » accueille des classes pour une journée. En octobre, elle reçoit une classe de CM1 de 26 enfants de 9 à 10 ans, avec leur enseignante et deux parents accompagnateurs. La ferme cultive quatre variétés de pommes : Golden, Reinette grise du Canada, Gala et Granny Smith. L'enseignante souhaite que les enfants « découvrent que les pommes n'ont pas toutes le même goût » et qu'ils « goûtent un dessert sans sucre ajouté ». La ferme dispose d'une salle d'atelier avec quatre tables, un évier, deux plaques à induction et une grande marmite. La stagiaire de BTS doit concevoir un atelier de 1 h 30 : dégustation comparée des quatre variétés, puis préparation d'une compote sans sucre ajouté, servie au goûter en portions de 100 g. Les pommes coûtent 1,80 € le kilo à la ferme. Un enfant est allergique au kiwi et au latex ; un autre ne mange pas de porc.

Étape 1 – Reformuler le besoin et préciser le public.

Réponse commentée – Étape 1

Besoin reformulé : « Faire découvrir aux enfants la diversité des pommes par les sens, et leur montrer qu'un dessert peut être bon sans sucre ajouté, grâce à une technique simple qu'ils peuvent refaire chez eux. » Public : 26 enfants de 9 à 10 ans. À cet âge, les enfants savent lire des consignes courtes, aiment manipuler et comparer, mais restent souvent attirés par le goût sucré. Ils peuvent utiliser un éplucheur et un couteau à bout rond sous surveillance. Le cadre est une sortie scolaire : le temps est limité et le groupe est nombreux. L'allergie au kiwi et au latex doit être prise au sérieux : il existe des allergies croisées entre le latex et certains fruits (kiwi, banane, avocat, châtaigne). La pomme n'est pas citée dans ce syndrome, mais il faut exclure les gants en latex et vérifier avec la famille et le projet d'accueil individualisé (PAI) s'il en existe un. Le refus du porc ne pose pas de problème ici, car la recette n'en contient pas.

Étape 2 – Rédiger deux ou trois objectifs pédagogiques.

Réponse commentée – Étape 2

1) « À la fin de la dégustation, chaque enfant sait citer au moins deux différences entre deux variétés de pommes, avec un mot du vocabulaire sensoriel (croquant, acide, sucré, juteux, farineux). » 2) « Chaque enfant réalise au moins un geste de la recette (laver, éplucher, couper, mélanger) en respectant les règles d'hygiène. » 3) « Chaque enfant goûte la compote sans sucre ajouté et donne son avis à l'aide d'une échelle de visages. » Ces objectifs sont observables : on peut compter les enfants qui ont réalisé un geste ou cité une différence. Le troisième objectif ne demande pas d'aimer la compote : il demande de la goûter, ce qui est réaliste face à la néophobie (voir la partie sur l'éducation sensorielle).

Étape 3 – Choisir les techniques et les règles de sécurité.

Réponse commentée – Étape 3

Techniques préliminaires : lavage des pommes, épluchage à l'éplucheur, retrait du trognon, découpe en morceaux réguliers (environ 2 cm, proche de la macédoine) pour une cuisson homogène. Cuisson : cuisson par **expansion** dans un fond d'eau, à couvert, à feu doux, pendant 15 à 20 minutes, puis écrasement au presse-purée. La couverture limite l'évaporation et la cuisson courte limite les pertes de vitamine C. Un trait de jus de citron sur les pommes coupées limite le brunissement enzymatique (le pH acide ralentit les polyphénol-oxydases). Sécurité : lavage des mains avant l'atelier, couteaux à bout rond, éplucheurs distribués par un adulte, plaques manipulées uniquement par l'animatrice, enfants éloignés de la marmite chaude. Gants en nitrile et non en latex pour tous, à cause de l'allergie. Refroidissement rapide de la compote dans des bacs peu profonds avant le goûter, puis conservation au froid si le service est différé.

Étape 4 – Calculer les quantités et le coût de la compote.

Réponse commentée – Étape 4

On veut 30 portions de 100 g (26 enfants, 3 adultes et une marge), soit **3 kg de compote finie**. La cuisson fait perdre environ 10 % de masse par évaporation : il faut donc 3 ÷ 0,90 = **3,33 kg de pommes nettes** (épluchées et sans trognon). Le rendement de l'épluchage est de 0,75 : il faut 3,33 ÷ 0,75 = **4,44 kg de pommes brutes**. Coût des pommes : 4,44 × 1,80 = 8,00 €. On ajoute un forfait de 0,50 € pour le citron et la cannelle : total **8,50 €**, soit 8,50 ÷ 30 = **0,28 € par portion**. Une compote du commerce vendue 1,95 € les 4 pots de 100 g revient à 0,49 € la portion. La compote maison coûte donc environ 42 % de moins, sans compter le temps de travail et l'énergie. Il faut le dire au jury : le coût calculé est un coût matière.

Étape 5 – Comparer les apports avec une compote du commerce.

Réponse commentée – Étape 5

La table Ciqual 2025 ne contient pas de « compote maison sans sucre ajouté ». On utilise donc un **proxy** : la pomme bouillie (code 13176), qu'il faut annoncer comme tel. Pour 100 g, on obtient :

Aliment (Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Sucres (g)
Pomme crue, pulpe et peau (13039)	54	10,6
Pomme bouillie, proxy de la compote maison (13176)	54	11,0
Compote de pomme, préemballée (13038)	107	22,6
Compote de pomme allégée en sucres (13151)	64,3	14,3

La compote préemballée apporte 22,6 − 11,0 = **11,6 g de sucres de plus**, soit environ 51 % de sucres en moins pour la compote maison, et 53 kcal de moins par portion. La compote allégée reste plus sucrée que la compote maison. Les sucres de la compote maison sont les sucres naturellement présents dans le fruit. Limite : une compote maison très cuite et très réduite concentre ses sucres ; la valeur dépend donc de la variété et du temps de cuisson.

Étape 6 – Analyser les résultats de la dégustation.

Réponse commentée – Étape 6

Les 26 enfants ont goûté chaque variété et ont choisi un visage, de 5 (très content) à 1 (pas content du tout). Résultats fictifs :

Variété · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 · Moyenne · Visages 4 et 5

Golden — *5 :* 9 ; *4 :* 10 ; *3 :* 4 ; *2 :* 2 ; *1 :* 1 ; *Moyenne :* 3,92 ; *Visages 4 et 5 :* 73,1 %

Reinette grise du Canada — *5 :* 3 ; *4 :* 6 ; *3 :* 8 ; *2 :* 6 ; *1 :* 3 ; *Moyenne :* 3,00 ; *Visages 4 et 5 :* 34,6 %

Gala — *5 :* 12 ; *4 :* 9 ; *3 :* 3 ; *2 :* 1 ; *1 :* 1 ; *Moyenne :* 4,15 ; *Visages 4 et 5 :* 80,8 %

Granny Smith — *5 :* 5 ; *4 :* 6 ; *3 :* 5 ; *2 :* 6 ; *1 :* 4 ; *Moyenne :* 3,08 ; *Visages 4 et 5 :* 42,3 %

Les enfants ont aussi désigné la pomme « la plus croquante » (Granny Smith 11 votes sur 26, soit 42,3 %), « la plus acide » (Granny Smith 17 votes, soit 65,4 %) et « la plus sucrée » (Gala 12 votes, soit 46,2 %). Interprétation : les pommes les plus appréciées sont les plus sucrées (Gala, Golden), ce qui correspond à l'attirance innée pour le goût sucré. La Granny Smith divise le groupe : ses notes sont réparties sur toute l'échelle. Les enfants reconnaissent bien l'acidité, ce qui montre que l'objectif 1 est en bonne voie. Limites : 26 enfants forment un petit groupe, l'ordre de présentation n'a pas été tiré au sort et les enfants voyaient les réponses de leurs voisins. Pour une conclusion plus solide, il faudrait coder les échantillons, varier l'ordre et isoler les réponses.

Étape 7 – Proposer le déroulé de l'atelier.

Réponse commentée – Étape 7

Temps · Activité · Rôle des enfants · Rôle des adultes

0 à 10 min — *Activité :* Accueil, lavage des mains, règles de sécurité ; *Rôle des enfants :* Écoutent, se lavent les mains ; *Rôle des adultes :* La stagiaire explique, un parent surveille l'évier

10 à 30 min — *Activité :* Dégustation des quatre variétés, échelle de visages, vocabulaire ; *Rôle des enfants :* Goûtent, notent, comparent ; *Rôle des adultes :* La stagiaire guide avec le vocabulaire

30 à 55 min — *Activité :* Préparation de la compote par table ; *Rôle des enfants :* Lavent, épluchent, coupent ; *Rôle des adultes :* Un adulte par table, l'animatrice gère la cuisson

55 à 75 min — *Activité :* Cuisson et jeu « devine le fruit » à l'aveugle ; *Rôle des enfants :* Jouent pendant la cuisson ; *Rôle des adultes :* L'animatrice surveille la marmite

75 à 90 min — *Activité :* Goûter de la compote, avis, bilan ; *Rôle des enfants :* Goûtent, donnent leur avis ; *Rôle des adultes :* La stagiaire recueille les avis et conclut

Une solution de secours est prévue : si la cuisson prend du retard, une compote préparée la veille par la ferme est servie, et la compote de l'atelier est donnée à l'enseignante pour le lendemain.

Étape 8 – Évaluer l'atelier et proposer des ajustements.

Réponse commentée – Étape 8

Indicateurs : nombre d'enfants ayant cité au moins deux différences entre deux variétés (objectif 1) ; nombre d'enfants ayant réalisé au moins un geste (objectif 2) ; nombre d'enfants ayant goûté la compote et part de visages 4 et 5 (objectif 3). On peut fixer un seuil, par exemple « au moins 80 % des enfants ». Ajustements possibles : présenter les variétés dans un ordre différent selon les tables ; proposer une compote de Gala et de Granny Smith mélangées, pour montrer que le mélange équilibre le sucré et l'acide sans ajouter de sucre ; remettre aux familles une fiche recette courte avec le coût par portion. Le jury apprécie un candidat qui repère les limites de sa propre dégustation et propose une amélioration chiffrée.

Cas guidé 2 : un atelier dahl de lentilles corail dans un centre social

Ce second cas guidé porte sur les légumineuses, le coût et une épreuve de préférence. Lisez la situation, essayez de répondre, puis lisez la réponse commentée. Le centre social, les prix et les résultats de dégustation sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

Le centre social fictif « La Passerelle » organise chaque mois un atelier cuisine pour des parents. Douze adultes y participent. Beaucoup disent manquer d'argent en fin de mois et acheter peu de légumes secs, car « c'est long à cuire et les enfants n'aiment pas ». Deux participantes proposent de faire découvrir le **dahl de lentilles corail**, un plat qu'elles cuisinent chez elles. La cuisine du centre a quatre plaques, deux grandes casseroles et un mixeur plongeant. La séance dure 2 h 30 et se termine par un repas partagé. À la fin, les enfants et les conjoints rejoignent le groupe : 24 personnes goûtent au total. Une participante suit un régime sans gluten pour une maladie cœliaque.

Recette pour 12 portions : 600 g de lentilles corail sèches, 200 g de lait de coco, 400 g de tomates pelées en conserve avec leur jus, 300 g d'oignons bruts, 375 g de carottes brutes, 20 g d'huile d'olive, 10 g d'ail, 10 g de gingembre frais, 4 g de curcuma, 4 g de cumin, 6 g de sel, environ 1,2 L d'eau. Accompagnement : 60 g de riz basmati cru par personne.

Étape 1 – Reformuler le besoin et fixer un objectif pédagogique.

Réponse commentée – Étape 1

Besoin reformulé : « Montrer aux parents que les légumineuses peuvent être rapides à cuisiner, économiques et appréciées en famille. » Les freins exprimés sont le temps de cuisson et le goût des enfants. Objectif pédagogique : « À la fin de la séance, chaque participant sait cuire des lentilles corail sans trempage, en moins de 25 minutes, et cite un moyen d'adapter le plat au goût de ses enfants. » Le choix d'une recette proposée par des participantes valorise leurs savoirs et facilite l'adhésion du groupe (voir la partie sur la posture interculturelle).

Étape 2 – Expliquer les techniques utilisées.

Réponse commentée – Étape 2

Les lentilles corail sont **décortiquées** : elles n'ont pas besoin de trempage et cuisent en 15 à 20 minutes, comme dans le fil rouge des Tilleuls (11.3.6). On les rince pour enlever la poussière et une partie de l'amidon de surface. On fait d'abord revenir l'oignon, l'ail, le gingembre et les épices dans l'huile : c'est une cuisson par **concentration** qui développe les arômes (réactions de Maillard sur l'oignon, libération des composés aromatiques des épices, qui sont en partie solubles dans les graisses). On ajoute ensuite les carottes, les tomates, les lentilles et l'eau : la suite est une cuisson par **expansion**. Les lentilles se défont et épaississent le plat, sans farine ni crème : c'est une liaison par l'amidon des légumineuses. Le riz basmati est cuit à part (60 g de riz cru donnent environ 140 à 150 g de riz cuit). Le plat ne contient pas de gluten si l'on vérifie l'étiquette des épices et du lait de coco ; on utilise une planche et des ustensiles propres pour éviter tout contact avec du pain.

Étape 3 – Calculer les apports d'une assiette.

Réponse commentée – Étape 3

On calcule les apports de toute la recette avec Ciqual 2025, puis on divise par 12. L'eau n'apporte pas de nutriments : elle ne change pas l'apport par portion, seulement la texture. Le riz est compté pour 150 g cuit (code 9125).

Pour une portion · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Dahl — *Énergie (kcal) :* 239 ; *Protéines (g) :* 15,0 ; *Glucides (g) :* 27,4 ; *Lipides (g) :* 5,6 ; *Fibres (g) :* 9,8 ; *Sel (g) :* 0,56

Riz basmati cuit, 150 g — *Énergie (kcal) :* 222 ; *Protéines (g) :* 4,5 ; *Glucides (g) :* 49,4 ; *Lipides (g) :* 0,6 ; *Fibres (g) :* moins de 0,8 ; *Sel (g) :* 0,07

Assiette complète — *Énergie (kcal) :* 461 ; *Protéines (g) :* 19,6 ; *Glucides (g) :* 76,7 ; *Lipides (g) :* 6,2 ; *Fibres (g) :* environ 10 ; *Sel (g) :* 0,63

Lecture : l'assiette apporte près de 20 g de protéines, surtout végétales, et environ 10 g de fibres, soit un tiers du repère de 30 g par jour (ANSES, 2016). Elle contient peu de sel (0,63 g, à comparer au repère de l'OMS de moins de 5 g par jour). Le dahl apporte aussi 4,3 mg de fer par portion. Ce fer est **non héminique** : il est moins bien absorbé que celui de la viande, mais la vitamine C des tomates et des légumes du repas aide son absorption. Les lipides ne représentent que 12 % de l'énergie de l'assiette : ce n'est pas un défaut pour un plat, car l'équilibre se juge sur la journée.

Étape 4 – Calculer le coût par portion.

Réponse commentée – Étape 4

Prix relevés **fictifs**, octobre 2026 : lentilles corail 3,20 € le kilo, lait de coco 5,25 € le kilo, tomates pelées 1,90 € le kilo, oignons 1,60 € le kilo, carottes 1,40 € le kilo, huile d'olive 9,00 € le kilo, riz basmati 3,10 € le kilo. Les oignons et les carottes sont achetés bruts : leur prix s'applique aux 300 g et 375 g bruts.

Ingrédient	Quantité achetée	Coût (€)
Lentilles corail	600 g	1,92
Lait de coco	200 g	1,05
Tomates pelées	400 g	0,76
Oignons	300 g	0,48
Carottes	375 g	0,52
Huile d'olive	20 g	0,18
Riz basmati	720 g	2,23

Ingrédient	Quantité achetée	Coût (€)
Forfait ail, gingembre, épices, sel	–	0,80
Total		**7,95**

Le coût matière est de 7,95 ÷ 12 = **0,66 € par assiette**. Le poste le plus cher est le riz, devant les lentilles. Pour un message réaliste, on peut dire aux parents qu'un plat complet pour quatre coûte environ 2,65 €, ce qui répond au frein du budget.

Étape 5 – Analyser l'épreuve de préférence.

Réponse commentée – Étape 5

Le groupe a préparé deux versions : la version A, douce, et la version B, avec 2 g de piment en plus. Les 24 convives goûtent les deux, présentées dans un ordre tiré au sort, et répondent à la question « Laquelle préférez-vous ? ». Résultat fictif : **17 préfèrent A** et 7 préfèrent B. Comme on ne savait pas à l'avance quelle version serait préférée, on utilise le seuil **bilatéral**. Pour 24 dégustateurs, il faut au moins **18** réponses identiques au risque de 5 % (tableau des seuils de la partie sur les épreuves discriminatives). Avec 17, la préférence pour A **n'est pas significative** : la probabilité d'obtenir un écart au moins aussi grand par hasard est d'environ 6 %. On peut seulement dire qu'il y a une **tendance** en faveur de la version douce. Une erreur fréquente serait d'écrire « 71 % préfèrent A, donc A est préférée » sans comparer au seuil.

Étape 6 – Proposer des adaptations pour les familles.

Réponse commentée – Étape 6

Adaptations pour les enfants : servir la version douce et proposer le piment à part, à table ; mixer une partie du dahl pour une texture de velouté ; ajouter un peu de lait de coco pour adoucir. Adaptations pour le budget : remplacer une partie du riz basmati par du riz long ordinaire, moins cher. Adaptations pour le temps : préparer une double quantité et congeler la moitié en portions. Adaptation pour la participante cœliaque : le plat convient, à condition de servir du riz et non du pain. Ces adaptations gardent le plat tel que les participantes le connaissent : on ajuste, on ne transforme pas la recette.

Étape 7 – Évaluer la séance.

Réponse commentée – Étape 7

Indicateurs possibles : nombre de participants capables d'expliquer, à la fin, pourquoi les lentilles corail ne demandent pas de trempage ; nombre de participants qui citent une adaptation pour leurs enfants ; part des 24 convives qui reprennent du plat ; et, un mois plus tard, nombre de participants qui disent avoir refait un plat de légumes secs. Ce dernier indicateur mesure un changement de pratique : il demande une question simple posée lors de l'atelier suivant. Il faut rester prudent : une déclaration n'est pas une observation, et le groupe est petit.

Ce que le jury attend sur les techniques culinaires, le choix des aliments et la dégustation

Le jury vérifie que vous savez expliquer une technique par son principe, la relier à la santé et la mettre au service d'un public. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes à l'épreuve E5.

Le jury attend… · Ce qui montre que vous l'avez fait · Ce qui le déçoit

Une technique expliquée par son principe — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* « Cuisson par concentration : la croûte retient les sucs » ; *Ce qui le déçoit :* Une liste de cuissons sans explication

Un lien entre technique et nutriments — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Pertes de vitamines, matières grasses ajoutées, acrylamide, chiffres à l'appui ; *Ce qui le déçoit :* « La vapeur, c'est plus sain », sans preuve

Des données sourcées et datées — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Ciqual 2025, ANSES 2011, EFSA 2015, avec la limite de chaque donnée ; *Ce qui le déçoit :* Des valeurs sans source ou inventées

Un choix d'aliment argumenté — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Critères nutritionnels, économiques, environnementaux, culturels ; *Ce qui le déçoit :* Un choix fondé sur un seul critère

Des calculs justes — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Net, brut, rendement, coût portion, écart en pourcentage ; *Ce qui le déçoit :* Des unités mélangées ou un pourcentage faux

Le respect des cultures — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Une adaptation qui garde le plat et son sens ; *Ce qui le déçoit :* Une recette « corrigée » qui n'a plus rien à voir

Une dégustation rigoureuse — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Épreuve adaptée, échantillons codés, seuil de significativité ; *Ce qui le déçoit :* « Les enfants ont aimé », sans chiffre

Un regard critique — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Limites de l'échantillon, du proxy Ciqual, de la méthode ; *Ce qui le déçoit :* Des conclusions trop générales

Dix questions fréquentes du jury et des pistes de réponse

Question · Piste de réponse

Pourquoi conseillez-vous la cuisson vapeur ? — *Piste de réponse :* Les vitamines hydrosolubles passent moins dans l'eau ; nuancer avec les données Ciqual et la durée de cuisson

Qu'est-ce que l'acrylamide et comment la limiter ? — *Piste de réponse :* Composé formé par la réaction de Maillard au-delà de 120 °C ; frire à 175 °C au plus (règlement européen 2017/2158), viser une couleur dorée, stocker les pommes de terre hors du froid

Comment rendre une sauce moins grasse sans perdre le goût ? — *Piste de réponse :* Liaison à la fécule, réduction, herbes et épices ; calculer l'écart de lipides

Le fait maison est-il toujours moins cher ? — *Piste de réponse :* Souvent pour le coût matière, pas toujours si l'on compte le temps et l'énergie ; préciser quel coût on compare

Comment choisissez-vous entre frais, surgelé et conserve ? — *Piste de réponse :* Saison, prix, praticité, apports, sel des conserves ; le surgelé garde bien les vitamines

Que signifient les signes de qualité ? — *Piste de réponse :* Label Rouge, AOP, IGP, AB : ce qu'ils garantissent et ce qu'ils ne garantissent pas

Comment adapter un plat d'une autre culture ? — *Piste de réponse :* Garder les ingrédients symboliques, ajuster une ou deux variables, demander l'avis des personnes concernées

Pourquoi un test triangulaire ? — *Piste de réponse :* Pour savoir si une différence est perçue ; lire le seuil dans une table binomiale

Comment limiter la néophobie chez l'enfant ? — *Piste de réponse :* Expositions répétées, sans pression, en groupe, avec du plaisir et des manipulations

Comment évaluez-vous une dégustation ? — *Piste de réponse :* Indicateurs chiffrés liés aux objectifs : part de visages 4 et 5, nombre de descripteurs cités

Astuce – Une phrase qui rassure le jury

Pour chaque conseil de technique culinaire, donnez **le principe, le chiffre et la limite**. Par exemple : « La cuisson à couvert réduit la perte de vitamine C (principe), la table Ciqual montre un écart de X mg pour 100 g (chiffre), mais ces valeurs varient selon la durée de cuisson (limite). »

Tableau de synthèse : de la technique au message santé

Ce tableau relie chaque grande technique du chapitre à son principe et à un message que l'on peut donner à un public. Il sert de base de révision avant l'épreuve et de trame pour une animation.

Technique · Principe · Message santé pour le public

Cuisson à la vapeur ou à l'étouffée — *Principe :* Expansion limitée, peu de contact avec l'eau ; *Message santé pour le public :* Cuire peu de temps, à couvert, pour garder la couleur et une partie des vitamines

Cuisson à l'eau — *Principe :* Expansion ; les nutriments hydrosolubles passent dans l'eau ; *Message santé pour le public :* Mettre les légumes dans l'eau déjà bouillante, utiliser le bouillon en soupe

Rôtir, griller, poêler — *Principe :* Concentration ; réaction de Maillard ; *Message santé pour le public :* Saisir sans brûler, éliminer les parties noircies, limiter la matière grasse ajoutée

Friture — *Principe :* Concentration dans un bain d'huile chaud ; *Message santé pour le public :* Frire à 175 °C au plus, viser une couleur dorée, égoutter, en faire un plat occasionnel

Braiser, mijoter — *Principe :* Cuisson mixte, longue et douce ; *Message santé pour le public :* Attendrir les morceaux économiques, dégraisser le jus après refroidissement

Liaisons à la fécule ou par réduction — *Principe :* Empesage de l'amidon, évaporation ; *Message santé pour le public :* Épaissir une sauce sans roux ni crème, ou avec moins de matière grasse

Émulsions — *Principe :* Dispersion d'une phase grasse grâce à un émulsifiant ; *Message santé pour le public :* Doser l'huile à la cuillère, alléger avec du yaourt ou du fromage blanc

Techniques préliminaires (laver, éplucher, couper) — *Principe :* Préparer sans perdre ; *Message santé pour le public :* Laver avant de couper, éplucher finement, couper juste avant la cuisson

Lutte contre le brunissement — *Principe :* Acide, froid, blanchiment ralentissent les enzymes ; *Message santé pour le public :* Citronner les fruits coupés, préparer au dernier moment

Choix des aliments — *Principe :* Critères nutritionnels, économiques, environnementaux, culturels ; *Message santé pour le public :* Préférer les produits de saison, comparer les prix au kilo, lire l'étiquette

Dégustation et éducation sensorielle — *Principe :* Les sens construisent la préférence ; *Message santé pour le public :* Goûter plusieurs fois, sans forcer, et mettre des mots sur ce que l'on ressent

À retenir – Le fil du chapitre

Une technique culinaire se choisit pour un résultat (goût, texture, sécurité), un effet sur les nutriments, un coût et un public. Le diététicien explique le principe, chiffre l'effet avec une source datée et transforme ce savoir en un geste simple, adapté à la culture et aux moyens des personnes.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 11

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. La julienne est une découpe en petits dés de 1 à 2 mm de côté.

2. Une cuisson par concentration commence dans un milieu très chaud pour former une croûte.

3. Le pochage départ à froid d'une viande favorise le passage des sucs dans le liquide.

4. Une béchamel est une sauce mère blanche liée par un roux.

5. L'amidon empèse à partir d'environ 60 à 70 °C selon son origine.

6. La chlorophylle devient vert olive en milieu acide.

7. Couper les légumes en petits morceaux avant une cuisson à l'eau limite les pertes de vitamine C.

8. L'acrylamide se forme surtout dans les aliments riches en amidon cuits au-delà de 120 °C.

9. Un produit Label Rouge est obligatoirement issu de l'agriculture biologique.

10. Le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

11. La flaveur associe le goût, l'odeur perçue par voie rétronasale et les sensations trigéminales.

12. Le test triangulaire sert à mesurer le degré d'appréciation d'un produit.

13. Avec 24 dégustateurs, il faut au moins 13 bonnes réponses à un test triangulaire pour conclure à une différence au risque de 5 %.

14. La néophobie alimentaire est souvent maximale entre 2 et 6 ans.

15. Les échantillons d'une dégustation sont codés par trois chiffres tirés au hasard.

Corrigé – Quinze vrai-faux

1. Faux : la julienne est une découpe en bâtonnets fins ; les petits dés de 1 à 2 mm forment la brunoise.

2. Vrai : la croûte limite la sortie des sucs et développe les arômes par la réaction de Maillard.

3. Vrai : c'est une cuisson par expansion, utile pour un bouillon savoureux.

4. Vrai : le roux blanc associe beurre et farine, puis on ajoute le lait.

5. Vrai : les grains d'amidon gonflent et la préparation épaissit.

6. Vrai : le magnésium est remplacé par des ions hydrogène et la phéophytine donne une teinte vert olive.

7. Faux : de petits morceaux augmentent la surface

d'échange avec l'eau et donc les pertes.

8. **Vrai** : elle provient de la réaction entre l'asparagine et les sucres réducteurs.
9. **Faux** : le Label Rouge garantit une qualité supérieure, pas un mode de production biologique.
10. **Vrai** : l'inscription date de 2010.
11. **Vrai** : la flaveur est une perception globale.
12. **Faux** : il sert à savoir si une différence est perçue ; l'appréciation se mesure par une épreuve hédonique.
13. **Vrai** : le seuil binomial, calculé avec une probabilité de 1 sur 3, est de 13 bonnes réponses sur 24.
14. **Vrai** : elle diminue ensuite avec les expositions répétées.
15. **Vrai** : ce codage évite d'influencer les dégustateurs.

Les erreurs fréquentes à l'écrit E5

Erreur · Pourquoi elle coûte des points · Ce qu'il faut écrire
Confondre concentration et expansion — *Pourquoi elle coûte des points :* Le principe de la cuisson est faux ; *Ce qu'il faut écrire :* Nommer le mode, puis expliquer ce qu'il devient des sucs
Dire « la vapeur garde toutes les vitamines » — *Pourquoi elle coûte des points :* Affirmation absolue et fausse ; *Ce qu'il faut écrire :* Une cuisson courte, avec peu d'eau, limite les pertes
Oublier le rendement dans un calcul de coût — *Pourquoi elle coûte des points :* La quantité achetée est sous-estimée ; *Ce qu'il faut écrire :* Brut = net ÷ rendement, puis coût = brut × prix
Comparer des valeurs Ciqual de catégories différentes — *Pourquoi elle coûte des points :* La comparaison n'a pas de sens ; *Ce qu'il faut écrire :* Comparer des aliments comparables et signaler les proxys
Lire un tiret Ciqual comme une valeur nulle — *Pourquoi elle coûte des points :* Le calcul est faux ; *Ce qu'il faut écrire :* Un tiret signifie une valeur manquante : changer d'aliment ou le dire
Conclure à une différence sans seuil — *Pourquoi elle coûte des points :* La conclusion n'est pas démontrée ; *Ce qu'il faut écrire :* Comparer le nombre de bonnes réponses au seuil binomial
Proposer une adaptation culturelle qui supprime le plat — *Pourquoi elle coûte des points :* Le public ne se sent pas respecté ; *Ce qu'il faut écrire :* Garder le plat, ajuster une ou deux variables
Utiliser un vocabulaire flou en dégustation — *Pourquoi elle coûte des points :* L'analyse n'est pas exploitable ; *Ce qu'il faut écrire :* Employer des descripteurs précis et une échelle

Astuce – La méthode en quatre temps pour une question de technique culinaire

1) **Nommer** la technique et son mode (concentration, expansion, mixte). 2) **Expliquer** ce qui se passe dans l'aliment (amidon, protéines, pigments, vitamines). 3) **Chiffrer** l'effet avec une donnée sourcée et datée. 4) **Conseiller** le public, avec un geste simple et réaliste.

11.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Techniques et physico-chimie

- **Tailles** : julienne, brunoise, paysanne, macédoine, jardinière, mirepoix ; régularité = cuisson homogène ; sécurité de la découpe (« griffe »).
- **Cuissons** : concentration (rôtir, griller, sauter, frire), expansion (départ à froid, bouillir, pocher), mixte (braiser, ragoût) ; vapeur, étuvée, papillote : cuissons douces.
- **Bases** : fonds, liaisons (roux, fécule, œuf), sauces mères, émulsions, pâtes, appareils.
- **Repères** : empesage de l'amidon ≈ 60-80 °C ; coagulation du blanc d'œuf ≈ 62-65 °C ; Maillard intense ≈ 140-180 °C ; caramélisation ≈ 160 °C ; point de fumée des huiles ≈ 170-230 °C.
- **Nutriments** : vitamines hydrosolubles sensibles à la chaleur, à l'eau, à l'air, à la lumière ; gestes : laver avant de couper, peu d'eau, cuisson courte, réutiliser l'eau de cuisson.
- **Acrylamide** : cuisson dorée et non brune ; règlement (UE) 2017/2158.

À retenir – Choix des aliments, culture et dégustation

- **Portions** : fruits et légumes ≈ 80-100 g ; raisonner par portion et par 10 g de protéines (lentilles ≈ 4 fois moins chères que la viande hachée dans l'exemple).
- **Qualité** : saison, signes officiels (AOP, IGP, STG, Label Rouge, AB), commerce équitable (loi de 2005 modifiée en 2014), impact environnemental (Agribalyse) ; EGalim 50 % dont 20 % bio en restauration collective.
- **Culture** : repas gastronomique des Français (UNESCO, 2010) ; diète méditerranéenne, couscous (2020) ; valoriser les cuisines des participants.
- **Dégustation** : vue, odorat (orthonasal, rétronasal), goût (5 saveurs dont umami), toucher, ouïe ; flaveur.
- **Épreuves** : discriminatives (triangulaire : 8/12 bonnes réponses au minimum), descriptives (profil), hédoniques (échelle à 9 points, smileys).
- **Néophobie** : exposition répétée sans pression, manipulation, modèle, vocabulaire descriptif.

11.8 Entraînement

11.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La brunoise est :

a) une taille en très petits dés **b)** une taille en bâtonnets fins **c)** souvent obtenue à partir d'une julienne **d)** une sauce brune

QCM 2 – Sont des cuissons par concentration :

a) rôtir **b)** pocher départ à froid **c)** griller **d)** sauter

QCM 3 – Le pot-au-feu est cuit :

a) par concentration **b)** par expansion **c)** en partant de l'eau froide **d)** au four à 220 °C

QCM 4 – Braiser consiste à :

a) colorer puis cuire lentement à couvert avec peu de liquide **b)** cuire à la vapeur **c)** frire **d)** réaliser une cuisson mixte

QCM 5 – L'empesage de l'amidon :

a) nécessite de l'eau et de la chaleur **b)** épaissit une sauce **c)** se produit vers 60 à 80 °C **d)** est une réaction de Maillard

QCM 6 – Les réactions de Maillard :

a) associent sucres réducteurs et acides aminés **b)** donnent une coloration brune et des arômes de grillé **c)** se produisent surtout dans l'eau bouillante **d)** peuvent former de l'acrylamide dans les aliments riches en amidon

QCM 7 – Pour préserver la vitamine C des légumes :

a) on les coupe longtemps à l'avance **b)** on les cuit à la vapeur ou dans peu d'eau **c)** on les laisse tremper dans l'eau **d)** on réutilise l'eau de cuisson

QCM 8 – La chlorophylle des légumes verts :

a) vire au vert olive en milieu acide ou en cuisson longue **b)** est bleue en milieu basique **c)** se conserve mieux avec une cuisson courte **d)** est un caroténoïde

QCM 9 – Le brunissement d'une pomme coupée :

a) est enzymatique **b)** est limité par le citron **c)** est une caramélisation **d)** est limité par la cuisson

QCM 10 – Une mayonnaise :

a) est une émulsion **b)** contient un émulsifiant apporté par le jaune d'œuf **c)** se réussit avec des ingrédients à même température **d)** est une sauce mère à base de roux

QCM 11 – Une portion de fruits ou légumes selon le PNNS correspond environ à :

a) 20 à 30 g **b)** 80 à 100 g **c)** 200 à 250 g **d)** une pomme moyenne

QCM 12 – Sont des signes officiels de qualité et d'origine :

a) AOP **b)** Label Rouge **c)** « produit fermier » sans cahier des charges **d)** IGP

QCM 13 – Le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en :

a) 2005 **b)** 2010 **c)** 2015 **d)** 2020

QCM 14 – Les cinq saveurs sont :

a) sucré, salé, acide, amer, umami **b)** sucré, salé, piquant, amer, gras **c)** toutes perçues sur l'ensemble des zones de la langue portant des bourgeons gustatifs **d)** perçues uniquement par le nez

QCM 15 – Les arômes perçus en bouche le sont par :

a) la voie rétronasale **b)** la langue seule **c)** l'odorat **d)** l'ouïe

QCM 16 – L'essai triangulaire :

a) est une épreuve discriminative **b)** présente trois échantillons dont deux identiques **c)** mesure le plaisir **d)** donne 1 chance sur 3 de réussir au hasard

QCM 17 – Avec 12 dégustateurs, une différence est significative (risque 5 %) dans un essai triangulaire à partir de :

a) 4 bonnes réponses **b)** 6 bonnes réponses **c)** 8 bonnes réponses **d)** 12 bonnes réponses

QCM 18 – Les échantillons d'une dégustation sont :

a) codés par 3 chiffres au hasard **b)** servis à la même température **c)** présentés toujours dans le même ordre **d)** en quantité identique

QCM 19 – Face à la néophobie d'un enfant, on :

a) oblige à finir l'assiette **b)** propose l'aliment plusieurs fois sous des formes variées **c)** fait manipuler et cuisiner l'aliment **d)** récompense par un dessert

QCM 20 – Pour limiter l'acrylamide :

a) on cuit jusqu'à une couleur dorée et non brune **b)** on stocke les pommes de terre au réfrigérateur **c)** on fait tremper les frites crues **d)** on augmente la température de friture

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. **a, c**. 2. **a, c, d**. 3. **b, c**. 4. **a, d**. 5. **a, b, c**. 6. **a, b, d**. 7. **b, d**. 8. **a, c**. 9. **a, b, d**. 10. **a, b, c**. 11. **b, d**. 12. **a, b, d**. 13. **b**. 14. **a, c**.

15. **a, c**. 16. **a, b, d**. 17. **c**. 18. **a, b, d** (l'ordre varie). 19. **b, c**. 20. **a, c**.

11.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les principes de cuisson




Figure 11.6 – Schéma à légender

Nommez les principes 1 à 3 et donnez, dans les cadres 4 à 6, deux exemples de cuisson pour chacun.

Corrigé

1. Concentration → 4 : rôtir, griller (sauter, frire). 2. **Expansion** → 5 : pocher départ à froid, bouillir (pot-au-feu, légumes secs). 3. **Mixte** → 6 : braiser, ragoût (sauté en sauce).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les températures repères




Figure 11.7 – Schéma à légender

Identifiez les phénomènes 1 à 6 et leurs températures approximatives.

Corrigé

1. Empesage de l'amidon (≈ 60-80 °C). 2. **Coagulation de l'œuf** (blanc ≈ 62-65 °C ; jaune ≈ 65-70 °C). 3. **Ébullition de l'eau** (100 °C). 4. **Réactions de Maillard** intenses (≈ 140-180 °C). 5. **Caramélisation** du saccharose (≈ 160 °C et plus). 6. **Point de fumée** de la plupart des huiles (≈ 170-230 °C).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : les tailles



Figure 11.8 – Schéma à légender

Nommez les tailles 1 à 6 (même ordre que la figure 11.1) et proposez un usage pour chacune.

Corrigé

1. Julienne (salade de carottes, bouillon). 2. **Brunoise** (garniture de potage, farce). 3. **Paysanne** (potage, poêlée). 4. **Macédoine** (salade composée). 5. **Jardinière** (garniture de légumes). 6. **Mirepoix** (fond, braisé).

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : les sens de la dégustation




Figure 11.9 – Schéma à légender

Nommez les sens 1 à 5 (même disposition que la figure 11.4) et proposez une question à poser aux participants pour chacun lors d'une dégustation de compote.

Corrigé

1. Vue : « De quelle couleur est-elle ? Est-elle homogène ? » 2. **Odorat** : « Que sentez-vous ? Fruité, épicé ? » 3. **Goût** : « Est-elle sucrée, acide ? » 4. **Toucher en bouche** : « Est-elle lisse, granuleuse, épaisse ? Chaude ou froide ? » 5. **Ouïe** : « Entendez-vous quelque chose en mangeant ? » (peu pour une compote : on peut ajouter un crumble croquant).

À vous de jouer – Exercice 5 – Coût par portion et par protéines

Comparez pois chiches en conserve (2,60 €/kg égouttés, 120 g par portion, environ 7 g de protéines pour 100 g) et blanc de poulet (12,50 €/kg, 100 g par portion, environ 23 g de protéines pour 100 g) : coût par portion et pour 10 g de protéines (données fictives et arrondies).

Corrigé

Pois chiches : 0,120 × 2,60 = **0,312 €** ; protéines 120 × 0,07 = **8,4 g** ; pour 10 g : 0,312 / 8,4 × 10 = **0,37 €**. Poulet : 0,100 × 12,50 = **1,25 €** ; protéines **23 g** ; pour 10 g : 1,25 / 23 × 10 = **0,54 €**. Le poulet coûte 0,54 / 0,37 = **1,5 fois** plus cher par 10 g de protéines, et 4 fois plus par portion.

À vous de jouer – Exercice 6 – Essai triangulaire

Un panel de 15 dégustateurs compare une compote avec et sans sucre ajouté ; 10 trouvent l'intrus. Avec 15 dégustateurs, la table donne 9 bonnes réponses minimum au risque de 5 %. Concluez et proposez la suite.

Corrigé

Réponses attendues au hasard : 15 / 3 = **5**. 10 ≥ 9 : la différence est **significative** : le panel perçoit l'absence de sucre ajouté. Suite : épreuve hédonique pour savoir si la version sans sucre est moins appréciée ; ajustements possibles (fruits plus mûrs, cannelle, vanille, réduction progressive).

11.8.3 Questions de réflexion

Mise en situation – Réflexion 1

Pourquoi présenter les températures de cuisson comme des « ordres de grandeur » ?

Corrigé

Parce qu'elles dépendent de la composition de l'aliment, de sa teneur en eau, du pH, de la durée de chauffage et de la méthode de mesure ; donner une valeur unique et précise serait inexact. L'important est de comprendre les phénomènes et d'en tirer des gestes.

Mise en situation – Réflexion 2

Un participant affirme : « Les légumes surgelés n'ont plus de vitamines. » Que répondez-vous ?

Corrigé

Les légumes surgelés sont blanchis puis congelés rapidement après la récolte : ils conservent une bonne partie de leurs vitamines, parfois davantage qu'un légume frais stocké plusieurs jours. Ils sont pratiques, sans épluchage et sans gaspillage ; on les choisit nature, sans sauce ajoutée.

Mise en situation – Réflexion 3

Faut-il bannir les fritures en atelier ?

Corrigé

Non nécessairement : il s'agit de montrer des alternatives (four, poêle avec peu de matière grasse) et, si une friture est réalisée, de le faire en sécurité (bain d'huile surveillé, température contrôlée, couleur dorée) et ponctuellement. Le discours reste non moralisateur ; la sécurité (brûlures) prime en atelier.

11.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Faire aimer les légumes à l'accueil périscolaire

Un accueil périscolaire (30 enfants de 6 à 10 ans) constate que les légumes sont très peu consommés au goûter et à la cantine. Le diététicien propose un cycle de 4 séances d'éducation sensorielle. Lors de la première séance, 30 enfants notent une soupe de potiron avec une échelle de 3 smileys : 9 « j'aime », 12 « moyen », 9 « je n'aime pas ». Après 4 séances (soupe proposée sous différentes formes), sur 28 enfants présents : 16 « j'aime », 8 « moyen », 4 « je n'aime pas ».

1. Expliquez la néophobie alimentaire et les leviers d'éducation sensorielle. (4 points)
2. Calculez les pourcentages avant et après et l'évolution en points de la part de « j'aime ». (4 points)
3. Proposez le contenu des 4 séances (sens travaillés, activités, préparations). (6 points)
4. Proposez trois formes de préparation du potiron et expliquez l'intérêt de varier les formes. (3 points)
5. Indiquez deux limites de l'évaluation. (3 points)

Corrigé

1. Réticence à goûter des aliments nouveaux, fréquente chez l'enfant ; leviers : exposition répétée, absence de pression, manipulation, modèle, vocabulaire descriptif, associations.
2. Avant : 9 / 30 = **30 %** « j'aime » ; 12 / 30 = **40 %** « moyen » ; 9 / 30 = **30 %** « je n'aime pas ». Après : 16 / 28 = **57,1 %** ; 8 / 28 = **28,6 %** ; 4 / 28 = **14,3 %**. « J'aime » : + **27,1 points**.
3. Séance 1 : la vue et le toucher (légumes entiers, couleurs, textures), soupe de potiron. Séance 2 : l'odorat (boîtes à odeurs d'épices et d'herbes), potiron rôti à la cannelle. Séance 3 : le goût (5 saveurs, jeux), purée potiron-pomme. Séance 4 : l'ouïe et la texture (croquant, fondant), chips de potiron au four et muffins au potiron préparés par les enfants.
4. Soupe veloutée, potiron rôti en cubes, muffins ou purée : varier les formes multiplie les **expositions** sans lassitude, permet de trouver une forme appréciée et montre que l'aliment peut être sucré ou salé.
5. Effectifs différents (30 puis 28, enfants absents) : comparer les réponses appariées ; effet de groupe et désirabilité (les enfants imitent leurs camarades) ; pas de groupe de comparaison ; appréciation en séance ≠ consommation à la cantine.

11.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Pourquoi avez-vous fait cuire les haricots verts sans couvercle puis les avez refroidis ? »

Corrigé

Pour fixer la couleur verte : une cuisson courte, à grande eau bouillante, sans couvercle au début (les acides volatils s'échappent), puis un refroidissement rapide limitent la transformation de la chlorophylle en pigments vert olive ; la cuisson courte limite aussi les pertes de vitamines.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Comment avez-vous évalué la qualité organoleptique de votre préparation ? »

Corrigé

Par une dégustation structurée : aspect, odeur, goût, texture, avec un vocabulaire descriptif, puis une appréciation hédonique des participants ; j'ai comparé au résultat attendu et proposé un ajustement (assaisonnement, texture).

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Pourquoi votre crumble est-il plus économique que des biscuits ? »

Corrigé

Il est préparé à partir de produits bruts (pommes de saison, farine, flocons, beurre, sucre) : environ 0,60 € la portion dans mon calcul ; il contient un fruit, moins d'emballages, et je maîtrise la quantité de sucre.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Que savez-vous de la réaction de Maillard ? »

Corrigé

C'est une réaction entre des sucres réducteurs et des acides aminés, favorisée par la chaleur sèche (environ 140 à 180 °C), qui donne couleur brune et arômes de grillé ; dans les aliments riches en amidon, elle peut former de l'acrylamide : on cuit jusqu'à une couleur dorée.

11.9 Glossaire

Terme · Définition

Acrylamide — *Définition :* Composé formé à haute température dans les aliments riches en amidon (asparagine + sucres réducteurs)

Agar-agar — *Définition :* Gélifiant d'origine algale

Analyse sensorielle — *Définition :* Examen des propriétés d'un produit par les sens, selon des méthodes normalisées

Anthocyanes — *Définition :* Pigments rouges à bleus dont la couleur varie avec le pH

Appareil — *Définition :* Mélange de base prêt à cuire (appareil à crème prise, à quiche)

Arôme — *Définition :* Odeur perçue par voie rétronasale en bouche

Braiser — *Définition :* Colorer puis cuire lentement à couvert avec peu de liquide

Brunoise — *Définition :* Taille en très petits dés

Brunissement enzymatique — *Définition :* Oxydation des polyphénols d'un végétal coupé par des enzymes

Caramélisation — *Définition :* Transformation des sucres par la chaleur

Caroténoïdes — *Définition :* Pigments orangés liposolubles, stables à la cuisson

Chlorophylle — *Définition :* Pigment vert, altéré en milieu acide et par une cuisson longue

Coagulation — *Définition :* Prise des protéines dénaturées (œuf, viande)

Cuisson par concentration — *Définition :* Saisie en surface, sucs retenus

Cuisson par expansion — *Définition :* Échanges avec le liquide de cuisson, départ à froid

Cuisson mixte — *Définition :* Coloration puis cuisson lente en milieu liquide

Dénaturation — *Définition :* Modification de la structure d'une protéine (chaleur, acide, agitation)

Dextrinisation — *Définition :* Dégradation de l'amidon par chaleur sèche

Duo-trio — *Définition :* Épreuve discriminative : retrouver l'échantillon identique à la référence

Échelle hédonique — *Définition :* Échelle de mesure de l'appréciation

Émulsion — *Définition :* Dispersion stable de gouttelettes d'un liquide dans un autre

Empesage — *Définition :* Gonflement de l'amidon dans l'eau chaude (gélatinisation)

Essai triangulaire — *Définition :* Trois échantillons dont deux identiques : trouver l'intrus

Étuver — *Définition :* Cuire à couvert dans l'eau de végétation

Fait maison — *Définition :* Plat élaboré sur place à partir de produits crus (décret n° 2015-505 en restauration)

Flaveur — *Définition :* Ensemble des sensations olfactives, gustatives et trigéminales en bouche

Jardinière — *Définition :* Taille en bâtonnets d'environ 4 mm

Julienne — *Définition :* Taille en bâtonnets très fins

Liaison — *Définition :* Technique d'épaississement (roux, fécule, œuf)

Macédoine — *Définition :* Taille en dés d'environ 4 à 5 mm

Maillard (réactions de) — *Définition :* Réactions entre sucres réducteurs et acides aminés : brunissement, arômes

Mirepoix — *Définition :* Gros dés de légumes aromatiques

Néophobie alimentaire — *Définition :* Réticence à goûter des aliments nouveaux

Paysanne — *Définition :* Fines tranches régulières

Point de fumée — *Définition :* Température de dégradation visible d'une matière grasse

Profil sensoriel — *Définition :* Description de l'intensité des caractéristiques d'un produit

Rétrogradation — *Définition :* Réorganisation de l'amidon au refroidissement

Roux — *Définition :* Liaison de beurre et de farine cuits

Saveur — *Définition :* Sensation perçue par la langue : sucré, salé, acide, amer, umami

Signe officiel de qualité — *Définition :* AOP, IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique

Synérèse — *Définition :* Expulsion d'eau d'un gel ou d'un appareil trop cuit

Trigéminal — *Définition :* Relatif aux sensations de piquant, fraîcheur, pétillant

Umami — *Définition :* Cinquième saveur, associée au glutamate

11.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion · Références

Techniques culinaires — *Références :* [1] Ferrandi ; [2] Escoffier

Physico-chimie — *Références :* [3] This ; [4] McGee ; [5] Cheftel

Composition, vitamines — *Références :* [6] ANSES, Ciqual

Acrylamide — *Références :* [7] Règlement (UE) 2017/2158 ; [8] CIRC

Portions, repères — *Références :* [9] Santé publique France ; [10] GEM-RCN

Qualité, équité, environnement — *Références :* [11] Décret fait maison ; [12] Loi 2005-882 ; [13] Agribalyse ; [14] Loi EGalim ; [15] INAO

Culture culinaire — *Références :* [16] UNESCO

Analyse sensorielle — *Références :* [17] ISO 4120 ; [18] ISO 5492 ; [19] ISO 8589 ; [20] Peryam et Pilgrim ; [21] Depledt

Éducation sensorielle — *Références :* [22] Puisais ; [23] Birch et Marlin ; [24] Rigal

Goût et société — *Références :* [25] Bourdieu

11.12 Bibliographie numérotée

1. École Ferrandi Paris. *Le grand cours de cuisine Ferrandi*. Paris, Hachette Pratique, 2014.

2. Escoffier A. *Le Guide culinaire*. Paris, 1903 (rééditions Flammarion).

3. This H. *Les secrets de la casserole*. Paris, Belin, 1993.

4. McGee H. *On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen*. New York, Scribner, éd. révisée 2004.

5. Cheftel J.-C., Cheftel H. *Introduction à la biochimie et à la technologie des aliments*. Paris, Lavoisier Tec & Doc.

6. ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*, *ciqual.anses.fr*.

7. Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires.

8. Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). *Monographies*, vol. 60, 1994 (acrylamide, groupe 2A).

9. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. 2019 ; *mangerbouger.fr*.

10. GEM-RCN. *Recommandation nutrition*, version 2.0, juillet 2015.

11. Décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 portant diverses dispositions relatives aux mentions et marques signalant les plats « faits maison ».

12. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, article 60 (commerce équitable), modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

13. ADEME, INRAE. *Agribalyse*, base de données d'impacts environnementaux des produits alimentaires, *agribalyse.ademe.fr*.

14. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim).

15. Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Les signes officiels de la qualité et de l'origine, *inao.gouv.fr*.

16. UNESCO. Listes du patrimoine culturel immatériel (repas gastronomique des Français, 2010 ; diète méditerranéenne, 2010-2013 ; couscous, 2020), *ich.unesco.org*.

17. ISO 4120. *Analyse sensorielle – Méthodologie – Essai triangulaire*.

18. ISO 5492. *Analyse sensorielle – Vocabulaire*.

19. ISO 8589. *Analyse sensorielle – Directives générales pour la conception de locaux destinés à l'analyse*.

20. Peryam D. R., Pilgrim F. J. « Hedonic scale method of measuring food preferences ». *Food Technology*, 1957, 11, p. 9-14.

21. Depledt F. (coord.), Société scientifique d'hygiène alimentaire. *Évaluation sensorielle : manuel méthodologique*. Paris, Lavoisier Tec & Doc, 3e éd., 2009.

22. Puisais J., Pierre C. *Le goût et l'enfant*. Paris, Flammarion, 1987.

23. Birch L. L., Marlin D. W. « I don't like it; I never tried it: effects of exposure on two-year-old children's food preferences ». *Appetite*, 1982, 3 (4), p. 353-360.

24. Rigal N. *La naissance du goût : comment donner aux enfants le plaisir de manger*. Paris, Noésis, 2000.

25. Bourdieu P. *La Distinction : critique sociale du jugement*. Paris, Éditions de Minuit, 1979.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 11.2.2)

26. CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.