Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 16

FICHE DE SYNTHÈSE · FACT SHEET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Épidémiologie nutritionnelle

Nutritional epidemiology

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 16

Fiche de synthèse · Fact sheet

Fiche de révision et fiches-outils – Chapitre 16

Épidémiologie nutritionnelle

Nutritional epidemiology

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume fiche de révision et fiches-outils

Chapitre 16

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Types d'études; Prévalence, incidence; RR, OR; Biais; Statistiques; Niveaux de preuve

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir l'épidémiologie et ses grandes branches (descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle) et en citer quelques repères historiques ; reconnaître le type d'une étude (transversale, cohorte, cas-témoins, essai) et en indiquer les atouts et les limites ; calculer et interpréter une prévalence, une incidence cumulée, un taux d'incidence ; construire un tableau de contingence et calculer un risque relatif, un rapport des cotes, une différence de risques ; identifier les principaux biais (sélection, mesure, classement, confusion) et proposer des moyens de les limiter ; calculer et interpréter une moyenne, une médiane, un écart-type, des percentiles et un intervalle de confiance simple.

Contenu. 1. Les études ; 2. Les calculs ; 3. Interpréter ; 4. Les pièges ; O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs ; O16.2 – Grille d'identification d'une étude ; O16.3 – Calcul d'un IC 95 %.

Conclusion. La fiche rassemble l'essentiel du chapitre et ses outils pour réviser vite.

ABSTRACT

Nutritional epidemiology. This fact sheet belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ définir l'épidémiologie et ses grandes branches (descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle) et en citer quelques repères historiques ;

■ reconnaître le type d'une étude (transversale, cohorte, cas-témoins, essai) et en indiquer les atouts et les limites ;

■ calculer et interpréter une prévalence, une incidence cumulée, un taux d'incidence ;

■ construire un tableau de contingence et calculer un risque relatif, un rapport des cotes, une différence de risques ;

■ identifier les principaux biais (sélection, mesure, classement, confusion) et proposer des moyens de les limiter ;


Sommaire

Fiche de révision du chapitre 16 4
1. Les études 4
2. Les calculs 4
3. Interpréter 4
4. Les pièges 4

Fiches-outils du chapitre 16 5
O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs 5
O16.2 – Grille d'identification d'une étude 5
O16.3 – Calcul d'un IC 95 % 5

Fiche de révision du chapitre 16

Épidémiologie nutritionnelle



Carte mentale du chapitre 16

1. Les études

Type · À retenir
Transversale — *À retenir :* Un instant ; prévalence ; pas de chronologie
Cas-témoins — *À retenir :* Malades / non-malades ; exposition passée ; OR ; biais de mémoire
Cohorte — *À retenir :* Suivi d'exposés / non-exposés ; incidence ; RR ; longue
Essai randomisé — *À retenir :* Tirage au sort ; causalité ; niveau 1
Écologique — *À retenir :* Populations ; hypothèses ; erreur écologique

2. Les calculs

Prévalence = cas existants / population. Incidence cumulée = nouveaux cas / population à risque. RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]. OR = (a × d) / (b × c). IC 95 % d'une proportion = p ± 1,96 × √(p (1 − p) / n). Sensibilité = VP / malades ; spécificité = VN / non-malades.

3. Interpréter

Biais : sélection, mesure, mémoire, classement, confusion. Médiane si asymétrie. Significatif ≠ important. Temporalité indispensable (Bradford Hill, 1965). HAS 2013 : niveaux 1 à 4, grades A, B, C, AE.

4. Les pièges

Attention

- Confondre prévalence et incidence.
- Calculer un RR dans une étude cas-témoins.
- Conclure à une causalité à partir d'une étude transversale.
- Présenter un pourcentage sur 31 personnes comme une prévalence du quartier.
- Oublier le groupe témoin dans une évaluation.

Fiches-outils du chapitre 16

Outil · Intitulé · Utilité

O16.1 — *Intitulé :* Tableau 2 × 2 et calculs ; *Utilité :* RR, OR, différence de risques
O16.2 — *Intitulé :* Grille d'identification d'une étude ; *Utilité :* Type, population, mesure, biais, niveau de preuve
O16.3 — *Intitulé :* Fiche de calcul d'un IC 95 % ; *Utilité :* Proportion et moyenne

O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs

	Malades	Non malades	Total
Exposés	a =	b =	
Non exposés	c =	d =	
Total			N =

Calcul	Résultat et interprétation
R1 = a / (a + b)	
R0 = c / (c + d)	
RR = R1 / R0	
Différence R1 − R0	
OR = (a × d) / (b × c)	

O16.2 – Grille d'identification d'une étude

Rubrique	À compléter
Question posée	
Population, échantillon, recrutement	
Type d'étude	
Exposition et critère de jugement	
Mesure produite (prévalence, RR, OR…) et IC	
Biais possibles	
Facteurs de confusion pris en compte	
Niveau de preuve (HAS)	

O16.3 – Calcul d'un IC 95 %

Étape	Valeur
Proportion p ou moyenne m	
Effectif n (et écart-type s)	
Erreur standard : √(p (1 − p) / n) ou s / √n	
Marge = 1,96 × erreur standard	
IC 95 % = estimation ± marge	
Interprétation	