Les schémas du chapitre 16 – version à légender

Même feuille, sans les légendes : entraînez-vous à tout remplir de mémoire, puis comparez avec la version corrigée.

1. Les quatre branches de l'épidémiologie (16.3.1 ; corrections CNED)

Classez : « Qui est touché ? » ; « Le programme a-t-il marché ? ».

2. Les sources de données en France (16.3.1)

Source	Ce qu'elle mesure	Vigilance

Quelle source pour les hospitalisations pour dénutrition d'un département ?

3. Repères historiques (16.3.1)

1.
2.
3.
4.
5.

Quelle étude a fondé l'épidémiologie de terrain ?

4. Enquêter sur une TIAC (16.3.1 ; cas guidé 1)

Calculez le taux d'attaque : 30 malades sur 75 convives.

5. Les principaux types d'études (16.3.2, figure 16.1 ; exercice 1 (figure 16.6))

Type	Principe	Mesure produite


Nommez les études 1 à 5 et leur mesure.

6. Reconnaître une étude en quatre questions (16.3.2)




52 crèches tirées au sort : quel type d'étude ?

7. Les qualités d'un essai randomisé (16.3.2)




Que signifie « analyse en intention de traiter » ?

8. Prévalence, incidence, taux d'incidence (16.3.3 ; corrections CNED)



12 cas pour 4 000 personnes-années : taux pour 1 000 ?

9. La standardisation sur l'âge (16.3.3 ; exercice 16.13)



Quel département est prioritaire ? Pourquoi ?

10. Le tableau de contingence 2 × 2 (16.3.3, figure 16.2 ; exercice 2 (figure 16.7))

	Malades	Non malades	Total

Nommez les cases 1 à 4 et écrivez les formules 5 et 6.

11. Calculer l'IC 95 % d'un RR (16.3.3 ; exercice 16.15)

1.
2.
3.
4.


Calculez le RR : 20 fractures sur 250 contre 30 sur 750.

12. Mesures d'impact : un même RR, deux décisions (16.3.3 ; exercice 16.19)




Un risque passe de 18 % à 12 % : calculez le NST.

13. Les cinq biais (16.3.4)



Quel biais dans une enquête faite uniquement en ligne ?

14. Le facteur de confusion (16.3.4, figure 16.3 ; exercice 4 (figure 16.9))




Proposez un exemple en nutrition avec le niveau social.

15. Décrire une série : médiane et quartiles (16.3.4)



Calculez la médiane : 2 ; 3 ; 5 ; 5 ; 6 ; 8 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 30.

16. L'intervalle de confiance et l'effectif (16.3.4)




Pourquoi l'IC est-il si large avec 25 enfants ?

17. Hasard, importance, causalité (16.3.4)

Commentez RR 0,96 [0,93 ; 0,99] dans une cohorte de 200 000.

18. Les critères de Bradford Hill (1965) (16.3.5)



Quel critère manque à une étude transversale ?

19. Niveaux de preuve et grades (HAS, 2013) (16.3.5, figure 16.5 ; exercice 3 (figure 16.8))

1

2

3

4

5

6

Nommez les étages 1 à 6 et leur grade.

20. Évaluer une action avec un groupe témoin (16.3.5 ; exercice 16.44)



Calculez l'effet : programme − 0,9 h, témoin − 0,4 h.

21. Dépistage : la VPP dépend de la prévalence (16.4.1 ; exercice 16.47)




Pourquoi la VPP baisse-t-elle quand la maladie est rare ?

22. Les méthodes d'échantillonnage (16.4.2)

Méthode	Principe	Limite


Quelle méthode avec la liste des 1 800 personnes de plus de 75 ans ?

23. Lire un graphique en forêt (16.4.4)



Pourquoi le résultat combiné est-il significatif alors que les études seules ne le sont pas ?

24. Le cas guidé 1 : TIAC au pique-nique (16.6, cas guidé 1)



Calculez l'IC du RR de la tarte : ES = 0,383.