
Les schémas du chapitre 4 à savoir refaire


19 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Les six rôles de l'acte alimentaire (4.3.1, figure 4.1 ; exercice 3)



> Dire : les six rôles sont toujours présents ensemble ; un conseil qui ne vise que le rôle biologique est rarement suivi. Le plaisir n'est pas un bonus : il participe à la régulation et à l'adhésion. Ex. couscous du dimanche = social, culturel, hédonique ; produit en promotion = économique.


2. Faim, rassasiement et satiété (4.3.3, figure 4.2 ; exercice 1 (figure 4.9))



cascade de satiété (Blundell, 1987) : signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs, post-absorptifs


> Dire : le rassasiement met fin au repas, la satiété fixe le délai jusqu'au suivant. Ce qui rassasie : eau, fibres, protéines (Holt 1995 : pomme de terre 323, croissant 47). Une boisson sucrée rassasie peu. Manger lentement, sans écran, au moins 20 à 30 minutes.

3. Les systèmes de régulation de la prise alimentaire (4.3.3, figure 4.3)




Dire : la prise réelle (quoi, quand, combien) résulte de l'équilibre entre ces systèmes ; dans un environnement d'abondance, le système hédonique et l'environnement prennent souvent le dessus sur les signaux de satiété. L3 : NPY/AgRP (faim) et POMC/CART (satiété) ; résistance à la leptine dans l'obésité.

4. Le cercle vicieux de la restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975) (4.3.3, figure 4.4 ; exercice 2 (figure 4.10))




Dire : la restriction cognitive remplace la faim et le rassasiement par des règles mentales. Messages de prévention : « aucun aliment n'est interdit, c'est la fréquence et la quantité qui comptent » ; « écoutez votre faim, mangez lentement et savourez ». Ne pas parler de poids en atelier.

5. Les six familles de déterminants du comportement alimentaire (4.3.4, figure 4.4 bis)



Dire : une action qui ne vise que les connaissances agit sur une seule famille sur six : c'est pourquoi l'information seule change peu les comportements. Environnement obésogène : grandes portions (+30 % d'énergie, Rolls 2002), offre palatable, marketing.


6. Le modèle socio-écologique des choix alimentaires (Story et coll., 2008) (4.3.4)



les actions les plus efficaces combinent plusieurs niveaux (atelier + panier à petit prix + proches invités)

Dire : quatre niveaux emboîtés, qui prolongent le modèle de Dahlgren et Whitehead. Au jury, préciser le niveau visé par l'action : un atelier culinaire agit sur l'individuel ; un menu de self sur l'environnement physique ; l'encadrement de la publicité sur le macro-environnement.

7. Végétariens et flexitariens en France (Ifop pour FranceAgriMer, 2020) (4.3.6, figure 4.5)



Dire : les régimes sans viande restent minoritaires, mais la réduction de la viande est une tendance de fond, cohérente avec les repères de 2019 et l'avis du HCSP de juin 2025. Végétalien : vitamine B12 obligatoire ; végétarien : fer + vitamine C, oméga-3, zinc, iode ; légumineuses + céréales.


8. Accompagner l'évolution des pratiques : les cinq principes (4.3.7)



choix de la personne (on respecte) ≠ sécurité nutritionnelle (on garantit : B12 du végétalien, protéines de la personne âgée)

Dire : vérifier la sécurité en 5 étapes : décrire la pratique, repérer les groupes exclus, lister les nutriments à risque, évaluer le contexte (âge, grossesse, maladie, budget), proposer des remplacements ou orienter.

9. Répartition usuelle de l'énergie dans la journée (4.3.8, figure 4.6 ; exercice 11)



Dire : fourchettes indicatives, pas des normes : petit-déjeuner 20-25 %, déjeuner 35-40 %, goûter 10-15 %, dîner 25-30 %. Collation = prévue, répond à une faim ; grignotage = sans faim. Pas de collation à 10 h si l'enfant a pris un petit-déjeuner (AFSSA, 2004).

10. Le développement du comportement alimentaire de l'enfant (4.3.9, figure 4.6 bis)

0-6 mois — lait à la demande ; le bébé régule seul

→ **4-6 mois** — diversification, purées lisses, allergènes sans retard

→ **8-10 mois** — petits morceaux fondants

→ **1-3 ans** — comme la famille, sans sel ajouté ; pas de miel avant 1 an

→ **2-6 ans** — néophobie maximale ; 8 à 15 expositions

les périodes se chevauchent : chaque enfant avance à son rythme (HCSP 2020 ; Santé publique France 2021)

Dire : goûts innés pour le sucré, l'umami et le salé, rejet de l'amer et de l'acide ; apprentissage dès la vie fœtale (liquide amniotique) et l'allaitement. Exposition répétée sans pression ni récompense (Birch) ; la pression fait moins manger (Galloway 2006) ; l'interdit rend plus désirable (Fisher et Birch 1999).

11. Le partage des responsabilités (Ellyn Satter) (4.3.9, figure 4.7 ; QCM 16)

Le parent décide	L'enfant décide
• QUOI : offre variée • QUAND : horaires réguliers • OÙ : cadre agréable, à table, sans écran	• SI il mange • COMBIEN il mange • sans être forcé, récompensé ni puni

Dire : ce partage protège la régulation naturelle de l'enfant ; « finis ton assiette » et « pas de dessert » perturbent l'écoute des sensations. Il déculpabilise les parents : ce n'est pas un échec si l'enfant ne mange pas tout. Servir petit et permettre de se resservir.

12. Les quatre styles parentaux alimentaires (Hughes et coll., 2005) (4.3.9)

	Sensibilité ÉLEVÉE	Sensibilité FAIBLE
Exigence ÉLEVÉE	DÉMOCRATIQUE : propose varié, encourage à goûter, respecte la faim (le plus favorable)	AUTORITAIRE : « tu finis ton assiette » ; pression, conflits
Exigence FAIBLE	PERMISSIF : l'enfant choisit ; plus de produits sucrés	DÉSENGAGÉ : pas de repas organisé ; le plus défavorable


Dire : deux dimensions, l'exigence (cadre, attentes) et la sensibilité (écoute, chaleur). Le style démocratique va avec le modèle de Satter. Au jury : décrire un comportement observé, nommer le style, proposer un conseil concret sans culpabiliser.

13. Cinq outils pour observer et mesurer les comportements alimentaires (4.3.11, figure 4.7 bis)

Rappel des 24 h	Carnet	Fréquence	Observation	Pesée des restes
• entretien, 5 passages • limite : mémoire, 1 jour, sous-déclaration (Goldberg 1991)	• tout noter plusieurs jours • limite : modifie le comportement	• fréquence habituelle par aliment • limite : quantités imprécises	• grille, accord inter-observateurs • limite : ne dit pas pourquoi	• servi − restant • limite : qui mange quoi ?


Dire : les trois premiers sont déclaratifs (biais de mémoire et de désirabilité sociale) ; les deux derniers mesurent ce qui se passe réellement. On combine un outil déclaratif et un outil d'observation. Questionnaires de style : TFEQ, DEBQ.

14. Les quatre dimensions de l'alimentation durable (FAO, 2010) (4.3.12, figure 4.7 ter)



Dire : les quatre dimensions vont ensemble : un panier bio trop cher pour les familles n'est pas durable. EAT-Lancet 2019 (mise à jour 2025) : environ 14 g de viande rouge par jour. EGalim : 50 % de produits durables dont 20 % de bio depuis le 1er janvier 2022 ; menu végétarien hebdomadaire.

15. Empreinte carbone de quelques sources de protéines, par portion (Agribalyse) (4.3.12, figure 4.8 ; exercice 13)



Dire : ordres de grandeur ADEME ; bœuf ≈ 50 fois les lentilles (2,8 / 0,06 = 46,7). Remplacer une partie de la viande rouge par des légumineuses est bon pour la santé, le budget et le climat (SNANC 2025-2030). Ex. cantine de 400 repas : ≈ 39 t CO2e évitées par an avec un chili hebdomadaire.

16. TCA : signes d'alerte et conduite à tenir (4.3.13 ; fiche O4.5 ; exercice 17)

Repérer

- **Physiques** : perte de poids rapide, cassure de courbe, arrêt des règles
- **Alimentaires** : restriction sévère, crises, vomissements, laxatifs
- **Comportements** : sport compulsif, isolement aux repas, rituels
- **Psychologiques** : peur intense de grossir, corps déformé

Réagir

- **En privé** : jamais devant le groupe
- **Des faits** : sans juger ni parler de poids
- **Écouter** : pas de régime pour « corriger »
- **Orienter** : infirmière, médecin, FFAB ; secret partagé

Dire : le diététicien en santé publique repère et oriente, il ne diagnostique pas ; le SCOFF est un outil individuel des soignants, jamais utilisé en groupe. Prévalences vie entière chez les femmes (Hudson 2007) : anorexie 0,9 %, boulimie 1,5 %, hyperphagie 3,5 %. HAS : 2010 et 2019.

17. Les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité (4.3.14)

1	**Qualité ↓ pour quantité**	aliments denses et bon marché (Drewnowski et Darmon, 2005) ; moins de fruits, légumes, poisson
2	**Priorité aux enfants**	les parents, souvent les mères, sautent des repas
3	**Faire durer**	achats au jour le jour, plats qui « tiennent au corps », promotions
4	**Aide alimentaire**	épiceries solidaires, colis ; choix limité, parfois honte
5	**Moments de plaisir**	aliments « plaisir » pour les enfants : normalité, dignité

Dire : les personnes précaires ne mangent pas mal par ignorance, elles s'adaptent à des contraintes fortes. L'action part de ces stratégies et reconnaît les compétences. Lien pauvreté-obésité = inégalités sociales de santé (prix, offre, temps, stress), pas une « récompense ». Aide : FSE+ 2021-2027, Mieux manger pour tous (2023).

18. La classification NOVA selon le degré de transformation (4.4.5, figure 4.8 bis ; exercice 4.26)

- **Groupe 1** : bruts ou peu transformés : fruits, légumes, œufs, lait, légumes secs
- **Groupe 2** : ingrédients culinaires : huile, beurre, sucre, sel
- **Groupe 3** : transformés : pain de boulangerie, fromages, conserves
- **Groupe 4** : ultra-transformés : arômes, émulsifiants, édulcorants, protéines isolées

NOVA (Monteiro, Brésil) décrit la transformation ; le Nutri-Score décrit la qualité nutritionnelle : ils se complètent

Dire : des cohortes (NutriNet-Santé) associent les ultra-transformés à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, au diabète et à la mortalité, mais la causalité reste discutée. Les repères de 2019 conseillent de privilégier le peu transformé. Ex. boisson zéro avec édulcorants = groupe 4.

19. Lire un contexte imposé d'atelier en six questions (4.6.2)

1	**Âge et stade**	autonomie, développement (un enfant de 4 ans ne manipule pas un couteau)
2	**Rôles**	plaisir, convivialité, identité, lien social
3	**Pratiques**	religions, végétarisme, allergies : demander, prévoir des variantes
4	**Déterminants**	budget, temps, équipement, compétences : la recette doit pouvoir être refaite
5	**Dérégulations**	grignotage, repas sautés, restriction : orientent le message
6	**Évaluation**	échelle hédonique, taux d'acceptation, question ouverte

> Dire : exemple du foyer de l'ASE : pizza maison sans porc pour tous (personne n'est mis à part), réalisée par les jeunes, 1,79 € par jeune contre 10 à 15 € livrée ; message plaisir, rapidité, coût, pas de poids. Réponse orale : définir, illustrer, justifier.