

CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express


Sommaire

Fiche de révision du chapitre 16 3
1. Les études 3
2. Les calculs 3
3. Interpréter 4
4. Les pièges 4

Fiches-outils du chapitre 16 4
O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs 4
O16.2 – Grille d'identification d'une étude 4
O16.3 – Calcul d'un IC 95 % 5

Fiche de révision du chapitre 16

Épidémiologie nutritionnelle



Carte mentale du chapitre 16

1. Les études

Type	À retenir
Transversale	Un instant ; prévalence ; pas de chronologie
Cas-témoins	Malades / non-malades ; exposition passée ; OR ; biais de mémoire
Cohorte	Suivi d'exposés / non-exposés ; incidence ; RR ; longue
Essai randomisé	Tirage au sort ; causalité ; niveau 1
Écologique	Populations ; hypothèses ; erreur écologique

2. Les calculs

Prévalence = cas existants / population. Incidence cumulée = nouveaux cas / population à risque. RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]. OR = (a × d) / (b × c). IC 95 % d'une proportion = p ± 1,96 × √(p (1 − p) / n). Sensibilité = VP / malades ; spécificité = VN / non-malades.

3. Interpréter

Biais : sélection, mesure, mémoire, classement, confusion. Médiane si asymétrie. Significatif ≠ important. Temporalité indispensable (Bradford Hill, 1965). HAS 2013 : niveaux 1 à 4, grades A, B, C, AE.

4. Les pièges

Attention

- Confondre prévalence et incidence.
- Calculer un RR dans une étude cas-témoins.
- Conclure à une causalité à partir d'une étude transversale.
- Présenter un pourcentage sur 31 personnes comme une prévalence du quartier.
- Oublier le groupe témoin dans une évaluation.

Fiches-outils du chapitre 16

Outil	Intitulé	Utilité
O16.1	Tableau 2 × 2 et calculs	RR, OR, différence de risques
O16.2	Grille d'identification d'une étude	Type, population, mesure, biais, niveau de preuve
O16.3	Fiche de calcul d'un IC 95 %	Proportion et moyenne

O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs

	Malades	Non malades	Total
Exposés	a =	b =	
Non exposés	c =	d =	
Total			N =

Calcul	Résultat et interprétation
R1 = a / (a + b)	
R0 = c / (c + d)	
RR = R1 / R0	
Différence R1 − R0	
OR = (a × d) / (b × c)	

O16.2 – Grille d'identification d'une étude

Rubrique	À compléter
Question posée	
Population, échantillon, recrutement	
Type d'étude	
Exposition et critère de jugement	

Rubrique	À compléter
Mesure produite (prévalence, RR, OR…) et IC	
Biais possibles	
Facteurs de confusion pris en compte	
Niveau de preuve (HAS)	

O16.3 – Calcul d'un IC 95 %

Étape	Valeur
Proportion p ou moyenne m	
Effectif n (et écart-type s)	
Erreur standard : $\sqrt{p(1-p)/n}$ ou $s/\sqrt{n}$	
Marge = 1,96 × erreur standard	
IC 95 % = estimation ± marge	
Interprétation	