Pathologies du système immunitaire

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.




Figure 39.1 – Les quatre types d'hypersensibilité de Gell et Coombs : acteurs, délai et exemples (Cadre)




Figure 39.2 – Les réactions indésirables aux aliments : allergie (immunologique) ou intolérance (non immunologique) (Cadre)




Figure 39.3 – L'allergie alimentaire IgE-médiée : sensibilisation au premier contact, puis dégranulation des mastocytes et effets des médiateurs aux contacts suivants (39.3.1)




Figure 39.4 – Planche – mastocyte sensibilisé au repos (à gauche) et activé par l'allergène (à droite) : IgE, récepteurs FcεRI, granules, médiateurs et capillaire (39.3.1)




Figure 39.5 – L'anaphylaxie alimentaire : grades de gravité (Ring et Messmer), conduite à tenir et facteurs de gravité (39.3.1)




Figure 39.6 – Délai d'apparition des signes selon le type de réaction : immédiat (IgE) ou retardé (mécanisme cellulaire) (39.3.1)




Figure 39.7 – Les allergies alimentaires non IgE-médiées et mixtes : SEIPA, proctocolite allergique et œsophagite à éosinophiles (39.3.1)





Planche originale – coupe schématique (biopsie) ; éosinophiles : cellules à noyau bilobé et granulations roses ; seuil diagnostique ≥ 15 par champ au fort grossissement

Figure 39.8 – Planche – muqueuse œsophagienne normale (à gauche) et œsophagite à éosinophiles (à droite) : épithélium, couche basale, éosinophiles, chorion (39.3.1)



Allergies non IgE-médiées : diagnostic sur l'histoire clinique, l'éviction puis la réintroduction (et l'endoscopie pour l'œsophagite à éosinophiles)

Figure 39.9 – La démarche diagnostique d'une allergie alimentaire IgE-médiée : interrogatoire, prick-test, IgE spécifiques, test de provocation orale (39.3.1)




Figure 39.10 – Bilan allergologique de Noah : prick-tests (A) et IgE spécifiques, dont allergènes moléculaires (B) (39.3.1)



Figure 39.11 – Les 14 allergènes à déclaration obligatoire du règlement INCO n° 1169/2011 et les règles d'information (39.3.1)




Figure 39.12 – L'allergie aux protéines du lait de vache du nourrisson : allaitement, hydrolysat poussé, formule d'acides aminés, laits à proscrire et suivi (39.3.1)




Figure 39.13 – Prévenir l'allergie alimentaire chez le nourrisson : de l'éviction à l'introduction précoce des allergènes (39.3.1)




Figure 39.14 – Essai LEAP (2015) : fréquence de l'allergie à l'arachide à 5 ans selon l'éviction ou la consommation précoce (39.3.1)




Figure 39.15 – Les réactions croisées : pollens et aliments, latex et fruits, acariens et crustacés, aliments entre eux (39.3.1)




Figure 39.16 – Accueillir un enfant allergique en restauration collective : démarche du PAI, organisation en cuisine et au service, cadre réglementaire (39.3.1)