Terminologie médicale

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Terminologie médicale

29.3.1 Construire et décomposer un terme médical

DÉFINITIONS

- **Terminologie médicale** : ensemble des termes employés par les professionnels de santé pour désigner les organes, les fonctions, les maladies, les signes, les examens et les traitements, avec un…
- **Terme savant** : mot formé à partir d'éléments grecs ou latins (hépatite, néphrectomie) ; il s'oppose au mot courant (jaunisse, ablation du rein), plus vague
- **Étymologie** : origine d'un mot et histoire de sa formation (gr. etumos, vrai, et logos, discours)
- **Préfixe** : élément placé avant la racine, qui en modifie ou en précise le sens (position, quantité, temps, vitesse, absence, anomalie) ; il ne forme pas un mot seul (hyper-, péri-,…
- **Racine (radical)** : élément qui porte le sens principal : organe, tissu, liquide, substance ou fonction (gastr-, néphr-, glyc-) ; un terme peut en contenir plusieurs (hépato-spléno-mégalie)
- **Voyelle de liaison** : voyelle (o, plus rarement i) insérée entre deux éléments pour faciliter la prononciation ; elle disparaît devant un élément qui commence par une voyelle (gastrite et non…
- **Suffixe** : élément placé à la fin, qui indique la catégorie du terme : maladie (-ite, -ose, -pathie), signe (-algie, -rrhée), examen (-scopie, -graphie), acte (-ectomie, -stomie),…
- **Suffixes adjectivaux** : -al, -ique, -aque, -aire, -eux, -é : « relatif à » (rénal, gastrique, cardiaque, pulmonaire, osseux, cutané)
- **-oïde** : « qui ressemble à » (gr. eidos, forme) : sigmoïde, thyroïde, lymphoïde ; androïde (répartition masculine des graisses), gynoïde (féminine)
- **Entéral / parentéral** : entéral : par l'intestin (le tube digestif) ; parentéral : « à côté de » l'intestin, c'est-à-dire en pratique par voie veineuse
- **Famille de mots** : ensemble des termes formés sur un même élément : gastrite, gastralgie, gastroscopie, gastrectomie, gastrostomie, gastroparésie, épigastre, gastro-entérite

FORMULES

- **Structure d'un terme** : [préfixe] + racine(s) + [voyelle de liaison] + suffixe
- **Sens de lecture** : suffixe → préfixe → racine(s)
- **Voyelle de liaison** : racine + o + élément commençant par une consonne
- **Pas de voyelle de liaison** : racine + élément commençant par une voyelle
- **Deux voyelles en contact** : trait d'union ou mot soudé (les deux graphies sont acceptées)
- **Méthode en 5 étapes** : 1. repérer le suffixe ; 2. repérer le préfixe ; 3. isoler la ou les racines (ôter les voyelles de liaison) ; 4. traduire chaque élément ; 5. recomposer en commençant par…

- **Rédiger une définition** : décomposition (sens de chaque élément entre parenthèses) + définition en une phrase + contexte si demandé
- **Construire un terme** : définition → nature (suffixe) + organe ou substance (racine) + précision (préfixe)

VALEURS REPÈRES

- **Liste indicative du guide 2025** : 53 préfixes, 49 suffixes, 135 racines
- **Éléments à connaître pour lire un dossier** : environ 300 préfixes, racines et suffixes

29.3.1 Doublets, termes non décomposables et orthographe

DÉFINITIONS

- **Doublet** : deux racines de même sens pour un organe : la grecque forme surtout les noms de maladies, d'examens et d'actes (néphrite, néphrectomie), la latine les adjectifs…
- **Éponyme** : maladie, signe, structure ou intervention portant le nom d'une personne ou d'un lieu ; ne contient aucun indice : il s'apprend (maladie de Crohn, de Basedow, de…
- **Sigle / acronyme** : abréviation par les initiales ; le sigle se prononce lettre par lettre (HTA), l'acronyme comme un mot (SIDA, IDDSI) ; à la première occurrence, terme en entier suivi du…
- **Termes historiques** : mots hérités du langage courant ou de l'histoire : scorbut (carence en vitamine C), béribéri (thiamine), pellagre (niacine), rachitisme, goitre, ictère, angine
- **Emprunts à l'anglais** : stent (endoprothèse), bypass (court-circuit), scanner (tomodensitomètre), screening (dépistage), binge eating (hyperphagie boulimique) : dans un écrit professionnel,…

FORMULES

- **ph = son « f »** : lettre grecque phi
- **th = son « t »** : lettre grecque thêta
- **ch = son « k »** : lettre grecque khi
- **y** : lettre grecque upsilon
- **rh, rr** : esprit rude du grec
- **œ, æ** : diphtongues grecques et latines
- **pn, ps, pt** : groupes de consonnes grecs : ne pas oublier le p
- **Pluriels et accords** : -s au pluriel ; -al → -aux ; pas de majuscule aux maladies, sauf le nom propre d'un éponyme

VALEURS REPÈRES

- **Rein** : néphr(o)- (gr.) / rén- (lat.)
- **Poumon** : pneum(on)(o)- / pulmon-
- **Bouche** : stomat(o)- / bucc-, or- (per os)
- **Langue** : gloss(o)- / lingu-
- **Peau** : derm(at)(o)- / cut-
- **Vessie** : cyst(o)- / vésic-
- **Sein** : mast(o)- / mamm-
- **Utérus** : hystér(o)-, métr(o)- / utér-
- **Nez** : rhin(o)- / nas-
- **Œil** : ophtalm(o)- / ocul-

29.3.1 Les pièges : termes voisins

DÉFINITIONS

- **ilé(o)- / ili(o)-** : iléon, dernière partie de l'intestin grêle (iléite, iléostomie) / ilion, partie supérieure de l'os coxal (fosse iliaque)
- **py(o)- / pyél(o)- / pyr(o)-** : pus (pyurie) / bassinet du rein (pyélonéphrite) / feu, fièvre (antipyrétique)
- **my(o)- / myél(o)- / myx(o)-** : muscle (myalgie) / moelle (myélite, myélome) / mucus (myxœdème de l'hypothyroïdie)
- **cyst-** : vessie ou toute poche : cystite (vessie), cholécystite (vésicule biliaire)
- **-tomie / -ectomie / -stomie** : couper, inciser / enlever / aboucher (créer un orifice)
- **dysphagie / dysphasie / dysarthrie** : trouble pour avaler / du langage / de l'articulation ; la dysphonie concerne la voix
- **-rragie / -rrhée** : écoulement de sang / écoulement d'un autre liquide
- **hématémèse / hémoptysie** : sang vomi (origine digestive) / sang craché en toussant (origine respiratoire)
- **-émie / -urie** : dans le sang / dans l'urine
- **hémi- / hém(o)-** : moitié (hémiplégie) / sang (hémorragie)
- **ana- / an-** : vers le haut, de nouveau (anabolisme, anamnèse) / privatif devant une voyelle (anémie, anurie)
- **anti- / anté-** : contre (antiémétique) / avant (antépartum)
- **inter- / intra-** : entre (intercostal) / à l'intérieur (intraveineux)
- **-phagie / -phasie** : manger, avaler / parler

29.3.2 Les préfixes : familles et contraires

DÉFINITIONS

- **Position : dedans** : endo- (gr.), intra- (lat.), en- : endoscopie, endocrine ; intraveineux (IV) ; encéphale
- **Position : dehors** : exo- (gr.), extra- (lat.), ecto- (gr.), ec-, ex- : exocrine, exogène ; extracellulaire ; ectopie ; exérèse
- **Position : dessus** : épi- (gr.), supra- (lat.), sus- : épigastre, épiderme ; suprarénal ; sus-hépatique
- **Position : dessous** : hypo- (gr.), sub- (lat.), sous- : hypoderme, hypophyse ; sublingual ; sous-cutané (SC)
- **Position : autour, à côté** : péri- (gr.), circum- (lat.) : péricarde, péritoine ; para- : parathyroïde, parentéral
- **Position : devant, derrière, entre** : anté-, pro- : antéversion, prolapsus ; rétro- : rétrosternal, rétropéritonéal ; inter- : intercostal, interstitiel
- **À travers, milieu** : trans-, per-, dia- : transcutané, percutané, per os, dialyse ; méso- : mésentère
- **Mouvement, changement** : ana- (vers le haut : anabolisme) / cata- (vers le bas : catabolisme) ; méta- (au-delà, changement : métastase, métaplasie)
- **Quantité** : a-, an- (absence) ; oligo- (peu) ; hypo- (insuffisance) ; normo-, eu- (normal) ; hyper- (excès) ; poly-, multi- (nombreux) ; pan- (tout) ; iso- (égal)
- **Taille** : micro- (petit) / macro- (grand) ; méga-, mégalo- (très grand : mégacôlon, mégaloblaste)
- **Nombre** : hémi-, semi- (½) ; mono-, uni- (1) ; di-, bi- (2) ; tri- (3) ; tétra-, quadri- (4) ; nulli- (0 : nullipare) ; prim(i)-, prot(o)- (premier)
- **Couleur** : érythr(o)- rouge ; leuc(o)-, alb- blanc ; mélan(o)- noir ; cyan(o)- bleu sombre ; xanth(o)- jaune ; chlor(o)- vert ; poli(o)- gris ; purpur- pourpre

- **Temps** : anté-, pré- (avant) ; pro- (avant : prodrome, pronostic, prophylaxie) ; per-, intra- (pendant) ; péri- (autour) ; post- (après) ; néo- (nouveau) ; ré- (de nouveau :...
- **Vitesse, fréquence** : brady- (lent) / tachy- (rapide) ; pollaki- (souvent : pollakiurie, mictions fréquentes ≠ polyurie)

FORMULES

- **Préfixe + racine du même grec ou latin** : en principe gr. + gr. ou lat. + lat. ; hybrides fréquents
- **Paires grec / latin de même sens** : épi- = supra- ; hypo- = sub- ; endo- = intra- ; exo- = extra- ; hémi- = semi- ; poly- = multi- ; péri- = circum-
- **Préfixe de quantité + -émie** : hypo- ou hyper- + substance + -émie = concentration sanguine basse ou élevée

VALEURS REPÈRES

- **hypo- / hyper-** : sous, insuffisant / au-dessus, excès : hypoglycémie / hyperglycémie
- **oligo- / poly-** : peu / beaucoup : oligurie / polyurie
- **micro- / macro-** : petit / grand : microcytose / macrocytose
- **brady- / tachy-** : lent / rapide : bradycardie / tachycardie
- **endo- / exo-** : dedans / dehors : endocrine / exocrine
- **pré-, anté- / post-** : avant / après : préopératoire / postopératoire
- **homo- / hétéro-** : semblable / différent : homozygote / hétérozygote
- **eu- / dys-** : bien, normal / difficulté, anomalie : eupnée / dyspnée
- **sus-, épi- / sous-, hypo-** : au-dessus / au-dessous : épigastre / hypogastre

29.3.2 Liste des 53 préfixes du guide (1/2)

DÉFINITIONS

- **a-, an-** : gr. a- privatif · absence, privation · ex. : aphagie, anurie, asthénie, apnée, anorexie
- **acro-** : gr. akros, extrême · extrémités du corps · ex. : acromégalie, acrocyanose
- **allo-** : gr. allos, autre · autre, différent · ex. : allogreffe, allergie, allogénique
- **anté-** : lat. ante, avant · avant (dans le temps ou l'espace) · ex. : antépartum, antérieur, antéversion
- **anti-** : gr. anti, contre · contre, opposé à · ex. : antibiotique, antiémétique, antioxydant, anticorps
- **auto-** : gr. autos, soi-même · soi-même · ex. : auto-immunité, autogreffe, autolyse
- **bio-** : gr. bios, vie · vie, vivant · ex. : biologie, biopsie, biodisponibilité
- **brady-** : gr. bradus, lent · lent · ex. : bradycardie, bradypnée, bradykinésie
- **caryo-** : gr. karuon, noix · noyau de la cellule · ex. : caryotype, caryolyse
- **copro-** : gr. kopros, excrément · selles, matières fécales · ex. : coproculture, coprologie, coprolithe
- **cyano-** : gr. kuanos, bleu sombre · bleu · ex. : cyanose, acrocyanose
- **dys-** : gr. dus-, mal, difficilement · difficulté, trouble, anomalie · ex. : dysphagie, dyspepsie, dyslipidémie, dysbiose
- **ecto-** : gr. ektos, au-dehors · à l'extérieur · ex. : ectoderme, ectopie (organe hors de sa place)
- **en-** : gr. en, dans · dans, à l'intérieur · ex. : encéphale (dans la tête), encéphalite

29.3.2 Liste des 53 préfixes du guide (2/2)

DÉFINITIONS

- **iso-** : gr. isos, égal · égal · ex. : isotonique, isocalorique, isotope
- **macro-** : gr. makros, grand, long · grand · ex. : macrocytose, macrosomie, macronutriment, macrophage
- **mal-** : lat. male, mal · mal, insuffisamment · ex. : malabsorption, malnutrition, malformation
- **méga-** : gr. megas, grand · très grand · ex. : mégacôlon, mégaœsophage
- **méno-** : gr. mên, mênos, mois · règles (menstruations) · ex. : ménopause, ménorragie, aménorrhée
- **micro-** : gr. mikros, petit · petit · ex. : microcytose, micronutriment, microbiote, microalbuminurie
- **mono-** : gr. monos, seul · un seul · ex. : monocyte, monothérapie, mononucléose
- **multi-** : lat. multus, nombreux · plusieurs, nombreux · ex. : multipare, multifactoriel
- **néo-** : gr. neos, nouveau · nouveau · ex. : néoglucogenèse, néonatal, néoplasie
- **odyno-** : gr. odunê, douleur · douleur · ex. : odynophagie (douleur à la déglutition)
- **oligo-** : gr. oligos, peu nombreux · peu, insuffisant · ex. : oligurie, oligoélément, oligospermie
- **ortho-** : gr. orthos, droit · droit, correct · ex. : orthopédie, orthophonie, orthostatique, orthopnée
- **pan-** : gr. pan, pantos, tout · tout, en totalité · ex. : pancytopénie, pandémie, pancréas
- **para-** : gr. para, à côté de · à côté de ; en marge, anormal · ex. : parathyroïde, paramédical, parentéral ; paresthésie

29.3.3 Les suffixes : familles

DÉFINITIONS

- **Maladies** : -ite inflammation (infectieuse ou non) ; -ose état chronique, dégénératif, non inflammatoire, ou excès de cellules (leucocytose) ; -iase état pathologique (lithiase) ;...
- **Volume et calibre** : -mégalie augmentation de volume ; -ectasie dilatation (bronchectasie) ; -sténose rétrécissement d'un conduit
- **Croissance des tissus** : -plasie formation d'un tissu (hyperplasie : cellules plus nombreuses ; dysplasie : anomalie précancéreuse ; aplasie) ; -trophie développement (atrophie ; hypertrophie :...
- **Paralysie, consistance** : -plégie paralysie complète, -parésie partielle (gastroparésie) ; -sclérose durcissement ; -malacie ramollissement (ostéomalacie) ; -porose présence de pores...
- **Signes et symptômes** : -algie, -dynie douleur ; -esthésie sensibilité ; -phasie langage ; -phonie voix ; -mnésie mémoire ; -phobie peur ; -pnée respiration ; -oxie, -oxémie oxygène des tissus,...
- **Quantités** : -émie substance dans le sang ; -urie urine ou substance dans l'urine ; -pénie diminution, manque ; -cytose augmentation du nombre de cellules (ou taille : microcytose)
- **Signes digestifs** : -phagie manger, avaler ; -orexie appétit ; -pepsie digestion ; -dipsie soif ; -émèse vomissement ; -rrhée écoulement ; -stase arrêt (cholestase) ; -lyse dégradation
- **Examens** : -scopie regarder (endoscope) ; -graphie enregistrer, produire une image ; -gramme document obtenu ; -métrie mesurer ; biopsie, -centèse prélever ; -culture cultiver un...
- **Source du signal** : écho- ultrasons ; radio- rayons X ; scinti- traceur radioactif ; électro- activité électrique

- **Actes chirurgicaux** : -tomie incision ; -ectomie ablation ; -stomie abouchement à la peau ; anastomose raccord de deux conduits ; -rraphie suture ; -pexie fixation ; -plastie remodelage ;…
- **Traitements, spécialités** : -thérapie traitement ; -logie science, spécialité, -logue spécialiste ; -iatrie spécialité médicale (pédiatrie, gériatrie)
- **Action d'une substance** : -cide qui tue ; -statique qui arrête la multiplication ; -lytique qui dissout ; -gène qui produit (pathogène, iatrogène, orexigène) ; -trope qui agit sur (psychotrope)
- **Cellules et processus** : -cyte cellule ; -blaste cellule jeune, qui forme ; -claste qui détruit ; -poïèse production de cellules ; -genèse formation ; -lyse dégradation ; -phile affinité ;…

FORMULES

- **Tumeur bénigne** : nom du tissu + -ome
- **Tumeur maligne épithéliale** : carcinome (gr. karkinos, crabe)
- **Tumeur maligne conjonctive** : tissu + sarcome (gr. sarx, chair)
- **-ome malins** : lymphome, myélome, mélanome
- **-ome qui ne sont pas des tumeurs** : hématome, athérome, granulome, xanthome, glaucome, fécalome, trachome
- **Synonymes de tumeur** : néoplasie, néoplasme (« formation nouvelle »)

29.3.3 Hémorragies, examens et actes chirurgicaux

DÉFINITIONS

- **-rragie** : écoulement abondant de sang (gr. rhêgnunai, jaillir) : hémorragie, rectorragie, ménorragie, gingivorragie, otorragie
- **-rrhée** : écoulement d'un liquide autre que le sang (gr. rhein, couler) : diarrhée, rhinorrhée, stéatorrhée
- **Épistaxis** : saignement de nez
- **Hématémèse** : vomissement de sang, d'origine digestive haute (œsophage, estomac, duodénum)
- **Méléna** : émission par l'anus de selles noires, poisseuses et malodorantes, faites de sang digéré : saignement digestif haut
- **Rectorragie** : émission de sang rouge par l'anus : saignement digestif bas (côlon, rectum, anus)
- **Hémoptysie** : rejet de sang par la bouche au cours d'un effort de toux, venant des voies respiratoires
- **Hématurie** : sang dans les urines
- **Purpura, pétéchies** : petites taches rouges ou violacées qui ne s'effacent pas à la pression (sang sorti des capillaires) ; à distinguer de l'érythème, qui s'efface
- **Hématome / ecchymose** : collection de sang dans un tissu / infiltration de sang sous la peau (« bleu »)
- **Ménorragie / métrorragie** : règles trop abondantes / saignement de l'utérus en dehors des règles
- **Électrocardiographie / électrocardiogramme** : technique d'enregistrement de l'activité électrique du cœur / tracé obtenu (ECG)
- **Hémogramme, ionogramme, myélogramme** : résultats écrits : numération formule sanguine (NFS) ; dosage des électrolytes ; examen de la moelle osseuse
- **FOGD** : fibroscopie œso-gastro-duodénale : la gastroscopie (fibro- rappelle les fibres optiques)

FORMULES

- **Nom d'une hémorragie** : racine d'organe + -rragie
- **Nom d'un examen** : organe ou technique + -scopie, -graphie, -métrie (technique) ou -gramme (document)
- **Nom d'un acte** : organe + -tomie, -ectomie, -stomie, -plastie, -pexie, -rraphie
- **Préfixe + -ectomie** : hémi- (moitié), partielle ou totale

29.3.3 Liste des 49 suffixes du guide (1/2)

DÉFINITIONS

- **-algie** : gr. algos, douleur · douleur · ex. : gastralgie, arthralgie, myalgie, névralgie
- **-blaste** : gr. blastos, germe · cellule jeune, en formation · ex. : ostéoblaste, fibroblaste, érythroblaste
- **-centèse** : gr. kentêsis, piqûre · ponction · ex. : paracentèse, amniocentèse, thoracentèse
- **-cide** : lat. caedere, tuer · qui tue · ex. : bactéricide, fongicide, insecticide
- **-claste** : gr. klastos, brisé · qui détruit, qui brise · ex. : ostéoclaste
- **-cyte** : gr. kutos, cavité, cellule · cellule · ex. : érythrocyte, leucocyte, adipocyte, hépatocyte
- **-dipsie** : gr. dipsa, soif · soif · ex. : polydipsie, adipsie
- **-ectasie** : gr. ektasis, extension · dilatation · ex. : bronchectasie, télangiectasie
- **-ectomie** : gr. ek, hors de, et tomê, section · ablation chirurgicale · ex. : gastrectomie, cholécystectomie, appendicectomie
- **-émèse** : gr. emesis, vomissement · vomissement · ex. : hématémèse, hyperémèse gravidique
- **-émie** : gr. haima, sang · présence dans le sang ; concentration sanguine · ex. : glycémie, urémie, kaliémie, natrémie
- **-esthésie** : gr. aisthêsis, sensation · sensibilité · ex. : anesthésie, paresthésie, hyperesthésie
- **-gène** : gr. -genês, né de, qui engendre · qui produit ; qui est produit par · ex. : pathogène, cancérogène, iatrogène, endogène
- **-genèse** : gr. genesis, naissance · formation, production · ex. : lipogenèse, néoglucogenèse, cancérogenèse

29.3.3 Liste des 49 suffixes du guide (2/2)

DÉFINITIONS

- **-pathie** : gr. pathos, souffrance · maladie (sens général) · ex. : néphropathie, cardiopathie, neuropathie
- **-pénie** : gr. penia, pauvreté · diminution, manque · ex. : thrombopénie, leucopénie, sarcopénie, ostéopénie
- **-pepsie** : gr. pepsis, cuisson, digestion · digestion · ex. : dyspepsie
- **-pexie** : gr. pêxis, fixation · fixation chirurgicale · ex. : rectopexie, néphropexie, gastropexie
- **-phasie** : gr. phasis, parole · parole, langage · ex. : aphasie, dysphasie
- **-phile** : gr. philos, ami · qui a de l'affinité pour · ex. : hydrophile, éosinophile, neutrophile
- **-phobie** : gr. phobos, peur · peur, aversion · ex. : néophobie alimentaire, hydrophobe, claustrophobie
- **-plasie** : gr. plasis, formation · formation, développement d'un tissu · ex. : hyperplasie, dysplasie, aplasie, néoplasie
- **-plastie** : gr. plassein, modeler · réparation, remodelage chirurgical · ex. : angioplastie, pyloroplastie, rhinoplastie

- **-plégie** : gr. plêgê, coup · paralysie (complète) · ex. : hémiplégie, paraplégie, tétraplégie
- **-poïèse** : gr. poiêsis, fabrication · production de cellules · ex. : hématopoïèse, érythropoïèse
- **-rèse** : gr. ourêsis, action d'uriner ; hairesis, action d'enlever · -urèse : excrétion urinaire ; -érèse : retrait · ex. : diurèse, natriurèse ; exérèse, aphérèse
- **-rragie** : gr. rhêgnunai, briser, jaillir · écoulement abondant de sang · ex. : hémorragie, ménorragie, rectorragie
- **-rraphie** : gr. rhaphê, couture · suture chirurgicale · ex. : herniorraphie, périnéorraphie

29.3.4 Les racines : repères par appareil

DÉFINITIONS

- **Appareil digestif** : stomat-, bucc- (bouche) ; gloss- (langue) ; sial- (salive) ; pharyng- ; œsophag- ; gastr- (estomac) ; duodén- ; jéjun- ; ilé- (iléon) ; entér- (intestin) ; col- (côlon)…
- **Appareil respiratoire** : rhin-, nas- (nez) ; laryng- ; trachéo- ; bronch- ; pneum-, pulmon- (poumon) ; pleur- (plèvre) ; thorac- ; phrén- (diaphragme) ; spir-, -pnée (respiration)
- **Appareil cardiovasculaire** : cardi- (cœur) ; angi-, vas-, vascul- (vaisseau) ; artéri- ; phléb- (veine) ; coronar- ; valvul- ; athér- (dépôt lipidique) ; thromb- (caillot)
- **Sang** : hém-, hémat- (sang) ; érythr- (rouge) ; leuc- (blanc) ; thromb- (plaquette) ; -cyte (cellule) ; myél- (moelle) ; lymph- ; sidér- (fer)
- **Appareil urinaire** : néphr-, rén- (rein) ; glomérul- ; pyél- (bassinet) ; cyst-, vésic- (vessie) ; -urie (urine) ; azot- (déchets azotés)
- **Système endocrinien et substances** : aden- (glande) ; insulin- ; glyc-, gluc- (sucre) ; lip-, stéat-, adip- (graisse) ; natri- (sodium) ; kali- (potassium) ; calc- (calcium) ; ur- (urée)
- **Système nerveux et sens** : neur-, névr- (nerf) ; encéphal-, cérébr- (cerveau) ; myél- (moelle épinière) ; psych- (esprit) ; ophtalm-, ocul- (œil) ; ot-, auricul- (oreille) ; audi- ; olfact- ;…
- **Peau et appareil locomoteur** : derm-, dermat-, cut- (peau) ; osté-, oss- (os) ; chondr- (cartilage) ; arthr- (articulation) ; my-, muscul- (muscle) ; sarc- (chair) ; tendin- ; spondyl- (vertèbre) ;…
- **Appareil génital** : hystér-, métr-, utér- (utérus) ; ovari- ; salping- (trompe) ; colp-, vagin- (vagin) ; mamm-, mast- (sein) ; orchi- (testicule) ; gynéc- (femme) ; andr- (homme) ; mén-…
- **Racines générales** : path- (souffrance) ; nos- (maladie) ; onc-, carcin-, cancér-, tumor- (tumeur) ; nécr- (mort) ; térat- (malformation) ; hist- (tissu) ; cyt- (cellule) ; sthén- (force) ;…

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (1/5)

DÉFINITIONS

- **adén(o)-** : gr. adên, glande · glande ; ganglion · ex. : adénome, adénocarcinome, adénopathie
- **adip(o)-** : lat. adeps, adipis, graisse · graisse · ex. : adipocyte, adipeux, adiposité
- **andr(o)-** : gr. anêr, andros, homme · homme, masculin · ex. : androgène, andropause, androïde
- **angi(o)-** : gr. angeion, vase · vaisseau · ex. : angiographie, angioplastie, angiome
- **appendic(o)-** : lat. appendix · appendice · ex. : appendicite, appendicectomie
- **artéri(o)-** : gr. artêria · artère · ex. : artériosclérose, artériopathie, artériographie
- **arthr(o)-** : gr. arthron, articulation · articulation · ex. : arthrite, arthrose, arthroscopie

- **athér(o)-** : gr. athêra, bouillie · dépôt lipidique de la paroi artérielle · ex. : athérome, athérosclérose
- **audi(o)-** : lat. audire, entendre · audition · ex. : audiogramme, audiométrie
- **auricul(o)-** : lat. auricula, petite oreille · oreille ; oreillette du cœur · ex. : auriculaire, auriculo-ventriculaire
- **azot(o)-** : fr. azote (gr. a- et zôê, sans vie) · azote, déchets azotés (urée) · ex. : azotémie, azoturie
- **bar(o)-** : gr. baros, poids · poids ; pression · ex. : bariatrique ; barorécepteur
- **brachi(al)** : lat. brachium, bras · bras · ex. : artère brachiale, plexus brachial
- **bronch(o)-** : gr. bronkhos, gorge · bronche · ex. : bronchite, bronchoscopie, bronchectasie

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (2/5)

DÉFINITIONS

- **col(o)-** : gr. kolon · côlon · ex. : colite, colectomie, colostomie, coloscopie
- **colp(o)-** : gr. kolpos, creux, vagin · vagin · ex. : colposcopie
- **coronar(o)-** : lat. corona, couronne · artères coronaires · ex. : coronarographie, coronarien
- **cost(o)-** : lat. costa, côte · côte · ex. : intercostal, costal
- **cox(o)-** : lat. coxa, hanche · hanche · ex. : coxarthrose, coxalgie
- **crâni(o)-** : gr. kranion, crâne · crâne · ex. : crânien, craniopharyngiome
- **cyst(o)-** : gr. kustis, vessie, poche · vessie ; poche · ex. : cystite, cystoscopie ; kyste
- **cyt(o)-** : gr. kutos, cavité, cellule · cellule · ex. : cytologie, cytoplasme, cytotoxique
- **dactyl(o)-** : gr. daktulos, doigt · doigt · ex. : polydactylie, syndactylie
- **derm(o)-, dermat(o)-** : gr. derma, dermatos, peau · peau · ex. : dermatologie, dermite, épiderme
- **disc(o)-** : gr. diskos, disque · disque intervertébral · ex. : discopathie, hernie discale
- **duodén(o)-** : lat. duodeni, douze · duodénum · ex. : duodénite, ulcère duodénal
- **entér(o)-** : gr. enteron, intestin · intestin · ex. : entérite, entérocyte, nutrition entérale
- **érythr(o)-** : gr. eruthros, rouge · rouge · ex. : érythrocyte, érythème, érythropoïétine

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (3/5)

DÉFINITIONS

- **jéjun(o)-** : lat. jejunus, à jeun · jéjunum · ex. : jéjunostomie
- **kali-** : lat. sc. kalium (arabe al-qalî, cendre de plantes) · potassium · ex. : kaliémie, hypokaliémie, kaliurèse
- **kinés(i)-** : gr. kinêsis, mouvement · mouvement · ex. : kinésithérapie, dyskinésie
- **lapar(o)-** : gr. lapara, flanc · paroi abdominale · ex. : laparotomie, laparoscopie
- **laryng(o)-** : gr. larunx · larynx · ex. : laryngite, laryngectomie
- **leuc(o)-** : gr. leukos, blanc · blanc · ex. : leucocyte, leucopénie, leucémie
- **lymph(o)-** : lat. lympha, eau claire · lymphe, tissu lymphoïde · ex. : lymphocyte, lymphome, lymphœdème
- **mamm(o)-** : lat. mamma, sein · sein · ex. : mammographie, glande mammaire
- **mast(o)-** : gr. mastos, sein · sein · ex. : mastectomie, mastite, mastose
- **médull(o)-** : lat. medulla, moelle · moelle ; partie centrale d'un organe · ex. : médullosurrénale, médullaire
- **mélan(o)-** : gr. melas, melanos, noir · noir ; mélanine · ex. : mélanome, mélanocyte, méléna
- **mén(o)-** : gr. mên, mois · règles · ex. : ménopause, ménorragie

- **métr(o)-** : gr. mêtra, utérus · utérus · ex. : métrorragie, endomètre, endométriose
- **myc(o)-** : gr. mukês, champignon · champignon microscopique · ex. : mycose, mycotoxine

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (4/5)

DÉFINITIONS

- **onc(o)-** : gr. onkos, masse · tumeur · ex. : oncologie, oncogène
- **ophtalm(o)-** : gr. ophthalmos, œil · œil · ex. : ophtalmologie, xérophtalmie
- **orchi(d)(o)-** : gr. orkhis, orkhidos, testicule · testicule · ex. : orchite, orchidectomie
- **osté(o)-** : gr. osteon, os · os · ex. : ostéoporose, ostéomalacie, ostéoblaste
- **ot(o)-** : gr. ous, ôtos, oreille · oreille · ex. : otite, otorragie, oto-rhino-laryngologie
- **ovari(o)-** : lat. ovarium · ovaire · ex. : ovariectomie, insuffisance ovarienne
- **oxy-** : gr. oxus, aigu, acide (d'où oxygène) · oxygène ; acide · ex. : hypoxie, hypoxémie, oxymétrie ; cellules oxyntiques
- **pédi-** : gr. pais, paidos, enfant ; lat. pes, pedis, pied · enfant ; pied · ex. : pédiatrie ; pédicure, artère pédieuse
- **phag(o)-** : gr. phagein, manger · manger, avaler · ex. : phagocyte, dysphagie, aphagie
- **pharyng(o)-** : gr. pharunx, gorge · pharynx · ex. : pharyngite, rhinopharynx
- **phléb(o)-** : gr. phleps, phlebos, veine · veine · ex. : phlébite, phlébotomie
- **phrén(o)-** : gr. phrên, diaphragme, esprit · diaphragme ; esprit · ex. : nerf phrénique ; schizophrénie
- **phon(o)-** : gr. phônê, voix · voix, son · ex. : aphonie, dysphonie, orthophonie
- **pleur(o)-** : gr. pleura, côté · plèvre · ex. : pleurésie, épanchement pleural

29.3.4 Liste des 135 racines du guide (5/5)

DÉFINITIONS

- **rhin(o)-** : gr. rhis, rhinos, nez · nez · ex. : rhinite, rhinorrhée, rhinopharynx
- **sagittal** : lat. sagitta, flèche · plan de coupe antéro-postérieur · ex. : coupe sagittale (IRM, scanner)
- **salping(o)-** : gr. salpinx, trompette · trompe (utérine ou auditive) · ex. : salpingite, salpingectomie
- **sarc(o)-** : gr. sarx, sarkos, chair · chair, muscle ; tissu conjonctif · ex. : sarcopénie, sarcomère ; sarcome
- **sclér(o)-** : gr. sklêros, dur · durcissement · ex. : sclérose, athérosclérose
- **sér(o)-** : lat. serum, petit-lait · sérum ; séreuse · ex. : sérologie, séropositif, séreuse
- **sial(o)-** : gr. sialon, salive · salive · ex. : sialorrhée, sialadénite
- **sidér(o)-** : gr. sidêros, fer · fer · ex. : sidérémie, sidéropénie
- **sperm(o)-, spermat(o)-** : gr. sperma, semence · sperme · ex. : spermatozoïde, oligospermie
- **spir(o)-** : lat. spirare, souffler, respirer · respiration · ex. : spirométrie
- **splén(o)-** : gr. splên, rate · rate · ex. : splénomégalie, splénectomie
- **spondyl(o)-** : gr. spondulos, vertèbre · vertèbre · ex. : spondylarthrite, spondylodiscite
- **sténo)-** : gr. stenos, étroit · rétrécissement · ex. : sténose, sténose aortique
- **sthén(o)-** : gr. sthenos, force · force · ex. : asthénie, myasthénie

29.3.5 Le vocabulaire de la démarche clinique

DÉFINITIONS

- **Santé** : « état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » (Constitution de l'OMS, 1946)
- **Maladie** : altération de l'état de santé qui se traduit par des symptômes et des signes, due à une cause (connue ou non) et évoluant selon un mode propre
- **Pathologie** : au sens strict, étude des maladies ; dans l'usage, synonyme de maladie
- **Physiopathologie** : étude des mécanismes par lesquels une cause perturbe le fonctionnement normal et produit les signes de la maladie
- **Étiologie** : étude des causes d'une maladie ; par extension, la cause elle-même
- **Pathogénie (pathogenèse)** : mécanisme d'apparition et de développement d'une maladie ; étiopathogénie : causes et mécanismes
- **Sémiologie** : étude des signes des maladies, de leur recherche et de leur interprétation
- **Épidémiologie** : étude de la fréquence et de la répartition des maladies dans les populations et des facteurs qui les influencent
- **Nosologie** : classification des maladies
- **Anamnèse** : interrogatoire : identité, mode de vie, motif, antécédents (ATCD) personnels et familiaux (hérédo-collatéraux), traitements, histoire de la maladie
- **Examen clinique** : inspection (regarder), palpation (toucher), percussion (frapper pour apprécier la sonorité), auscultation (écouter) ; constantes : PA, FC, FR, température, SpO_2, poids,...
- **Symptôme (signe fonctionnel)** : manifestation ressentie et rapportée par le patient, subjective : douleur, nausée, asthénie, dysphagie
- **Signe physique** : anomalie constatée par le soignant à l'examen, objective : œdème, ictère, hépatomégalie
- **Signe général** : signe non spécifique d'un organe : fièvre, amaigrissement, asthénie, anorexie

FORMULES

- **Prévalence** : cas existants / population, à un instant donné
- **Incidence** : nouveaux cas pendant une période / population à risque
- **Mortalité (d'un groupe)** : décès pendant la période / effectif du groupe
- **Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)** : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → physiopathologie → diagnostic et examens → conséquences et complications → traitements

29.3.5 Se repérer sur le corps

DÉFINITIONS

- **Position anatomique de référence** : sujet debout, face à l'observateur, bras le long du corps, paumes vers l'avant : la droite du patient est à gauche de l'image
- **Rangée supérieure de l'abdomen** : hypocondre droit (foie, vésicule biliaire) ; épigastre (estomac, pancréas) ; hypocondre gauche (rate)
- **Rangée moyenne** : flanc droit (côlon ascendant) ; région ombilicale ou mésogastre (intestin grêle) ; flanc gauche (côlon descendant)
- **Rangée inférieure** : fosse iliaque droite (cæcum, appendice) ; hypogastre (vessie, utérus) ; fosse iliaque gauche (côlon sigmoïde) ; région inguinale (aine)
- **Plans de coupe** : sagittal : sépare droite et gauche ; frontal ou coronal : avant et arrière ; transversal ou axial : haut et bas (coupes habituelles du scanner)
- **Termes de direction** : supérieur (crânial) / inférieur (caudal) ; antérieur (ventral) / postérieur (dorsal) ; médial / latéral ; proximal / distal ; superficiel / profond

- **Homolatéral / controlatéral** : du même côté / du côté opposé (AVC gauche → hémiplégie droite)
- **Décubitus** : position couchée : dorsal (sur le dos), latéral, ventral ; le décubitus prolongé expose aux escarres
- **Position demi-assise** : tête et thorax relevés à 30-45° : pendant et après une alimentation par sonde
- **Orthostatisme** : position debout ; hypotension orthostatique : baisse de la pression artérielle au passage debout
- **Bilatéral / unilatéral** : des deux côtés / d'un seul côté

29.3.6 Le compte rendu d'hospitalisation et ses sigles

DÉFINITIONS

- **Plan du compte rendu** : identité et service ; motif ; antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux ; allergies ; mode de vie ; traitement habituel ; histoire de la maladie ; examen clinique ;...
- **Méthode de lecture** : repérer, décomposer, traduire, puis sélectionner ce qui est utile à la prise en charge nutritionnelle
- **Antécédents et état** : ATCD antécédents ; AEG altération de l'état général ; ALD affection de longue durée
- **Maladies cardiovasculaires** : HTA hypertension artérielle ; IDM infarctus du myocarde ; SCA syndrome coronarien aigu ; IC insuffisance cardiaque ; FA fibrillation auriculaire ; AVC, AIT accident...
- **Autres maladies** : DT1, DT2 diabète de type 1, 2 ; BPCO bronchopneumopathie chronique obstructive ; IRC, MRC insuffisance rénale chronique, maladie rénale chronique ; IRA insuffisance...
- **Biologie** : NFS numération formule sanguine ; VGM volume globulaire moyen ; CRP protéine C réactive ; HbA1c hémoglobine glyquée ; DFG débit de filtration glomérulaire ; ASAT, ALAT...
- **Examens** : ECG électrocardiogramme ; TDM tomodensitométrie ; IRM imagerie par résonance magnétique ; TEP tomographie par émission de positons ; FOGD fibroscopie œso-gastro-duodénale
- **Constantes et voies** : PA, FC, FR pression artérielle, fréquences cardiaque et respiratoire ; SpO_2 saturation pulsée en oxygène ; PO per os ; IV, IM, SC
- **Nutrition** : IMC indice de masse corporelle ; DPE dénutrition protéino-énergétique ; SRI syndrome de renutrition inappropriée ; CNO compléments nutritionnels oraux ; NE, NP nutrition...
- **Structures** : EHPAD ; SSR (aujourd'hui SMR, soins médicaux et de réadaptation) ; HAD hospitalisation à domicile ; RCP réunion de concertation pluridisciplinaire
- **Sigles ambigus** : IC (insuffisance cardiaque ou coronarienne) ; PA (pression artérielle ou phosphatases alcalines) ; AG (anesthésie générale ou acides gras) ; IR (insuffisance rénale ou...

29.3.6 Le vocabulaire de la nutrition clinique

DÉFINITIONS

- **Voie orale (per os)** : alimentation par la bouche, éventuellement enrichie (densité énergétique et protéique augmentée sans augmenter le volume), textures modifiées, CNO
- **CNO** : compléments nutritionnels oraux : mélanges nutritifs complets, hyperénergétiques et/ou hyperprotidiques, pris en plus des repas

- **Nutrition entérale (NE)** : apport de nutriments par une sonde dans le tube digestif (gastrique ou jéjunale) ; continue (pompe) ou discontinue ; à privilégier dès que le tube digestif fonctionne
- **Sonde nasogastrique (SNG)** : sonde introduite par le nez jusqu'à l'estomac : nutrition entérale de courte durée
- **Gastrostomie (GPE) / jéjunostomie** : sonde reliant l'estomac / le jéjunum à la peau : nutrition entérale prolongée ; jéjunostomie quand l'estomac n'est pas utilisable
- **Nutrition parentérale (NP)** : apport de nutriments par voie veineuse, réservé aux situations où le tube digestif est inutilisable ou insuffisant
- **Voie veineuse périphérique / centrale** : veine du bras : parentérale courte et peu concentrée / cathéter dont l'extrémité atteint la veine cave supérieure : parentérale prolongée ou concentrée (chambre...
- **Jeûne, à jeun strict** : absence de tout apport par la bouche (aliments et boissons), avant une intervention ou un examen
- **Réalimentation, renutrition** : reprise de l'alimentation après un jeûne ; correction progressive d'une dénutrition
- **Iso- / hyperénergétique, hyperprotidique** : apport égal à / supérieur aux besoins habituels en énergie, en protéines
- **Hyposodé / désodé** : pauvre en sodium (4 à 6 g de sel par jour) / sans sel ajouté et pauvre en sodium (strict, rare aujourd'hui)
- **Textures modifiées** : aliments hachés, moulinés, mixés pour les troubles de la mastication ou de la déglutition
- **Liquides épaissis, eau gélifiée** : boissons rendues plus épaisses pour ralentir leur passage et limiter les fausses routes en cas de dysphagie
- **Fausse route** : passage d'aliments ou de liquide dans les voies aériennes au lieu de l'œsophage ; risque de pneumopathie d'inhalation

FORMULES

- **Phrase PES** : « [Problème] lié à [Étiologie], mis en évidence par [Signes et symptômes] »

VALEURS REPÈRES

- **IDDSI 0 / 1 / 2** : fluide / très légèrement épais / légèrement épais (boissons)
- **IDDSI 3** : modérément épais (boisson) ; liquéfié (aliment)
- **IDDSI 4** : très épais (boisson : eau gélifiée) ; purée (aliment : mixé lisse sans grumeaux)
- **IDDSI 5** : haché et humide : morceaux ≤ 4 mm chez l'adulte
- **IDDSI 6** : tendre et en petits morceaux : ≤ 1,5 cm, écrasables à la fourchette
- **IDDSI 7** : normal ; variante « facile à mâcher »
- **Tests IDDSI** : boissons : écoulement d'une seringue de 10 mL pendant 10 s ; aliments : tests de la fourchette et de la cuillère
- **Durée de la SNG** : nutrition entérale de courte durée (moins de 4 à 6 semaines)

29.4 Rédiger dans le dossier et terminologie de la dénutrition

DÉFINITIONS

- **Six règles d'écriture** : être exact (observé, interprété, rapporté) ; précis et mesurable (chiffres, unités, dates) ; concis ; limiter les abréviations ; rester dans son champ de compétence ;...
- **Transmissions ciblées (DAR)** : une cible (problème, réaction, risque) suivie de Données (observé, mesuré, rapporté), Actions (fait ou proposé), Résultats (effet obtenu ou attendu)
- **Dénutrition** : déséquilibre nutritionnel avec bilan énergétique et/ou protéique négatif, entraînant des effets délétères sur les tissus et une aggravation du pronostic des

maladies…

- **Malnutrition** : terme plus large (OMS) : dénutrition, carences en micronutriments, surpoids et obésité ; en anglais, désigne souvent la seule dénutrition
- **Carence / déficit / subcarence** : apport ou statut insuffisant en un nutriment / manque mesuré par rapport à une norme / statut bas sans signe clinique
- **Cachexie** : syndrome métabolique associé à une maladie chronique : perte de masse musculaire, avec ou sans perte de masse grasse, non entièrement corrigée par la seule renutrition…
- **Sarcopénie** : diminution de la force musculaire, confirmée par une diminution de la masse ou de la qualité musculaire ; sévère si la performance physique est aussi diminuée (EWGSOP2,…
- **Fragilité** : réduction des réserves physiologiques qui augmente la vulnérabilité à un stress ; phénotype de Fried (2001) : fragile si 3 critères ou plus sur 5, préfragile si 1 ou 2
- **Obésité sarcopénique** : excès de masse grasse associé à une sarcopénie (ESPEN-EASO, 2022)
- **Bilan énergétique / azoté** : apports − dépenses d'énergie / azote ingéré − azote excrété ; négatif dans l'agression et la dénutrition
- **Hypercatabolisme / anabolisme** : dégradation accrue des réserves, surtout protéiques, au cours de l'agression / ensemble des synthèses, objectif de la renutrition
- **Agression** : réponse inflammatoire et hormonale à une maladie aiguë ou chronique, qui augmente les besoins et favorise le catabolisme
- **Ingesta** : aliments et boissons effectivement consommés ; relevé des ingesta sur 1 à 3 jours
- **Outils** : MNA (personne âgée), NRS 2002 (hôpital), SGA ; impédancemétrie (eau, masse maigre, masse grasse) ; DEXA (densité osseuse, composition corporelle)

FORMULES

- **Diagnostic de dénutrition (HAS, GLIM)** : ≥ 1 critère phénotypique + ≥ 1 critère étiologique
- **Perte de poids** : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **IMC** : poids (kg) / taille² (m^2)

VALEURS REPÈRES

- **Critère phénotypique : perte de poids** : ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel
- **Critère phénotypique : IMC** : < 18,5 kg/m^2 (18-69 ans) ; < 22 kg/m^2 (70 ans et plus)
- **Critère étiologique** : réduction des apports (≥ 50 % pendant plus d'1 semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines) ou absorption réduite ; situation d'agression (aiguë ou chronique)
- **Dénutrition sévère (18-69 ans)** : IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie ≤ 30 g/L
- **Dénutrition sévère (70 ans et plus)** : IMC < 20 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie < 30 g/L
- **Dénutrition modérée** : 18-69 ans : 17 < IMC < 18,5 ; 70 ans et plus : 20 ≤ IMC < 22 ; perte de 5 à 10 % en 1 mois ou de 10 à 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie : 30…
- **Sarcopénie : force** : préhension < 27 kg (homme) / < 16 kg (femme) ; 5 levers de chaise > 15 s
- **Sarcopénie : masse** : masse musculaire squelettique appendiculaire < 20 kg / < 15 kg (ou < 7,0 / < 5,5 kg/m^2)

- **Sarcopénie : performance** : vitesse de marche ≤ 0,8 m/s ; SPPB ≤ 8 ; TUG ≥ 20 s
- **IMC (OMS, adulte < 70 ans)** : maigreur < 18,5 ; normal 18,5 à 24,9 ; surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30 (I : 30-34,9 ; II : 35-39,9 ; III : ≥ 40)

29.4 Le vocabulaire de la santé publique et de la recherche

DÉFINITIONS

- **Étude descriptive (transversale)** : photographie d'une population à un instant : mesure une prévalence, ne prouve pas de causalité
- **Étude cas-témoins** : compare l'exposition passée de malades et de non-malades : odds ratio (OR) ; biais de mémoire
- **Étude de cohorte** : suit dans le temps des sujets exposés et non exposés, initialement indemnes : incidence et risque relatif
- **Essai contrôlé randomisé** : intervention attribuée par tirage au sort, groupe contrôle, idéalement en double aveugle : preuve de causalité la plus forte pour une intervention
- **Revue systématique, méta-analyse** : synthèse de toutes les études sur une question, avec combinaison statistique : niveau de preuve le plus élevé
- **Biais / facteur de confusion** : erreur systématique (sélection, mesure, mémoire) / facteur lié à l'exposition et à la maladie qui crée une association trompeuse
- **Intervalle de confiance à 95 %** : fourchette qui contient la vraie valeur avec une confiance de 95 % ; si l'IC d'un RR contient 1, l'association n'est pas significative
- **Valeur p** : probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême si l'hypothèse nulle est vraie ; $p < 0,05$: « statistiquement significatif »
- **Dépistage / diagnostic** : repérer les personnes à risque dans une population (test simple, sensible) / confirmer la maladie chez un individu (examen spécifique)
- **Grades HAS** : A preuve scientifique établie ; B présomption ; C faible niveau de preuve ; AE accord d'experts

FORMULES

- **Risque relatif** : RR = incidence chez les exposés / incidence chez les non-exposés
- **Sensibilité** : Se = VP / (VP + FN)
- **Spécificité** : Sp = VN / (VN + FP)
- **Valeur prédictive positive** : VPP = VP / (VP + FP) ; dépend de la prévalence
- **Valeur prédictive négative** : VPN = VN / (VN + FN)

29.9 Valeurs de référence et conversions associées aux termes

FORMULES

- **Glucose** : g/L × 5,55 = mmol/L (M = 180 g/mol)
- **Cholestérol** : g/L × 2,58 = mmol/L (M ≈ 387 g/mol)
- **Triglycérides** : g/L × 1,14 = mmol/L
- **Créatinine** : mg/L × 8,84 = µmol/L (M = 113 g/mol)
- **Sodium et sel** : 1 mmol de Na = 23 mg ; 1 g de NaCl = 393 mg de Na ≈ 17 mmol ; sel = Na × 2,54
- **Potassium** : 1 mmol de K = 39 mg

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie à jeun** : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; hypoglycémie < 0,70 g/L ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10 à 1,25 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises

- **HbA1c** : objectif usuel ≤ 7 % dans le diabète de type 2 (HAS 2013, à individualiser) ; reflète les 2 à 3 derniers mois
- **Natrémie / kaliémie** : 135 à 145 mmol/L / 3,5 à 5,0 mmol/L
- **Calcémie / phosphatémie** : 2,20 à 2,60 mmol/L / 0,80 à 1,45 mmol/L
- **Urée / créatinine** : 2,5 à 7,5 mmol/L / ≈ 60 à 110 µmol/L (homme), 45 à 90 µmol/L (femme)
- **DFG et stades de MRC** : ≥ 90 mL/min/1,73 m² ; 60-89 (2) ; 45-59 (3a) ; 30-44 (3b) ; 15-29 (4) ; < 15 (5)
- **Albuminurie** : < 30 mg/24 h ; 30 à 300 : microalbuminurie ; > 300 : macroalbuminurie
- **Protéinurie** : < 0,15 g/24 h
- **Hémoglobine (OMS)** : ≥ 13 g/dL (homme), ≥ 12 g/dL (femme), ≥ 11 g/dL (femme enceinte) ; en dessous : anémie
- **VGM** : 80 à 100 fL ; microcytose < 80, macrocytose > 100

Les pièges

- « Le suffixe -ite signifie « infection ». » → faux : Il signifie inflammation, qui peut être infectieuse ou non (arthrite rhumatoïde, gastrite médicamenteuse).
- « Une arthrose est une inflammation de l'articulation. » → faux : -ose : processus dégénératif ; l'inflammation est l'arthrite.
- « Le préfixe dys- signifie « deux ». » → faux : Dys- = difficulté, anomalie ; « deux » = di- ou bi-.
- « Une gastrostomie est l'ablation de l'estomac. » → faux : C'est un abouchement de l'estomac à la peau ; l'ablation est une gastrectomie.
- « L'hémoptysie est un vomissement de sang. » → faux : C'est un crachat de sang d'origine respiratoire ; le vomissement de sang est l'hématémèse.
- « La racine latine forme plus souvent les noms de maladies que la racine grecque. » → faux : C'est l'inverse : le grec forme surtout les maladies et les actes, le latin les adjectifs anatomiques.
- « Un symptôme est constaté par le médecin lors de l'examen. » → faux : Il est ressenti et rapporté par le patient ; le signe est constaté.
- « La prévalence mesure les nouveaux cas apparus pendant une période. » → faux : C'est l'incidence ; la prévalence compte tous les cas présents à un instant.
- « Une maladie chronique est forcément grave. » → faux : Chronique = qui dure ; la gravité est une autre notion.
- « Une bradycardie est une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute. » → faux : Brady- = lent : < 60/min ; > 100/min = tachycardie.
- « Une échographie utilise des rayons X. » → faux : Elle utilise des ultrasons (écho) ; le scanner (TDM) utilise des rayons X.
- « La coloscopie et la cœlioscopie explorent le même organe. » → faux : Coloscopie : intérieur du côlon ; cœlioscopie : cavité abdominale (péritonéale).