


Introdução à Teoria de Grupos e Teoria de Módulos

Marco Vieira Buseti

Orientador: Prof. Francismar Ferreira Lima



Índice

Lista de Símbolos e Notações	3
1 Generalidades sobre Grupos	5
1.1 Operações Binárias	5
1.2 Grupos	6
1.3 Subgrupos	9
1.4 Teorema de Lagrange	17
1.5 Grupos Quocientes	20
1.6 Homomorfismos de Grupos	31
2 Produtos	48
2.1 Produto Direto de Grupos	48
2.2 Produto Semidireto de Grupos	54
2.3 Sequências Exatas Curtas	59
3 Grupo Simétrico	63
3.1 Generalidades sobre o grupo simétrico	63
3.2 Ciclos e transposições	67
3.3 Assinatura	74
3.4 Grupo Alternado $\mathfrak{A}_X$	79
4 Ações de Grupos	88
4.1 Generalidades sobre Ações de Grupos	88
5 Grupos Solúveis	92
5.1 Teorema de Jordan-Hölder	92
5.2 Grupos Solúveis	99

Lista de Símbolos e Notações

Abaixo estão listadas as principais notações utilizadas ao longo deste trabalho.

$\mathbb{N}$	Conjunto dos números naturais: $\{0, 1, 2, \dots\}$	$X_{<n}$	Subconjunto dos elementos de X que são estritamente menores que n
$\mathbb{Z}$	Conjunto dos números inteiros: $\{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$	$A \times B$	Produto cartesiano entre os conjuntos A e B
$\mathbb{Q}$	Conjunto dos números racionais	$\text{Card}(X)$	Cardinalidade do conjunto X
$\mathbb{R}$	Conjunto dos números reais	$[[a, b]]$	Conjunto de inteiros compreendidos entre a e b
$\mathbb{C}$	Conjunto dos números complexos	$a \mid b$	O inteiro a divide o inteiro b
$\mathbb{U}$	Círculo unitário (conjunto dos números complexos de módulo 1)	$a \nmid b$	O inteiro a não divide o inteiro b
X^*	Conjunto X excluindo o elemento nulo (ex: $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$)	e ou e_G	Elemento neutro do grupo G
X_+	Subconjunto dos elementos não negativos de X (ex: $\mathbb{Z}_+ = \mathbb{N}$)	$ G $	Ordem do grupo G
X_+^*	Subconjunto dos elementos estritamente positivos de X	$H \leq G$	H é subgrupo de G
$X_{\geq n}$	Subconjunto dos elementos de X que são maiores ou iguais a n (ex: $\mathbb{Z}_{\geq 2} = \{2, 3, 4, \dots\}$)	$H < G$	H é subgrupo próprio de G
		$N \trianglelefteq G$	N é subgrupo normal de G
		$N \triangleleft G$	N é subgrupo normal próprio de G

$H \trianglelefteq G$	H é subgrupo característico de G	$H \rtimes_{\theta} K$	Produto semidireto externo associado a θ
$[G : H]$	Índice do subgrupo H em G	$GL_n(\mathbb{K})$	Grupo linear geral sobre $\mathbb{K}$
G/H	Grupo quociente de G por H	$SL_n(\mathbb{K})$	Grupo linear especial sobre $\mathbb{K}$
$Z(G)$	Centro do grupo G	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Grupo dos inteiros módulo n
$\langle X \rangle$	Subgrupo gerado pelo conjunto X	$\mathbb{Z}_p^*$	Grupo multiplicativo dos inteiros invertíveis módulo p
$[x, y]$	Comutador dos elementos x e y	$\mathfrak{S}_X$ ou $\mathfrak{S}_n$	Grupo simétrico do conjunto X (ou de grau n)
G' ou $G^{(1)}$	Grupo derivado (ou dos comutadores) de G	$\mathfrak{A}_X$ ou $\mathfrak{A}_n$	Grupo alternado do conjunto X (ou de grau n)
G^{ab}	Abelianização de G (quociente G/G')	$\mathcal{K}$	Grupo de Klein
$\mathcal{O}(g)$	Ordem do elemento g	$\mathfrak{K}$	Grupo simétrico de Klein
$\ker \varphi$	Núcleo do homomorfismo φ	id_X	Permutação identidade (ou função identidade)
$\text{Im } \varphi$	Imagem do homomorfismo φ	$\text{supp}(\sigma)$	Suporte da permutação σ
$\text{Hom}(G, \mathcal{G})$	Conjunto de homomorfismos de G em $\mathcal{G}$	$\mathcal{I}(\sigma)$	Número de inversões da permutação σ
$\text{Aut}(G)$	Grupo de automorfismos de G	$\varepsilon(\sigma)$	Assinatura da permutação σ
$\text{Inn}(G)$	Grupo de automorfismos internos de G	$G \curvearrowright X$	G age à esquerda sobre X
$G \cong \mathcal{G}$	Isomorfismo entre G e $\mathcal{G}$	$\mathcal{O}(x)$	Órbita do elemento x
$\prod G_i$	Produto direto externo de grupos	X/G	Conjunto das órbitas da ação de G sobre X
$\odot H_i$	Produto direto interno de grupos	G_x	Estabilizador (grupo de isotropia) de x
$H \rtimes K$	Produto semidireto interno		

Capítulo 1

Generalidades sobre Grupos

1.1 Operações Binárias

Definição 1.1.1

Sejam G e E conjuntos não-vazios e $\oplus$ uma função tal que:

$$\oplus : \begin{array}{ccc} G \times G & \rightarrow & E \\ (a, b) & \mapsto & \oplus(a, b) \end{array}$$

Definimos a função acima como a **operação binária de dois elementos de G em E** e a escrevemos comumente como: $a \oplus b$.

Exemplo 1.1.1

Sejam $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, a função que define a distância cartesiana entre dois pontos a e b :

$$\text{dist}(a, b) : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R}^+ \\ (a, b) & \mapsto & \sqrt{a^2 + b^2} \end{array}$$

representa uma operação binária de dois elementos de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^+$.

Definição 1.1.2

A partir das notações acima, definimos **lei de composição interna de $G \times G \rightarrow G$ se $E = G$** .

*Observação: caso não haja ambiguidade, denotaremos simplesmente **lei de composição interna em G** para representar a lei de composição interna de $G \times G \rightarrow G$.*

Exemplo 1.1.2

A operação usual $+$ em $\mathbb{N}$ é uma lei de composição interna em $\mathbb{N}$, ao contrário da operação usual $-$ de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{Z}$.

1.2 Grupos

Definição 1.2.1

Seja G um conjunto não-vazio. **Dizemos que $(G, \cdot)$ é um grupo** se, e somente se, $\cdot$ é uma lei de composição interna em G tal que:

1. $\exists e \in G, \forall x \in G : x \cdot e = e \cdot x = x;$
2. $\forall x \in G, \exists \hat{x} \in G : x \cdot \hat{x} = \hat{x} \cdot x = e;$
3. $\forall x, y, z \in G : (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$

Observações:

Levando em consideração as notações acima, temos:

1. *Primeiramente, notamos que e e $\hat{x}$ são únicos, uma vez que:*

Supondo que existam e e e' pertencentes à G que satisfazem o item 1, temos:

$$x \cdot e = x = x \cdot e' \implies \hat{x} \cdot x \cdot e = \hat{x} \cdot x \cdot e' \implies e = e' \quad \square$$

Supondo agora que existam $\hat{x}$ e $\hat{x}'$ que satisfaçam o item 2, temos:

$$\hat{x} \cdot x = e = \hat{x}' \cdot x \implies \hat{x} \cdot x \cdot \hat{x} = \hat{x}' \cdot x \cdot \hat{x} \implies \hat{x} \cdot e = \hat{x}' \cdot e \implies \hat{x} = \hat{x}' \quad \square$$

2. *Notamos por convenção x^{-1} no lugar de $\hat{x}$ no **item 2** (dada sua unicidade).*
3. *Caso $\forall (x, y) \in G \times G : x \cdot y = y \cdot x$, dizemos que G é um grupo abeliano (ou comutativo).*
4. *Caso G seja um grupo abeliano, então*

$$(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

5. *Caso não haja ambiguidade, a operação do grupo poderá ser omitida, isto é, denotaremos o grupo $(G, \cdot)$ apenas por G .*

Exemplo 1.2.1

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ e $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ são grupos abelianos (onde $+$ e $\cdot$ denotam as operações usuais de adição e produto em $\mathbb{C}$).

Exemplo 1.2.2

$(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ define uma estrutura de grupo, onde $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$ e $GL_n(\mathbb{K})$ é o conjunto das matrizes $n \times n$ invertíveis com entradas em $\mathbb{K}$, munido da operação usual de produto de matrizes, denotada por $\times$.

Exemplo 1.2.3

Seja A um conjunto não-vazio. Considere:

$$\text{Bij}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{f : A \rightarrow A ; f \text{ bijetiva}\}$$

o conjunto das funções bijetivas de A em A .

$(\text{Bij}(A), \circ)$ define uma estrutura de grupo, onde $\circ$ representa composição entre funções.

Caso A seja um conjunto finito, $\text{Bij}(A)$ será representado por $\mathfrak{S}_A$ e será chamado de **grupo simétrico ou grupo das permutações**.

Exemplo 1.2.4

Consideremos, neste exemplo, para fins de simplificação, $\mathbb{Z}_n \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, para $n \in \mathbb{Z}$.

Seja a operação $\odot$ em $\mathbb{Z}_n$ definida da seguinte forma:

$$\odot : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n & \rightarrow & \mathbb{Z}_n \\ (\bar{a}, \bar{b}) & \mapsto & \bar{a} \odot \bar{b} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{a \cdot b} \end{array}$$

onde $\cdot$ é a operação usual de produto nos inteiros.

Temos que $(\mathbb{Z}_p^*, \odot)$, para p primo, é um grupo abeliano.

Demonstração:

Por construção, temos que $\bar{a} \odot \bar{b} \in \mathbb{Z}_p^*$.

Para mostrar a associatividade, sejam $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_p^*$.

Temos que:

$$\begin{aligned} \bar{a} \odot (\bar{b} \odot \bar{c}) &= \bar{a} \odot (\overline{b \cdot c}) = \\ &= \overline{a \cdot (b \cdot c)} = \overline{(a \cdot b) \cdot c} = (\bar{a} \odot \bar{b}) \odot \bar{c}. \end{aligned}$$

O elemento neutro é evidentemente o elemento $\bar{1} \in \mathbb{Z}_p^*$, pois:

$$\bar{a} \odot \bar{1} = \overline{a \cdot 1} = \bar{a}, \quad \forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_p^*.$$

Também temos que para todo elemento de $\mathbb{Z}_p^*$, existe elemento inverso, pois, sabemos que:

$$\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_p^* \implies \text{mdc}(a, p) = 1.$$

Logo, pelo Teorema de Bézout, temos que existem x e y inteiros tais que:

$$ax - py = 1$$

Ora mas isso é a mesma coisa que afirmar que existe uma solução para a equação:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{p} \iff \bar{a} \odot \bar{x} = \bar{1}.$$

Logo, deduzimos que $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_p^*, \exists \bar{a}^{-1} \in \mathbb{Z}_p^*$.

Além disso, é evidente que a operação $\odot$ é comutativa.

Portanto, provamos que $(\mathbb{Z}_p^*, \odot)$ é um grupo abeliano. □

Exemplo 1.2.5

Seja o conjunto $G =]-1, 1[$ e a operação binária $\star$ definida por:

$$x \star y = \frac{x+y}{1+xy}, \quad \forall x, y \in G$$

Então $(G, \star)$ é um grupo abeliano.

Demonstração:

Provemos primeiramente que $\forall x, y \in G, x \star y \in G$.

Fixando $y \in G$ temos a seguinte função de $x \in G$:

$$f(x) = \frac{x+y}{1+xy}$$

A função é derivável em G . Tomando sua derivada temos:

$$f'(x) = \frac{1-y^2}{(1+xy)^2}$$

Temos evidentemente $\forall (x, y) \in G \times G, f'(x) > 0$.

(De forma simétrica podemos mostrar o mesmo escrevendo f como uma função de y).

Logo, deduzimos que a função f é estritamente crescente.

Portanto:

$$f(-1) < x \star y < f(1) \iff \frac{y-1}{1-y} < x \star y < \frac{1+y}{1+y} \iff -1 < x \star y < 1$$

Logo, provamos que $x \star y \in G$.

Provemos os outros axiomas:

Existência do neutro:

Tomando $y = 0$ temos:

$$x \star 0 = \frac{x+0}{1+0 \cdot x} = x$$

Portanto, deduzimos que o elemento neutro do grupo G é dado por $e = 0$.

Existência do inverso:

Tomando $y = -x$ temos:

$$x \star -x = \frac{x-x}{1-(-x)x} = 0$$

Portanto, deduzimos que o elemento inverso do grupo G existe e é dado por $x^{-1} = -x$.

Associatividade:

Sejam $x, y, z \in G$, mostremos que $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
Temos:

$$\begin{aligned} (x \star y) \star z &= \frac{(x \star y) + z}{1 + (x \star y)z} = \frac{\frac{x+y}{1+xy} + z}{1 + z\frac{x+y}{1+xy}} = \frac{x + y + z + xyz}{1 + xy + xz + yz} = \\ &= \frac{x(1 + yz) + (y + z)}{(1 + yz) + x(y + z)} = \frac{x + \frac{y+z}{1+yz}}{1 + x\frac{y+z}{1+yz}} = x \star (y \star z) \end{aligned}$$

Mostrando, assim, a associatividade.

Ainda, temos que o grupo é evidentemente abeliano.

□

1.3 Subgrupos

Definição 1.3.1

Seja $(G, \cdot)$ um grupo. Um subconjunto $H \subseteq G$ é chamado de subgrupo de G (denotamos $H \leq G$) se, e somente se, $(H, \cdot)$ é um grupo.

Observação: temos ainda que se $H \subset G$, então H é chamado de subgrupo próprio de G e denotamos $H < G$.

Proposição 1.3.1

Seja $H \subseteq G$ tal que $H \neq \emptyset$ e $(G, \cdot)$ é um grupo. $H \leq G$ é equivalente à satisfazer as seguintes condições:

- (i) $h_1 \cdot h_2 \in H, \forall (h_1, h_2) \in H \times H$;
- (ii) $h^{-1} \in H, \forall h \in H$.

Demonstração:

É necessário mostrarmos as duas implicações da equivalência:

$$H \leq G \implies \text{(i) e (ii)} \quad (1.1)$$

$$\text{(i) e (ii)} \implies H \leq G \quad (1.2)$$

A implicação (1.1) é trivial. Ora, se $H \leq G$, então pela definição de subgrupo temos que $h_1 \cdot h_2 \in H$ e $h^{-1} \in H$, isto é $\exists h^{-1} \in H : h \cdot h^{-1} = h^{-1} \cdot h = h$.

Para a implicação (1.2):

Sabemos que $H \subseteq G$, logo, se $h_1 \cdot h_2 \in H \implies h_1 \cdot h_2 \in G$. Ora, sabemos que $(G, \cdot)$ é um grupo. Logo, a associatividade é satisfeita. Para demonstrar que $e \in H$, basta tomarmos $h_2 = h^{-1}$ a partir de (ii). Logo, temos $h \cdot h^{-1} = e \in H$. Com isso mostramos todos os axiomas necessários e deduzimos que $H \leq G$.

□

Exemplo 1.3.1

$(\mathbb{U}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{Q}_+^*, \cdot)$ são subgrupos de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$, onde $\cdot$ denota a multiplicação usual em $\mathbb{C}$.

Exemplo 1.3.2

Se G é um grupo, então G e $\{e\}$ são subgrupos *triviais* de G .

Exemplo 1.3.3

Seja $n \in \mathbb{N}^*$, defina:

$$SL_n(\mathbb{K}) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in GL_n(\mathbb{K}), \det(A) = 1\}$$

Temos que $(SL_n(\mathbb{K}), \cdot) \leq (GL_n(\mathbb{K}), \cdot)$, onde $\cdot$ denota o produto usual de matrizes.

Chamamos $SL_n(\mathbb{K})$ de **grupo linear especial**.

Demonstração:

Mostremos que temos de fato $SL_n(\mathbb{K}) \leq GL_n(\mathbb{K})$.

Primeiramente, note que é evidente que $SL_n(\mathbb{K})$ é não vazio, pois $\text{id}_n \in SL_n(\mathbb{K})$.

Mostremos que $\forall A, B \in SL_n(\mathbb{K}), AB^{-1} \in SL_n(\mathbb{K})$.

Sabemos que se $A, B \in SL_n(\mathbb{K})$ então $\det(A) = \det(B) = 1$.

Ora, sabemos que:

$$\det(AB^{-1}) = \det(A)\det(B^{-1}) = \det(A)\det(B)^{-1} = 1 \cdot 1 = 1.$$

Logo, mostramos que $SL_n(\mathbb{K}) \leq GL_n(\mathbb{K})$. □

Exemplo 1.3.4

Seja $n \in \mathbb{Z}$, então $(n\mathbb{Z}, +)$ são subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ e, em particular, são os únicos.

Demonstração:

É evidente que $(n\mathbb{Z}, +)$ são subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$. Mostremos que são os únicos.

Seja $(H, +)$ um subgrupo qualquer de $(\mathbb{Z}, +)$. Se $H = \{0\}$, então $H = 0\mathbb{Z}$.

Suponhamos agora $H \neq \{0\}$. Seja $n = \min\{a \in H, a > 0\}$.

Logo, como $n \in H$ e $H \leq \mathbb{Z}$, temos que $n\mathbb{Z} \subseteq H$.

De maneira inversa, seja $h \in H$. Logo, pelo Algoritmo de Euclides, existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que:

$$h = qn + r \quad (0 \leq r < n)$$

Porém, note que, como $h \in H$, temos:

$$r = h - qn \in H$$

Porém, sabemos que $0 \leq r < n$.

Ora, como n é o elemento mínimo de H estritamente maior que 0, deduzimos que apenas podemos ter $r = 0$.

Logo:

$$h = qn \implies h \in n\mathbb{Z} \implies H \subseteq n\mathbb{Z}.$$

Portanto deduzimos que $H = n\mathbb{Z}$. □

Exemplo 1.3.5

Seja G um grupo e I um conjunto não-vazio de índices. Se $\{H_i\}_{i \in I}$ é uma família de subgrupos de G , então $\bigcap_{i \in I} H_i$ é um subgrupo de G .

Demonstração:

Como visto na **Proposição 1.3.1**, basta mostrar que:

$$(i) \forall x_1, x_2 \in \bigcap_{i \in I} H_i \implies x_1 \cdot x_2 \in \bigcap_{i \in I} H_i;$$

$$(ii) x \in \bigcap_{i \in I} H_i \implies x^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i.$$

Note, primeiramente, que $\bigcap_{i \in I} H_i$ é não vazio. De fato, como H_i é grupo para todo $i \in I$ temos trivialmente que $e \in \bigcap_{i \in I} H_i$, onde e denota o elemento neutro do grupo G .

Provemos, agora, o item (i):

Sejam $x_1, x_2 \in \bigcap_{i \in I} H_i$.

Logo, por definição, temos que $x_1, x_2 \in H_i, \forall i \in I$.

Sabemos também que $H_i \leq G, \forall i \in I$.

Portanto, deduzimos diretamente que $x_1 \cdot x_2 \in H_i, \forall i \in I$.

Mas isso é a mesma coisa que afirmar que:

$$\forall x_1, x_2 \in \bigcap_{i \in I} H_i \implies x_1 \cdot x_2 \in \bigcap_{i \in I} H_i$$

Provemos o item (ii):

Analogamente ao item (i), sabemos que:

$$x \in \bigcap_{i \in I} H_i \iff x \in H_i, \forall i \in I$$

Sabemos também que $H_i \leq G, \forall i \in I$.

Logo, analogamente, temos que se $x \in H_i$, então $x^{-1} \in H_i, \forall i \in I$.

Mas isso é a mesma coisa que afirmar:

$$x \in \bigcap_{i \in I} H_i \implies x^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$$

Portanto, provamos que:

$$\bigcap_{i \in I} H_i \leq G$$

□

Definição 1.3.2

Seja G um grupo. O subconjunto $Z(G)$ tal que:

$$Z(G) = \{x \in G : xg = gx, \forall g \in G\}$$

define um subgrupo de G chamado **centro** de G .

Demonstração:

Como visto na **Proposição 1.3.1**, para mostrar que $Z(G) \leq G$ é necessário mostrar que $x \cdot x^{-1} \in Z(G)$, $\forall x \in Z(G)$.

Note que $Z(G)$ é claramente não vazio uma vez que o elemento neutro comuta com todos elementos de G e, portanto, está em $Z(G)$.

Ora, se:

$$x \in Z(G) \implies x \cdot g = g \cdot x, \forall g \in G.$$

Então:

$$xgx^{-1} = g \implies x^{-1}xgx^{-1} = x^{-1}g \implies gx^{-1} = x^{-1}g, \forall g \in G$$

Portanto $x^{-1} \in Z(G)$.

Temos também que, se:

$$x_1 \in Z(G) \implies x_1g = gx_1, \forall g \in G \quad (I)$$

e,

$$x_2 \in Z(G) \implies x_2g = gx_2, \forall g \in G \quad (II)$$

Deduzimos de (I):

$$x_1g = gx_1 \implies g = x_1^{-1}gx_1$$

Substituindo em (II):

$$x_2x_1^{-1}gx_1 = x_1^{-1}gx_1x_2 \implies x_2x_1^{-1}x_1g = x_1^{-1}gx_1x_2$$

$$\implies x_2g = x_1^{-1}gx_1x_2 \implies (x_1x_2)g = g(x_1x_2)$$

Logo, deduzimos que:

$$(x_1, x_2) \in Z(G) \times Z(G) \implies x_1 \cdot x_2 \in Z(G)$$

Portanto, $Z(G) \leq G$. □

Observação: O subgrupo centro serve o propósito de "medir a comutatividade" de um dado grupo. Por exemplo, observamos que $Z(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, $Z(GL_2(\mathbb{R})) = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{R}^*\}$ e $Z(S_n) = \{e\}$, $n \geq 3$.

Definição 1.3.3

Seja $(G, \cdot)$ um grupo e X um conjunto não-vazio tal que $X \subseteq G$. Chamamos de **subgrupo gerado por um subconjunto** a interseção de todos os subgrupos de G que contém X . Denotamos-o como $\langle X \rangle$.

Matematicamente temos:

$$\langle X \rangle = \bigcap \{H : H \leq G \text{ e } X \subseteq H\}$$

Proposição 1.3.2

A partir das notações da **Definição 1.3.3**, temos que $\langle X \rangle$ é o menor subgrupo de G que contém X .

Demonstração:

Suponha que $J \leq G$ seja o menor subgrupo de G tal que $X \subseteq J$.

Ora, como $J \leq G$ e $X \subseteq J$, então: $\langle X \rangle \subseteq J$.

Entretanto, também sabemos que J é o menor subgrupo de G tal que $X \subseteq J$.

Portanto, deduzimos que $J \subseteq H$, $\forall H : H \leq G$ e $X \subseteq H$.

Porém, para todo H subgrupo de G temos que $X \subseteq H$, logo, deduzimos que $J \subseteq \langle X \rangle$.

Portanto, $J = \langle X \rangle$.

□

Proposição 1.3.3

A partir das notações da **Definição 1.3.3**, temos que:

$$\langle X \rangle = \{x_1 x_2 \dots x_n : x_i \in X \cup X^{-1}, n \geq 1\}$$

Demonstração:

Sejam:

$$\dot{X} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap \{H : H \leq G \text{ e } X \subseteq H\}$$

$$\bar{X} \stackrel{\text{def}}{=} \{x_1 x_2 \dots x_n : x_i \in X \cup X^{-1}, n \geq 1\}$$

Queremos mostrar que: $\dot{X} = \bar{X}$.

Realizemos, primeiramente, algumas convenções de notação:

$$\bar{x}_p \stackrel{\text{def}}{=} x_1 x_2 \dots x_p, p \in \mathbb{Z}_+^*$$

$$\bar{x}_p^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} x_1^{-1} x_2^{-1} \dots x_p^{-1}, p \in \mathbb{Z}_+^*$$

É evidente que $\bar{x}_p, \bar{x}_p^{-1} \in \bar{X}$. Assim como $\bar{x}_p \bar{x}_p^{-1} \in \bar{X}$, o que nos mostra que $\bar{X} \leq G$.

Mostremos que $\dot{X} \subseteq \bar{X}$:

Sabemos que:

$$\bar{X} = \{\bar{x}_p : x_i \in X \cup X^{-1}, p \in \mathbb{Z}_+^* \text{ e } 1 \leq i \leq p\}$$

Evidentemente temos que:

$$\forall x \in X \implies x \in \bar{X}$$

Uma vez que $\bar{X} \leq G$, temos diretamente que $\dot{X} \subseteq \bar{X}$.

Isso se dá pelo fato de que $\dot{X}$ é o menor subgrupo de G contendo X , e, como $\bar{X}$ é um subgrupo de G contendo X , realizamos tal dedução.

Mostremos agora que $\bar{X} \subseteq \dot{X}$:

Seja $H \leq G$ tal que:

$$H \leq G \text{ e } X \subseteq H.$$

Ora, temos evidentemente que:

$$\forall \bar{x}_p \in \bar{X} \implies \bar{x}_p \in H.$$

Logo:

$$\bar{x}_p \in H \implies \bar{x}_p \in \bigcap_{i \in I} H_i$$

Onde I é um conjunto não-vazio de índices.

Evidentemente temos então que $\bar{x}_p \in \dot{X}$.

Logo, $\bar{X} \subseteq \dot{X}$.

Portanto, mostramos que: $\bar{X} = \dot{X}$.

□

Exemplo 1.3.6

Seja o grupo $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ e o subconjunto $E \subset \mathbb{R}^*$ tal que $E = \{2\}$. O subgrupo gerado por E é, portanto, $H = \{2^n, n \in \mathbb{Z}\}$.

De forma genérica, para um grupo G e um elemento $a \in G$, temos: $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$.

De forma geral, dado um grupo G , para determinarmos um subgrupo H gerado por um subconjunto X devemos provar os seguintes pontos:

1. H é um subgrupo de G
2. $X \subset H$
3. Se H' é um outro subgrupo tal que $X \subset H'$, então $H \subset H'$

Definição 1.3.4

Seja G um grupo. G é chamado de grupo cíclico quando ele pode ser gerado por um único elemento $x \in G$.

Observação: caso um grupo possa ser gerado por mais de um elemento, digamos n elementos, então dizemos que o grupo é n -gerado.

Exemplo 1.3.7

$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$, $\mathbb{U} = \langle e^{\frac{2\pi i}{n}} \rangle$ são exemplos de grupos cíclicos.

Proposição 1.3.4

Se G é um grupo cíclico, então G é um grupo abeliano.

Demonstração:

Seja $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$. Podemos representar G como:

$$G = \{ \dots, (a^{-1})^r, \dots, (a^{-1})^2, a^{-1}, e, a, a^2, \dots, a^r, \dots \}$$

Onde $r \in \mathbb{Z}$.

Sejam $(x, y) \in G \times G$, queremos mostrar que $x \cdot y = y \cdot x$.

Sabemos que:

$$x = a^{r_1}, r_1 \in \mathbb{Z}$$

$$y = a^{r_2}, r_2 \in \mathbb{Z}$$

Logo:

$$x \cdot y = a^{r_1} \cdot a^{r_2} = a^{r_1+r_2} \stackrel{(*)}{=} a^{r_2+r_1} = a^{r_2} \cdot a^{r_1} = y \cdot x$$

$(*)$: deduz-se que $r_1 + r_2 = r_2 + r_1$ pois estamos trabalhando dentro do grupo abeliano $(\mathbb{Z}, +)$.

Portanto, G é um grupo abeliano. □

Definição 1.3.5

Sejam G um grupo e $x, y \in G$. Definimos o **comutador de x e y** como o elemento $[x, y] \stackrel{\text{def}}{=} xyx^{-1}y^{-1} \in G$.

Definimos ainda o **grupo derivado de G** (ou **grupo dos comutadores de G**) como o subgrupo de G dado por:

$$G' \stackrel{\text{def}}{=} \langle [x, y] : x, y \in G \rangle$$

Alternativamente podemos escrever $G^{(1)} \stackrel{\text{def}}{=} G'$, $G^{(2)} \stackrel{\text{def}}{=} (G')'$, e assim sucessivamente.

Observações:

- Note que G' é de fato um subgrupo de G , uma vez que ele é, por definição, um subgrupo gerado;
- Note que, para um dado grupo G e $x, y \in G$, **não** necessariamente temos $[x, y] = [y, x]$.

Definição 1.3.6

Seja G um grupo. Chamamos G de **grupo perfeito** se $G' = G$.

Definição 1.3.7

Seja $(G, \cdot)$ um grupo. Definimos **ordem do grupo** $(G, \cdot)$ a **quantidade de elementos no conjunto** G e a denotamos por $|G|$.

Se $\alpha \in G$, a **ordem de α** é a **ordem do subgrupo gerado por α** , denotada por $\mathcal{O}(\alpha)$, isto é, $\mathcal{O}(\alpha) = |\langle \alpha \rangle|$.

Exemplo 1.3.8

$$|\mathbb{Z}| = \infty, |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n, |(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*| = p - 1, |\mathfrak{S}_n| = n!$$

Proposição 1.3.5

Seja G um grupo finito e α um elemento de G .
Logo, $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$.

Demonstração:

Provemos a **Proposição 1.3.5** via absurdo.

Suponha que $\mathcal{O}(\alpha)$ seja não finito, logo podemos gerar n valores distintos a partir de potências de α , onde $n \in \mathbb{Z}$.

Ora, a partir da geração de infinitos valores distintos de potências de α , sabemos que, para dado valor inteiro k , teremos $\alpha^k \notin G$. Ora, mas $\langle \alpha \rangle$ é um subgrupo de G . Absurdo.

Portanto, temos que $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$. □

Proposição 1.3.6

Seja G um grupo e α um elemento de G . Então, as seguintes proposições são equivalentes:

- (i) A ordem $\mathcal{O}(\alpha)$ é finita. Isto é, $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$;
- (ii) $\exists t \in \mathbb{Z}_+^* : \alpha^t = e$, onde $t = \min \{k \in \mathbb{Z} : k > 0\}$.

Note que, caso a proposição seja satisfeita, então temos $\mathcal{O}(\alpha) = t$.

Demonstração:

Queremos provar que: (i) $\iff$ (ii).

Começamos provando a implicação (i) $\implies$ (ii) :

Temos, por definição, que $\langle \alpha \rangle = \{\alpha^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$.

Como $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$, temos que $\exists p, q \in \mathbb{Z} : p > q$ e $\alpha^p = \alpha^q$.

Deduzimos diretamente que: $\alpha^{p-q} = e$. Como $p - q \in \mathbb{Z}_+^*$, mostramos (i) $\implies$ (ii).

Note que a escolha do valor $p - q$ ocorre sem perda de generalidade, uma vez que o conjunto $\mathbb{Z}_+^*$ é enumerável e sempre podemos garantir a minimalidade de $p - q$.

Provemos (ii) $\implies$ (i) :

Seja $\alpha \in G$ tal que $\langle \alpha \rangle = \{\alpha^n : n \in \mathbb{Z}\}$, sabemos via o Algoritmo de Euclides que:

$$n = qt + r, \quad q, t \in \mathbb{Z} \quad \text{e} \quad r \in \llbracket 0, t - 1 \rrbracket$$

Temos, portanto:

$$\alpha^n = \alpha^{qt+r} = \alpha^{qt} \alpha^r = (\alpha^t)^q \alpha^r = e^q \alpha^r = \alpha^r$$

Portanto $\alpha^n = \alpha^r$, $\forall n \in \mathbb{Z}$ e $r \in \llbracket 0, t-1 \rrbracket$.

Logo, deduzimos que:

$$\langle \alpha \rangle = \{\alpha^0, \dots, \alpha^{t-1}\} \implies \mathcal{O}(\alpha) < \infty$$

Para mostrar que de fato temos $\mathcal{O}(\alpha) = t$, mostremos que $\alpha^{r_1} \neq \alpha^{r_2}$, $\forall r_1, r_2 \in \llbracket 0, t-1 \rrbracket$.

Suponha, por absurdo, que $\exists r_1, r_2 \in \llbracket 0, t-1 \rrbracket$ tal que $\alpha^{r_1} = \alpha^{r_2}$.

Temos, portanto:

$$\alpha^{r_1} = \alpha^{r_2} \iff \alpha^{r_1-r_2} = e$$

Absurdo, pois $r_1 - r_2 < t$, porém t é minimal.

Logo, como todos elementos de $\langle \alpha \rangle$ são distintos, deduzimos que $\mathcal{O}(\alpha) = t$. □

1.4 Teorema de Lagrange

Definição 1.4.1

Seja G um grupo e H um subgrupo de G . Definimos **classe lateral à esquerda de H em G que contém x o subconjunto xH de G tal que $\forall x \in G$:**

$$xH = \{xh : h \in H\}$$

Analogamente definimos **classe lateral à direita de H em G que contém x o subconjunto Hx de G tal que $\forall x \in G$:**

$$Hx = \{hx : h \in H\}$$

Observações:

- As classes laterais de G não são necessariamente subgrupos de G ;
- Quando não houver confusão possível, podemos denominar as classes laterais à esquerda/direita de H em G que contém x como simplesmente: classe lateral à esquerda/direita de H .

Definição 1.4.2

A cardinalidade do conjunto das classes laterais à esquerda ou à direita é definida como o **índice de H em G** , e será denotada por $[G : H]$.

Observação: note que o número de classes laterais à direita de H é igual ao número de classes laterais à esquerda de H (por mais que as classes laterais sejam diferentes).

Isto se dá pelo fato de que a função:

$$\phi : \{\text{classes lat. à esquerda}\} \rightarrow \{\text{classes lat. à direita}\}$$

$$xH \mapsto Hx^{-1}$$

é claramente uma bijeção.

Teorema 1.4.1

Teorema de Lagrange (Grupos)

Seja G um grupo finito e H um subgrupo de G .
Logo, $|H|$ divide $|G|$.

Demonstração:

Seja $x \in G \setminus H$, consideremos o conjunto das classes laterais à esquerda de H :

$$xH = \{xh : h \in H\}$$

Mostremos que $H \cap xH = \emptyset$:

Supondo $\alpha \in H \cap xH$:

$$\alpha \in H \cap xH \iff \alpha = xh \in H.$$

Como $\alpha = xh \in H$, logo $\exists h^{-1} \in H$ tal que $hh^{-1} \in H$

Portanto:

$$\alpha h^{-1} = xhh^{-1} \in H \iff x \in H$$

O que é um absurdo, pois $x \in G \setminus H$. Logo, $H \cap xH = \emptyset$.

Agora mostremos que $\text{Card}(xH) = |H|$:

Seja ζ a função definida abaixo:

$$\zeta : \begin{array}{l} H \rightarrow xH \\ h \mapsto xh \end{array}$$

A função ζ é claramente sobrejetiva por definição.

ζ também é injetiva pois se $(xh_1, xh_2) \in xH \times xH$, temos que:

$$xh_1 = xh_2 \implies x^{-1}xh_1 = x^{-1}xh_2 \implies h_1 = h_2.$$

Portanto, deduzimos que $\text{Card}(xH) = |H|$.

Consideremos agora o conjunto yH das classes laterais à esquerda de H em G que contém y tal que $y \notin H \cup xH$.

Já mostramos anteriormente que $y \notin H$.

Mostremos que $yH \cap xH = \emptyset$

Supondo $\beta \in yH \cap xH$:

Então β pode ser escrito de duas formas:

$$\beta = yh_1$$

$$\beta = xh_2$$

Logo, temos:

$$yh_1 = xh_2 \implies y = xh_2h_1^{-1} \in xH$$

O que é absurdo, pois $y \notin H \cup xH$.

Analogamente ao passo anterior podemos provar que $\text{Card}(yH) = \text{Card}(xH) = |H|$.

Portanto, realizando os passos acima sucessivamente, construímos partições de G .

Como G é finito, o processo terá finalizado após um número inteiro n de etapas. Portanto, temos que $|G| = n|H|$. $\square$

Observações:

1. Segue como consequência direta do **Teorema de Lagrange** que caso G seja um grupo finito e $\alpha \in G$, então $\mathcal{O}(\alpha)$ divide $|G|$.
2. Temos diretamente pela **Definição 1.4.2** que: $|G| = |H|[G : H]$.

Proposição 1.4.1

Seja G um grupo finito de ordem $p \in \mathbb{N}^*$.
Se p for primo, então G é um grupo cíclico.

Demonstração:

Pelo Teorema de Lagrange sabemos que se H é subgrupo de um grupo finito G , então $|H|$ divide $|G|$.

Como $|G| = p$ primo, então os únicos subgrupos possíveis de G são seus subgrupos triviais.

Seja $x \in G$ tal que $x \neq e$, onde e é o elemento neutro de G .

Logo, o único subgrupo gerado por x é o próprio G , isto é: $\langle x \rangle = G$ $\square$

Observação: como visto na Proposição 1.3.2, G também é abeliano!

Teorema 1.4.2

Teorema de Euler (Grupos)

Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito tal que $|G| = n$, $n \in \mathbb{Z}_+$. Então:

$$\forall g \in G, g^n = 1.$$

Demonstração:

Seja g um elemento do grupo finito G . Sabemos que $\langle g \rangle \leq G$. Sabemos também, pelo **Teorema de Lagrange** que $\mathcal{O}(g)$ divide a ordem de G .

Ora, podemos então escrever:

$$|G| = k\mathcal{O}(g), k \in \mathbb{Z}$$

Porém, pela **Proposição 1.3.6**, temos que:

$$g^n = g^{|G|} = g^{k\mathcal{O}(g)} = (g^{\mathcal{O}(g)})^k = e^k = e$$

$\square$

Teorema 1.4.3**Pequeno Teorema de Fermat**

Seja p um número primo e $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, então:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demonstração:

O **Pequeno Teorema de Fermat** é evidentemente o caso específico do **Teorema de Euler** em que $(G, \cdot) = ((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \odot)$. □

Proposição 1.4.2

Seja G um grupo e sejam $K \leq H \leq G$.

Logo $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Demonstração:

Basta aplicar sucessivamente o **Teorema de Lagrange**:

$$\begin{array}{lll} H \leq G & \Rightarrow & |G| = |H| \cdot [G : H] \quad (\text{I}) \\ K \leq H & \Rightarrow & |H| = |K| \cdot [H : K] \quad (\text{II}) \\ K \leq G & \Rightarrow & |G| = |K| \cdot [G : K] \quad (\text{III}) \end{array}$$

Combinando as expressões (I) e (II), obtemos:

$$|G| = |K| \cdot [H : K] \cdot [G : H] = |K| \cdot [G : K]$$

Portanto:

$$[G : K] = [G : H] \cdot [H : K]$$
□

1.5 Grupos Quocientes

Definição 1.5.1

Seja G um grupo e $H \leq G$.

Chamamos de **conjunto quociente** o conjunto G/H (ou $\frac{G}{H}$) cujos elementos são as **classes laterais à esquerda** (ou **à direita**) de H em G .

Observação: decorre da definição acima que $|G/H| = [G : H]$.

Definição 1.5.2

Seja G um grupo e $H \leq G$.

Definimos a seguinte operação entre as classes laterais à esquerda de H em G :

$$\bullet : \begin{array}{ccc} G/H \times G/H & \rightarrow & G/H \\ (xH, yH) & \mapsto & xyH \end{array}$$

Observações:

- Note que, por convenção, estamos tratando das classes laterais à esquerda de H em G . Entretanto, a definição é válida para classes laterais à direita também.
- A operação definida é uma **lei de composição interna** por construção.
- Não mostramos ainda que a operação está de fato bem definida, isto é:

$$\begin{cases} (x_1H, y_1H) \in G/H \times G/H \\ (x_2H, y_2H) \in G/H \times G/H \end{cases}$$

$$\text{Se } (x_1H, y_1H) = (x_2H, y_2H) \implies x_1y_1H = x_2y_2H.$$

Tal fato será destacado na **Proposição 1.5.1**.

Proposição 1.5.1

Seja G um grupo e $H \leq G$.

As afirmações a seguir são equivalentes:

- (i) A operação definida na **Definição 1.5.2** está bem definida;
- (ii) $gHg^{-1} \subseteq H, \forall g \in G$;
- (iii) $gHg^{-1} = H, \forall g \in G$;
- (iv) $gH = Hg, \forall g \in G$.

Demonstração:

Mostremos as equivalências:

$$(i) \iff (ii) \quad (I)$$

$$(ii) \iff (iii) \quad (II)$$

$$(iii) \iff (iv) \quad (III)$$

Começamos mostrando a equivalência (I):

Ora, perceba que para $(x, y) \in G \times G$ e $(h, h') \in H \times H$, temos que:

x e xh são representantes distintos para a mesma classe lateral xH .

y e yh' são representantes distintos para a mesma classe lateral yH .

Portanto, podemos deduzir que a operação " $\bullet$ " definida na **Definição 1.5.2** só estará bem definida se, e somente se:

$$xyH = xhyh'H, \forall (x, y) \in G \times G \text{ e } \forall (h, h') \in H \times H.$$

Logo:

$$xyH = xhyh'H \iff y^{-1}x^{-1}xyH = y^{-1}x^{-1}xhyh'H \iff H = y^{-1}hyh'H.$$

Ora, mas isso é equivalente à dizer que a operação só estará bem definida se, e somente se:

$$ghg^{-1} \in H, \forall g \in G, \forall h \in H.$$

Com isso mostramos a equivalência (I).

Mostremos a equivalência (II):

Para a implicação (ii) $\implies$ (iii) mostremos que:

$$gHg^{-1} \subseteq H \implies H \subseteq gHg^{-1}, \forall g \in G.$$

Ora, temos diretamente da hipótese:

$$\begin{aligned} gHg^{-1} \subseteq H &\implies g^{-1}Hg \subseteq H \implies g(g^{-1}Hg)g^{-1} \subseteq gHg^{-1} \\ &\implies H \subseteq gHg^{-1} \end{aligned}$$

Logo, podemos concluir que:

$$gHg^{-1} \subseteq H \implies H = gHg^{-1}.$$

A implicação (iii) $\implies$ (ii) é evidente.

Com isso mostramos a equivalência (II).

Mostremos a equivalência (III):

$$gHg^{-1} = H \iff gHg^{-1}g = Hg \iff gH = Hg.$$

Assim mostramos a equivalência (III).

Tendo mostrado as equivalências (I), (II) e (III), mostramos que todas as afirmações são duas a duas equivalentes. □

Definição 1.5.3

Um subgrupo H é um **subgrupo normal** de G caso ele satisfaça as afirmações equivalentes da **Proposição 1.5.1**.

Neste caso, denotamos:

$$H \trianglelefteq G$$

Observações:

- Note que caso $H \trianglelefteq G$ então as classes laterais à esquerda e à direita de H são iguais;
- Denotamos $H \triangleleft G$ se H é um **subgrupo normal próprio** de G .
- De forma geral quando queremos mostrar que um subgrupo H é subgrupo normal de um grupo G , mostramos que $ghg^{-1} \in H$.

Exemplo 1.5.1

G e $\{e\}$ (subgrupos triviais de G) são claramente subgrupos normais de G .

Exemplo 1.5.2

Seja G um grupo e $Z(G)$ o centro de G . Logo, $Z(G) \trianglelefteq G$.

Demonstração:

Já mostramos anteriormente que $Z(G) \leq G$.

Para mostrar que $Z(G) \trianglelefteq G$ basta mostrar que:

$$\forall (g, z) \in G \times Z(G) \implies gzg^{-1} \in Z(G)$$

Ora, mas pela própria definição de centro (todos elementos de G que comutam entre si), sabemos que:

$$\text{Se } z \in Z(G) \implies zg = gz, \forall g \in G.$$

Logo:

$$gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G).$$

□

Observações:

- De forma geral, é evidente que se $H \leq Z(G)$, então $H \trianglelefteq G$;
- Isso equivale ainda a dizer que se G é um grupo abeliano, então todos seus subgrupos são normais.

Exemplo 1.5.3

Seja G um grupo e G' o subgrupo dos comutadores de G . Logo $G' \trianglelefteq G$.

Demonstração:

Sabemos, a partir da **Definição 1.3.5** que $G' \leq G$.

Seja $g \in G$ e tomemos $q = xyx^{-1}y^{-1} = [x, y]$, para $x, y \in G$.

Temos, portanto:

$$gqg^{-1} = g(xy x^{-1} y^{-1})g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1})(gx^{-1}g^{-1})(gy^{-1}g^{-1})$$

Tomando $k = gxg^{-1}$ e $l = gyg^{-1}$, deduzimos que:

$$gqg^{-1} = klk^{-1}l^{-1} = [k, l] \in G'$$

Temos, portanto, recursivamente para um elemento genérico $g' \in G'$:

$$gg'g^{-1} = \underbrace{\prod_{i=1}^{n \in \mathbb{N}} \underbrace{(g[x_i, y_i]g^{-1})}_{\in G'}}_{\in G'}$$

Concluimos que $gg'g^{-1} \in G'$.

Logo, $G' \trianglelefteq G$.

□

Exemplo 1.5.4

Seja $n \in \mathbb{N}^*$.
Temos que $SL_n(\mathbb{K}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{K})$

Demonstração:

Sabemos que $SL_n(\mathbb{K}) \leq GL_n(\mathbb{K})$, mostremos portanto que:

$$GSG^{-1} \in SL_n(\mathbb{K}), \forall (G, S) \in GL_n(\mathbb{K}) \times SL_n(\mathbb{K})$$

Ora, sabemos que $\det(G) \neq 0$ e que $\det(G^{-1}) = \det(G)^{-1}$, $\forall G \in GL_n(\mathbb{K})$.
Portanto:

$$\begin{aligned} \det(GSG^{-1}) &= \det(G)\det(S)\det(G^{-1}) = \det(G)\det(S)\det(G)^{-1} = \\ &= \det(G)\det(G)^{-1}\det(S) = \det(S) = 1 \implies GSG^{-1} \in SL_n(\mathbb{K}) \end{aligned}$$

Isto é,

$$SL_n(\mathbb{K}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{K})$$

□

Definição 1.5.4

Seja G um grupo não-trivial.

Chamamos G de grupo simples caso seus únicos subgrupos normais sejam $\{e\}$ e G .

Isto é, caso seus únicos subgrupos normais sejam os subgrupos triviais.

Proposição 1.5.2

Seja G um grupo e $H \leq G$.
Se $[G : H] = 2$, então $H \trianglelefteq G$.

Demonstração:

Mostremos que $gH = Hg, \forall g \in G$.

Demonstremos por disjunção de casos:

Caso $g \in H$. Logo:

$$gH = H = Hg$$

Caso $g \notin H$. Logo:

Como $[G : H] = 2$, temos de imediato:

$$G/H = \{H, gH\}$$

Logo:

$$G = H \sqcup gH = H \sqcup Hg$$

Portanto, deduzimos de imediato que:

$$gH = Hg$$

Logo: $H \trianglelefteq G$.

□

Proposição 1.5.3

Seja G um grupo e $H \leq G$.
Se $[G : H] = 2$, então $\forall x \in G, x^2 \in H$.

Demonstração:

Suponha que $x \in H$. Como H é grupo, temos trivialmente que $x^2 \in H$.

Suponha, agora, que $x \notin H$. Nesse caso G tem duas classes laterais de H disjuntas representadas por H e xH .

Suponha que $x^2 \notin H$. Então:

$$xH = x^2H \iff H = xH$$

Isto é um absurdo, pois H e xH são classes disjuntas.

Portanto, $x^2 \in H$.

□

Definição 1.5.5

Sejam G um grupo e $A, B \leq G$. Definimos o conjunto AB da seguinte forma:

$$AB = \{ab, a \in A, b \in B\}.$$

Observação:

Note que o conjunto AB não necessariamente é um grupo mesmo que A e B o sejam.

Note, por exemplo, o caso do grupo $\mathfrak{S}_3$ (para entender as representações dos elementos de $\mathfrak{S}_3$ leia brevemente o começo do Capítulo 3):

$$A, B \leq \mathfrak{S}_3, \quad A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}, \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Note que A e B são de fato subgrupos de $\mathfrak{S}_3$, pois:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}, \quad e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = e,$$

$$e, \sigma, \sigma^{-1} = \sigma \in A \implies A \leq \mathfrak{S}_3.$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau^2 = e,$$

$$e, \tau, \tau^{-1} = \tau \in B \implies B \leq \mathfrak{S}_3.$$

Temos que o conjunto AB é dado por:

$$AB = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_e, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ora, mas temos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \notin AB$$

Proposição 1.5.4

Seja G um grupo e $H, K \leq G$. Logo:

$$HK \text{ é um subgrupo de } G \iff HK = KH.$$

Demonstração:

Mostremos a implicação ($\implies$):

Seja HK um subgrupo de G .

Logo, temos que:

$$HK = (HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$$

Mostremos, agora, a implicação ($\impliedby$):

Seja $HK = KH$, mostremos que $HK \leq G$.

Para mostrar que $HK \leq G$ é suficiente mostrar que:

$$(HK)(HK) = HK$$

$$(HK)^{-1} = HK$$

Note que essa é uma forma diferente, porém equivalente, de enunciar a **Proposição 1.3.1**.

Ora, temos diretamente que:

$$(HK)(HK) = H(KH)K = H(HK)K = (HH)(KK) = HK$$

$$(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH = HK$$

□

Lema 1.5.1

Seja G um grupo e A, B e C subgrupos de G tais que $A \leq C$. Então:

$$AB \cap C = A(B \cap C).$$

Demonstração:

Note que a inclusão $A(B \cap C) \subseteq AB \cap C$ é trivial.

Mostremos que $AB \cap C \subseteq A(B \cap C)$. Seja $x \in AB \cap C$, então $x \in AB$ e $x \in C$.

Como $x \in AB$, então podemos escrever $x = ab$, para $a \in A$ e $b \in B$. Como também sabemos que $x \in C$ e $A \leq C$, sabemos que $a^{-1} \in C$ e portanto:

$$x = ab \iff b = a^{-1}x \implies b \in C$$

Portanto, concluímos que $b \in B \cap C$ e, ainda, como $x = ab$, temos que $x \in A(B \cap C)$.

Logo, $AB \cap C = A(B \cap C)$.

□

Proposição 1.5.5

Seja G um grupo e $H, K \leq G$. Se $H \trianglelefteq G$ ou $K \trianglelefteq G$, então $HK \leq G$.

Demonstração:

Sejam $H, K \leq G$. Tomemos H como subgrupo normal de G e mostremos, sem perda de generalidade, que $HK \leq G$.

Para mostrarmos que $HK \leq G$ é suficiente mostrar que a operação de HK é uma lei de composição interna em HK e que para todo elemento de HK , existe elemento inverso.

Note, primeiramente, que HK é não vazio, uma vez que $H, K \leq G$.

Sejam $a, b \in HK$, mostremos que $ab \in HK$.

Ora, se $a, b \in HK$, então:

$$a = hk, \quad h \in H, \quad k \in K$$

$$b = h'k', \quad h' \in H, \quad k' \in K$$

Portanto, temos que:

$$ab = hkh'k' = hkh'k^{-1}kk' = (\underbrace{hkh'k^{-1}}_{\in H})(kk') \in HK$$

Mostremos, agora, que para $a \in HK$, $\exists a^{-1} \in HK$.

Ora, como $a \in HK$, então analogamente ao passo anterior temos que:

$$a = hk, \quad h \in H, \quad k \in K$$

Portanto:

$$a^{-1} = k^{-1}h^{-1} = k^{-1}h^{-1}kk^{-1} = (\underbrace{k^{-1}h^{-1}k}_{\in H})(k^{-1}) \in HK$$

Portanto, mostramos que $HK \leq G$.

□

Proposição 1.5.6

Seja G um grupo e $H, K \trianglelefteq G$. Então $HK \trianglelefteq G$.

Demonstração:

Sabemos a partir do **Proposição 1.5.4** que se $H \trianglelefteq G$ ou $K \trianglelefteq G$, temos que $HK \leq G$.

Mostremos que se $H \trianglelefteq G$ e $K \trianglelefteq G$, temos $HK \trianglelefteq G$.

Para isso, é suficiente mostrarmos que $gHKg^{-1} \in HK$.

Ora, como $H, K \trianglelefteq G$, temos:

$$gHKg^{-1} = gHg^{-1}gKg^{-1} = \underbrace{(gHg^{-1})}_{\in H} \underbrace{(gKg^{-1})}_{\in K} \in HK$$

□

Proposição 1.5.7

Seja G um grupo finito e $H, K \leq G$. Então:

$$\text{Card}(HK) = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$$

Demonstração:

Note que $H \cap K \leq H$ e $H \cap K \leq K$, então podemos escrever:

$$H = \bigsqcup_{1 \leq i \leq r} a_i(H \cap K), \quad \text{com } r = [H : H \cap K],$$

$$K = \bigsqcup_{1 \leq j \leq s} (H \cap K)b_j, \quad \text{com } s = [K : H \cap K].$$

Assim, o conjunto $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$ pode ser escrito como:

$$HK = \bigcup_{i=1}^r \bigcup_{j=1}^s a_i(H \cap K)b_j.$$

Cada conjunto $a_i(H \cap K)b_j$ possui $|H \cap K|$ elementos. A união acima é disjunta: se

$$a_i(H \cap K)b_j = a_{i'}(H \cap K)b_{j'},$$

então, por multiplicações à esquerda e direita, deduz-se que $i = i'$ e $j = j'$, dado que os a_i e b_j representam classes distintas.

Logo, temos rs conjuntos disjuntos de tamanho $|H \cap K|$, e portanto:

$$\text{Card}(HK) = rs \cdot |H \cap K| = [H : H \cap K][K : H \cap K] \cdot |H \cap K|.$$

Mas

$$|H| = [H : H \cap K] \cdot |H \cap K|, \quad |K| = [K : H \cap K] \cdot |H \cap K|,$$

e portanto:

$$\text{Card}(HK) = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

□

Proposição 1.5.8

Seja G um grupo e $H, K \leq G$ tal que $HK \leq G$. Então:

$$[HK : K] = [H : H \cap K]$$

Demonstração:

Note, primeiramente, que $K \leq HK$, uma vez que $K \subseteq HK$, $K \leq G$ e $HK \leq G$. Logo, pelo **Teorema de Lagrange**, temos:

$$|HK| = |K| \cdot [HK : K] \iff \frac{|HK|}{|K|} = [HK : K]$$

Sabemos também que $H \cap K \leq H$, logo, analogamente:

$$|H| = |H \cap K| \cdot [H : H \cap K] \iff \frac{|H|}{|H \cap K|} = [H : H \cap K]$$

Pela **Proposição 1.5.6**, temos diretamente:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} \iff \frac{|HK|}{|K|} = \frac{|H|}{|H \cap K|}$$

Logo, deduzimos que:

$$[HK : K] = [H : H \cap K]$$

□

Definição 1.5.6

Seja G um grupo e $H \leq G$.

Então $(G/H, \bullet)$ é um grupo chamado de grupo quociente.

Demonstração:

Mostremos que $(G/H, \bullet)$ é de fato um grupo.

Ora, pela **Definição 1.5.2** sabemos que a operação " $\bullet$ " é uma lei de composição interna por construção. Sabemos também, pela **Proposição 1.5.1** que caso $H \leq G$, então " $\bullet$ " está bem definida.

Nos resta mostrar que $(G/H, \bullet)$ satisfaz os axiomas de grupo.

De fato, G/H é associativo em relação à operação " $\bullet$ " pois:

Sejam $xH, yH, zH \in G/H$, temos:

$$(xH \bullet yH) \bullet zH = (xy)H \bullet zH = (xy)zH \stackrel{(*)}{=} x(yz)H = xH \bullet (yH \bullet zH).$$

Também temos evidentemente que o elemento neutro é dado por $H \in G/H$.

Ora, seja $xH \in G/H$, temos evidentemente:

$$xH \bullet H = xH = H \bullet xH.$$

Por fim, temos que para dado $xH \in G/H$, seu elemento inverso é dado por $x^{-1}H \in G/H$.

De fato:

$$xH \bullet x^{-1}H = xx^{-1}H = H = x^{-1}xH = x^{-1}H \bullet xH.$$

Portanto, $(G/H, \bullet)$ é de fato um grupo. □

Observação: muitas vezes iremos denotar $\bar{x} \stackrel{\text{def}}{=} xH$ para elementos de G/H por uma questão de simplificação de escrita.

Exemplo 1.5.5

O grupo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é um grupo quociente formado pelo quociente entre $\mathbb{Z}$ e $n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$.

Proposição 1.5.9

Seja G um grupo e $Z(G)$ seu centro.
Se o grupo $G/Z(G)$ for cíclico, então $G = Z(G)$.

Demonstração:

Seja $G/Z(G)$ um grupo cíclico, mostremos que $G = Z(G)$.

Como $G/Z(G)$ é cíclico, então existe $x \in G$ tal que $\langle xZ(G) \rangle = G/Z(G)$.

Tomemos $g_1, g_2 \in G$, então suas classes laterais devem ser potências de $xZ(G)$. Isto é, existem $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tais que:

$$g_1Z(G) = x^{k_1}Z(G) \implies g_1 = x^{k_1}z_1, \text{ para algum } z_1 \in Z(G)$$

e,

$$g_2Z(G) = x^{k_2}Z(G) \implies g_2 = x^{k_2}z_2, \text{ para algum } z_2 \in Z(G)$$

Logo, temos que:

$$\begin{aligned} g_1g_2 &= (x^{k_1}z_1)(x^{k_2}z_2) = x^{k_1}x^{k_2}z_1z_2 \\ &= x^{k_1+k_2}z_1z_2 = x^{k_2+k_1}z_2z_1 \\ &= x^{k_2}z_2x^{k_1}z_1 = (x^{k_2}z_2)(x^{k_1}z_1) = g_2g_1 \end{aligned}$$

Portanto, como $g_1g_2 = g_2g_1$ para quaisquer $g_1, g_2 \in G$, temos que G é abeliano e, consequentemente, $G = Z(G)$. □

Proposição 1.5.10

Seja G um grupo e G' o seu subgrupo de comutadores. Então, grupo quociente G/G' é abeliano.

Este grupo é denominado como *abelianização* de G e é denotado como G^{ab} . Note que G' é o menor subgrupo normal de G com essa propriedade e G^{ab} representa o maior quociente abeliano de G .

Demonstração:

Note, primeiramente, que G^{ab} é de fato um grupo, uma vez que $G' \trianglelefteq G$.
Sejam $\bar{x} = xG'$, $\bar{y} = yG'$ elementos de G^{ab} , com $x, y \in G$, sabemos que:

$$xyx^{-1}y^{-1} \in G' \iff xy(yx)^{-1} \in G' \iff xyG' = yxG' \iff \bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x}$$

Concluimos, portanto, que G^{ab} é um grupo abeliano.

Para mostrar que G' é o menor subgrupo normal de G tal que G/G' é abeliano, basta mostrar que para quaisquer $H \trianglelefteq G$, se G/H for abeliano, então $G' \subseteq H$.

Suponha, por absurdo, que G/H é um grupo abeliano e $G' \not\subseteq H$.

Ora, então temos, para $x, y \in G$:

$$xyH = yxH \iff xy(yx)^{-1} \in H \iff xyx^{-1}y^{-1} \in H$$

Sabemos que $xyx^{-1}y^{-1} \in G'$, mas $G' \not\subseteq H$, portanto induzimos um absurdo.
Concluimos que $G' \subseteq H$. □

1.6 Homomorfismos de Grupos

Definição 1.6.1

Sejam $(G, \cdot)$ e $(\mathcal{G}, *)$ dois grupos. Uma função $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ é chamada de **homomorfismo de grupos** se:

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) * \varphi(b), \quad \forall a, b \in G$$

Observações:

- Se φ for um homomorfismo de grupos injetivo, dizemos que φ é um **monomorfismo**;
- Se φ for um homomorfismo de grupos sobrejetivo, dizemos que φ é um **epimorfismo**;
- Note que, se $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ for um homomorfismo de grupos, então:

1. $\varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$;
2. $\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$.

De fato, note que, para o item 1., temos que:

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G) * \varphi(e_G) \implies \varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$$

E para o item 2., temos:

$$e_{\mathcal{G}} = \varphi(e_G) = \varphi(x \cdot x^{-1}) = \varphi(x) * \varphi(x^{-1}) \implies \varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$$

- Muitas vezes as operações de G e de $\mathcal{G}$ serão confundidas para fins de simplificação, isto é: $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

Definição 1.6.2

Sejam G e $\mathcal{G}$ dois grupos. Definimos $\text{Hom}(G, \mathcal{G})$ como o **conjunto de todos os homomorfismos de G em $\mathcal{G}$** .

Exemplo 1.6.1

$\text{id} : (G, \cdot) \rightarrow (G, \cdot)$, $\text{id}(g) = g$ é um homomorfismo chamado *identidade*.

Exemplo 1.6.2

$\theta : G \rightarrow \mathcal{G}$, $\theta(g) = e_{\mathcal{G}}$, $\forall g \in G$, é um homomorfismo chamado *homomorfismo trivial*.

Exemplo 1.6.3

A função:

$$\begin{aligned} \det : \quad \text{GL}_n(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathbb{K}^* \\ A &\mapsto \det(A) \end{aligned}$$

é um homomorfismo de grupos, pois sabemos que $\forall A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ temos:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

Exemplo 1.6.4

Seja G um grupo e $N \trianglelefteq G$, logo a função:

$$\begin{aligned} \pi : \quad G &\rightarrow G/N \\ x &\mapsto xN \end{aligned}$$

é um epimorfismo chamado de *projeção canônica*.

Demonstração:

Sejam $x, y \in G$, ora:

$$\pi(xy) = xyN = xN \bullet yN = \pi(x) \bullet \pi(y).$$

Além disso, π é trivialmente sobrejetora.

□

Exemplo 1.6.5

Seja $G = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ munido da operação $\heartsuit$ definida por:

$$\begin{aligned} (a, b) \heartsuit (a', b') &= (aa', b + b'), \\ (a, b), (a', b') &\in G \end{aligned}$$

A função:

$$\spadesuit : \begin{array}{ccc} (G, \heartsuit) & \rightarrow & (\mathbb{C}^*, \cdot) \\ (r, \theta) & \mapsto & re^{i\theta} \end{array}$$

é um homomorfismo de grupos, onde e é o número de Euler, $i^2 = -1$ e:

$$e^{i\theta} \stackrel{\text{def}}{=} \cos \theta + i \sin \theta, \forall \theta \in \mathbb{R}$$

Demonstração:

Mostremos primeiramente que $(G, \heartsuit)$ é de fato um grupo.

Por construção temos diretamente que $\heartsuit$ é uma lei de composição interna em G .

Também sabemos que, pelo fato de $\mathbb{R}_+^*$ ser um grupo com o produto usual e $\mathbb{R}$ ser um grupo com a adição usual, temos diretamente que a dupla formada pela operação $\heartsuit$ é um grupo.

Portanto, mostramos que $(G, \heartsuit)$ é de fato um grupo.

Mostremos que $\spadesuit$ é um homomorfismo de grupos.

Note, primeiramente, que $\spadesuit$ é claramente uma função de G em $\mathbb{C}^*$.

Sejam $(r, \theta), (r', \theta') \in G$, temos que:

$$\spadesuit((r, \theta) \heartsuit (r', \theta')) = \spadesuit(rr', \theta + \theta') = rr' e^{i(\theta + \theta')} = \spadesuit(r, \theta) \cdot \spadesuit(r', \theta')$$

Logo, $\spadesuit$ é de fato um homomorfismo de grupos. □

Definição 1.6.3

Definimos o **núcleo de um homomorfismo** φ o subconjunto $\ker \varphi \subseteq G$, tal que:

$$\ker \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in G, \varphi(x) = e_G\}.$$

Proposição 1.6.1

O núcleo de um homomorfismo φ é um subgrupo normal de G .

Demonstração:

Note, primeiramente, que $\ker \varphi$ é não-vazio, uma vez que sempre teremos $\varphi(e_G) = e_G$.

Mostremos, portanto, que $\ker \varphi \leq G$.

Para isso, mostremos que $x, y \in \ker \varphi \implies xy^{-1} \in \ker \varphi$.

Sejam $x, y \in \ker \varphi$, temos:

$$\varphi(x \cdot y^{-1}) = \varphi(x) * \varphi(y^{-1}) = \varphi(x) * \varphi(y)^{-1} = e_G * e_G = e_G;$$

Deduzimos que $\ker \varphi \leq G$, mostremos, por fim, que $\ker \varphi \trianglelefteq G$:

Sejam $g, x \in G \times \ker \varphi$, mostremos que $gxg^{-1} \in \ker \varphi$.

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g) * \varphi(x) * \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) * e_G * \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) * \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) * \varphi(g)^{-1} = e_G.$$

Portanto, deduzimos que:

$$\ker \varphi \leq G$$

□

Exemplo 1.6.6

Seja $n \in \mathbb{N}^*$. O núcleo do homomorfismo

$$\det : GL_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^*, \quad A \mapsto \det(A)$$

é dado por

$$\ker(\det) = \{A \in GL_n(\mathbb{K}), \det(A) = 1\} = SL_n(\mathbb{K}).$$

Definição 1.6.4

Definimos a **imagem de um homomorfismo** φ o subconjunto $\text{Im } \varphi \subseteq \mathcal{G}$ tal que:

$$\text{Im } \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in \mathcal{G} : \exists x \in G, y = \varphi(x)\}$$

Proposição 1.6.2

A imagem de um homomorfismo φ é um subgrupo de $\mathcal{G}$.

Demonstração:

Note, primeiramente, que $\text{Im } \varphi$ é não vazio uma vez que $e_{\mathcal{G}} \in \text{Im } \varphi$.

Mostremos agora que $\forall x, y \in \text{Im } \varphi, xy^{-1} \in \text{Im } \varphi$:

Temos que:

$$x, y \in \text{Im } \varphi \implies \exists a, b \in G, x = \varphi(a) \text{ e } y = \varphi(b)$$

Ora, mas então temos:

$$\exists b^{-1} \in G \implies y^{-1} = \varphi(b^{-1}) = \varphi(b)^{-1}$$

Também temos que:

$$ab^{-1} \in G, \text{ logo, } \varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = xy^{-1}$$

Portanto, via a definição de imagem de um homomorfismo de grupos deduzimos que:

$$xy^{-1} \in \text{Im } \varphi$$

Logo, mostramos que $\text{Im } \varphi \leq \mathcal{G}$.

□

Proposição 1.6.3

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos tais que a função $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ define um homomorfismo

de grupos. Logo:

$$\ker \varphi = \{e_G\} \iff \varphi \text{ injetiva.}$$

Demonstração:

Mostremos a implicação ($\Rightarrow$):

Para mostrar que φ é injetiva, é necessário mostrar a seguinte implicação:

$$\varphi(x) = \varphi(y) \implies x = y, \forall x, y \in G$$

Suponhamos que $\varphi(x) = \varphi(y)$, logo:

$$\varphi(x) = \varphi(y) \implies \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = e_G \implies \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = e_G \implies \varphi(xy^{-1}) = e_G$$

Deduzimos, portanto, que $xy^{-1} \in \ker \varphi$.

Ora, por hipótese, temos que $\ker \varphi = \{e_G\}$, logo deduzimos que:

$$x = y$$

Portanto, concluímos que φ é injetiva.

Mostremos a implicação ($\Leftarrow$):

Agora, supondo que φ é injetiva, mostremos que $\ker \varphi = \{e_G\}$.

Para mostrar que $\ker \varphi = \{e_G\}$ é necessário mostrar:

$$\text{Se } \varphi(x) = e_G \implies x = e_G, \forall x \in G$$

Sabemos que $\varphi(e_G) = e_G$.

Suponha que $\varphi(x) = e_G$, para $x \in G$.

Porém, sabemos que φ é injetiva, logo:

$$\varphi(x) = \varphi(e_G) \implies x = e_G$$

Logo, concluímos que:

$$\ker \varphi = \{e_G\}$$

□

Proposição 1.6.4

Sejam $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ e $\xi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ homomorfismos de grupos.

Logo, $(\xi \circ \varphi) : G \rightarrow \mathcal{H}$ é um homomorfismo de grupos.

Demonstração:

Sejam $a, b \in G$.

Queremos mostrar que:

$$(\xi \circ \varphi)(ab) = (\xi \circ \varphi)(a)(\xi \circ \varphi)(b)$$

Sabemos que φ e ξ são homomorfismos de grupos, portanto:

$$(\xi \circ \varphi)(ab) = \xi(\varphi(ab)) = \xi(\varphi(a)\varphi(b)) = \xi(\varphi(a))\xi(\varphi(b)) = (\xi \circ \varphi)(a)(\xi \circ \varphi)(b)$$

Portanto, mostramos que $(\xi \circ \varphi)$ é de fato um homomorfismo de grupos. $\square$

Definição 1.6.5

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos. Um homomorfismo $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ é **chamado de isomorfismo de grupos se φ é bijetivo**.

Caso φ seja um isomorfismo, dizemos que G e $\mathcal{G}$ são **isomorfos** e denotamos-os como:

$$G \cong \mathcal{G}$$

Observação: note que para que dois grupos sejam isomorfos basta mostrar que existe um isomorfismo entre eles.

Exemplo 1.6.7

$(\mathbb{R}_+^*, \cdot) \cong (\mathbb{R}, +)$, onde $+$ e $\cdot$ denotam as operações usuais de soma e produto, respectivamente, no conjunto $\mathbb{R}$.

Demonstração:

Seja $\varphi : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \log(x)$.

Mostremos que φ é um homomorfismo de grupos bijetivo.

Primeiramente, note que $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ e $(\mathbb{R}, +)$ são de fato grupos.

Sabemos também que a função:

$$\varphi(x) = \log(x), \quad x \in]0, \infty[= \mathbb{R}_+^*$$

é uma bijeção com imagem igual à $\mathbb{R}$.

Mostremos que φ é um homomorfismo de grupos.

Sejam $x, y \in \mathbb{R}_+^*$

$$\varphi(xy) = \log(xy) = \log(x) + \log(y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

Logo, deduzimos que φ é um isomorfismo de grupos e, portanto, temos:

$$(\mathbb{R}_+^*, \cdot) \cong (\mathbb{R}, +)$$

$\square$

Proposição 1.6.5

Seja G um grupo finito e $g \in G$ tal que $\mathcal{O}(g) = k \in \mathbb{Z}_+^*$. Então $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \cong \langle g \rangle$.

Demonstração:

Nesta demonstração, a notação aditiva será utilizada para denotar a operação de soma usual em $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ e a operação do grupo G .

Seja a função φ definida a seguir:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} &\rightarrow \langle g \rangle \\ \varphi : \quad \bar{x} &\mapsto xg \end{aligned}$$

Note que φ é de fato uma função e é injetiva. Sejam $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

$$\varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y}) \iff xg = yg \iff xg - yg = 0 \iff g(x - y) = 0$$

Como $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, então $x, y \in [0, k - 1]$. Temos também que $\mathcal{O}(g) = k$ e $-k < x - y < k$. Portanto, temos:

$$g(x - y) = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$$

Logo, φ é de fato função e é injetora.

Note também que φ é trivialmente sobrejetora, uma vez que φ é injetora e $|\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}| = \mathcal{O}(g) = k$.

Mostremos, por fim, que φ é um homomorfismo de grupos. Sejam $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

$$\varphi(\bar{x} + \bar{y}) = \varphi(\overline{x + y}) = (x + y)g = xg + yg = \varphi(\bar{x}) + \varphi(\bar{y})$$

Concluimos que φ é de fato um isomorfismo de grupos e portanto:

$$\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \cong \langle g \rangle$$

□

Proposição 1.6.6

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos tal que $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ é um isomorfismo de grupos. Logo, $\varphi^{-1} : \mathcal{G} \rightarrow G$ é um isomorfismo de grupos.

Demonstração:

Seja $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ um isomorfismo de grupos.

Logo:

$$\forall y \in \mathcal{G}, \exists! x \in G : \varphi(x) = y$$

Portanto, temos que:

$$\varphi^{-1}(\varphi(x)) = \varphi^{-1}(y) \iff x = \varphi^{-1}(y)$$

Dada a bijetividade de φ temos diretamente que φ^{-1} é também uma função bijetiva.

Mostremos que φ^{-1} é de fato um homomorfismo de grupos.

Sejam $x, y \in \mathcal{G}$, mostremos que:

$$\varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y) = \varphi^{-1}(xy)$$

Dada a bijetividade de φ , sabemos que existem $a, b \in G$ tais que $\varphi(a) = x$ e $\varphi(b) = y$.

Logo:

$$\varphi^{-1}(xy) = \varphi^{-1}(\varphi(a)\varphi(b)) = \varphi^{-1}(\varphi(ab)) = ab = \varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y)$$

Portanto, $\varphi^{-1} : \mathcal{G} \rightarrow G$ é isomorfismo de grupos.

□

Teorema 1.6.1**Primeiro Teorema dos Isomorfismos**

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos tais que $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ é um homomorfismo de grupos. Então, a função ψ tal que:

$$\psi : \begin{array}{ll} G/\ker \varphi & \rightarrow \text{Im } \varphi \\ g\ker \varphi & \mapsto \varphi(g) \end{array}$$

é um isomorfismo de grupos.

Isto é:

$$\frac{G}{\ker \varphi} \cong \text{Im } \varphi$$

Demonstração:

Mostremos que ψ é uma função bem definida e que se trata de uma função injetiva:

Sejam $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker \varphi$, temos:

$$\bar{x} = \bar{y} \iff xy^{-1} \in \ker \varphi \iff \varphi(xy^{-1}) = e_{\mathcal{G}} \iff$$

$$\iff \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = e_{\mathcal{G}} \iff \varphi(x) = \varphi(y) \iff \psi(\bar{x}) = \psi(\bar{y})$$

Logo, a função ψ está de fato bem definida e é injetiva.

Mostremos que ψ é uma função sobrejetora.

Seja $y \in \text{Im } \varphi$, então:

$$\exists x \in G; \varphi(x) = y$$

Temos, portanto:

$$\psi(\bar{x}) = \varphi(x) = y$$

Logo, ψ é sobrejetora.

Mostremos que ψ é um homomorfismo de grupos.

Primeiramente, note que $G/\ker \varphi$ e $\text{Im } \varphi$ são de fato grupos (já demonstrado).

Sejam $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker \varphi$, logo:

$$\psi(\bar{x}\bar{y}) = \psi(\overline{xy}) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = \psi(\bar{x})\psi(\bar{y})$$

Com isso, mostramos que ψ se trata de um isomorfismo de grupos e deduzimos que:

$$\frac{G}{\ker \varphi} \cong \text{Im } \varphi$$

□

Teorema 1.6.2**Segundo Teorema dos Isomorfismos**

Seja G um grupo, $H \trianglelefteq G$ e $K \leq G$. Temos:

$$H \trianglelefteq HK$$

e,

$$\frac{K}{H \cap K} \cong \frac{HK}{H}$$

Demonstração:

Note que HK é de fato um grupo, pois $H \trianglelefteq G$ e $K \leq G$.

Tal fato foi mostrado na **Proposição 1.5.4**.

Mostremos, primeiramente, que $H \trianglelefteq HK$:

Seja $x \in HK$, logo, é suficiente mostrar que $xHx^{-1} \subseteq H$.

Como $H \trianglelefteq G$, temos que:

$$gH = Hg, \quad \forall g \in G$$

Portanto:

$$xHx^{-1} = Hxx^{-1} = H$$

Logo, deduzimos que $H \trianglelefteq HK$.

Seja φ o homomorfismo de grupos definido a seguir:

$$\varphi : \begin{array}{l} K \rightarrow \frac{HK}{H} \\ x \mapsto xH \end{array}$$

Note que $\frac{HK}{H}$ é de fato um grupo, uma vez que $H \trianglelefteq HK$.

Note também que φ se trata mesmo de um homomorfismo (restrição da projeção canônica).

Mostremos que φ é um homomorfismo sobrejetivo.

Tome $x \in \frac{HK}{H}$, logo:

$$x = \underbrace{hk}_{\in HK} H = Hhk = Hk = kH = \varphi(k), \quad k \in K$$

Logo, mostramos que φ é sobrejetiva, isto é:

$$\text{Im}(\varphi) = \frac{HK}{H}$$

Mostremos agora que $\ker \varphi = H \cap K$.

Sabemos que, por definição:

$$\ker \varphi = \{k \in K : \varphi(k) = H\}$$

Deduzimos portanto que $k \in \ker \varphi \iff k \in H \cap K$.

Logo, deduzimos que $\ker \varphi = H \cap K$.

Aplicando o **Primeiro Teorema do Isomorfismo** deduzimos diretamente que:

$$\frac{K}{H \cap K} \cong \frac{HK}{H}$$

□

Teorema 1.6.3**Terceiro Teorema dos Isomorfismos**

Seja G um grupo e $H, K \trianglelefteq G$ tal que $K \subseteq H$.

Logo,

$$\frac{H}{K} \trianglelefteq \frac{G}{K}$$

e,

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}$$

Demonstração:

Mostremos, primeiramente, que $H/K \trianglelefteq G/K$:

Seja $gK \in G/K$ e $hK \in H/K$, mostremos que $(gK)(hK)(gK)^{-1} \subseteq H/K$:

$$\begin{aligned} (gK)(hK)(gK)^{-1} &= gKhKKg^{-1} = gKhKg^{-1} = ghKKg^{-1} = \\ &= ghKg^{-1} = \underbrace{ghg^{-1}}_{\in H} K \in H/K \end{aligned}$$

Logo, concluímos que:

$$\frac{H}{K} \trianglelefteq \frac{G}{K}$$

Seja a função φ definida a seguir:

$$\begin{aligned} \varphi : \quad & \frac{G}{K} \rightarrow \frac{G}{H} \\ & gK \mapsto gH \end{aligned}$$

Note que, como $K \subseteq H$, todo elemento de G/K é evidentemente elemento de G/H e a função é bem definida, sobrejetora e um homomorfismo de grupos.

Logo, deduzimos que:

$$\text{Im } \varphi = \frac{G}{H}$$

Mostremos que $\ker \varphi = H/K$:

Por definição, sabemos que:

$$\ker \varphi = \{gK \in G/K : \varphi(gK) = H\}$$

Logo:

$$gK \in \ker \varphi \iff \varphi(gK) = H \iff gH = H \iff g \in H \iff gK \subseteq H/K$$

Concluímos que $\ker \varphi = H/K$.

Portanto, aplicando o **Primeiro Teorema dos Isomorfismos** deduzimos diretamente que:

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}$$

□

Lema 1.6.1

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos e $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ um homomorfismo de grupos. Se H é um subgrupo de G tal que $\ker \varphi \subseteq H$, então:

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H.$$

Demonstração:

Mostremos, primeiramente, que $H \subseteq \varphi^{-1}(\varphi(H))$.

Tomemos $h \in H$. Temos, diretamente, que $\varphi(h) \in \varphi(H)$.

Ainda, pela definição de pré-imagem, sabemos que:

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) = \{g \in G : \varphi(g) \in \varphi(H)\}$$

Ora, como $\varphi(h) \in \varphi(H)$, temos então que $h \in \varphi^{-1}(\varphi(H))$.

Concluimos que $H \subseteq \varphi^{-1}(\varphi(H))$.

Mostremos, agora, que $\varphi^{-1}(\varphi(H)) \subseteq H$.

Tomemos $g \in \varphi^{-1}(\varphi(H))$. Pela definição de $\varphi^{-1}(\varphi(H))$, temos $\varphi(g) \in \varphi(H)$.

Como $\varphi(g) \in \varphi(H)$, existe $h \in H$ tal que $\varphi(g) = \varphi(h)$. Logo:

$$\varphi(g) = \varphi(h) \iff \varphi(g)\varphi(h)^{-1} = e_{\mathcal{G}} \iff \varphi(gh^{-1}) = e_{\mathcal{G}} \iff gh^{-1} \in \ker \varphi$$

Como $\ker \varphi \subseteq H$ e $h^{-1} \in H$, temos portanto que $g \in H$.

Concluimos que $\varphi^{-1}(\varphi(H)) \subseteq H$ e, portanto, $\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H$

□

Observação: note que, caso $\ker \varphi \not\subseteq H$, então não é possível garantir $\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H$. Consideremos o seguinte homomorfismo como contra-exemplo:

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ a &\mapsto a + 2\mathbb{Z} \end{aligned}$$

Note que $\ker \varphi = 2\mathbb{Z}$. Tomando $H \stackrel{\text{def}}{=} 4\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$, temos que:

- $\varphi(H) = \{\bar{0}\}$;
- $\varphi^{-1}(\{\bar{0}\}) = 2\mathbb{Z}$.

Portanto, temos que $\varphi^{-1}(\varphi(H)) = 2\mathbb{Z} \neq H$.

Teorema 1.6.4**Teorema da Correspondência**

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos e $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}$ um homomorfismo de grupos. Então:

$$\begin{aligned} f : \{\text{subgrupos de } G \text{ que contém } \ker \varphi\} &\rightarrow \{\text{subgrupos de } \varphi(G)\} \\ H &\mapsto \varphi(H) \end{aligned}$$

e,

$$g : \begin{array}{ccc} \{\text{subgrupos de } \varphi(G)\} & \rightarrow & \{\text{subgrupos de } G \text{ que contém } \ker \varphi\} \\ K & \mapsto & \varphi^{-1}(K) \end{array}$$

são bijeções, inversas uma da outra. Ainda, temos que:

(i) $H \trianglelefteq G \implies \varphi(H) \trianglelefteq \varphi(G)$.

(ii) $K \trianglelefteq \varphi(G) \implies \varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$.

Demonstração:

Mostremos, primeiramente, que f se trata de uma função bijetiva.

Note que f é de fato função, pois, dados $H_1, H_2 \leq G$, temos:

$$H_1 = H_2 \implies \varphi(H_1) = \varphi(H_2) \implies f(H_1) = f(H_2)$$

Para mostrar a injetividade de f , tomemos novamente $H_1, H_2 \leq G$ tais que $f(H_1) = f(H_2)$.

Perceba que, pela definição de f , isso é equivalente a afirmar que $\varphi(H_1) = \varphi(H_2)$, onde $\varphi(H_1)$ e $\varphi(H_2)$ são subgrupos de $\varphi(G)$. Portanto, tomando a pré-imagem de tais conjuntos temos que:

$$\varphi(H_1) = \varphi(H_2) \implies \varphi^{-1}(\varphi(H_1)) = \varphi^{-1}(\varphi(H_2)) \xrightarrow{\text{Lema 1.6.1}} H_1 = H_2$$

Logo, f é uma função injetiva.

Mostremos, agora, a sobrejetividade de f .

Ora, basta notar que, dado $K \leq \varphi(G)$, podemos tomar $H = \varphi^{-1}(K) \leq G$. De fato:

$$f(H) = \varphi(H) = \varphi(\varphi^{-1}(K)) = K$$

Ainda, temos que H é um elemento válido do domínio, pois, como K é grupo, então $e_G \in K$. Como a pré-imagem de e_G é por definição $\ker \varphi$, então temos que $\ker \varphi \subseteq H$.

Concluimos, portanto, que f é uma função bijetora.

Para mostrarmos que g também é uma função bijetora tal que $g = f^{-1}$, basta notar que:

$$f \circ g(K) = f(g(K)) = f(\varphi^{-1}(K)) = \varphi(\varphi^{-1}(K)) = K, \forall K \leq \varphi(G)$$

e,

$$g \circ f(H) = g(f(H)) = g(\varphi(H)) = \varphi^{-1}(\varphi(H)) = H, \forall H \leq G \text{ tal que } \ker \varphi \subseteq H$$

Mostremos, agora, os itens (i) e (ii).

Para mostrar o item (i) note que, como $H \trianglelefteq G$ tal que $\ker \varphi \subseteq H$ temos para $h \in H$ e $g \in G$:

$$\underbrace{\varphi(ghg^{-1})}_{\in H} = \underbrace{\varphi(g)}_{\in \varphi(G)} \underbrace{\varphi(h)}_{\in \varphi(H)} \underbrace{\varphi(g)^{-1}}_{\in \varphi(G)} \in \varphi(H)$$

Logo, $\varphi(H) \trianglelefteq \varphi(G)$.

Para mostrar o item (ii) note que, se $K \trianglelefteq \varphi(G)$, então para $x \in \varphi^{-1}(K)$ e $g \in G$, temos:

$$\varphi(gxg^{-1}) = \underbrace{\varphi(g)}_{\in \varphi(G)} \underbrace{\varphi(x)}_{\in K} \underbrace{\varphi(g)^{-1}}_{\in \varphi(G)} \in K$$

Ora, temos portanto $gxg^{-1} \in \varphi^{-1}(K)$. Logo, $\varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$. □

Definição 1.6.6

Seja G um grupo.

Um **automorfismo de G** é um isomorfismo φ tal que:

$$\varphi : G \rightarrow G$$

Denotamos o conjunto de todos os automorfismos de G por $\text{Aut}(G)$.

Proposição 1.6.7

Seja G um grupo. Então $(\text{Aut}(G), \circ)$ é um grupo, onde $\circ$ denota a composição usual de funções.

Demonstração:

Note que $\text{Aut}(G)$ não é vazio, uma vez que o isomorfismo $\text{id} : G \rightarrow G$, $\text{id}(g) = g$ está em $\text{Aut}(G)$.

Evidentemente a função id é o elemento neutro de $\text{Aut}(G)$.

Também sabemos que a operação $\circ$ é associativa via associatividade de composição usual de funções.

Pela **Proposição 1.6.6**, sabemos que o homomorfismo inverso, φ^{-1} , existe e é um isomorfismo. Logo, concluímos que $\varphi^{-1} \in \text{Aut}(G)$.

Por fim, sabemos que a composição de funções bijetivas resulta em uma função bijetiva e pela **Proposição 1.6.4** sabemos que a composição de homomorfismo de G em G é um homomorfismo de G em G .

Portanto, concluímos que $\circ$ é uma lei de composição interna em $\text{Aut}(G)$.

Logo, deduzimos que $(\text{Aut}(G), \circ)$ é um grupo. □

Exemplo 1.6.8

A função:

$$\mathcal{J}_g : \begin{array}{ccc} G & \rightarrow & G \\ x & \mapsto & gxg^{-1} \end{array}$$

é um automorfismo de G denominado **automorfismo interno de G associado a $g \in G$** .

O automorfismo $\mathcal{J}_g$ é também chamado de **conjugação por g** .

Demonstração:

Mostremos que $\mathcal{I}_g$ é de fato um automorfismo de G , dado $g \in G$.

Mostremos, primeiramente, que $\mathcal{I}_g$ é um homomorfismo de grupos.

Sabemos, trivialmente, que $\mathcal{I}_g$ é de fato uma função.

Sejam $x, y \in G$, temos, por definição:

$$\mathcal{I}_g(xy) = gxyg^{-1} = gx(g^{-1}y)g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \mathcal{I}_g(x)\mathcal{I}_g(y)$$

Portanto, concluímos que $\mathcal{I}_g$ é um homomorfismo de grupos.

Mostremos que $\mathcal{I}_g$ é uma função bijetiva.

Sejam $x, y \in G$:

$$\mathcal{I}_g(x) = \mathcal{I}_g(y) \Rightarrow gxg^{-1} = gyg^{-1} \Rightarrow g^{-1}gxg^{-1}g = g^{-1}gyg^{-1}g \Rightarrow x = y$$

Logo, $\mathcal{I}_g$ é injetiva.

Tomemos, ainda, $y \in G$ e $x = g^{-1}yg$. Temos, portanto:

$$\mathcal{I}_g(x) = g(g^{-1}yg)g^{-1} = y$$

Logo, $\mathcal{I}_g$ é sobrejetiva.

Concluímos, portanto, que $\mathcal{I}_g$ é um automorfismo de G .

□

Definição 1.6.7

Seja G um grupo, definimos:

$$\text{Inn}(G) = \{\mathcal{I}_g \in \text{Aut}(G) : g \in G\}$$

o conjunto de todos os automorfismos internos de G associados à $g \in G$.

Proposição 1.6.8

Seja G um grupo. Então:

$$\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G).$$

Demonstração:

Sabemos que $\text{Inn}(G) \subseteq \text{Aut}(G)$, por construção.

Mostremos primeiramente que para $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{Inn}(G)$, $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1} \in \text{Inn}(G)$, onde $\circ$ é a composição usual de funções.

Como o domínio e contradomínio das funções em $\text{Inn}(G)$ são iguais para as funções em $\text{Aut}(G)$, mostremos apenas a igualdade de suas leis de correspondência.

Ora, como $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{Inn}(G)$, podemos escrevê-los, sem perda de generalidade, para um dado $x \in G$, como:

$$\varphi_1(x) = g_1 x g_1^{-1}, \quad g_1 \in G$$

$$\varphi_2(x) = g_2 x g_2^{-1}, \quad g_2 \in G$$

Temos:

$$\begin{aligned}\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}(x) &= \varphi_1(\varphi_2^{-1}(x)) = g_1(g_2^{-1}xg_2)g_1^{-1} = (g_1g_2^{-1})x(g_2g_1^{-1}) = \\ &= (g_1g_2^{-1})x(g_1g_2^{-1})^{-1} \in \text{Inn}(G)\end{aligned}$$

Logo, concluímos que $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$.

Provemos agora que para $(\varphi, \phi) \in \text{Inn}(G) \times \text{Aut}(G)$, $\phi \circ \varphi \circ \phi^{-1} \in \text{Inn}(G)$.
Seja $x \in G$ tal que:

$$\varphi(x) = gxg^{-1}, \quad g \in G$$

Temos:

$$(\phi \circ \varphi \circ \phi^{-1})(x) = \phi(\varphi(\phi^{-1}(x))) = \phi(g\phi^{-1}(x)g^{-1}) = \phi(g)x\phi(g)^{-1} \in \text{Inn}(G)$$

Logo, concluímos que:

$$\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$$

□

Definição 1.6.8

Seja G um grupo e $\varphi : G \rightarrow G$ um homomorfismo de grupos.
Dizemos que $X \subseteq G$ é **invariante por φ** se $\varphi(X) \subseteq X$.
Ou ainda, se $\forall x \in X \implies \varphi(x) \in X$.


Definição 1.6.9

Sejam G um grupo e $H \leq G$.
 H é dito **subgrupo característico de G** se H é invariante para todo $\varphi \in \text{Aut}(G)$ e o denotamos como:

$$H \trianglelefteq G$$

Observações:

- A partir da definição acima temos que, se $H < G$ e H é subgrupo característico de G , denotamos $H \triangleleft G$;
- A definição de subgrupo característico é considerada mais forte que a definição de subgrupo normal, uma vez que enquanto um subgrupo normal é invariante apenas para automorfismos internos, um subgrupo característico é invariante para todo automorfismo de G :



- Temos, portanto, diretamente que $H \trianglelefteq\trianglelefteq G \implies H \trianglelefteq G$.

Exemplo 1.6.9

Os subgrupos triviais de G são subgrupos característicos de G .

Exemplo 1.6.10

Seja G um grupo e $Z(G)$ seu centro, logo:

$$Z(G) \trianglelefteq\trianglelefteq G$$

Demonstração:

Seja $z \in Z(G)$, temos por definição que:

$$zg = gz, \forall g \in G$$

Seja $\varphi \in \text{Aut}(G)$, temos:

$$\varphi(zg) = \varphi(gz) \iff \varphi(z)\varphi(g) = \varphi(g)\varphi(z)$$

Como φ é um automorfismo, então sabemos que se trata de uma função bijetora.

Logo, $\varphi(G) = G$ e podemos escrever $\varphi(g) = h$, $h \in G$.

Temos, portanto:

$$\varphi(z)h = h\varphi(z), \forall h \in G$$

Concluimos que $\varphi(z) \in Z(G)$.

Logo:

$$Z(G) \trianglelefteq\trianglelefteq G$$

□

Proposição 1.6.9

Seja $K \trianglelefteq\trianglelefteq H \trianglelefteq G$, então $K \trianglelefteq G$.

Demonstração:

Seja $\varphi \in \text{Aut}(H)$ tal que:

$$\varphi(K) \stackrel{\text{def}}{=} gKg^{-1}$$

Note que a função acima é bem definida uma vez que $K \subseteq H$ e $gHg^{-1} \subseteq H$.

Como $K \trianglelefteq H$, então $\varphi(K) \subseteq K$.

Concluimos que:

$$gKg^{-1} \subseteq K \implies K \trianglelefteq G.$$

□

Observações: note que $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G \not\Rightarrow K \trianglelefteq G$.

Tomemos como contraexemplo a seguinte cadeia de normalidade:

$$\underbrace{\{e, s\}}_{\stackrel{\text{def}}{=} K} \trianglelefteq \underbrace{\{e, r^2, s, r^2s\}}_{\stackrel{\text{def}}{=} H} \trianglelefteq \underbrace{D_4}_{\stackrel{\text{def}}{=} G}.$$

Onde D_4 é o Grupo Diedral D_4 , s representa uma reflexão/espelhamento, r representa uma rotação de 90° no sentido anti-horário e e representa o elemento neutro.

Note que de fato a cadeia de normalidade é verificada, uma vez que:

1. Temos que $K \leq H \leq G$;
2. $\frac{|H|}{|K|} = \frac{|G|}{|H|} = 2$ e, pela **Proposição 1.5.2** temos diretamente que $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G$.

Mostremos que o item 1. é de fato verdadeiro, validando os itens 2. e 3..

Note que $H \subseteq D_4$ e é evidentemente não vazio. Além disso, cada elemento de H é seu próprio elemento inverso.

Temos também para os resultados não triviais gerados a partir das operações entre os elementos de H :

$$r^2r^2s = r^4s = s, \quad sr^2 = r^2s, \quad sr^2s = r^2, \quad r^2sr^2 = s, \quad r^2s^2 = r^2$$

Note que todos os resultados pertencem ao conjunto H .

Portanto, $H \leq G$. Note que $K \leq H$, trivialmente.

Concluimos que $K \leq H \leq G$ e, pelos itens 2. e 3., $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G$.

Note, porém, que K não é normal em G , uma vez que:

$$\underbrace{r}_{\in G} \cdot \underbrace{s}_{\in K} \cdot \underbrace{r^{-1}}_{\in G} = r^2s \notin K$$

Concluimos, portanto, via contraexemplo, que a normalidade não é transitiva.

Capítulo 2

Produtos

2.1 Produto Direto de Grupos

Nesta seção inteira a variável n representa um número inteiro positivo.

Definição 2.1.1

Seja $\mathcal{G} = \{G_1, \dots, G_n\}$ uma família de grupos. Definimos **produto direto externo de $\mathcal{G}$** como sendo o conjunto $G_1 \times \dots \times G_n$ munido da operação:

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 y_1, \dots, x_n y_n).$$

Denotamos, comumente:

$$\prod_{i=1}^n G_i \stackrel{\text{def}}{=} G_1 \times \dots \times G_n.$$

Observação: por convenção, a operação "." será omitida.

Proposição 2.1.1

A partir da **Definição 2.1.1**, temos que o produto direto externo de $\mathcal{G}$ é um grupo.

Demonstração:

Via a **Definição 2.1.1** temos que a operação "." é uma lei de composição interna por construção.

Temos também, de forma evidente, que o elemento neutro e o elemento inverso de $x \stackrel{\text{def}}{=} (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n G_i$ são dados por, respectivamente:

$$e \stackrel{\text{def}}{=} (e_1, \dots, e_n) \in \prod_{i=1}^n G_i$$

Onde e_n representa o elemento neutro do n -ésimo grupo do produto direto externo.

$$x^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} (x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1}) \in \prod_{i=1}^n G_i$$

Onde x_n^{-1} representa o elemento inverso para x_n no n -ésimo grupo do produto direto externo.

Temos também que o produto direto externo de $\mathcal{G}$ é evidentemente associativo, uma vez que $G_1, \dots, G_n$ são grupos.

Concluimos, portanto, que $(\prod_{i=1}^n G_i, \cdot)$ é um grupo. □

Definição 2.1.2

Sejam G um grupo e $H_1, \dots, H_n \leq G$.

Dizemos que G é um **produto direto interno** de $H_1, \dots, H_n$ se, e somente se, as seguintes condições são satisfeitas:

- $G = H_1 \dots H_n$;
- $H_i \trianglelefteq G, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$;
- $\begin{cases} H_1 \cap H_2 \dots H_n = \{e\} \\ H_i \cap H_1 \dots H_{i-1} H_{i+1} \dots H_n = \{e\}, \forall i \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket \\ H_n \cap H_1 \dots H_{n-1} = \{e\} \end{cases}$

Caso G e $H_1, \dots, H_n$ satisfaçam as condições acima, denotamos:

$$G \stackrel{\text{def}}{=} \bigodot_{i=1}^n H_i$$

Proposição 2.1.2

Sejam G um grupo e $H_1, \dots, H_n \leq G$.

Se G for um produto direto interno de $H_1, \dots, H_n$, então quaisquer elementos de $H_1, \dots, H_n$ distintos comutam entre si.

Demonstração:

Sejam $(h_i, h_j) \in H_i \times H_j$, onde $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ e $i \neq j$.

Tomemos o elemento $g \stackrel{\text{def}}{=} [h_i, h_j] = h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} \in G$.

Note que:

$$h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} = (h_i h_j h_i^{-1}) h_j^{-1} \in H_j, \text{ pois } H_j \trianglelefteq G$$

$$h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} = h_i (h_j h_i^{-1} h_j^{-1}) \in H_i, \text{ pois } H_i \trianglelefteq G$$

Temos, portanto, que $[h_i, h_j] \in H_i \cap H_j = \{e\}$.

Logo:

$$h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} = e \iff h_i h_j = h_j h_i$$

Logo, quaisquer fatores de $H_1, \dots, H_n$ distintos comutam entre si. □

Proposição 2.1.3

Seja G um grupo e $H_1, \dots, H_n$ subgrupos de G tal que $G = \bigodot_{i=1}^n H_i$.
Se $g \in G$ tal que $g = h_1 \dots h_n = h'_1 \dots h'_n$, onde $h_i, h'_i \in H_i$, para $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,
então temos $h_i = h'_i$, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Demonstração:

Seja $g \stackrel{\text{def}}{=} h_1 \dots h_n = h'_1 \dots h'_n$. Ora, temos então que:

$$h_1 \dots h_n = h'_1 \dots h'_n \iff h_1^{-1} h'_1 = (h'_2 \dots h'_n)(h_2 \dots h_n)^{-1}$$

A partir da **Proposição 2.1.2** podemos reescrever a expressão tal que:

$$h_1^{-1} h'_1 = \underbrace{(h'_2 h_2^{-1}) \dots (h'_n h_n^{-1})}_{\in H_2 \dots H_n}$$

Como $h_1^{-1} h'_1 \in H_1$ deduzimos que $(h'_2 h_2^{-1}) \dots (h'_n h_n^{-1}) \in H_1$.

Deduzimos que $(h'_2 h_2^{-1}) \dots (h'_n h_n^{-1}) \in H_1 \cap H_2 \dots H_n$.

Ora, como $H_1 \cap H_2 \dots H_n = \{e\}$, então temos $(h'_2 h_2^{-1}) \dots (h'_n h_n^{-1}) = e$.

Logo $h_1^{-1} h'_1 = e \iff h_1 = h'_1$.

Realizando de forma análoga as mesmas operações indutivamente sobre n concluimos que $h_i = h'_i$, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. □

Teorema 2.1.1

Sejam G um grupo e $H_1, \dots, H_n \leq G$.

Temos, a partir das notações nas definições 2.1.1 e 2.1.2, que:

$$G = \bigodot_{i=1}^n H_i \implies G \cong \prod_{i=1}^n H_i$$

Demonstração:

Suponha que $G = \bigodot_{i=1}^n H_i$.

Tomemos a função μ tal que:

$$\begin{aligned} \mu : \quad G &\rightarrow \prod_{i=1}^n H_i \\ h_1 \dots h_n &\mapsto (h_1, \dots, h_n) \end{aligned}$$

Note que a função está de fato bem definida e é trivialmente bijetiva:

A sobrejetividade de μ segue diretamente da primeira condição da **Definição 2.1.2**, pois $G = H_1 \dots H_n$. Além disso, pela **Proposição 2.1.3** temos que a representação de qualquer elemento $g \in G$ na forma $h_1 \dots h_n$ é única. Essa unicidade assegura que μ está bem definida e é injetiva. Logo, μ é uma bijeção.

Mostremos, por fim, que μ é um homomorfismo de grupos.

Sejam $g \stackrel{\text{def}}{=} h_1 \dots h_n$ e $g' \stackrel{\text{def}}{=} h'_1 \dots h'_n$.

Temos:

$$\begin{aligned}
 \mu(gg') &= \mu((h_1 \dots h_n)(h'_1 \dots h'_n)) \\
 &= \mu(h_1 h'_1 \dots h_n h'_n) \quad (\text{Proposição 2.1.2}) \\
 &= (h_1 h'_1, \dots, h_n h'_n) \\
 &= (h_1, \dots, h_n)(h'_1, \dots, h'_n) \\
 &= \mu(g)\mu(g')
 \end{aligned}$$

Logo, μ é um isomorfismo de grupos e temos que:

$$G \cong \prod_{i=1}^n H_i$$

□

Observação: note que pela **Proposição 1.6.4** e pelo fato da composição usual de bijeções ser uma bijeção temos também diretamente que:

$$G \cong \bigodot_{i=1}^n H_i \implies G \cong \prod_{i=1}^n H_i$$

Teorema 2.1.2

Teorema Chinês do Resto

Seja $M \stackrel{\text{def}}{=} m_1 \dots m_n \in \mathbb{Z}_+^*$ tal que $\text{mdc}(m_i, m_j) = 1, \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ e $i \neq j$.
Então:

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$$

Demonstração:

Seja $M_i \stackrel{\text{def}}{=} \frac{M}{m_i}, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Note que $\overline{M_i} \in \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, uma vez que $M_i \in \llbracket 1, M \rrbracket$.
Note também que, evidentemente, temos $\mathcal{O}(M_i) = m_i$, uma vez que $m_i M_i = M$.

A partir da **Proposição 1.6.5** temos portanto $\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z} \cong \langle M_i \rangle \cong \langle \overline{M_i} \rangle$.

Mostremos que $\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} = \bigodot_{i=1}^n \langle \overline{M_i} \rangle$.

É evidente que $\langle \overline{M_i} \rangle \leq \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, uma vez que, por definição, ele é um subgrupo gerado. Além disso, pelo fato de $\mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$ ser um grupo abeliano, temos diretamente que $\langle \overline{M_i} \rangle \trianglelefteq \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$.

Portanto, devido a operação de soma usual de inteiros módulo M , denotemos:

$$\langle \overline{M_1} \rangle \dots \langle \overline{M_n} \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n \langle \overline{M_i} \rangle$$

Mostremos que:

$$\mathfrak{M} \stackrel{\text{def}}{=} \langle \overline{M_i} \rangle \cap \sum_{\substack{j \neq i \\ j \in \llbracket 1, n \rrbracket}} \langle \overline{M_j} \rangle = \{\overline{0}\}, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

Suponha que $\bar{x} \in \mathfrak{M} \setminus \{\bar{0}\}$ e $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Ora, temos então que $\bar{x} \in \langle \overline{M_i} \rangle$, logo, $m_i \nmid x$, para algum representante x da classe lateral $\bar{x}$.

Além disso, como $\bar{x} \in \sum_{\substack{j \neq i \\ j \in \llbracket 1, n \rrbracket}} \langle \overline{M_j} \rangle$, então $\bar{x}$ pode ser representado como uma combinação linear em que m_i é um fator de cada termo. Portanto, $m_i \mid x$, para algum representante x da classe lateral $\bar{x}$.

Deduzimos, portanto, que $m_i \nmid x$ e $m_i \mid x$, para algum representante x da classe lateral $\bar{x}$. Absurdo.

Como $\mathfrak{M}$ é não vazio, concluímos que $\mathfrak{M} = \{\bar{0}\}$.

Mostremos, por fim, que:

$$\sum_{i=1}^n \langle \overline{M_i} \rangle = \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$$

Note que pela **Proposição 1.5.6** temos que:

$$\left| \sum_{i=1}^n \langle \overline{M_i} \rangle \right| = \left| \langle \overline{M_1} \rangle + \sum_{i=2}^n \langle \overline{M_i} \rangle \right| = \frac{|\langle \overline{M_1} \rangle| \left| \sum_{i=2}^n \langle \overline{M_i} \rangle \right|}{\underbrace{\left| \langle \overline{M_1} \rangle \cap \sum_{i=2}^n \langle \overline{M_i} \rangle \right|}_{=1}} = m_1 \left| \sum_{i=2}^n \langle \overline{M_i} \rangle \right|$$

Aplicando a fórmula indutivamente em i , temos que:

$$\left| \sum_{i=1}^n \langle \overline{M_i} \rangle \right| = m_1 \left| \sum_{i=2}^n \langle \overline{M_i} \rangle \right| = \dots = m_1 \dots m_n = M$$

Como $\sum_{i=1}^n \langle \overline{M_i} \rangle \subseteq \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, deduzimos diretamente que:

$$\sum_{i=1}^n \langle \overline{M_i} \rangle = \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$$

Concluimos, finalmente, que:

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} = \bigodot_{i=1}^n \langle \overline{M_i} \rangle \implies \mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$$

□

Exemplo 2.1.1

Seja $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$. Como $6 = 3 \cdot 2$ e $\text{mdc}(2, 3) = 1$, temos que:

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

Onde $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$ e:

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{(\bar{a}, \bar{b}); \bar{a} \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \bar{b} \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\}.$$

Definição 2.1.3

Definimos o grupo $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$, onde $+$ denota a soma usual de inteiros módulo 2, como **grupo de Klein** e denotamos:

$$\mathcal{K} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Observação: note que o grupo de Klein é de fato, trivialmente, um grupo. Além disso, trata-se de um grupo abeliano e temos que $|\mathcal{K}| = 4$.

Exemplo 2.1.2

O grupo de Klein possui 5 subgrupos normais:

- Os subgrupos triviais $\{(\bar{0}, \bar{0})\}$ e $\mathcal{K}$;
- O subgrupo gerado por $(\bar{0}, \bar{1})$;
- O subgrupo gerado por $(\bar{1}, \bar{0})$;
- O subgrupo gerado por $(\bar{1}, \bar{1})$.

Note que os subgrupos de $\mathcal{K}$ são de fato todos normais, uma vez que $\mathcal{K}$ é abeliano.

Proposição 2.1.4

Seja $\mathcal{K}$ o grupo de Klein, logo $\mathcal{K} \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Demonstração:

Note que, isto é equivalente a afirmar que $\mathcal{K}$ é o menor grupo não cíclico:

Suponha $\mathcal{K}$ como sendo o menor grupo não cíclico. Ora, como $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ é um grupo cíclico, então temos diretamente que $\mathcal{K} \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Mostremos, agora, a afirmação contrária:

Ora, como $\mathcal{K}$ é um grupo finito abeliano tal que $|\mathcal{K}| = 4$, então se $\mathcal{K} \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, deduzimos diretamente que $\mathcal{K}$ não é cíclico.

Note também que se trata do menor grupo com tal propriedade.

Suponha G um grupo finito. Ora, se $|G| = 1$, G é trivialmente cíclico.

Suponha, agora, que $|G| = 2$ ou $|G| = 3$. Ora, como a ordem de G nos dois casos é prima, então pela **Proposição 1.4.1**, temos diretamente que G é cíclico.

Concluimos que $\mathcal{K}$ é o menor grupo finito e não cíclico.

Mostremos, portanto, que $\mathcal{K}$ é de fato não cíclico:

$$(\bar{1}, \bar{0}) + (\bar{1}, \bar{0}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$(\bar{0}, \bar{1}) + (\bar{0}, \bar{1}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$(\bar{1}, \bar{1}) + (\bar{1}, \bar{1}) = (\bar{0}, \bar{0})$$

Deduzimos, finalmente, que $\mathcal{K}$ é o menor grupo não cíclico e, portanto, $\mathcal{K} \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.



2.2 Produto Semidireto de Grupos

Definição 2.2.1

Seja G um grupo e $H, K \leq G$. Dizemos que G é o **produto semidireto interno** de H e K se:

- $G = HK$;
- $H \trianglelefteq G$;
- $H \cap K = \{e\}$.

Caso G, H e K satisfaçam as condições acima, denotamos:

$$G = H \rtimes K$$

Observações:

- Note que, diferentemente da **Definição 2.1.2**, definimos o produto semidireto interno apenas entre 2 subgrupos de G . Tal escolha é motivada pela natureza assimétrica do produto semidireto, ao contrário da simetria do produto direto. Entretanto é possível estender essa estrutura de forma indutiva para n subgrupos de G . Nesse caso, obtemos um produto semidireto interno onde agrupamos os subgrupos passo a passo e cada novo subgrupo interage com o bloco formado pelos anteriores;
- Caso $H \leq G$ e $K \trianglelefteq G$, denotaríamos $G = K \rtimes H$ ou $G = H \rtimes K$.

Exemplo 2.2.1

Tomemos os grupos $GL_2(\mathbb{R})$ e $SL_2(\mathbb{R})$. Sabemos, a partir dos exemplos 1.3.3 e 1.6.6 que $SL_2(\mathbb{R}) \trianglelefteq GL_2(\mathbb{R})$. Denotemos $H \stackrel{\text{def}}{=} SL_2(\mathbb{R})$

Tomemos também $K \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ M(a) : M(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, a \neq 0 \right\}$. Então,

$$GL_2(\mathbb{R}) = H \rtimes K.$$

Demonstração:

Note que $K \leq G$, mas $K \not\trianglelefteq G$, pois:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\stackrel{\text{def}}{=} M \in GL_2(\mathbb{R})} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_{= M^{-1} \in GL_2(\mathbb{R})} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin K.$$

Porém, note que $GL_2(\mathbb{R}) = HK$, uma vez que:

Sendo $A \in GL_2(\mathbb{R})$ e $M\left(\frac{1}{\det(A)}\right) \in K$, temos,

$$A \cdot M\left(\frac{1}{\det(A)}\right) \in H, \text{ pois } \det\left(A \cdot M\left(\frac{1}{\det(A)}\right)\right) = 1$$

Logo $\exists S \in H$ tal que $A \cdot M\left(\frac{1}{\det(A)}\right) = S$, onde $A = \underbrace{S}_{\in H} \cdot \underbrace{M(\det(A))}_{\in K}$.

Note ainda que a interseção é evidentemente trivial:

$$H \cap K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Concluimos que $GL_2(\mathbb{R}) = H \rtimes K$.

□

Proposição 2.2.1

Seja G um grupo e $H, K \leq G$ tal que $G = H \rtimes K$. Se $g \in G$ é tal que $g = hk = h'k'$, onde $h, h' \in H$ e $k, k' \in K$, então $h = h'$ e $k = k'$.

Demonstração:

Seja $g \in G$ tal que $g = hk = h'k'$ para $h, h' \in H$ e $k, k' \in K$. Note que:

$$hk = h'k' \iff h'^{-1}h = k'k^{-1} \iff h'^{-1}h \in K \text{ e } k'k^{-1} \in H$$

Ora, como $H \cap K = \{e\}$, temos $h'^{-1}h = e \iff h = h'$ e $k'k^{-1} = e \iff k = k'$.

□

Note que, diferentemente do produto direto interno, não existe a comutatividade entre elementos de subgrupos distintos. Isso ocorre pois tal resultado dependia fortemente da normalidade de ambos os subgrupos. Além disso, note que, sendo $g_1, g_2 \in G$ temos pela **Proposição 2.2.1** que tais elementos são decompostos de forma única em:

$$g_1 = h_1k_1, \quad h_1 \in H, \quad k_1 \in K$$

$$g_2 = h_2k_2, \quad h_2 \in H, \quad k_2 \in K$$

Logo, como $g_1g_2 \in G$, temos também que tal elemento deve ser decomposto como $g_1g_2 = h'k'$, para $h' \in H$ e $k' \in K$.

Note que:

$$g_1g_2 = h_1k_1h_2k_2 = h_1(k_1h_2)k_2 = h_1(k_1h_2k_1^{-1}k_1)k_2 = (h_1k_1h_2k_1^{-1})(k_1k_2)$$

Como $H \trianglelefteq G$, então temos, evidentemente, que $k_1h_2k_1^{-1} \in H$. Logo, tomando $h' \stackrel{\text{def}}{=} h_1k_1h_2k_1^{-1}$ e $k' \stackrel{\text{def}}{=} k_1k_2$, temos o resultado esperado. Ainda, perceba que, tal manipulação gera naturalmente um automorfismo interno de H .

Tal observação é a motivação principal da definição a seguir:

Definição 2.2.2

Sejam H e K grupos e $\theta : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ um homomorfismo de grupos. Definimos o **produto semidireto externo de H e K** como o conjunto $H \times K$ munido da seguinte operação:

$$(h_1, k_1) \cdot (h_2, k_2) \stackrel{\text{def}}{=} (h_1 \theta_{k_1}(h_2), k_1 k_2)$$

Onde $h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K$ e $\theta_{k_1} \in \text{Aut}(H)$.
Denotamos, comumente:

$$H \rtimes_{\theta} K.$$

Observações:

- Quando livre de ambiguidade, a operação “ $\cdot$ ” será omitida;
- Note que, caso θ seja trivial, então $H \rtimes_{\theta} K = H \times K$.

Proposição 2.2.2

A partir das notações da **Definição 2.2.2**, temos que o produto semidireto externo de H e K é um grupo.

Demonstração:

Sejam H e K grupos e consideremos seu produto semidireto externo $H \rtimes_{\theta} K$, onde $\theta : K \rightarrow \text{Aut}(H)$. Perceba que, por definição, θ é um homomorfismo de grupos, e, portanto, para quaisquer $k_1, k_2 \in K$ temos que $\theta_{k_1 k_2} = \theta_{k_1} \theta_{k_2}$.

Note que, de fato, a operação definida é uma lei de composição interna por definição.

Além disso, temos evidentemente que o elemento neutro é dado por $e \stackrel{\text{def}}{=} (e_H, e_K)$, onde e_H denota o elemento neutro do grupo H e e_K denota o elemento neutro do grupo K .

Tomemos $(h, k) \in H \times K$, note que seu elemento inverso é dado por:

$$(h, k)^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} (\theta_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1})$$

De fato, temos:

$$\begin{aligned} (h, k)(h, k)^{-1} &= (h, k)(\theta_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1}) \\ &= (h \theta_k(\theta_{k^{-1}}(h^{-1})), e_K) \\ &= (h \theta_{e_K}(h^{-1}), e_K) \\ &= (h h^{-1}, e_K) \\ &= (e_H, e_K) \end{aligned}$$

Por fim, sendo $h_1, h_2, h_3 \in H$ e $k_1, k_2, k_3 \in K$ temos que:

$$\begin{aligned}
((h_1, k_1)(h_2, k_2))(h_3, k_3) &= (h_1\theta_{k_1}(h_2), k_1k_2)(h_3, k_3) \\
&= ((h_1\theta_{k_1}(h_2))\theta_{k_1k_2}(h_3), (k_1k_2)k_3) \\
&= (h_1(\theta_{k_1}(h_2)\theta_{k_1k_2}(h_3)), k_1(k_2k_3)) \\
&= (h_1(\theta_{k_1}(h_2)\theta_{k_1}(\theta_{k_2}(h_3))), k_1(k_2k_3)) \\
&= (h_1\theta_{k_1}(h_2\theta_{k_2}(h_3)), k_1(k_2k_3)) \\
&= (h_1, k_1)(h_2\theta_{k_2}(h_3), k_2k_3) \\
&= (h_1, k_1)((h_2, k_2)(h_3, k_3))
\end{aligned}$$

Concluimos, portanto, que $H \rtimes_{\theta} K$ é um grupo. □

Teorema 2.2.1

Seja G um grupo e $H, K \leq G$ tal que $G = H \rtimes K$. Logo, $G \cong H \rtimes_{\theta} K$, onde $\theta : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ é definida por $\theta_k(h) = khk^{-1}$.

Demonstração:

Seja ψ definida da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
\psi : G &\rightarrow H \rtimes_{\theta} K \\
hk &\mapsto (h, k)
\end{aligned}$$

Mostremos que ψ é um isomorfismo de grupos.

Note primeiramente que ψ é, por construção, uma função sobrejetora, uma vez que $g = hk$ é escrito de forma única.

Tomemos $h_1, h_2 \in H$ e $k_1, k_2 \in K$. Perceba que:

$$\begin{aligned}
\psi(h_1k_1h_2k_2) &= \psi((h_1k_1h_2k_1^{-1})(k_1k_2)) \\
&= (h_1k_1h_2k_1^{-1}, k_1k_2) \\
&= (h_1\theta_{k_1}(h_2), k_1k_2) \\
&= (h_1, k_1)(h_2, k_2) \\
&= \psi(h_1k_1)\psi(h_2k_2)
\end{aligned}$$

Além disso, como temos evidentemente $\ker \psi = \{e\}$, concluimos que ψ é injetora.

Portanto, ψ é um isomorfismo de grupos e $G \cong H \rtimes_{\theta} K$. □

Proposição 2.2.3

Sejam H e K grupos e $\theta : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ um homomorfismo. Se θ é não trivial, então $H \rtimes_{\theta} K$ é não abeliano.

Demonstração:

Suponha que $H \rtimes_{\theta} K$ seja abeliano. Por contrapositiva, mostremos que θ é trivial.

Como $(h_1, k_1)(h_2, k_2) = (h_2, k_2)(h_1, k_1)$ para quaisquer $h_1, h_2 \in H$ e $k_1, k_2 \in K$, temos então, para um dado $(h, k) \in H \times K$:

$$(h, e_K)(e_H, k) = (e_H, k)(h, e_K) \iff (h\theta_{e_K}(e_H), k) = (\theta_k(h), k) \iff \theta_k(h) = h$$

Concluimos, portanto, que θ é trivial. □

Exemplo 2.2.2

Sejam H um grupo e $K \stackrel{\text{def}}{=} \text{Aut}(H)$. Se definirmos $\theta : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ por $\theta(\sigma) = \sigma$, então temos o produto semidireto externo $H \rtimes_{\theta} K$, onde:

$$(h, \sigma)(h', \tau) = (h\sigma(h'), \sigma\tau).$$

*Observação: a construção do exemplo acima é chamada de **Holomorfo do grupo** H .*

Teorema 2.2.2

Sejam H e K grupos e $\theta, \delta : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ dois homomorfismos. Se existir $\sigma \in \text{Aut}(H)$ tal que:

$$\delta_k = \sigma\theta_k\sigma^{-1}, \quad \forall k \in K$$

Então,

$$H \rtimes_{\theta} K \cong H \rtimes_{\delta} K.$$

Demonstração:

Defina φ a função dada por:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} H \rtimes_{\theta} K & \rightarrow & H \rtimes_{\delta} K \\ (h, k) & \mapsto & (\sigma(h), k) \end{array}$$

Mostremos que φ é um isomorfismo de grupos.

Note, primeiramente, que φ é de fato função e é bijetora por construção, pelo fato de σ ser um automorfismo de H .

Sejam $(h_1, k_1), (h_2, k_2) \in H \rtimes_{\theta} K$, temos:

$$\begin{aligned} \varphi((h_1, k_1)(h_2, k_2)) &= \varphi((h_1\theta_{k_1}(h_2), k_1k_2)) = (\sigma(h_1\theta_{k_1}(h_2)), k_1k_2) \\ &= (\sigma(h_1)\sigma(\theta_{k_1}(h_2)), k_1k_2) = (\sigma(h_1)\delta_{k_1}(\sigma_{k_1}(h_2)), k_1k_2) \\ &= (\sigma(h_1), k_1)(\sigma(h_2), k_2) = \varphi((h_1, k_1))\varphi((h_2, k_2)) \end{aligned}$$

Concluimos, portanto, que φ é um isomorfismo de grupos e,

$$H \rtimes_{\theta} K \cong H \rtimes_{\delta} K. \quad \square$$

Teorema 2.2.3

Sejam H e K grupos e $\theta, \delta : K \rightarrow \text{Aut}(H)$ homomorfismos. Se existir $\beta \in \text{Aut}(K)$ tal que $\theta = \delta\beta$, então:

$$H \rtimes_{\theta} K \cong H \rtimes_{\delta} K.$$

Demonstração:

Defina φ a função dada por:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} H \rtimes_{\theta} K & \rightarrow & H \rtimes_{\delta} K \\ (h, k) & \mapsto & (h, \beta(k)) \end{array}$$

Mostremos que φ é um isomorfismo de grupos.

Note que, analogamente ao **Teorema 2.2.2**, φ é de fato função e é bijetora por construção, pelo fato de β ser um automorfismo de K .

Mostremos, portanto, que φ é um homomorfismo de grupos. Sejam $(h_1, k_1), (h_2, k_2) \in H \rtimes_{\theta} K$. Temos:

$$\begin{aligned} \varphi((h_1, k_1)(h_2, k_2)) &= \varphi((h_1 \theta_{k_1}(h_2), k_1 k_2)) = (h_1 \theta_{k_1}(h_2), \beta(k_1 k_2)) \\ &= (h_1 \theta_{k_1}(h_2), \beta(k_1) \beta(k_2)) = (h_1 \delta \beta k_1(h_2), \beta(k_1) \beta(k_2)) \\ &= (h_1, \beta(k_1))(h_2, \beta(k_2)) = \varphi((h_1, k_1)) \varphi((h_2, k_2)) \end{aligned}$$

Portanto, temos que φ é um isomorfismo de grupos e,

$$H \rtimes_{\theta} K \cong H \rtimes_{\delta} K.$$

□

2.3 Sequências Exatas Curtas

Definição 2.3.1

Sejam H, G e K grupos e $\varphi : H \rightarrow G$ e $\psi : G \rightarrow K$ homomorfismos de grupos. A sequência:

$$H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} K$$

é dita **sequência exata em G** se, e somente se, $\text{Im } \varphi = \ker \psi$.

Definição 2.3.2

A partir das notações da **Definição 2.3.1**, uma sequência da forma:

$$\{e\} \xrightarrow{\epsilon_1} H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} K \xrightarrow{\epsilon_2} \{e\}$$

é dita **sequência exata curta** se for uma sequência exata em H, G e K , onde $\{e\}$ é o grupo trivial cujo único elemento é seu neutro e e os homomorfismos ϵ_1 e ϵ_2 são dados por:

$$\epsilon_1 : \begin{array}{ccc} \{e\} & \rightarrow & H \\ e & \mapsto & e \end{array} \quad e, \quad \epsilon_2 : \begin{array}{ccc} K & \rightarrow & \{e\} \\ k & \mapsto & e \end{array}$$

Observações:

- Note que o grupo trivial $\{e\}$ é único a menos de isomorfismo, logo podemos assumir, sem perda de generalidade, que os grupos triviais definidos na **Definição 2.3.2** são de fato iguais;

- Pelo fato dos homomorfismos ϵ_1 e ϵ_2 serem únicos, podemos simplesmente escrever:

$$\{e\} \rightarrow H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} K \rightarrow \{e\}$$

- A partir da definição temos que φ é um monomorfismo, pois $\ker \varphi = \text{Im } \epsilon_1 = \{e\}$;
- Analogamente, temos que ψ é um epimorfismo, pois $\text{Im } \psi = \ker \epsilon_2 = K$;
- Desde que a sequência é exata em G , então como $\text{Im } \varphi = \ker \psi$, temos que $\text{Im } \varphi \trianglelefteq G$.

Exemplo 2.3.1

Sejam G um grupo e $H \trianglelefteq G$. A sequência:

$$\{e\} \rightarrow H \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} G/H \rightarrow \{e\}$$

onde,

$$\iota: \begin{array}{ccc} H & \rightarrow & G \\ h & \mapsto & h \end{array} \quad \text{e,} \quad \pi: \begin{array}{ccc} G & \rightarrow & G/H \\ g & \mapsto & gH \end{array}$$

é uma sequência exata curta.

Demonstração:

Basta mostrar que ι é um monomorfismo, π é um epimorfismo e que $\text{Im } \iota = \ker \pi$.

Note que, de fato, ι é um monomorfismo e π é um epimorfismo, trivialmente. Resta mostrar que $\text{Im } \iota = \ker \pi$.

Ora, é fácil ver que:

$$\ker \pi = \{g \in G : \pi(g) = H\} = H = \text{Im } \iota$$

Portanto, a sequência apresentada é de fato uma sequência exata curta. □

Definição 2.3.3

Dizemos que uma sequência exata curta da forma:

$$\{e\} \rightarrow H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} K \rightarrow \{e\}$$

cinde se existe um homomorfismo $\kappa : K \rightarrow G$ tal que $\psi(\kappa(k)) = k$, $\forall k \in K$.

Observação: se uma dada sequência exata curta cinde, então podemos representar seu diagrama como:

$$\{e\} \longrightarrow H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} K \longrightarrow \{e\}$$

$\swarrow \kappa$

$$\xi((h, k)) = e_G \iff (h, k) = (e_H, e_K) \iff \ker \xi = \{(e_H, e_K)\}$$

Logo, ξ é injetora.

Para mostrar a sobrejetividade, tomemos $g \in G$. Encontremos $(h, k) \in H \rtimes_{\theta} K$ tal que $\xi(h, k) = g$. Seja $k = \psi(g)$ e defina $x \stackrel{\text{def}}{=} g\kappa(k)^{-1} \in G$. Note que:

$$\psi(x) = \psi(g\kappa(k)^{-1}) = \psi(g)\psi(\kappa(k))^{-1} = k \cdot k^{-1} = e_K$$

Portanto, $x \in \ker \psi = \text{Im } \varphi$. Como $x \in \text{Im } \varphi$ e φ é injetora, existe um único $h \in H$ tal que $\varphi(h) = x$, isto é, $\varphi(h) = g\kappa(k)^{-1}$.

Logo, $\varphi(h)\kappa(k) = g$, ou seja, $\xi(h, k) = g$. Temos, portanto, que ξ é sobrejetora.

Concluimos, finalmente, que ξ é um isomorfismo de grupos e temos:

$$G \cong H \rtimes_{\theta} K$$

□

Capítulo 3

Grupo Simétrico

3.1 Generalidades sobre o grupo simétrico

Retomemos com mais detalhes a construção do *grupo simétrico*, introduzido de forma breve no **Exemplo 1.2.3**.

Definição 3.1.1

Seja X um conjunto finito e não vazio. A função bijetiva $\sigma : X \rightarrow X$ é chamada de **permutação de X** .

Denotamos o conjunto de todas as permutações de X como $\mathfrak{S}_X$. Se $X = \{1, \dots, n\}$ então também podemos denotar $\mathfrak{S}_X$ como $\mathfrak{S}_n$, onde $n \in \mathbb{Z}_+^*$.

Observação: por convenção o símbolo para composição usual de funções será omitido, isto é, para $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$:

$$\sigma\tau \stackrel{\text{def}}{=} \sigma \circ \tau$$

Definição 3.1.2

O conjunto $\mathfrak{S}_X$ munido da operação usual de composição de funções é chamado de **grupo de permutações de X** , ou **grupo simétrico de X** .

Observações:

- Note que o conjunto $\mathfrak{S}_X$ com a composição usual de funções forma de fato um grupo, uma vez que a composição de funções bijetivas retorna de fato uma função bijetiva, a composição é associativa, toda função bijetiva admite uma função inversa e o elemento neutro é a função identidade, qual denotaremos e $\stackrel{\text{def}}{=} id_X$.
- Seja $X = \{1, \dots, n\}$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, utilizamos comumente a notação a seguir para descrever a permutação σ :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Exemplo 3.1.1

Sejam $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_3$, tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Temos:

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Note que $\sigma\tau \neq \tau\sigma$, logo $\mathfrak{S}_3$ não é grupo abeliano.

Evidentemente, $\mathfrak{S}_X$ não é abeliano para $\text{Card}(X) \geq 3$.

Proposição 3.1.1

Seja X um conjunto não vazio tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_+^*$.

Então $|\mathfrak{S}_X| = n!$.

Demonstração:

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ e $X \stackrel{\text{def}}{=} \{a_1, \dots, a_n\}$.

Como σ é uma função bijetiva, então para um elemento $a_i \in X$ é possível realizar n escolhas de imagem de a_i para $a_j \in X$, com $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Uma vez tomada essa relação entre os dois elementos de X tomamos novamente um $a_k \in X \setminus \{a_i\}$ e escolhemos uma imagem no conjunto $X \setminus \{a_j\}$. Como $X \setminus \{a_j\}$ possui $\text{Card}(X) - 1$ elementos, possuímos $n - 1$ escolhas de bijeção.

Realizamos esse passo a passo recursivamente até bijetarmos (realizarmos uma bijeção) todos os elementos do domínio X .

Como todas as escolhas de bijeção em cada passo formam escolhas independentes, podemos utilizar o princípio multiplicativo para mostrar diretamente que existem no total $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1 = n!$ possibilidades de funções bijetoras em $\mathfrak{S}_X$.

Portanto, $|\mathfrak{S}_X| = n!$.

□

Teorema 3.1.1**Teorema de Cayley**

Sejam G um grupo finito tal que $|G| = n \in \mathbb{Z}_+^*$ e G_0 seu conjunto subjacente (isto é, o conjunto G sem a estrutura de grupo).

A função Υ :

$$\begin{aligned} \Upsilon : G &\longrightarrow \mathfrak{S}_{G_0} \\ g &\longmapsto \Upsilon_g : G_0 \longrightarrow G_0 \\ &\quad x \longmapsto gx \end{aligned}$$

é um monomorfismo de grupos.

Demonstração:

Mostremos que Υ é de fato função e é injetiva.

Sejam $g_1, g_2 \in G$ tais que $g_1 = g_2$, temos que:

$$g_1 = g_2 \iff g_1x = g_2x \iff \Upsilon_{g_1} = \Upsilon_{g_2} \iff \Upsilon(g_1) = \Upsilon(g_2)$$

Portanto, Υ é função injetiva.

Mostremos que Υ é um homomorfismo de grupos.

Sejam $g_1, g_2 \in G$, temos que:

$$\Upsilon(g_1g_2) = \Upsilon_{g_1g_2}(x) = g_1g_2x = g_1(g_2x) = \Upsilon_{g_1}\Upsilon_{g_2} = \Upsilon(g_1)\Upsilon(g_2)$$

Portanto, Υ é um homomorfismo injetivo. □

Observações:

- Note que G não é isomorfo a $\mathfrak{S}_{G_0}$, uma vez que $|G| = n \neq |\mathfrak{S}_{G_0}| = n!$, como mostrado na **Proposição 3.1.1**;
- Como mostramos que se trata de um homomorfismo de grupos injetivo, então a estrutura de grupo é preservada e é possível mapear cada elemento de G para algum elemento de $\mathfrak{S}_{G_0}$, em outras palavras:

"Todo grupo finito é isomorfo a um subgrupo de um grupo simétrico".

Definição 3.1.3

Seja X um conjunto finito e não vazio. Chamamos de **suporte de uma permutação σ de X** o conjunto de elementos em X cuja imagem é diferente do elemento no domínio. Isto é:

$$\text{supp}(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X, \sigma(x) \neq x\}.$$

Exemplo 3.1.2

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_5$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Temos que $\text{supp}(\sigma) = \{1, 2, 3\}$.

Proposição 3.1.2

Sejam X um conjunto finito não vazio e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.

Se $x \in \text{supp}(\sigma)$, então $\sigma^n(x) \in \text{supp}(\sigma)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Demonstração:

Suponha que $x \in \text{supp}(\sigma)$, por definição temos que $\sigma(x) \neq x$.

Pela bijetividade, temos que $\sigma(\sigma(x)) = \sigma^2(x) \neq \sigma(x)$ e, portanto, $\sigma(x) \in \text{supp}(\sigma)$.

Realizando recursivamente este procedimento temos evidentemente que $\sigma^n(x) \in \text{supp}(\sigma)$, $\forall n \in \mathbb{Z}_+$.

Como X é um conjunto finito, observamos que quaisquer potências negativas de σ equivalem à potências positivas, pois a ordem de σ é finita. Portanto, o resultado vale para qualquer $n \in \mathbb{Z}$. □

Observação: deduzimos, portanto, que o suporte de uma permutação σ de X é invariante sob σ .

Proposição 3.1.3

Sejam X um conjunto finito e não vazio tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_+^*$ e $\tau_1, \dots, \tau_k \in \mathfrak{S}_X$ de suporte dois a dois disjuntos, onde $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ tal que $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k$, então para $x \in X$ temos:

$$\sigma(x) = \begin{cases} \tau_i(x) & \text{se } x \in \text{supp}(\tau_i) \text{ para } i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \\ x & \text{se } x \notin \text{supp}(\tau_i) \text{ para } i \in \llbracket 1, k \rrbracket. \end{cases}$$

Temos também que os elementos $\tau_1, \dots, \tau_k$ comutam entre si e:

$$\text{supp}(\sigma) = \bigsqcup_{i=1}^k \text{supp}(\tau_i).$$

Demonstração:

Seja $x \in \text{supp}(\tau_i)$, para algum $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Pela **Proposição 3.1.2** temos que $\tau_i(x) \in \text{supp}(\tau_i)$.

Como $\forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tal que $i \neq j$ temos que $\text{supp}(\tau_j) \cap \text{supp}(\tau_i) = \emptyset$, então $\sigma(x) = \tau_i(x)$.

Caso $x \notin \text{supp}(\tau_i)$, para todos $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, temos evidentemente que $\sigma(x) = x$, uma vez que $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k$.

Note que a composição entre os elementos $\tau_1, \dots, \tau_k$ também comuta.

Sejam $i, j \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tais que $i \neq j$. Suponha que $x \in \text{supp}(\tau_i)$. Como $\text{supp}(\tau_i) \cap \text{supp}(\tau_j) = \emptyset$, temos que:

$$\tau_i(\tau_j(x)) = \underbrace{\tau_i(x)}_{\in \text{supp}(\tau_i)} = \tau_j(\tau_i(x))$$

Simetricamente o mesmo é válido para $x \in \text{supp}(\tau_j)$. Suponha, agora, que $x \notin \text{supp}(\tau_i) \sqcup \text{supp}(\tau_j)$, temos trivialmente que:

$$\tau_i(\tau_j(x)) = \tau_i(x) = x = \tau_j(x) = \tau_j(\tau_i(x))$$

Portanto temos que $\tau_i \tau_j = \tau_j \tau_i$, $\forall i, j \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tais que $i \neq j$.

A partir das observações feitas acima temos diretamente que:

$$\text{supp}(\sigma) = \bigsqcup_{i=1}^k \text{supp}(\tau_i).$$

□

3.2 Ciclos e transposições

Definição 3.2.1

Seja $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ tal que $\text{Card}(X) \geq 2$. Uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ é chamada de **k-ciclo** (onde $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$) se:

$$\begin{aligned}\sigma(x_1) &= x_2 \\ \sigma(x_2) &= x_3 \\ &\dots \\ \sigma(x_{k-1}) &= x_k \\ \sigma(x_k) &= x_1 \\ \sigma(y) &= y, \quad y \in X \setminus \{x_1, \dots, x_k\}\end{aligned}$$

Denotamos tal k-ciclo como:

$$\sigma \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 \dots x_k).$$

Observações:

- A notação $x_1, \dots, x_k$ utilizada não implica que o ciclo deve atuar necessariamente nos primeiros k elementos indexados do conjunto X . De maneira rigorosa, um k -ciclo é determinado por uma escolha ordenada de k elementos distintos $a_1, \dots, a_k \in X$. A definição aplica-se fazendo a correspondência $\sigma(a_i) = a_{i+1}$ (com $a_{k+1} = a_1$ e fixando todos os elementos em $X \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$);
- Note que, por definição, se $\sigma = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_k)$, então $\text{supp}(\sigma) = \{x_1 \ x_2 \ \dots \ x_k\}$;
- Perceba que a escolha de x_1 como ponto de partida para o k -ciclo σ é arbitrária, é possível começar com qualquer outro $x_i \in \text{supp}(\sigma)$:

$$(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_k) = (x_i \ x_{i+1} \ \dots \ x_k \ x_1 \ \dots \ x_{i-1});$$

- Chamamos também um k -ciclo de **ciclo de comprimento k** ;
- Caso σ, τ sejam ciclos com suportes dois a dois disjuntos, temos diretamente via a **Proposição 3.1.3** que $\sigma\tau = \tau\sigma$;
- Note que nem toda permutação é um ciclo. Tomemos $\sigma \in \mathfrak{S}_4$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (1 \ 2)(3 \ 4)$$

Evidentemente σ não é um ciclo, porém σ pode ser escrito como produto de 2 ciclos de suportes disjuntos.

Definição 3.2.2

Uma **transposição** é um 2-ciclo.

Teorema 3.2.1

Seja $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ para $n \geq 2$. Então toda permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X \setminus \{\text{id}_X\}$ pode ser decomposta em um produto de ciclos de suportes dois a dois disjuntos. Tal decomposição é única, exceto pela ordem em que os ciclos são escritos.

Demonstração:

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X \setminus \{\text{id}_X\}$.

Tomemos de forma arbitrária um elemento x_j , com $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tal que $\sigma(x_j) \neq x_j$. Note que é garantido que tal elemento exista, uma vez que $\sigma \neq \text{id}_X$.

Definimos o seguinte conjunto:

$$\mathfrak{O}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \{\sigma^k(x) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

Note que a restrição $\sigma|_{\mathfrak{O}(x_j)}$ forma um k -ciclo e $\text{supp}(\sigma|_{\mathfrak{O}(x_j)}) = \mathfrak{O}(x_j)$, pela **Proposição 3.1.2**.

Realizamos o mesmo procedimento para todo $x \in X \setminus \mathfrak{O}(x_j)$ tal que $\sigma(x) \neq x$ e assim sucessivamente. Como X é um conjunto finito, realizamos tal procedimento em um número finito de passos.

Pela **Proposição 3.1.3** temos que a família $\{\mathfrak{O}(x)\}_{x \in X}$ forma uma partição de $X \setminus I$, onde $I \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X ; \sigma(x) = x\}$.

Sendo $\mathfrak{R}$ o conjunto dos representantes de cada k_x -ciclo $\sigma|_{\mathfrak{O}(x)}$, $\forall x \in X \setminus I$, temos:

$$\text{supp}(\sigma) = \bigsqcup_{r \in \mathfrak{R}} \text{supp}(\sigma|_{\mathfrak{O}(r)})$$

deduzimos que σ é igual a composição de todo k_x -ciclo $\sigma|_{\mathfrak{O}(r)}$, onde $r \in \mathfrak{R}$.

Mostremos que tal decomposição é única.

Suponha $\sigma = \rho_1 \dots \rho_h = \eta_1 \dots \eta_m$ duas decomposições de σ em ciclos de suportes dois a dois disjuntos.

Tomemos $x \in \text{supp}(\sigma)$. Como os ciclos dentro de cada decomposição possuem suportes disjuntos, x pertence ao suporte de exatamente um ciclo da primeira decomposição, digamos ρ_i , e a exatamente um ciclo da segunda, digamos η_j .

Como todos os outros ciclos nas respectivas decomposições fixam x , a ação iterada de σ sobre x é determinada unicamente por ρ_i e η_j . Ou seja, para todo $k \in \mathbb{Z}$, temos:

$$\sigma^k(x) = \rho_i^k(x) = \eta_j^k(x)$$

Isso significa que ρ_i e η_j possuem o mesmo suporte, e, pelo fato de serem ciclos, temos portanto $\rho_i = \eta_j$.

Como isso vale para qualquer elemento $x \in \text{supp}(\sigma)$, todo ciclo que aparece na primeira decomposição necessariamente aparece na segunda, e vice-versa. Portanto, os conjuntos de ciclos $\{\rho_1, \dots, \rho_h\}$ e $\{\eta_1, \dots, \eta_m\}$ coincidem, provando que a decomposição é única exceto pela ordem em que os ciclos são escritos. $\square$

Proposição 3.2.1

Seja X um conjunto finito e não vazio tal que $\text{Card}(X) \geq 3$.
Então $Z(\mathfrak{S}_X) = \{\text{id}_X\}$.

Demonstração:

Sejam $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$ e $(x, y) \in (X \setminus \text{supp}(\sigma)) \times \text{supp}(\sigma)$. Tomemos $\sigma \neq \text{id}_X$ e $\tau \stackrel{\text{def}}{=} (x \ y)$.

Ora, temos então $y \notin \text{supp}(\tau\sigma\tau^{-1})$, pois $\tau\sigma\tau^{-1}(y) = y$. Portanto, temos diretamente que $\tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma \iff \tau\sigma \neq \sigma\tau$.

Suponha, agora, que $X \setminus \text{supp}(\sigma) = \emptyset$. Procedemos por disjunção de casos.

Considere, inicialmente, que σ possui um ciclo de comprimento maior ou igual a 3 (como $\text{Card}(X) \geq 3$, então podemos afirmar que tal caso existe).

Tomemos, sem perda de generalidade, $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 \ x_s \ x_k)\kappa$, onde $\kappa \in \mathfrak{S}_X$ e $\{x_1, x_s, x_k\} \cap \text{supp}(\kappa) = \emptyset$. Sabemos que σ pode ser decomposto unicamente de tal forma pelo **Teorema 3.2.1**.

Definimos, ainda, $\tau \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 \ x_s)$. Logo, temos que $\tau\sigma\tau^{-1}(x_k) = x_s \neq x_1$ e, portanto, $\tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma \iff \tau\sigma \neq \sigma\tau$.

Suponha, agora, que σ não possui nenhum ciclo de comprimento maior ou igual a 3. Isto é, σ é apenas composto de transposições de suportes dois a dois disjuntos (note que, no mínimo, duas transposições, visto que $\text{Card}(X) \geq 3$).

Denotemos $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 \ x_2)(x_3 \ x_4)\kappa$, onde $\kappa \in \mathfrak{S}_X$ e $\{x_1, x_2, x_3, x_4\} \cap \text{supp}(\kappa) = \emptyset$.

Tomemos, neste caso, $\tau = (x_1 \ x_3)$. Temos, portanto, $\tau\sigma\tau^{-1}(x_3) = x_2 \neq x_4 \implies \tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma$.

Como para ambos os casos sempre podemos encontrar uma permutação τ tal que σ não comuta, então deduzimos que $Z(\mathfrak{S}_X) = \{\text{id}_X\}$ para $\text{Card}(X) \geq 3$. □

Proposição 3.2.2

Seja $X \stackrel{\text{def}}{=} \{x_1, \dots, x_n\}$ para $n \geq 2$. Logo, todo k -ciclo de $\mathfrak{S}_X$ é igual a um produto de $k - 1$ transposições.

Demonstração:

Tomemos $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ tal que $\sigma = (x_1 \ \dots \ x_k)$ para $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$.

Perceba pela definição de σ que $\sigma(x_1) = x_2, \sigma(x_2) = x_3, \dots, \sigma(x_k) = x_1$.

Logo, podemos reescrever σ como $\sigma = \underbrace{(x_1 \ x_k)(x_1 \ x_{k-1}) \dots (x_1 \ x_2)}_{k-1 \text{ transposições}}$. □

Exemplo 3.2.1

Tomemos alguns exemplos de permutações em $\mathfrak{S}_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1 \ 2) = (2 \ 1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2 \ 3) = (3 \ 2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 3) = (2 \ 3 \ 1) = (3 \ 1 \ 2) = (1 \ 2)(2 \ 3).$$

Proposição 3.2.3

Seja $X \stackrel{\text{def}}{=} \{x_1, \dots, x_n\}$ para $n \geq 2$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ um k -ciclo, onde $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$. Então $\mathcal{O}(\sigma) = k$.

Demonstração:

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ um k -ciclo. Tomemos, sem perda de generalidade, $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 \dots x_k)$.

Note primeiramente que para qualquer $i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$ a aplicação de σ iteradas i vezes sobre o elemento x_1 resulta em $\sigma^i(x_1) = x_{i+1}$. Como $x_{i+1} \neq x_1$, deduzimos que $\sigma^i \neq \text{id}_X$ e, portanto, $\mathcal{O}(\sigma) \geq k$.

Mostremos que $\sigma^k(x) = x, \forall x \in X$. Provamos por disjunção de casos:

Suponha que $x_j \in \text{supp}(\sigma)$ para algum $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Ora, neste caso, ao iterarmos a aplicação σ k vezes sobre x_j temos $\sigma^k(x_j) = x_j$.

Suponha, agora, que $x \in X \setminus \text{supp}(\sigma)$. Ora, temos portanto trivialmente que $\sigma^k(x) = x$.

Como $\sigma^k(x) = x$ para todo $x \in X$ e k é o menor inteiro positivo com essa propriedade, deduzimos que $\mathcal{O}(\sigma) = k$. □

Proposição 3.2.4

Seja $X \stackrel{\text{def}}{=} \{x_1, \dots, x_n\}$ para $n \geq 2$. Tomemos $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ tal que:

$$\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_t, \quad t \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

Onde γ_i é um k_i -ciclo, $\forall i \in \llbracket 1, t \rrbracket$ e γ_i, γ_j tem suportes dois a dois disjuntos $\forall i, j \in \llbracket 1, t \rrbracket, i \neq j$.

Então, $\mathcal{O}(\sigma) = \text{mmc}(k_1, \dots, k_t)$.

Demonstração:

Seja $h \in \mathbb{Z}_+^*$ tal que $h \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{O}(\sigma)$, isto é, $\sigma^h = \text{id}_X$.

Note que, como $\gamma_i \gamma_j = \gamma_j \gamma_i, \forall i, j \in \llbracket 1, t \rrbracket$ tal que $i \neq j$, pela **Proposição 3.1.3** temos:

$$\text{id}_X = \sigma^h = (\gamma_1 \dots \gamma_t)^h = \gamma_1^h \dots \gamma_t^h$$

Como os suportes de cada componente γ_i de σ são dois a dois disjuntos para todo $i \in \llbracket 1, t \rrbracket$, é necessário que h seja um múltiplo de cada ordem k_i para cada γ_i simultaneamente.

Por definição, como h é a ordem de σ , logo h assume o menor múltiplo comum de cada ordem k_i .

Concluimos, portanto, que $\mathcal{O}(\sigma) = \text{mmc}(k_1, \dots, k_t)$.



Exemplo 3.2.2

Exercício 5.41 da referência [GL22].

(a) Seja $\sigma_{(a)} \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma_{(a)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 6 & 7 & 9 & 8 \end{pmatrix} = \underbrace{(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)}_{\text{ordem}=5} \underbrace{(8 \ 9)}_{\text{ordem}=2}$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(a)}) = \text{mmc}(5, 2) = 10$$

(b) Seja $\sigma_{(b)} \in \mathfrak{S}_7$ tal que:

$$\sigma_{(b)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \end{pmatrix} = \underbrace{(1 \ 6 \ 2 \ 5)}_{\text{ordem}=4} \underbrace{(3 \ 4)}_{\text{ordem}=2}$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(b)}) = \text{mmc}(4, 2) = 4$$

(c) Seja $\sigma_{(c)} \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma_{(c)} = (1 \ 2 \ 3)(4 \ 5)(1 \ 6 \ 8 \ 7 \ 9)(1 \ 5) = (1 \ 4 \ 5 \ 6 \ 8 \ 7 \ 9 \ 2 \ 3)$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(c)}) = 9$$

(d) Seja $\sigma_{(d)} \in \mathfrak{S}_3$ tal que:

$$\sigma_{(d)} = (1 \ 2)(1 \ 2 \ 3)(1 \ 2) = (1 \ 3 \ 2)$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(d)}) = 3.$$

Corolário 3.2.1

Seja X um conjunto finito e não vazio tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$. Então, todo elemento de $\mathfrak{S}_X$ é igual a um produto de no máximo $n - 1$ transposições.

Demonstração:

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação tal que:

$$\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_m, \quad m \in \llbracket 1, \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \rrbracket$$

Definimos $\mathcal{O}(\gamma_i) = k_i$, $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket$ (de tal forma que γ_i é um k_i -ciclo).

Sabemos a partir da **Proposição 3.2.1** que cada k -ciclo pode ser escrito como $k - 1$ transposições (de suportes não necessariamente disjuntos).

Como possuímos m ciclos dois a dois disjuntos, temos:

$$\sum_{i=1}^m k_i - 1 = \sum_{i=1}^m k_i - \sum_{i=1}^m 1 = \sum_{i=1}^m k_i - m$$

Como $\sum_{i=1}^m k_i \leq n$, pelo Princípio da Casa de Pombos, e $m \in \llbracket 1, \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \rrbracket$, σ pode se fatorar em no máximo $n - 1$ transposições (de suportes não necessariamente disjuntos).



Observações:

- Diferentemente do **Teorema 3.2.1**, a decomposição de uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ em transposições não é necessariamente única. Será mostrado na **Proposição 3.2.4** que uma permutação pode também ser decomposta em **transposições elementares**;
- Note que, para o caso $n = 2$, temos que o resultado é trivialmente válido para qualquer elemento do grupo simétrico, com exceção do elemento neutro, que é representado por no mínimo duas transposições: $(x_1 \ x_2)(x_1 \ x_2) = id_X$.

Exemplo 3.2.3

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_8$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 5 & 6 & 4 & 3 & 2 & 8 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 7 \ 8)(2 \ 5 \ 3 \ 6)$$

Note que, seguindo a mesma estratégia de prova da **Proposição 3.2.1**, podemos ainda reescrever σ como:

$$\sigma = (1 \ 7 \ 8)(2 \ 5 \ 3 \ 6) = (1 \ 8)(1 \ 7)(2 \ 6)(2 \ 3)(2 \ 5)$$

Definição 3.2.3

Seja $X = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Uma **transposição elementar** é uma transposição $\tau \in \mathfrak{S}_X$ da forma:

$$\tau = (x_i \ x_{i+1}), \quad i \in \{1, \dots, n-1\}$$

Isto é, uma transposição cujas imagens são elementos consecutivos de X .

Proposição 3.2.5

Toda transposição de um conjunto finito e não vazio X pode ser decomposta em um número ímpar de transposições elementares de X .

Demonstração:

Seja $(x_i \ x_j)$ uma transposição de $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, onde $i < j$.

Note que podemos escrever $(x_i \ x_j)$ como:

$$(x_i \ x_j) = (x_i \ x_{i+1})(x_{i+1} \ x_{i+2}) \dots (x_{j-2} \ x_{j-1})(x_{j-1} \ x_j)(x_{j-2} \ x_{j-1}) \dots (x_{i+1} \ x_{i+2})(x_i \ x_{i+1})$$

Note que de fato, ao realizar o produto das transposições elementares acima, temos que:

$$x_i \rightarrow x_{i+1} \rightarrow \dots \rightarrow x_{j-1} \rightarrow x_j$$

e,

$$x_j \rightarrow x_{j-1} \rightarrow \dots \rightarrow x_{i+1} \rightarrow x_i.$$

Além disso, temos também diretamente que:

$$x_k \rightarrow x_k, \forall k \in]i, j[$$

Isto conclui a prova e mostra que de fato podemos escrever quaisquer transposições de um conjunto finito e não vazio X em transposições elementares de X . $\square$

Observação: note que a decomposição de uma dada transposição em transposições elementares não é única. Temos, por exemplo, em $\mathfrak{S}_3$:

$$(1\ 3) = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2) = (2\ 3)(1\ 2)(2\ 3)$$

Exemplo 3.2.4

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_5$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Temos que:

$$\begin{aligned} \sigma = (1\ 3\ 5\ 4) &= (1\ 4)(1\ 5)(1\ 3) = (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4)(2\ 3)(1\ 2) \\ &\quad (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4)(4\ 5)(3\ 4)(2\ 3)(1\ 2) \\ &\quad (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2) \\ &= (1\ 2)(2\ 3)(4\ 5)(3\ 4)(1\ 2) \end{aligned}$$

Corolário 3.2.2

Seja X um conjunto finito e não vazio tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$. Então, todo elemento de $\mathfrak{S}_X$ é igual a um produto de transposições elementares.

Demonstração:

O resultado é consequência imediata da combinação do **Corolário 3.2.1** e da **Proposição 3.2.4**. $\square$

Proposição 3.2.6

Sejam $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ tal que $n \geq 2$ e $(x_i\ x_j)$ uma transposição arbitrária de X .

Então, $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_X$, temos:

$$\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1} = (\sigma(x_i)\ \sigma(x_j)).$$

Demonstração:

Seja $x \in X \setminus \{\sigma(x_i), \sigma(x_j)\}$. Temos diretamente que:

$$\sigma^{-1}(x) = \underbrace{x'}_{\in X \setminus \{x_i, x_j\}} \implies ((x_i \ x_j) \sigma^{-1})(x) = x' \implies (\sigma(x_i \ x_j) \sigma^{-1})(x) = \sigma(x') = x$$

Tomemos agora $x = \sigma(x_i)$, temos que:

$$\sigma^{-1}(\sigma(x_i)) = x_i \implies ((x_i \ x_j) \sigma^{-1})(\sigma(x_i)) = x_j \implies (\sigma(x_i \ x_j) \sigma^{-1})(\sigma(x_i)) = \sigma(x_j)$$

Analogamente temos que $x = \sigma(x_j) \implies (\sigma(x_i \ x_j) \sigma^{-1})(\sigma(x_j)) = \sigma(x_i)$.

Concluimos que $\sigma(x_i \ x_j) \sigma^{-1} = (\sigma(x_i) \ \sigma(x_j))$. □

Observação: perceba que a proposição vale também para quaisquer r -ciclos tal que $r \leq n$. Basta realizar de forma indutiva em r o mesmo procedimento construtivo. Logo, temos:

$$\sigma(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_r) \sigma^{-1} = (\sigma(x_1) \ \sigma(x_2) \ \dots \ \sigma(x_r))$$

Isto é, quaisquer ciclos em $\mathfrak{S}_X$ são conjugados a outro ciclo se eles têm o mesmo comprimento.

Teorema 3.2.2

Seja $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ tal que $n \geq 3$.

Então, o grupo $\mathfrak{S}_X$ é gerado por $\tau = (x_1 \ x_2)$ e $\gamma = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)$.

Isto é, $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_X, \exists a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_p \in \mathbb{Z}$, onde $a_1 = 0$ e $a_2, \dots, a_p = 1$ tal que:

$$\sigma = \prod_{i=1}^p \tau^{a_i} \gamma^{b_i}$$

Demonstração:

A partir do **Corolário 3.2.2**, basta mostrar que é possível formar uma transposição elementar a partir de um produto de τ e γ .

Ora, pela **Proposição 3.2.5** temos diretamente que:

$$\gamma^k \tau \gamma^{-k} = \gamma^k (x_1 \ x_2) \gamma^{-k} = (\gamma^k(x_1) \ \gamma^k(x_2)) = (x_{k+1} \ x_{k+2}), \quad \forall k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$$

Portanto, concluimos que $\mathfrak{S}_X$ pode ser gerado a partir de apenas τ e γ . □

Observação: a partir do resultado acima deduzimos que $\mathfrak{S}_X$ é um grupo 2-gerado.

3.3 Assinatura

Definição 3.3.1

Sejam X um conjunto ordenado, finito e não vazio e uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.

Chamamos de **inversão em σ** o par ordenado $(x, y) \in X^2$ tal que $x < y$ e

$\sigma(x) > \sigma(y)$.

Denotamos o número de inversões de uma dada permutação σ como $\mathcal{I}(\sigma)$.

Exemplo 3.3.1

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 9 & 6 & 4 & 2 & 1 & 7 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

Contando cada par de inversões partindo do primeiro elemento temos que:

$$\mathcal{I}(\sigma) = 2 + 7 + 4 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 17.$$

Definição 3.3.2

Sejam X um conjunto ordenado, finito e não vazio e uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.

Definimos a **assinatura de** σ como o resultado da função $\varepsilon(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} (-1)^{\mathcal{I}(\sigma)}$.

Observação: note que, embora a definição de inversão dependa de uma relação de ordem em X , a assinatura $\varepsilon(\sigma)$ é uma propriedade intrínseca da permutação. Se X for um conjunto finito qualquer, podemos sempre munir X de uma ordem total arbitrária para calcular $\varepsilon(\sigma)$; o valor obtido será independente da ordem escolhida, como será mostrado posteriormente.

Definição 3.3.3

A partir das notações da **Definição 3.3.2**, uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ é dita **par** se $\varepsilon(\sigma) = 1$.

Simetricamente, uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ é dita **ímpar** se $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Exemplo 3.3.2

Retomando o **Exemplo 3.3.1** temos diretamente que σ é uma permutação de assinatura igual à -1 e é, portanto, ímpar:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\mathcal{I}(\sigma)} = (-1)^{17} = -1.$$

Proposição 3.3.1

Seja X um conjunto finito, não vazio e munido de uma ordem total. Logo, toda transposição de $\mathfrak{S}_X$ é uma permutação ímpar.

Demonstração:

Seja $\tau = (x \ y) \in \mathfrak{S}_X$ uma transposição tal que, pela ordem total de X , $x < y$ e $\tau(x) > \tau(y)$.

Note que, como $x < y$ e $\tau(x) > \tau(y)$, então temos diretamente que $\forall z \in X_{<x}$, $\tau(y) > z$.

Simetricamente, temos que $\forall z \in X_{>y}, \tau(x) < z$.

Portanto, resta contar o número de inversões para $z \in \llbracket x, y \rrbracket$.

Ora, para todo z tal que $x \leq z < y$, temos $z < y$, mas $\tau(z) \geq \tau(y)$ (pois $\tau(y) = x$).

Seja M o número destas inversões, isto é, os pares (z, y) .

Note que, de forma análoga, para todo z tal que $x < z \leq y$, temos $x < z$, mas $\tau(x) \geq \tau(z)$ (pois $\tau(x) = y$).

Portanto, o número de inversões dos pares (x, z) é também M .

Entretanto, como contabilizamos duas vezes a mesma inversão (x, y) , temos que $\mathcal{I}(\tau) = 2M - 1$.

Portanto, $\varepsilon(\tau) = -1$ e τ é ímpar.

□

Teorema 3.3.1

Sejam X um conjunto finito munido de uma ordem total tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ e uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.

Portanto, ao decompor $\sigma = \tau_1 \dots \tau_m$ para $m \in \mathbb{Z}_+^*$ onde τ_i é uma transposição para todo $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, temos que:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^m$$

Demonstração:

Note, primeiramente, que podemos supor sem perda de generalidade que σ é decomposto em um número finito $p \in \mathbb{Z}_{\geq m}$ de transposições elementares.

Isso se dá pois, pela **Proposição 3.2.5**, temos diretamente via a construção da demonstração que uma dada transposição se decompõe em um número ímpar de transposições elementares. Portanto, $(-1)^m = (-1)^p$.

Sejam $\sigma' \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação arbitrária e $\tau' = (x_d \ x_{d+1}) \in \mathfrak{S}_X$ uma transposição elementar tal que $x_d < x_{d+1}$ via a ordem total de X .

Note que, ao tomar sem perda de generalidade o produto $\sigma'\tau'$, a transposição τ' atua trocando os elementos apenas nas posições adjacentes d e $d+1$. Consequentemente, a quantidade total de inversões envolvendo qualquer outro par de posições permanece idêntica. Temos, portanto, apenas o par (x_d, x_{d+1}) a analisar:

Suponha que $\sigma'\tau'(x_d) > \sigma'\tau'(x_{d+1})$. Logo, a aplicação de τ' gerou uma nova inversão, de modo que $\mathcal{I}(\sigma'\tau') = \mathcal{I}(\sigma') + 1$.

Suponha, agora, que $\sigma'\tau'(x_d) < \sigma'\tau'(x_{d+1})$. Logo, simetricamente, $\mathcal{I}(\sigma'\tau') = \mathcal{I}(\sigma') - 1$.

Logo, concluímos que $\varepsilon(\sigma'\tau') = -\varepsilon(\sigma')$.

Como $\sigma = \tau'_1 \dots \tau'_p$ onde τ'_i é transposição elementar para todo $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, temos diretamente que:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^p = (-1)^m$$

□

A partir do **Teorema 3.3.1** podemos enunciar a seguinte definição equivalente para o conceito de **assinatura de uma permutação**:

Definição 3.3.4

Sejam X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geq 2$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação. Então, se $\sigma = \tau_1 \dots \tau_m$ é a decomposição de σ em transposições de $\mathfrak{S}_X$, onde $m \in \mathbb{Z}_+^*$, definimos a **assinatura** de σ o valor denotado $\varepsilon(\sigma)$ dado por:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^m$$

Observação: note que a definição equivale a afirmar que uma permutação é par se é composta por um número par de transposições e que uma permutação é ímpar se é composta por um número ímpar de transposições.

Proposição 3.3.2

Sejam X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ e $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$. Logo, para quaisquer k -ciclos $\sigma \in \mathfrak{S}_X$, temos que:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{k-1}$$

Demonstração:

O resultado da proposição é imediato via a **Proposição 3.2.1** e o **Teorema 3.3.1**. □

Teorema 3.3.2

Sejam X um conjunto finito com $\text{Card}(X) \geq 2$ e a **função assinatura** ε tal que:

$$\begin{aligned} \varepsilon : \mathfrak{S}_X &\rightarrow \{-1, 1\} \\ \sigma &\mapsto \varepsilon(\sigma) \end{aligned}$$

Logo, ε é um epimorfismo de grupos.

Demonstração:

Sejam $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_X$ tais que suas decomposições em transposições de $\mathfrak{S}_X$ são dadas por:

$$\sigma = \tau_1 \dots \tau_p, \quad p \in \mathbb{Z}_+^*$$

e,

$$\sigma' = \tau'_1 \dots \tau'_q, \quad q \in \mathbb{Z}_+^*$$

Logo, temos que:

$$\varepsilon(\sigma\sigma') = (-1)^{p+q} = (-1)^p(-1)^q = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma').$$

Como $\varepsilon(\text{id}_X) = 1$ e $\varepsilon(\tau) = -1$ para qualquer $\tau \in \mathfrak{S}_X$ (cuja existência é garantida, uma vez que $\text{Card}(X) \geq 2$), então concluímos que ε é um epimorfismo de grupos. □

Observação: note que $\forall \sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$ tal que τ é uma transposição, temos que:

$$\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\tau\sigma) = -\varepsilon(\sigma).$$

Exemplo 3.3.3

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 5 & 6 & 3 & 1 & 9 & 4 & 7 & 8 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 5)(3\ 6\ 9\ 8\ 7\ 4)$$

Note que conseguimos calcular a assinatura de σ diretamente da seguinte forma:

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon((1\ 2\ 5))\varepsilon((3\ 6\ 9\ 8\ 7\ 4)) = (-1)^2(-1)^5 = -1$$

Exemplo 3.3.4

Retirado de <https://www.bibmath.net>.

Um jogo de quebra-cabeça deslizante é constituído por nove casas, das quais oito são ocupadas por uma peça numerada de 1 a 8, e uma está vazia. Pode-se deslizar uma peça horizontalmente ou verticalmente para a casa vazia. O resultado de uma manipulação é identificado pela permutação dos números que ela produz (lê-se os números em ordem, sem se importar com a casa vazia). Por exemplo, na seguinte manipulação,

Posição inicial:	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px 10px;">1</td><td style="padding: 2px 10px;">2</td><td style="padding: 2px 10px;">3</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 10px;">4</td><td style="padding: 2px 10px;">5</td><td style="padding: 2px 10px;">6</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 10px;">7</td><td style="padding: 2px 10px;">8</td><td style="padding: 2px 10px;"></td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8		Posição final:	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px 10px;">4</td><td style="padding: 2px 10px;">1</td><td style="padding: 2px 10px;">3</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 10px;">2</td><td style="padding: 2px 10px;"></td><td style="padding: 2px 10px;">5</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 10px;">7</td><td style="padding: 2px 10px;">8</td><td style="padding: 2px 10px;">6</td></tr> </table>	4	1	3	2		5	7	8	6
1	2	3																			
4	5	6																			
7	8																				
4	1	3																			
2		5																			
7	8	6																			

a permutação obtida é:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 5 & 7 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

Demonstre que só é possível obter permutações de assinatura igual a 1.

Demonstração:

Denotemos Ω_8 como o conjunto das permutações possíveis para o quebra-cabeça deslizante.

Note, primeiramente, que para qualquer $\sigma \in \Omega_8$, σ é invariante para movimentos horizontais de peças para a casa vazia. Tal invariância é justificada pela convenção de leitura linha por linha da esquerda para a direita.

Temos, portanto, apenas dois casos a analisar: caso a peça deslize verticalmente para cima para a casa vazia ou caso a peça deslize verticalmente para baixo para a casa vazia.

Consideremos o deslize vertical para baixo de uma peça arbitrária do tabuleiro. Ora, sabemos, por construção, que a peça em questão não pode realizar tal deslize caso esteja na última linha do tabuleiro.

Seja i a posição inicial da peça na permutação $\sigma \in \Omega_8$, onde $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ (isto é, no caso em que queremos mover a peça verticalmente para baixo).

Ora, como existe uma casa vazia abaixo da peça a ser movida, então as peças

originalmente à esquerda da casa vazia passarão a estar à esquerda da peça movida. Isto é, realizamos o produto $(i \ i + 1 \ i + 2)\sigma$.

De forma simétrica, o deslize vertical para cima de uma peça arbitrária no tabuleiro pode apenas ocorrer caso a peça em questão não esteja situada na primeira linha do tabuleiro.

Tomando i sendo a posição inicial da peça a ser movida na permutação $\sigma \in \Omega_8$, onde $i \in \llbracket 3, 8 \rrbracket$, realizamos o produto $(i \ i - 1 \ i - 2)\sigma$.

Como o jogo de quebra-cabeça deslizante começa a partir da permutação identidade e sabemos que $\varepsilon(\text{id}_{\Omega_8}) = 1$, de acordo com o argumento acima quaisquer permutações $\sigma \in \Omega_8$ serão produtos de 3-ciclos. Como o resultado da função assinatura para um 3-ciclo sempre resulta em 1, deduzimos que Ω_8 só pode ser composto de permutações de assinatura igual a 1.

□

3.4 Grupo Alternado $\mathfrak{A}_X$

Definição 3.4.1

Seja X um conjunto finito e não vazio. Definimos o conjunto $\mathfrak{A}_X$ como o **conjunto alternado de $\mathfrak{S}_X$** , tal que:

$$\mathfrak{A}_X \stackrel{\text{def}}{=} \{\sigma \in \mathfrak{S}_X ; \varepsilon(\sigma) = 1\}.$$

Onde ε denota a função assinatura.

Proposição 3.4.1

Seja X um conjunto finito e não vazio, então:

$$\mathfrak{A}_X \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$$

Demonstração:

Sabemos que a função assinatura ε é um epimorfismo de grupos. Por definição, sabemos que o núcleo de ε é definido por:

$$\ker \varepsilon \stackrel{\text{def}}{=} \{\sigma \in \mathfrak{S}_X ; \varepsilon(\sigma) = 1\} = \mathfrak{A}_X$$

Como $\ker \varepsilon \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$, então temos diretamente que:

$$\mathfrak{A}_X \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$$

□

Exemplo 3.4.1

Enumeremos todos os elementos de $\mathfrak{S}_3$:

$$(1 \ 2 \ 3), (1 \ 3 \ 2), (1 \ 2), (1 \ 3), (2 \ 3), \text{id}_{\{1,2,3\}}$$

Logo, fica claro que os elementos de $\mathfrak{A}_3$ são:

$$(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), \text{id}_{\{1,2,3\}}.$$

Proposição 3.4.2

Seja X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$. Logo:

$$|\mathfrak{A}_X| = \frac{n!}{2}.$$

Demonstração:

Seja $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$, tal que τ é uma transposição fixada.

Definimos a função φ de forma que:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_X & \rightarrow & \mathfrak{S}_X \\ \sigma & \mapsto & \sigma\tau \end{array}$$

Note que φ é de fato uma função e é bijetiva. Sejam $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathfrak{S}_X$ tal que $\sigma_1 = \sigma_2$, temos que:

$$\sigma_1 = \sigma_2 \iff \sigma_1\tau = \sigma_2\tau \iff \varphi(\sigma_1) = \varphi(\sigma_2)$$

Como a função φ é injetiva e tem como domínio e contradomínio o mesmo conjunto $\mathfrak{S}_X$, deduzimos que φ é de fato uma bijeção.

Sabemos, também, que $\varepsilon(\sigma\tau) = -\varepsilon(\sigma)$ para qualquer $\sigma \in \mathfrak{S}_X$. Portanto, deduzimos diretamente que $\varphi(\mathfrak{A}_X) = \mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X$.

Como a função φ é bijetiva, então também temos que $|\mathfrak{A}_X| = \text{Card}(\mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X)$.

É evidente ainda que $\mathfrak{S}_X = \mathfrak{A}_X \sqcup \mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X$, logo:

$$|\mathfrak{S}_X| = |\mathfrak{A}_X| + \text{Card}(\mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X) = 2|\mathfrak{A}_X| \iff |\mathfrak{A}_X| = \frac{n!}{2}$$

□

Observação: note que para o caso em que $\text{Card}(X) = 1$ temos evidentemente que $\mathfrak{A}_X = \{\text{id}_X\} \implies |\mathfrak{A}_X| = 1$.

Proposição 3.4.3

Sejam X um conjunto finito e não vazio e $x, y, z \in X$, então:

$$\mathfrak{A}_X = \langle (x\ y\ z) \rangle$$

Isto é, o grupo alternado $\mathfrak{A}_X$ é gerado por 3-ciclos de $\mathfrak{S}_X$.

Demonstração:

Mostremos, primeiramente, que $\langle (x\ y\ z) \rangle \subseteq \mathfrak{A}_X$.

Note que $(x\ y\ z)^3 = \text{id}_X \in \mathfrak{A}_X$.

Pela **Proposição 3.3.2** temos ainda que $\varepsilon((x\ y\ z)^k) = 1, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Portanto, temos diretamente que $\langle (x\ y\ z) \rangle \subseteq \mathfrak{A}_X$.

Mostremos que $\mathfrak{A}_X \subseteq \langle (x\ y\ z) \rangle$.

Note, primeiramente, que $\text{id}_X = (x\ y\ z)^3 \in \langle (x\ y\ z) \rangle$.

Perceba também que qualquer par de transposições de $\mathfrak{S}_X$ pode ser escrito como um 3-ciclo. Sejam $a, b, c \in X$, temos que:

$$(a\ b)(b\ c) = (a\ b\ c)$$

Ora, temos ainda que $\forall \sigma \in \mathfrak{A}_X$, σ pode ser decomposto em transposições. Para $\sigma \in \mathfrak{A}_X$, tal decomposição é obrigatoriamente realizada em pares de transposições, uma vez que, caso tenhamos um número ímpar de transposições, $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Como qualquer par de transposições pode ser escrito como um 3-ciclo, então $\mathfrak{A}_X \subseteq \langle (x\ y\ z) \rangle$.

Concluimos que:

$$\mathfrak{A}_X = \langle (x\ y\ z) \rangle.$$

□

Proposição 3.4.4

Seja X um conjunto finito e não vazio. Logo, se $H \leq \mathfrak{S}_X$, então ou $H \leq \mathfrak{A}_X$ ou $[H : H \cap \mathfrak{A}_X] = 2$.

Demonstração:

Note, primeiramente, que não existe subgrupo $H \leq \mathfrak{S}_X$ tal que H é composto exclusivamente de permutações ímpares. Ora, para quaisquer permutações $\sigma_1, \sigma_2 \in H$ teríamos $\varepsilon(\sigma_1\sigma_2) = 1 \implies \sigma_1\sigma_2 \notin H$.

Logo, podemos somente tomar os subgrupos $H \leq \mathfrak{A}_X \leq \mathfrak{S}_X$ ou $H \cap \mathfrak{A}_X \leq \mathfrak{S}_X$.

A respeito do subgrupo $H \cap \mathfrak{A}_X$, consideremos a função assinatura $\varepsilon : H \rightarrow \{-1, 1\}$. Temos diretamente que $\ker \varepsilon = H \cap \mathfrak{A}_X$.

Ora, pelo **Primeiro Teorema dos Isomorfismos** temos portanto:

$$\frac{H}{H \cap \mathfrak{A}_X} \cong \{-1, 1\}$$

Como $\text{Card}(\{-1, 1\}) = 2$, então deduzimos que $[H : H \cap \mathfrak{A}_X] = 2$.

□

Observações:

- Isto significa que para quaisquer subgrupos H de $\mathfrak{S}_X$, então ou H é composto de permutações pares ou H possui o mesmo número de permutações pares e permutações ímpares;
- Em particular, se $H = \mathfrak{S}_X$, temos que $[\mathfrak{S}_X : \mathfrak{A}_X] = 2$.

Teorema 3.4.1

Seja G um grupo de ordem $n \in \mathbb{Z}_+^*$. Logo, se $d|n$, não é possível garantir que exista subgrupo $H \leq G$ tal que $|H| = d$. Isto é, a recíproca do **Teorema de Lagrange** é falsa.

Demonstração:

Seja $\mathfrak{A}_4$ o grupo alternado do conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$. Sabemos que $|\mathfrak{A}_4| = \frac{4!}{2} = 12$. Logo, $\mathfrak{A}_4$ pode admitir subgrupos de ordens 1, 2, 3, 4, 6 e 12.

Suponha que $\mathfrak{A}_4$ admite um subgrupo H de ordem 6. Logo, $[\mathfrak{A}_4 : H] = 2$.

Segundo a **Proposição 1.5.3**, sabemos que se $\sigma \in \mathfrak{A}_4$, então $\sigma^2 \in H$.

Ora, note que se $\tau \in \mathfrak{A}_4$ for um 3-ciclo, então τ pode ser escrito como $\tau = (\tau^2)^2$.

Isto é, todo 3-ciclo é um quadrado de um outro 3-ciclo.

Sabemos que em $\mathfrak{A}_4$ existem 8 3-ciclos, porém H tem ordem 6. Absurdo.

Concluimos que não existe subgrupo H de $\mathfrak{A}_4$ tal que $|H| = 6$. □

Proposição 3.4.5

Seja X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geq 5$. Logo, todos 3-ciclos são dois a dois conjugados em $\mathfrak{A}_X$.

Demonstração:

Sejam $x, y, z \in X$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação arbitrária.

Sabemos, da **Proposição 3.2.5**, que quaisquer ciclos são conjugados entre si em $\mathfrak{S}_X$ se possuem mesmo comprimento. Mostremos que para os 3-ciclos essa conjugação permanece em $\mathfrak{A}_X$.

Note que, se σ for par, então a proposição está demonstrada diretamente. Suponha, agora, que σ é ímpar.

Tomemos $\sigma' \stackrel{\text{def}}{=} \sigma(a\ b)$, onde $a, b \in X \setminus \{x, y, z\}$. Note que a existência de a, b é garantida pois $\text{Card}(X) \geq 5$. Temos, portanto:

$$\sigma(x\ y\ z)\sigma^{-1} = \sigma'(a\ b)(x\ y\ z)(\sigma'(a\ b))^{-1} = \sigma'(a\ b)(x\ y\ z)(a\ b)\sigma'^{-1} = \sigma'(x\ y\ z)\sigma'^{-1}$$

Como σ' é uma permutação par ($\sigma' \in \mathfrak{A}_X$), concluimos que a conjugação também pode ser realizada por um elemento do grupo alternado. Logo, quaisquer dois 3-ciclos são conjugados em $\mathfrak{A}_X$. □

Lema 3.4.1

Seja X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geq 5$. Então, se um subgrupo normal $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$ contém um 3-ciclo, temos que $H = \mathfrak{A}_X$.

Demonstração:

Suponha $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$ tal que H contém um 3-ciclo. Ora, então, por definição de normalidade, todo elemento conjugado do 3-ciclo de H por permutações de $\mathfrak{A}_X$ pertence à H .

Pela **Proposição 3.4.5**, sabemos que, se $\text{Card}(X) \geq 5$, então todos os 3-ciclos são conjugados entre si.

Como $\mathfrak{A}_X$ é gerado por 3-ciclos, concluimos que $H = \mathfrak{A}_X$. □

Teorema 3.4.2

Seja X um conjunto não vazio e finito, onde $n \stackrel{\text{def}}{=} \text{Card}(X)$.
Se $n \neq 4$, então $\mathfrak{A}_X$ é um grupo simples.

Demonstração:

Note que, caso $n = 1$ ou $n = 2$, temos trivialmente que $\mathfrak{A}_X$ é simples e, pelo **Teorema de Lagrange**, sabemos que se $n = 3$ então $\mathfrak{A}_X$ é simples (uma vez que $|\mathfrak{A}_X| = 3$ é primo).

Suponha que $n \geq 5$. Para mostrar que $\mathfrak{A}_X$ é simples, basta mostrar que se existe um subgrupo normal não trivial $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$, então H contém um 3-ciclo. Pelo **Lema 3.4.1** temos então que $H = \mathfrak{A}_X$.

Definimos pontos fixos de uma permutação σ todos os elementos que não pertencem ao suporte de σ . Vamos mostrar que, se existe $\sigma \in H$ com um número máximo de pontos fixos tal que σ não é a função identidade e nem um 3-ciclo, então sempre é possível construir uma permutação $\sigma' \in H$ tal que σ' tem mais pontos fixos que σ .

Suponha, primeiramente, que $\sigma \in H$ é um produto de transposições de suportes dois a dois disjuntos (número par não nulo de transposições, uma vez que σ não é a função identidade e temos que $\varepsilon(\sigma) = 1$). Definimos $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} (x\ y)(z\ t)\gamma$, onde $\gamma \in \mathfrak{A}_X$ é um produto de transposições tal que $\text{supp}((x\ y)(z\ t)) \cap \text{supp}(\gamma) = \emptyset$. Tomemos também $\tau \in \mathfrak{A}_X$ tal que $\tau \stackrel{\text{def}}{=} (x\ y)(z\ s)$, onde $s \notin \text{supp}(\sigma)$.

Note que a existência de $s \in X \setminus \text{supp}(\sigma)$ é garantida, uma vez que $n \geq 5$.

Seja $\sigma' \stackrel{\text{def}}{=} \sigma\tau\sigma\tau^{-1}$. Note que $\sigma' \in H$, uma vez que $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$ e $\tau \in \mathfrak{A}_X$. Temos, portanto:

$$\sigma' = ((x\ y)(z\ t)\gamma(x\ y)(z\ s))^2 = ((z\ t)\gamma(z\ s))^2$$

Note que $\sigma'(t) = s$, então σ' não é a função identidade. Além disso, temos que σ' fixa $x, y \in X$, além de todos os outros pontos fixos de σ , com a possível exceção de $s \in X$. Portanto, concluímos que σ' possui mais pontos fixos que σ .

Suponha, agora, que a decomposição de $\sigma \in H$ em ciclos de suportes dois a dois disjuntos possui um k -ciclo, tal que $k \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$, mas de tal forma que σ não seja simplesmente um 3-ciclo. Definimos $\sigma \stackrel{\text{def}}{=} (x\ y\ z\ \dots)\gamma$, onde $\text{supp}((x\ y\ z\ \dots)) \cap \text{supp}(\gamma) = \emptyset$.

Perceba que, caso σ possuísse $n - 4$ pontos fixos, então σ seria da forma $\sigma = (x\ y\ z\ t)$, o que é absurdo pois $\varepsilon(\sigma) = -1$. Logo, σ tem no máximo $n - 5$ pontos fixos. Sabemos, portanto, que existem $t, s \in \text{supp}(\sigma) \setminus \{x, y, z\}$, uma vez que o suporte de σ possui pelo menos 5 elementos. Defina $\tau \stackrel{\text{def}}{=} (z\ t\ s)$.

Tomemos, então, $\sigma' \stackrel{\text{def}}{=} \sigma^{-1}\tau\sigma\tau^{-1}$. Analogamente ao caso anterior, temos diretamente que $\sigma' \in H$.

Ainda, como τ fixa $x, y \in X$, assim como todos os outros pontos fixos de σ , temos que σ' fixa $x \in X$ e todos os outros pontos fixos de σ . Logo, temos que σ' fixa um ponto a mais que σ . Note também que σ' é não trivial, uma vez que $\sigma'(y) \neq y$.

Finalmente, como para quaisquer permutações $\sigma \in H$ não triviais com um número máximo de pontos fixos temos os dois casos acima, concluímos que σ pode ser apenas um 3-ciclo. Pelo **Lema 3.4.1**, temos então que $H = \mathfrak{A}_X$.

Concluímos que $\mathfrak{A}_X$ é simples para $n \neq 4$.

□

Definição 3.4.2

Seja $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ e $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$ tal que:

$$\mathfrak{K} \stackrel{\text{def}}{=} \{\text{id}_X, \underbrace{(x_1 \ x_2)(x_3 \ x_4)}_{\kappa_1}, \underbrace{(x_1 \ x_3)(x_2 \ x_4)}_{\kappa_2}, \underbrace{(x_1 \ x_4)(x_2 \ x_3)}_{\kappa_3}\}$$

Definimos o subconjunto $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$ como sendo o **conjunto simétrico de Klein**.

Observação: note que de fato $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$, uma vez que $\varepsilon(\sigma) = 1, \forall \sigma \in \mathfrak{K}$.

Proposição 3.4.6

Seja $\mathfrak{K}$ o conjunto simétrico de Klein e $\mathcal{K}$ o grupo de Klein. Então, se $\mathfrak{K}$ for munido da composição usual de funções, temos:

$$\mathfrak{K} \cong \mathcal{K}$$

Isto é, $\mathfrak{K}$ é isomorfo ao grupo de Klein.

Demonstração:

Sejam $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ e $\varphi : \mathfrak{K} \rightarrow \mathcal{K}$ uma função tal que:

$$\begin{aligned}\varphi(\text{id}_X) &= (\bar{0}, \bar{0}) \\ \varphi(\kappa_1) &= (\bar{1}, \bar{0}) \\ \varphi(\kappa_2) &= (\bar{0}, \bar{1}) \\ \varphi(\kappa_3) &= (\bar{1}, \bar{1})\end{aligned}$$

Note que φ é bijetiva por construção. Mostremos que se trata de um homomorfismo de grupos.

Perceba, primeiramente, que:

$$\varphi(\kappa_i \text{id}_X) = \varphi(\text{id}_X \kappa_i) = \varphi(\kappa_i) + \underbrace{(\bar{0}, \bar{0})}_{\varphi(\text{id}_X)} = \underbrace{(\bar{0}, \bar{0})}_{\varphi(\text{id}_X)} + \varphi(\kappa_i), \forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$$

Da mesma forma, temos diretamente que:

$$\varphi(\kappa_i \kappa_i) = \varphi(\text{id}_X) = \varphi(\kappa_i) + \varphi(\kappa_i), \forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$$

Tomando agora o produto de cada elemento distinto e diferente do neutro de $\mathfrak{K}$, temos que:

$$\varphi(\kappa_1 \kappa_2) = \varphi(\kappa_3) = (\bar{1}, \bar{1}) = (\bar{1}, \bar{0}) + (\bar{0}, \bar{1}) = \varphi(\kappa_1) + \varphi(\kappa_2)$$

$$\varphi(\kappa_1 \kappa_3) = \varphi(\kappa_2) = (\bar{0}, \bar{1}) = (\bar{1}, \bar{0}) + (\bar{1}, \bar{1}) = \varphi(\kappa_1) + \varphi(\kappa_3)$$

$$\varphi(\kappa_2 \kappa_3) = \varphi(\kappa_1) = (\bar{1}, \bar{0}) = (\bar{0}, \bar{1}) + (\bar{1}, \bar{1}) = \varphi(\kappa_2) + \varphi(\kappa_3)$$

Ora, de forma análoga, temos que $\varphi(\kappa_1\kappa_2) = \varphi(\kappa_2\kappa_1)$, $\varphi(\kappa_1\kappa_3) = \varphi(\kappa_3\kappa_1)$, $\varphi(\kappa_2\kappa_3) = \varphi(\kappa_3\kappa_2)$. Como a soma usual de inteiros é abeliana em $\mathcal{K}$, concluímos que todas as imagens preservam, portanto, a estrutura de grupo.

Finalmente, concluímos que φ é um isomorfismo de grupos e temos:

$$\mathfrak{K} \cong \mathcal{K}$$

□

Observações:

- A partir do resultado acima, **definimos $\mathfrak{K}$ como grupo simétrico de Klein ou, quando não houver ambiguidade, simplesmente grupo de Klein;**
- Temos diretamente via o isomorfismo que $\mathfrak{K}$ é abeliano.;
- Como $\mathfrak{K}$ contém a identidade e todos os elementos de estrutura de ciclos do tipo $(a\ b)(c\ d)$ de $\mathfrak{S}_X$, e a conjugação preserva o comprimento dos ciclos, concluímos que $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$ e, consequentemente, $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$.

Teorema 3.4.3

Seja $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, então os únicos subgrupos normais que $\mathfrak{A}_X$ admite são: $\{\text{id}_X\}$, $\mathfrak{K}$ e $\mathfrak{A}_X$, onde $\mathfrak{K}$ é o grupo de Klein. Isto é, o único grupo normal não trivial de $\mathfrak{A}_X$ é $\mathfrak{K}$, quando $\text{Card}(X) = 4$.

Demonstração:

Sabemos que $|\mathfrak{A}_X| = \frac{4!}{2} = 12$. Logo, seus subgrupos podem admitir apenas cardinais 1, 2, 3, 4, 6 e 12.

As ordens 1 e 12 correspondem, respectivamente, aos subgrupos normais triviais $\{\text{id}_X\}$ e $\mathfrak{A}_X$. Para a ordem 6, sabemos pelo **Teorema 3.4.1** que $\mathfrak{A}_X$ não admite subgrupos com essa cardinalidade. Resta-nos analisar as ordens 2, 3 e 4.

Um subgrupo de ordem 2 deve ser da forma $H_2 = \{\text{id}_X, \tau\}$, em que τ é um elemento de ordem 2. Em $\mathfrak{A}_X$, tais elementos são necessariamente produtos de duas transposições disjuntas. Suponha, sem perda de generalidade, que $\tau = (x_1\ x_2)(x_3\ x_4)$ e $\sigma = (x_1\ x_2\ x_3)$. Note que $\tau, \sigma \in \mathfrak{A}_X$. Ao conjugarmos τ por σ obtemos:

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = (x_1\ x_2\ x_3)(x_1\ x_2)(x_3\ x_4)(x_1\ x_3\ x_2) = (x_1\ x_4)(x_2\ x_3)$$

Claramente temos que $\sigma\tau\sigma^{-1} \notin H_2$, logo H_2 não é normal.

Um subgrupo de ordem 3 é gerado por um 3-ciclo, tendo a forma $H_3 = \{\text{id}_X, \gamma, \gamma^{-1}\}$. Suponha, sem perda de generalidade, que $\gamma = (x_1\ x_2\ x_3)$. Tomemos o elemento $\kappa = (x_1\ x_2)(x_3\ x_4) \in \mathfrak{A}_X$. Note que:

$$\kappa\gamma\kappa^{-1} = (x_1\ x_2)(x_3\ x_4)(x_1\ x_2\ x_3)(x_1\ x_2)(x_3\ x_4) = (x_2\ x_1\ x_4) = (x_1\ x_4\ x_2)$$

Uma vez que $(x_1\ x_4\ x_2) \notin H_3$, temos $\kappa H_3 \kappa^{-1} \neq H_3$. Logo, H_3 não é normal.

Finalmente, para a ordem 4, sabemos que $\mathfrak{A}_X$ possui exatamente um subgrupo com essa cardinalidade: o grupo de Klein $\mathfrak{K}$. Isso se dá pois $\mathfrak{A}_X$ não admite elementos de ordem 4, uma vez que 4-ciclos são permutações ímpares. Isso força

qualquer subgrupo de ordem 4 a ser composto pela identidade e por três elementos de ordem 2. Como existem exatamente três elementos de ordem 2 em $\mathfrak{A}_X$, há apenas uma combinação possível. Sabemos, ainda, da **Proposição 3.4.7**, que $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$.

Concluimos assim que os únicos subgrupos normais em $\mathfrak{A}_X$ são $\{\text{id}_X\}$, $\mathfrak{K}$ e $\mathfrak{A}_X$. $\square$

Teorema 3.4.4

Seja X um conjunto não vazio e finito. Logo, se $\text{Card}(X) \neq 4$, os únicos subgrupos normais de $\mathfrak{S}_X$ são $\{\text{id}_X\}$, $\mathfrak{A}_X$ e $\mathfrak{S}_X$.

Caso $\text{Card}(X) = 4$ então os únicos subgrupos normais de $\mathfrak{S}_X$ são $\{\text{id}_X\}$, $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{A}_X$ e $\mathfrak{S}_X$.

Demonstração:

O resultado é imediato combinando as proposições 3.2.1 e 3.4.4 e os teoremas 3.4.2 e 3.4.3. $\square$

Proposição 3.4.7

Seja X um conjunto não vazio e finito com $n \stackrel{\text{def}}{=} \text{Card}(X)$, então:

1. $\mathfrak{S}'_X = \mathfrak{A}_X$, $n \geq 2$;
2. $\mathfrak{A}'_X = \{\text{id}_X\}$, $n \leq 3$;
3. $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{K}$, $n = 4$;
4. $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{A}_X$, $n \geq 5$.

Onde G' denota o grupo dos comutadores do grupo G .

Demonstração:

Sabemos que, para qualquer grupo G , temos que $G' \trianglelefteq G$ pelo **Exemplo 1.5.3**. Mostremos, primeiramente, o item 1.:

Caso $n = 2$, temos diretamente que $\mathfrak{S}_X$ é abeliano e, portanto $\mathfrak{S}'_X = \{\text{id}_X\} = \mathfrak{A}_X$.

Caso $n \geq 3$, então sabemos que a função assinatura $\varepsilon : \mathfrak{S}_X \rightarrow \{-1, 1\}$ é um epimorfismo onde $\ker \varepsilon = \mathfrak{A}_X$. Além disso, como $\text{Im } \varepsilon$ é um grupo abeliano, temos que $\mathfrak{S}_X/\mathfrak{A}_X$ é abeliano. Portanto, pela **Proposição 1.5.10**, temos que $\mathfrak{S}'_X \leq \mathfrak{A}_X$.

Sendo $n \geq 3$, sabemos que $\mathfrak{A}_X$ é gerado por 3-ciclos. Note que, para um dado 3-ciclo $(x \ y \ z) \in \mathfrak{A}_X$, podemos escrever:

$$(x \ y \ z) = (x \ y)(x \ z)(x \ y)(x \ z) = (x \ y)(x \ z)(x \ y)^{-1}(x \ z)^{-1} = [(x \ y), (x \ z)]$$

Logo, como os geradores de $\mathfrak{A}_X$ estão em $\mathfrak{S}'_X$, temos que $\mathfrak{A}_X \leq \mathfrak{S}'_X$.

Como $\mathfrak{S}'_X \leq \mathfrak{A}_X$ e $\mathfrak{A}_X \leq \mathfrak{S}'_X$, concluimos que $\mathfrak{S}'_X = \mathfrak{A}_X$.

Mostremos o item 2.:

Ora, se $n \leq 3$, então sabemos que $\mathfrak{A}_X = \{\text{id}_X\}$ para $n = 1, 2$ e que $|\mathfrak{A}_X| = \frac{3!}{2} = 3$ para $n = 3$. Logo, $\mathfrak{A}_X$ é trivialmente abeliano para todos os casos e, portanto, temos que $\mathfrak{A}'_X = \{\text{id}_X\}$.

Mostremos o item 3.:

Se $n = 4$, então $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$. Como $|\mathfrak{A}_X/\mathfrak{K}| = 3$, então $\mathfrak{A}_X/\mathfrak{K}$ é um grupo abeliano. Pela **Proposição 1.5.10** temos então que $\mathfrak{A}'_X \leq \mathfrak{K}$.

Como $\mathfrak{A}'_X$ não é abeliano, então sabemos que $\mathfrak{A}'_X \neq \{\text{id}_X\}$. Sabemos, também, que $\mathfrak{A}'_X \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$. Portanto, como sabemos também que $\mathfrak{A}'_X \neq \mathfrak{A}_X$, temos que $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{K}$.

Mostremos, por fim, o item 4.:

Se $n \geq 5$, então $\mathfrak{A}_X$ é um grupo simples e não abeliano. Portanto temos diretamente que $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{A}_X$. Isto é, $\mathfrak{A}_X$ é perfeito para $n \geq 5$.

□

Teorema 3.4.5

Seja X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geq 2$. Então:

$$\mathfrak{S}_X \cong \mathfrak{A}_X \rtimes_{\theta} \{-1, 1\}$$

onde $\theta : \{-1, 1\} \rightarrow \text{Aut}(\mathfrak{A}_X)$ é um homomorfismo tal que:

$$\theta_1(\sigma) = \sigma, \forall \sigma \in \mathfrak{A}_X$$

e, para uma dada transposição $\tau \in \mathfrak{S}_X$,

$$\theta_{-1}(\sigma) = \tau\sigma\tau^{-1}, \forall \sigma \in \mathfrak{A}_X$$

Demonstração:

A partir do **Teorema 2.3.1**, basta mostrar que a sequência:

$$\{\text{id}_X\} \longrightarrow \mathfrak{A}_X \xrightarrow{\varphi} \mathfrak{S}_X \xrightarrow{\varepsilon} \{-1, 1\} \longrightarrow \{1\}$$

$\xleftarrow{\kappa}$

é uma sequência exata curta que cinde, onde φ , ε e κ são homomorfismos dados por:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathfrak{A}_X & \rightarrow & \mathfrak{S}_X \\ \sigma & \mapsto & \sigma \end{array} \quad , \quad \varepsilon : \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_X & \rightarrow & \{-1, 1\} \\ \sigma & \mapsto & \varepsilon(\sigma) \end{array} \quad \text{e}, \quad \kappa : \begin{array}{ccc} \{-1, 1\} & \rightarrow & \mathfrak{S}_X \\ -1 & \mapsto & (x_1 \ x_2) \\ 1 & \mapsto & \text{id}_X \end{array}$$

em que ε é a função assinatura.

Perceba que temos diretamente que φ é um monomorfismo e que ε é um epimorfismo.

Ainda, temos que: $\ker \varepsilon = \mathfrak{A}_X = \text{Im } \varphi$.

Por fim, é fácil ver que $\varepsilon(\kappa(-1)) = \varepsilon((x_1 \ x_2)) = -1$ e que $\varepsilon(\kappa(1)) = \varepsilon(\text{id}_X) = 1$, para $x_1, x_2 \in X$ distintos (note que é garantido que tais elementos existam pois $\text{Card}(X) \geq 2$).

Portanto, concluímos que:

$$\mathfrak{S}_X \cong \mathfrak{A}_X \rtimes_{\theta} \{-1, 1\}$$

□

Capítulo 4

Ações de Grupos

4.1 Generalidades sobre Ações de Grupos

Definição 4.1.1

Seja G um grupo e X um conjunto não vazio. Definimos a **ação à esquerda de G sobre X** a função:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} G \times X & \rightarrow & X \\ (g, x) & \mapsto & \varphi(g, x) \end{array}$$

tal que:

$$\begin{cases} \varphi(e, x) = x, & \forall x \in X \\ \varphi(g, \varphi(h, x)) = \varphi(gh, x), & \forall (g, h, x) \in G \times G \times X \end{cases}$$

Caso φ seja uma ação à esquerda de G sobre X dizemos que **G age à esquerda sobre X** e denotamos:

$$G \curvearrowright X.$$

Observações:

- Podemos, de forma análoga, definir a **ação à direita de G sobre X** . Neste caso denotamos $X \curvearrowleft G$;
- Quando não houver ambiguidade, a ação à esquerda de G sobre X será denominada apenas como **ação de G sobre X** .

Exemplo 4.1.1

Seja $\varphi : G \times G \rightarrow G$ tal que $\varphi(g, h) \stackrel{\text{def}}{=} gh$. Logo, $G \curvearrowright G$. De fato:

- $\varphi(g, h) = gh \in G, \forall g, h \in G$;
- $\varphi(e, h) = eh = h, \forall h \in G$;
- $\varphi(g, \varphi(g', h)) = \varphi(g, g'h) = gg'h = \varphi(gg', h), \forall g, g', h \in G$.

A ação φ é denominada **ação por translação à esquerda de G** .

Exemplo 4.1.2

Seja $\varphi : G \times G \rightarrow G$ tal que $\varphi(g, h) \stackrel{\text{def}}{=} ghg^{-1}$. Logo, $G \curvearrowright G$. De fato:

- $\varphi(g, h) = ghg^{-1} \in G, \forall g, h \in G$;
- $\varphi(e, h) = ehe^{-1} = h, \forall h \in G$;
- $\varphi(g_1, \varphi(g_2, h)) = \varphi(g_1, g_2hg_2^{-1}) = g_1g_2hg_2^{-1}g_1^{-1} = (g_1g_2)h(g_1g_2)^{-1} = \varphi(g_1g_2, h), \forall g_1, g_2, h \in G$.

A ação φ é denominada **ação por conjugação de G** .

Exemplo 4.1.3

Seja $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\varphi(M, v) \stackrel{\text{def}}{=} Mv$. Logo, $GL_n(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^n$. De fato:

- $\varphi(M, v) = Mv \in \mathbb{R}^n, \forall (M, v) \in GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$;
- $\varphi(\text{id}_n, v) = \text{id}_n v = v, \forall v \in \mathbb{R}^n$;
- $\varphi(M_1, \varphi(M_2, v)) = \varphi(M_1, M_2v) = M_1M_2v = (M_1M_2)v = \varphi(M_1M_2, v), \forall (M_1, M_2, v) \in GL_n(\mathbb{R}) \times GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$.

Definição 4.1.2

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ . Definimos a **órbita de $x \in X$ como o conjunto**:

$$\mathcal{O}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \{\varphi(g, x) ; g \in G\}$$

Note que $\mathcal{O}(x) \subseteq X$.

Definição 4.1.3

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ . Definimos o **conjunto das órbitas da ação φ como**:

$$X/G \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathcal{O}(x) ; x \in X\}.$$

Exemplo 4.1.4

Seja $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\varphi(M, v) \stackrel{\text{def}}{=} Mv$.

Proposição 4.1.1

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$. Então:

1. $X = \bigcup_{x \in X} \mathcal{O}(x)$;

2. Ou $\mathcal{O}(x) = \mathcal{O}(y)$ ou $\mathcal{O}(x) \cap \mathcal{O}(y) = \emptyset, \forall x, y \in X$.

Demonstração:

Mostremos primeiramente o item 1.. Note que $\bigcup_{x \in X} \mathcal{O}(x) \subseteq X$ é trivial por definição. Além disso, dado $x \in X$, sempre teremos $x \in \mathcal{O}(x)$, pois $\varphi(e, x) = x \in \mathcal{O}(x)$. Logo, $X \subseteq \bigcup_{x \in X} \mathcal{O}(x)$.

Concluimos que $\bigcup_{x \in X} \mathcal{O}(x) = X$.

Mostremos, agora, o item 2.. Suponha que $\mathcal{O}(x) \cap \mathcal{O}(y) \neq \emptyset$, para $x, y \in X$. Consideremos ainda φ a ação de G em X .

Ora, então existe $z \in \mathcal{O}(x) \cap \mathcal{O}(y)$ tal que:

$$z = \varphi(g, x) \text{ e } z = \varphi(h, y), \text{ para } g, h \in G$$

Temos, portanto:

$$\varphi(g, x) = \varphi(h, y) \implies x = \varphi(g^{-1}h, y)$$

Ora, como $g^{-1}h \in G$, deduzimos que $x \in \mathcal{O}(y)$. De forma análoga mostramos que $y \in \mathcal{O}(x)$. Concluimos, portanto, que $\mathcal{O}(x) = \mathcal{O}(y)$. □

Definição 4.1.4

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ . Dado $x \in X$, definimos **o estabilizador de x como o conjunto**:

$$G_x \stackrel{\text{def}}{=} \{g \in G ; \varphi(g, x) = x\}.$$

Proposição 4.1.2

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ . Então, dado $x \in X$, o conjunto estabilizador G_x é um subgrupo de G . Denominamos tal subgrupo como **grupo de isotropia de x** .

Demonstração:

Note, primeiramente, que G_x é não vazio, pois $\varphi(e, x) = x \in G_x$.

Sejam $g_1, g_2 \in G_x$, mostremos que $g_1 g_2^{-1} \in G_x$. Note, primeiramente, que para dado $g \in G_x$:

$$\varphi(e, x) = \varphi(g^{-1}g, x) = \varphi(g^{-1}, \varphi(g, x)) = \varphi(g^{-1}, x) = x$$

Portanto, deduzimos:

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}, x) = \varphi(g_1, \varphi(g_2^{-1}, x)) = \varphi(g_1, x) = x$$

Portanto, $g_1 g_2^{-1} \in G_x$. Concluimos que $G_x \leq G$. □

Definição 4.1.5

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$. Então, dado $x_0 \in X$, se $G_{x_0} = G$, dizemos que x_0 **é um ponto fixo da ação de G sobre X** .

Definição 4.1.6

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ . Definimos o **conjunto de pontos fixos da ação de G sobre X** como:

$$\text{Fix}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X, \varphi(g, x) = x, \forall g \in G\}$$

Exemplo 4.1.5

Capítulo 5

Grupos Solúveis

5.1 Teorema de Jordan-Hölder

Definição 5.1.1

Seja G um grupo e $n \in \mathbb{Z}^*$. Definimos **série subnormal** de G como sendo a seguinte cadeia de normalidade:

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_n = \{e\}$$

Onde G_{i+1} são subgrupos normais de G_i e $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Observações:

- Se uma série subnormal λ de um grupo G possuir r subgrupos normais próprios, dizemos que λ tem comprimento r ;
- Em uma série subnormal, um mesmo subgrupo pode ser repetido e, portanto, podemos ter G_i/G_{i+1} grupos quocientes triviais e não triviais;
- Note que todo grupo G admite a série subnormal trivial $G \supseteq \{e\}$.

Exemplo 5.1.1

A cadeia de normalidade:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \supseteq & \langle \bar{5} \rangle & \supseteq & \langle \bar{10} \rangle & \supseteq & \langle \bar{0} \rangle \\ \lambda : & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ & & G_0 & & G_1 & & G_2 & & G_3 \end{array}$$

é uma série subnormal de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ de comprimento igual a 3.

Exemplo 5.1.2

Seja $X \stackrel{\text{def}}{=} \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ um conjunto arbitrário. Então, a cadeia de normalidade:

$$\Lambda : \begin{array}{ccccccc} \mathfrak{S}_X & \supseteq & \mathfrak{A}_X & \supseteq & \mathfrak{K} & \supseteq & \langle (x_1 \ x_2)(x_3 \ x_4) \rangle & \supseteq & \{\text{id}_X\} \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ G_0 & & G_1 & & G_2 & & G_3 & & G_4 \end{array}$$

é uma série subnormal de $\mathfrak{S}_X$ de comprimento igual a 4.

Definição 5.1.2

Seja G um grupo e λ uma série subnormal de G . Dizemos que uma série subnormal λ' de G é um **refinamento de λ** se λ' é obtida inserindo uma quantidade finita de subgrupos na cadeia de normalidade de λ .

Dizemos ainda que um refinamento é **próprio** se é adicionada uma quantidade não nula de subgrupos distintos dos que já existem na cadeia de normalidade.

Exemplo 5.1.3

A série subnormal apresentada no **Exemplo 5.1.1** é um refinamento das seguintes séries subnormais de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$:

$$\lambda_1 : \begin{array}{ccccc} \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \supseteq & \langle \overline{5} \rangle & \supseteq & \langle \overline{0} \rangle \\ \parallel & & \parallel & & \parallel \\ G_0 & & G_1 & & G_2 \end{array}$$

e,

$$\lambda_2 : \begin{array}{ccccc} \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \supseteq & \langle \overline{10} \rangle & \supseteq & \langle \overline{0} \rangle \\ \parallel & & \parallel & & \parallel \\ G_0 & & G_1 & & G_2 \end{array}$$

Definição 5.1.3

Seja G um grupo e λ uma série subnormal de G . Dizemos que λ é uma **série de composição de G** se, e somente se, λ não possui repetições e não admite refinamento próprio.

Observação: note que nem todo grupo admite uma série de composição. Por exemplo, o grupo aditivo $(\mathbb{Z}, +)$ não possui série de composição pois, dado qualquer subgrupo não trivial de $\mathbb{Z}$, sempre existe um subgrupo normal próprio e não trivial contido nele. Assim, qualquer série subnormal de $\mathbb{Z}$ pode ser refinada indefinidamente.

Exemplo 5.1.4

As séries subnormais apresentadas nos **Exemplos 5.1.1 e 5.1.2** são também séries de composição.

Proposição 5.1.1

Sejam G um grupo, $n \in \mathbb{Z}^*$ e λ uma série subnormal de G dada por:

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_n = \{e\}$$

Logo, as seguintes afirmações são equivalentes:

- (i) λ é uma série de composição de G ;
- (ii) G_i/G_{i+1} é simples para todo $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Demonstração:

Suponha que G_i/G_{i+1} não é simples para algum $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Nesse caso, existe um subgrupo normal próprio e não trivial $G'_i/G_{i+1} \triangleleft G_i/G_{i+1}$. Pelo **Teorema da Correspondência**, sabemos que existe portanto G'_i tal que $G_{i+1} \subsetneq G'_i \subsetneq G_i$ e $G'_i \triangleleft G_i$. Basta tomarmos então λ' um refinamento próprio de λ inserindo o subgrupo G'_i . Como λ admite um refinamento próprio, concluímos que λ não é uma série de composição de G .

Suponha, agora, que G_i/G_{i+1} é simples para todo $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Nesse caso, G_i/G_{i+1} não admite nenhum subgrupo normal não trivial. Se λ não é uma série de composição, então λ admite um refinamento próprio. Digamos, sem perda de generalidade, que tal refinamento próprio é dado pela inserção de um grupo $G'_j \triangleleft G_j$ para um dado $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Ora, pelo **Teorema da Correspondência**, temos que $G'_j/G_{j+1} \triangleleft G_j/G_{j+1}$. Absurdo. Concluímos que λ é uma série de composição. $\square$

Proposição 5.1.2

Todo grupo finito não trivial admite uma série de composição.

Demonstração:

Tomemos G um grupo finito não trivial. Caso G seja um grupo simples, temos trivialmente a seguinte série de composição:

$$\lambda : G \supseteq \{e\}$$

Suponha, agora, que G não é simples. Logo, existe pelo menos um subgrupo normal $G_1 \triangleleft G$.

Tomemos $G_1 \triangleleft G$ tal que G_1 seja um subgrupo normal maximal de G .

Nesse caso, podemos construir a série subnormal λ_1 dada por:

$$\lambda_1 : G \supseteq G_1 \supseteq \{e\}$$

Note que, caso G_1 seja simples, então λ_1 é uma série de composição. Caso G_1 não seja simples, então podemos proceder de forma indutiva o mesmo procedimento para os subgrupos normais de G_1 .

Como G é um grupo finito, então tal construção será realizada em um número finito de passos.

Concluímos, portanto, que todo grupo finito não trivial possui série de composição. $\square$

Definição 5.1.4

Sejam G um grupo e λ_1 e λ_2 duas séries subnormais de G dadas por:

$$\lambda_1 : G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{e\}$$

e,

$$\lambda_2 : G = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \dots \supseteq H_m = \{e\}$$

Dizemos que λ_1 e λ_2 são **séries equivalentes** se existe uma bijeção entre os grupos quocientes não triviais da série λ_1 e os da série λ_2 tal que os grupos quocientes correspondentes são isomorfos.

Observações:

- Note que duas séries subnormais que são equivalentes possuem o mesmo comprimento;
- Note também que λ_2 é um refinamento próprio de λ_1 se, e somente se, λ_1 e λ_2 não são equivalentes.

Exemplo 5.1.5

Considere as seguintes séries de composição de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$:

$$\begin{array}{l} \lambda_1 : \begin{array}{cccc} \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \supseteq & \langle \bar{5} \rangle & \supseteq & \langle \bar{10} \rangle & \supseteq & \langle \bar{0} \rangle \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ G_0 & & G_1 & & G_2 & & G_3 \end{array} \\ \\ \lambda_2 : \begin{array}{cccc} \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \supseteq & \langle \bar{2} \rangle & \supseteq & \langle \bar{6} \rangle & \supseteq & \langle \bar{0} \rangle \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ H_0 & & H_1 & & H_2 & & H_3 \end{array} \\ \\ \lambda_3 : \begin{array}{cccc} \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \supseteq & \langle \bar{2} \rangle & \supseteq & \langle \bar{10} \rangle & \supseteq & \langle \bar{0} \rangle \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ K_0 & & K_1 & & K_2 & & K_3 \end{array} \end{array}$$

Note que λ_1, λ_2 e λ_3 são todas equivalentes, pois:

$$\begin{array}{l} \frac{G_0}{G_1} = \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}, \quad \frac{G_1}{G_2} = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \quad \frac{G_2}{G_3} = \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \\ \frac{H_0}{H_1} = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \quad \frac{H_1}{H_2} = \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}, \quad \frac{H_2}{H_3} = \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}} \\ \frac{K_0}{K_1} = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \quad \frac{K_1}{K_2} = \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}, \quad \frac{K_2}{K_3} = \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \end{array}$$

Logo, de fato temos que:

$$\frac{G_0}{G_1} \cong \frac{H_2}{H_3} \cong \frac{K_1}{K_2}$$

$$\frac{G_1}{G_2} \cong \frac{H_0}{H_1} \cong \frac{K_0}{K_1}$$

$$\frac{G_2}{G_3} \cong \frac{H_1}{H_2} \cong \frac{K_2}{K_3}$$

Lema 5.1.1**Lema da Borboleta de Zassenhaus**

Sejam H_1, H_2, K_1 e K_2 subgrupos de um grupo G tais que $H_2 \trianglelefteq H_1$ e $K_2 \trianglelefteq K_1$. Então:

$$\begin{cases} H_2(H_1 \cap K_2) \trianglelefteq H_2(H_1 \cap K_1) \\ K_2(H_2 \cap K_1) \trianglelefteq K_2(H_1 \cap K_1) \\ \frac{H_2(H_1 \cap K_1)}{H_2(H_1 \cap K_2)} \cong \frac{K_2(H_1 \cap K_1)}{K_2(H_2 \cap K_1)} \end{cases}$$

Demonstração:

Mostremos, primeiramente, que $H_2(H_1 \cap K_2) \trianglelefteq H_2(H_1 \cap K_1)$.

Sabemos que $K_2 \trianglelefteq K_1$. Note, então, que $H_1 \cap K_2 \trianglelefteq H_1 \cap K_1$. De fato, sendo $y \in H_1 \cap K_2$ e tomando $x \in H_1 \cap K_1$, temos simultaneamente $x \in H_1$ e $x \in K_1$, o que nos garante que:

$$\begin{cases} xyx^{-1} \in H_1, & \text{pois } x \in H_1 \text{ e } H_1 \text{ é subgrupo} \\ xyx^{-1} \in K_2, & \text{pois } x \in K_1 \text{ e } K_2 \trianglelefteq K_1 \end{cases}$$

Logo, $xyx^{-1} \in H_1 \cap K_2$.

Por fim, vejamos que $H_2(H_1 \cap K_2) \trianglelefteq H_2(H_1 \cap K_1)$.

Como $H_2 \trianglelefteq H_1$, tomando $a \in H_1 \cap K_2$, $b \in H_1 \cap K_1$, $h_1 \in H_2$ e $h_2 \in H_2$, temos que:

$$(h_2 b)(h_1 a)(h_2 b)^{-1} = h_2 \underbrace{(bh_1 b^{-1})}_{\in H_2} \underbrace{(bab^{-1})}_{\in H_1 \cap K_2} h_2^{-1}$$

Tomando $h_3 \stackrel{\text{def}}{=} h_2 b h_1 b^{-1}$ e $a_1 \stackrel{\text{def}}{=} b a b^{-1}$, temos então:

$$h_3 a_1 h_2^{-1} = \underbrace{h_3 h_4 a_1}_{H_2 \trianglelefteq H_1}, \text{ para algum } h_4 \in H_2$$

Como $(h_3 h_4) \in H_2$ e $a_1 \in H_1 \cap K_2$, concluímos que o elemento pertence a $H_2(H_1 \cap K_2)$. Logo, $H_2(H_1 \cap K_2) \trianglelefteq H_2(H_1 \cap K_1)$.

A prova de que $K_2(H_2 \cap K_1) \trianglelefteq K_2(H_1 \cap K_1)$ é análoga.

Mostremos, por fim, que:

$$\frac{H_2(H_1 \cap K_1)}{H_2(H_1 \cap K_2)} \cong \frac{K_2(H_1 \cap K_1)}{K_2(H_2 \cap K_1)}$$

Para isto, basta mostrar que:

$$\frac{H_2(H_1 \cap K_1)}{H_2(H_1 \cap K_2)} \cong \frac{H_1 \cap K_1}{(H_2 \cap K_1)(H_1 \cap K_2)} \cong \frac{K_2(H_1 \cap K_1)}{K_2(H_2 \cap K_1)}$$

Tomemos $\mathcal{H} \stackrel{\text{def}}{=} H_2(H_1 \cap K_2)$ e $\mathcal{K} \stackrel{\text{def}}{=} H_1 \cap K_1$. Perceba que:

$$\mathcal{H}\mathcal{K} = H_2(H_1 \cap K_2)(H_1 \cap K_1) = H_2 \underbrace{(H_1 \cap K_1)}_{K_2 \leq K_1}$$

e,

$$\mathcal{H} \cap \mathcal{K} = H_2(H_1 \cap K_2) \cap (H_1 \cap K_1) = \underbrace{(H_1 \cap K_2)H_2 \cap (H_1 \cap K_1)}_{H_2 \trianglelefteq H_1}$$

Como $(H_1 \cap K_2) \leq (H_1 \cap K_1)$, pelo **Lema 1.5.1** temos que:


$$\mathcal{H} \cap \mathcal{K} = (H_1 \cap K_2)H_2 \cap (H_1 \cap K_1) = (H_1 \cap K_2)(H_2 \cap H_1 \cap K_1) = (H_1 \cap K_2)(H_2 \cap K_1)$$

Como já mostrado, sabemos que $\mathcal{H} \trianglelefteq \mathcal{H}\mathcal{K}$, e portanto, pelo **Segundo Teorema do Isomorfismo**, temos que:

$$\frac{\mathcal{H}\mathcal{K}}{\mathcal{H}} \cong \frac{\mathcal{K}}{\mathcal{H} \cap \mathcal{K}} \implies \frac{H_2(H_1 \cap K_1)}{H_2(H_1 \cap K_2)} \cong \frac{H_1 \cap K_1}{(H_2 \cap K_1)(H_1 \cap K_2)}$$

A prova de que $\frac{K_2(H_1 \cap K_1)}{K_2(H_2 \cap K_1)} \cong \frac{H_1 \cap K_1}{(H_2 \cap K_1)(H_1 \cap K_2)}$ é análoga. □

Observação: a partir da construção da prova acima, podemos construir o seguinte diagrama que possui formato semelhante a uma borboleta:



Teorema 5.1.1**Teorema de Schreier**

Quaisquer duas séries subnormais de um grupo G possuem refinamentos equivalentes.

Demonstração:

Sejam λ_1 e λ_2 duas séries subnormais de G dadas por:

$$\lambda_1 : G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{e\}$$

e,

$$\lambda_2 : G = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \dots \supseteq H_m = \{e\}$$

Onde n e m são dois inteiros positivos.

Defina $G_{i,j} \stackrel{\text{def}}{=} G_{i+1}(G_i \cap H_j)$, para $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ e $j \in \llbracket 0, m \rrbracket$.

Note que:

$$G_{i,0} = G_{i+1}(G_i \cap H_0) = G_{i+1}(G_i \cap G) = G_{i+1}G_i = G_i$$

e,

$$G_{i,m} = G_{i+1}(G_i \cap H_m) = G_{i+1}(G_i \cap \{e\}) = G_{i+1}\{e\} = G_{i+1}$$

Ainda, como $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ e $H_{j+1} \trianglelefteq H_j$, pelo **Lema da Borboleta de Zassenhaus**, temos que $G_{i,j+1} \trianglelefteq G_{i,j}$.

Portanto, podemos construir o seguinte refinamento λ'_1 da série subnormal λ_1 :

$$\begin{array}{ccccccc} G_{0,0} & \supseteq & G_{0,1} & \supseteq & \dots & \supseteq & G_{0,m} \\ \parallel & & & & & & \parallel \\ G_0 & & & & G_{1,0} & \supseteq & G_{1,1} & \supseteq & \dots & \supseteq & G_{1,m} \\ \lambda'_1 : & & & & \parallel & & \parallel & & & & \parallel \\ & & & & G_1 & & G_{2,0} & \supseteq & \dots & \supseteq & G_{n-1,m} \\ & & & & & & \parallel & & & & \parallel \\ & & & & & & G_2 & \dots & & & G_n = \{e\} \end{array}$$

De forma análoga, podemos construir um refinamento λ'_2 da série subnormal λ_2 :

$$\begin{array}{ccccccc} H_{0,0} & \supseteq & H_{0,1} & \supseteq & \dots & \supseteq & H_{0,n} \\ \parallel & & & & & & \parallel \\ H_0 & & & & H_{1,0} & \supseteq & H_{1,1} & \supseteq & \dots & \supseteq & H_{1,n} \\ \lambda'_2 : & & & & \parallel & & \parallel & & & & \parallel \\ & & & & H_1 & & H_{2,0} & \supseteq & \dots & \supseteq & H_{m-1,n} \\ & & & & & & \parallel & & & & \parallel \\ & & & & & & H_2 & \dots & & & H_m = \{e\} \end{array}$$

Onde $H_{i,j} \stackrel{\text{def}}{=} H_{i+1}(H_i \cap G_j)$, para $i \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket$ e $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Note que os grupos quocientes adjacentes das séries refinadas são da forma $\frac{G_{i,j}}{G_{i,j+1}}$ e $\frac{H_{j,i}}{H_{j,i+1}}$. Pelo **Lema da Borboleta de Zassenhaus**, temos diretamente o isomorfismo:

$$\frac{G_{i,j}}{G_{i,j+1}} \cong \frac{H_{j,i}}{H_{j,i+1}}$$

para todos $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ e $j \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket$.

Com isso, concluímos que os refinamentos λ'_1 e λ'_2 são equivalentes. □

Teorema 5.1.2

Teorema de Jordan-Hölder

Seja G um grupo. Logo, todas as séries de composição de G são equivalentes.

Demonstração:

Sejam λ_1 e λ_2 duas séries de composição de G . Pelo **Teorema de Schreier**, sabemos que λ_1 e λ_2 possuem refinamentos equivalentes, digamos λ'_1 e λ'_2 .

Por definição, uma série de composição não admite refinamentos próprios. Logo, os refinamentos λ'_1 e λ'_2 são formados apenas pela inserção de repetições de subgrupos que já pertenciam às cadeias originais.

Logo, o conjunto de grupos quocientes não triviais da série refinada λ'_1 é exatamente igual ao conjunto de grupos quocientes não triviais da série original λ_1 . O mesmo ocorre entre λ'_2 e λ_2 .

Ora, como λ'_1 e λ'_2 são séries equivalentes, então temos diretamente que as séries de composição λ_1 e λ_2 também são equivalentes. □

Observações:

5.2 Grupos Solúveis

Definição 5.2.1

Seja G um grupo. Dizemos que G é **solúvel** se G possui uma cadeia subnormal λ :

$$\lambda : G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{e\}$$

tal que G_i/G_{i+1} é abeliano para todo $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Neste caso, também chamamos λ de **série solúvel de G** .

Observação: note que todo grupo abeliano é solúvel.

Exemplo 5.2.1

Sendo X um conjunto finito, temos que:

- (i) Se $\text{Card}(X) = 4$, então $\mathfrak{S}_X$ e $\mathfrak{A}_X$ são grupos solúveis;
- (ii) Se $\text{Card}(X) \geq 5$, então $\mathfrak{S}_X$ e $\mathfrak{A}_X$ não são grupos solúveis.

Demonstração:

Para o item (i) basta notar que no **Exemplo 5.1.2** os grupos quocientes das subséries subnormais de $\mathfrak{S}_X$ e $\mathfrak{A}_X$ têm ordem prima. Logo, tratam-se de grupos abelianos.

Para o item (ii), pelo **Teorema 3.4.4**, basta notar que a única série de composição possível para $\mathfrak{S}_X$ é:

$$\mathfrak{S}_X \supseteq \mathfrak{A}_X \supseteq \{\text{id}_X\}$$

Como $\mathfrak{A}_X/\{\text{id}_X\}$ não é abeliano para $\text{Card}(X) \geq 5$, temos que $\mathfrak{S}_X$ e $\mathfrak{A}_X$ não são solúveis. □

Exemplo 5.2.2**Proposição 5.2.1**

Seja G um grupo. Temos que:

- (i) Se G for solúvel e $H \leq G$, então H é solúvel;
- (ii) Se G for solúvel e $H \trianglelefteq G$, então G/H é solúvel;
- (iii) Se $H \trianglelefteq G$ e H e G/H forem solúveis, então G é solúvel;

Demonstração:

Mostremos, primeiramente, o item (i).

Defina $H_{i+1} \stackrel{\text{def}}{=} H \cap G_{i+1}$, $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Tomando $H_1 = G_i$, $H_2 = G_{i+1}$, $K_1 = H$ e $K_2 = \{e\}$ tal como no **Lema de Zassenhaus**, temos diretamente que $H_{i+1} \trianglelefteq H_i$, $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Além disso, temos também que:

$$\frac{G_i \cap H}{G_{i+1} \cap H} = \frac{H_i}{H_{i+1}} \cong \frac{G_{i+1}(G_i \cap H)}{G_{i+1}(G_i \cap \{e\})} = \frac{G_{i+1}(G_i \cap H)}{G_{i+1}}$$

Como $G_{i+1}(G_i \cap H) \leq G_i$, pois $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ e $G_i \cap H \leq G_i$, e $\frac{G_i}{G_{i+1}}$ é abeliano, deduzimos que $\frac{H_i}{H_{i+1}}$ é abeliano para todo $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Portanto, $H = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \dots \supseteq H_n = \{e\}$ é uma série solúvel de H .

Mostremos, agora, o item (ii).

Seja λ uma série solúvel para G dada por:

$$\lambda : G_0 = G \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{e\}$$

Consideremos o epimorfismo projeção canônica dado por $\pi : G \rightarrow G/H$, $\pi(g) \mapsto gH$.

Logo, pelo **Teorema da Correspondência**, existe uma série subnormal λ' dada por:

$$\lambda' : G/H = \pi(G_0) \supseteq \pi(G_1) \supseteq \dots \supseteq \pi(G_n) = H$$

Ainda, temos que π induz o epimorfismo $\tilde{\pi} : G_{j+1}/G_j \rightarrow \pi(G_{j+1})/\pi(G_j)$ para todo $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Logo, como G_{j+1}/G_j é abeliano para todo $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ e $\tilde{\pi}$ é um epimorfismo, temos que $\pi(G_{j+1})/\pi(G_j)$ forma um grupo abeliano para todo $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Portanto, λ' é uma série solúvel.

Mostremos, finalmente, o item (iii).

Ora, se $H \trianglelefteq G$ e G/H são grupos solúveis, então existem séries solúveis λ_1 e λ_2 de H e G/H , respectivamente.

$$\lambda_1 : H = H_0 \trianglerighteq H_1 \trianglerighteq \dots \trianglerighteq H_n = \{e\}$$

e,

$$\lambda_2 : G/H = Q_0 \trianglerighteq Q_1 \trianglerighteq \dots \trianglerighteq Q_m = H$$

Como $Q_j = L_j/H$ para um dado $L_j \leq G$, temos pelo **Teorema da Correspondência** a série subnormal:

$$\lambda_3 : G = L_0 \trianglerighteq \dots \trianglerighteq L_m = H = H_0 \trianglerighteq \dots \trianglerighteq H_n = \{e\}$$

Claramente λ_3 é uma série solúvel. □

Teorema 5.2.1

(P. Hall, 1928) Seja G um grupo solúvel com $|G| = mn$, onde $\text{mdc}(m, n) = 1$. Então:

- (i) Existe pelo menos um subgrupo de G de ordem m .
- (ii) Dois subgrupos quaisquer de G de ordem m são conjugados
- (iii) Qualquer subgrupo cuja ordem divide m está contido num subgrupo de ordem m .

Demonstração:

Ver artigo "*A note on soluble groups*" [Hal28]. □

Teorema 5.2.2

(P. Hall, 1937)

Seja G um grupo finito com a seguinte propriedade: para todo inteiro a tal que $|G| = ab$, com $\text{mdc}(a, b) = 1$, existe um subgrupo de G de ordem a . Então, G é solúvel.

Demonstração:

Ver artigo "*A characteristic property of soluble groups*" [Hal37]. □

Teorema 5.2.3

(Feit-Thompson, 1963) Todos os grupos finitos de ordem ímpar são solúveis.

Demonstração:

Ver artigo "*Solvability of groups of odd order*" [FT63]. □

Bibliografia

- [Dai] R. C. Daileda. The alternating group.
- [FT63] Walter Feit and John G. Thompson. Solvability of groups of odd order. *Pacific Journal of Mathematics*, 13(3):775–1029, 1963.
- [GL22] Arnaldo Garcia and Yves Lequain. *Elementos de Álgebra*. Projeto Euclides. IMPA, Rio de Janeiro, 7 edition, 2022.
- [Hal28] Philip Hall. A note on soluble groups. *Journal of the London Mathematical Society*, 1(2):98–105, 1928.
- [Hal37] Philip Hall. A characteristic property of soluble groups. *Journal of the London Mathematical Society*, 1(3):198–200, 1937.
- [Mar98] P.A. Martin. *Introdução a teoria dos grupos e a teoria de Galois*. Publicações do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. IME-USP, 1998.
- [Yaa] Itai Ben Yaacov. Cours de groupes. Université Claude Bernard Lyon 1, Institut Camille Jordan.