

# Chapitre : Statistiques (correction)

## Compétence : Caractère

### Exercice 1 : Caractère

Pour chacun des cas suivants répondre à ces questions :

1. Quelle est la population étudiée ?
2. Quel est le caractère étudié ?
3. Ce caractère est-il quantitatif ? Qualitatif ? (Justifier votre réponse)

a. Une étude est réalisée sur la marque des chaussures des jeunes japonais de 16-18ans.

Tous les japonais de 16 à 18 ans	La marque des chaussures.	Le caractère est qualitatif, car il ne prend pas de valeurs numériques.
----------------------------------	---------------------------	---

b. Fabrice étudie le nombre de fois où les numéros sortent au loto sur la période 2009-2010

Numéros sortis au loto.	Nombre sur la boule (de 1 à 49).	Le caractère est quantitatif discret, car le caractère ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs numériques.
-------------------------	----------------------------------	---

c. Avant les négociations en vue de demander une augmentation de salaires, un syndicat routier commande une étude statistique du salaire des routiers travaillant en France ayant plus de 5 ans d'ancienneté.

Routiers travaillant en France ayant plus de 5 ans d'ancienneté.	Le salaire.	Le caractère est quantitatif continu, car le caractère peut prendre une infinité de valeurs numériques.
--	-------------	---

## Compétence : Distribution de fréquences

### Exercice 2 : Distribution de fréquences

Compléter les tableaux suivants :

1.

Valeurs	1,5	1,8	2,1	3	Total
Effectifs	31	54	153	12	250
Fréquences	0,124	0,216	0,612	0,048	1

2.

Valeurs	1,5	1,8	2,1	3	Total
Effectifs	31	54	253	12	350
Fréquences	0,09	0,15	0,72	0,04	1

3.

Valeurs	150	230	310	400	Total
Pourcentages	38%	35%	15%	12%	100%
Fréquences	0,38	0,35	0,15	0,12	1


4.

Valeurs	$4 \times 10^5$	$9 \times 10^5$	$2 \times 10^6$	$5 \times 10^6$	$8 \times 10^6$
Fréquences	0,15	0,40	0,21	0,16	0,08
Effectifs	450	1200	630	480	240

### Exercice 3 : Distribution de fréquences

On s'intéresse au nombre de domaines (site web) dont l'extension se termine par « .fr » créés chaque année entre 2000 et 2009. On obtient les statistiques suivantes :

1. Si on considère l'ensemble des sites « .fr » créés entre 2000 et 2009, quelle est la fréquence des sites créés en 2004 ? (On donnera un résultat avec 3 décimales)



$$N = 700 + 427 + 283 + 181 + 897 + 1524 + 2072 + 3592 + 3715 + 3497 = 16888.$$

$$f = \frac{897}{16888} \approx 5,3 \times 10^{-2}$$

2. Quelle pourcentage l'année 2008 représente-t-elle pour la création de sites « .fr » pour la période de 2004 à 2009 ? (on donnera un résultat sans décimale)

$$f = \frac{3715}{16888} \approx 22\%$$

#### Exercice 4 : Distribution de fréquences

Le taux de calcium dans le sang doit être compris entre 95mg/L et 105mg/L.

L'**hypocalcémie** est la diminution du taux de calcium dans le sang. Elle entraîne des troubles neurologiques et musculaires (fourmillement, contractures, ...)

Un patient atteint d'hypocalcémie doit faire des analyses tous les jours. Voici ses résultats sur deux mois:

Taux de calcium (en mg/L)	[70; 80[	[80; 90[	[90; 100[	[100; 110[	[110; 120[	Total
Nombres d'analyses	11	21	14	13	1	60

1. Quel est le caractère étudié ?

**Le caractère étudié est le taux de calcium dans le sang.**

2. Calculez la fréquence correspondant à une quantité de calcium comprise entre 70 et 80 mg/L ?

$$f = \frac{11}{60}$$

3. Quel est le pourcentage de jours (au dixième près) où la quantité de calcium est supérieure à 110mg/L ?

$$f = \frac{1}{60} \approx 0,017 \approx 1,7\%$$

#### Compétence : Moyenne

##### Exercice 5 : Moyenne

Calculer la moyenne des séries des exercices 3 et 4. Répondre par une phrase en lien avec l'exercice.

<b>Exercice 3 :</b>	$\bar{x} = \frac{700+427+\dots+3497}{10} = \frac{16888}{10} \approx 1688,8.$ <b>Le nombre de domaine moyen créé est d'environ 1689.</b>
<b>Exercice 4 :</b>	$\bar{x} = \frac{75 \times 11 + 85 \times 21 + 95 \times 14 + 105 \times 13 + 115 \times 1}{60} = \frac{5420}{60} \approx 90,33.$ <b>Le taux de calcium moyen est de 90,33 mg/L.</b>

##### Exercice 6 : Moyenne

Un TD est noté sur 10. Les élèves ont obtenus les notes : 8 ; 5 ; 6 ; 8 ; 5 ; 5 ; 4 ; 5 ; 6 ; 6

Calculer la moyenne de cette série.

<b>1<sup>ère</sup> méthode :</b> $\bar{x} = \frac{8+5+6+8+5+5+4+5+6+6}{10} = \frac{58}{10} = 5,8$	<b>2<sup>ème</sup> méthode :</b> $\bar{x} = \frac{4 \times 1 + 5 \times 4 + 6 \times 3 + 8 \times 2}{10} = \frac{58}{10} = 5,8$
--	--

##### Exercice 7 : Moyenne

La poste d'une petite ville a noté le nombre de clients journalier sur deux semaines :

17 ; 12 ; 16 ; 5 ; 18 ; 25 ; 18 ; 6 ; 7 ; 13 ; 21 ; 10

1. Calculer la moyenne de cette série.

$$\bar{x} = \frac{17+12+16+5+18+25+18+6+7+13+21+10}{12} = \frac{168}{12} = 14$$

2. Que représente cette moyenne ?

**Sur une période de deux semaines, le nombre moyen de clients journaliers est de 14.**

##### Exercice 8 : Moyenne

Une enquête a montré en 2008 que 67% des français ont un téléphone portable, 19% en ont deux et 6% en ont trois et les autres n'en ont pas.

Calculer le nombre moyen de téléphones que possèdent les français.

$$\bar{x} = 0,67 \times 1 + 0,19 \times 2 + 0,06 \times 3 = 1,23.$$

### Exercice 9 : Moyenne

Un médecin a relevé le nombre de visites de ses patients pendant le mois de juin 2010 :

Nombre de visites	1	2	3	4
Nombre de patients	132	82	42	19

1. Combien de patients ce médecin a-t-il reçu en juin 2010 ?

$$N = 132 + 82 + 42 + 19 = 275 \text{ patients.}$$

2. Combien de fois, en moyenne, les patients sont-ils venus voir ce médecin durant le mois de juin ?

$$\bar{x} = \frac{1 \times 132 + 2 \times 82 + 3 \times 42 + 4 \times 19}{275} = \frac{498}{275} \approx 1,8.$$

3. Sachant que ce médecin a travaillé 26 jours au mois de juin 2010, combien de patients a-t-il reçus en moyenne par jour ?

**Le nombre de consultations est de 498, ce qui représente  $\frac{498}{26}$ , soit 19 consultations par jour environ.**

### Exercice 10 : Moyenne

On a relevé les temps d'attente des skieurs sur une remontée mécanique pendant 1 heure :

Temps d'attente (en min)	[0; 2[	[2; 6[	[6; 10[	[10; 30]
Nombre de skieurs	20	42	19	27

1. Quel est l'effectif total ?

$$N = 20 + 42 + 19 + 27 = 108$$

2. Quel est le temps d'attente moyen ? On présentera le résultat en « minute, seconde ».

$$\bar{x} = \frac{1 \times 20 + 4 \times 42 + 8 \times 19 + 20 \times 27}{108} = \frac{880}{108} = \frac{220}{27} \approx 8,15. \text{ (On a au préalable calculer les centre de classe, ex : } \frac{0+2}{2} = 1).$$

**Le temps d'attente moyen est de 8 minutes et 9s environ.**

### Exercice 11 : Moyenne

Une enquête sur le nombre d'heures de cours hebdomadaires des lycéens a donné les résultats suivant pour les 1902 élèves de deux lycéens :

Nombre d'heures	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Total
Effectif	231	352	411	98	153	197	87	214	159	1902

1. Calculer le nombre d'heures moyen de cours hebdomadaire pour ces lycéens.

$$\bar{x} = \frac{27 \times 231 + 28 \times 352 + \dots + 34 \times 214 + 35 \times 159}{1902} = \frac{57711}{1902} \approx 30,3.$$

2. Sachant que ces lycéens travaillent 6 jours par semaine quel est le nombre d'heures moyen de cours journalier ?

$$\bar{x} = \frac{57711}{6 \times 1902} \approx 5,1.$$

### Exercice 12 : Moyenne

Un guide de restauration souhaite calculer le prix moyen des menus proposés par les restaurants d'une capitale européenne.

Afin de faciliter le calcul, le guide a regroupé les résultats dans le tableau suivant :

Prix moyen d'un menu	[10; 14[	[14; 22[	[22; 40[	[40; 80]	Total
Nombre de restaurants	196	96	73	21	386

Calculer le prix moyen d'un menu sur l'ensemble de ces restaurants au centime près.

$$\bar{x} = \frac{12 \times 196 + 18 \times 96 + 31 \times 73 + 60 \times 21}{386} \approx 19,7. \text{ (On calcule au préalable les centres de classe, ex : } \frac{10+14}{2} = 12).$$

**Exercice 13 : Comparaison : Utiliser le couple Moyenne – Ecart-type**

Deux élèves, Fatima et Benjamin, ont obtenu les notes suivantes à une série de six devoirs de mathématiques.

Fatima	7	14	13	9	11	15
Benjamin	14	11	10	9	13	12

1. Calculer les moyennes de chacun des deux élèves.

$\bar{x}_{Fatima} = 11,5$	$\bar{x}_{Benjamin} = 11,5$
---------------------------	-----------------------------

2. Calculer l'écart-type de ces deux séries de notes.

$\sigma_{Fatima} \approx 2,81$ .	$\sigma_{Benjamin} \approx 1,7$ .
----------------------------------	-----------------------------------

3. Comparer les résultats de ces deux élèves.

**Les moyennes sont identiques mais l'écart-type de la série de note de Benjamin est plus faible, cet élève a des résultats plus réguliers.**

**Exercice 14 : Comparaison : Utiliser le couple Moyenne – Ecart-type**

Natacha et Lorenzo jouent aux fléchettes. Chacun lance 40 fléchettes

**LORENZO:**

Points par fléchettes	0	10	20	50	100
Nombre de fléchettes	11	9	1	8	11
ECC	11	20	21	29	40

**NATACHA:**

Points par fléchettes	0	10	20	50	100
Nombre de fléchettes	4	6	22	5	3
ECC	4	10	32	37	40

1. Calculer la moyenne de chaque joueur. Quel est le meilleur joueur?

$\bar{x}_{Lorenzo} = \frac{0 \times 11 + 10 \times 9 + 20 \times 1 + 50 \times 8 + 100 \times 11}{40}$ $= \frac{1610}{40} = 40,25$	$\bar{x}_{Natasha} = \frac{0 \times 4 + 10 \times 6 + 20 \times 22 + 50 \times 5 + 100 \times 3}{40}$ $= \frac{1050}{40} = 26,25$
--	---

**Lorenzo a en moyenne le plus de points. Ainsi c'est le meilleur joueur.**

2. Calculer l'écart interquartile de chaque joueur. Quel est le joueur le plus régulier?

<p><b>Pour Lorenzo : <math>N = 40</math>.</b></p> <p><math>\frac{N}{4} = 10</math>. <math>Q_1</math> est la 10<sup>ème</sup> valeur. <math>Q_1 = 0</math>.</p> <p><math>\frac{3N}{4} = 30</math>. <math>Q_3</math> est la 30<sup>ème</sup> valeur. <math>Q_3 = 100</math>.</p> <p><math>E_Q = Q_3 - Q_1 = 100 - 0 = 100</math>.</p> <p><b>Natasha a l'écart interquartile le plus petit. Ainsi c'est la plus régulière.</b></p>	<p><b>Pour Natasha : <math>N = 40</math>.</b></p> <p><math>\frac{N}{4} = 10</math>. <math>Q_1</math> est la 10<sup>ème</sup> valeur. <math>Q_1 = 10</math>.</p> <p><math>\frac{3N}{4} = 30</math>. <math>Q_3</math> est la 30<sup>ème</sup> valeur. <math>Q_3 = 20</math>.</p> <p><math>E_Q = Q_3 - Q_1 = 20 - 10 = 10</math>.</p>
---	--

**Exercice 15 : Comparaison : Utiliser le couple Moyenne – Ecart-type**

Le tableau indique les durées d'ensoleillements (en h) dans les villes de Brest et Strasbourg durant de mois de juin 2010.

Durée	0	1	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Brest	2	3	4	0	3	2	0	3	3	2	4	4	0
Stras.	1	4	3	4	3	0	4	0	0	3	1	3	4

1. Quelle est la durée moyenne  $\bar{x}$  d'ensoleillement pour chacune des deux villes ?

$\bar{x}_{Brest} = 8$	$\bar{x}_{Stras} = 7,9$
-----------------------	-------------------------

2. Calculez l'écart-type  $\sigma$  de chacune des séries.

$\sigma_{Brest} \approx 4,63$ .	$\sigma_{Stras} \approx 4,94$ .
---------------------------------	---------------------------------

3. Pour chacune des villes, quel est le pourcentage de valeurs dans  $[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma]$  ?

<p><b>Brest : <math>[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma] = [3,37; 12,63]</math></b></p> <p><b>On a 17 valeurs dans cet intervalle, il y a alors environ 57% de valeurs dans cet intervalle.</b></p>	<p><b>Stras : <math>[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma] = [2,96; 12,84]</math></b></p> <p><b>On a 17 valeurs dans cet intervalle, il y a alors environ 57% de valeurs dans cet intervalle.</b></p>
---	---

L'affirmation : « en juin, il a fait aussi beau à Brest qu'à Strasbourg » est-elle fondée ?

**Les durées moyennes sont proches et la dispersion des valeurs autour d'elles est comparable donc l'affirmation : « en juin, il a fait aussi beau à Brest qu'à Strasbourg » est fondée.**

**Exercice 16 : Comparaison : Utiliser le couple Moyenne – Ecart-type**

Une enquête a testé les durées d'attente  $d$  (en s) chez eux opérateurs  $A$  et  $B$ , fournisseurs d'accès à internet.

$d$	[20 ; 30[	[30 ; 40[	[40 ; 50[	[50 ; 60[	[60 ; 80[	[80 ; 120[	[120 ; 180[	[180 ; 240[
A		13%	41%	19%	11%	6%	4%	6%
B	5%	15%	25%	11%	18%	12%	7%	7%

1. Estimez les durées moyennes d'attente chez chacun des opérateurs.

$$\bar{x}_A \approx 66$$

$$\bar{x}_B \approx 74$$

2. Calculer une estimation de l'écart-type pour chacune des séries.

$$\sigma_A \approx 44.$$

$$\sigma_B \approx 49.$$

3. Quel opérateur semble posséder le service de relation avec les consommateurs le plus efficaces ?

**L'opérateur A est le plus efficace puisqu'il offre :**

– la durée d'attente moyenne la plus faible ( $\bar{x}_A < \bar{x}_B$ ) ;

– une meilleure concentration des durées d'attente autour de la moyenne ( $\sigma_A < \sigma_B$ ).

**Exercice 17 : Comparaison : Utiliser le couple Moyenne – Ecart-type**

Les tableaux suivants donnent la répartition des salaires mensuels nets en euros des employés, à temps partiel ou à temps complet, dans deux entreprises A et B.

Entreprise A		Entreprise B	
Salaire (en €)	Effectif	Salaire (en €)	Effectif
[610 ; 1220[	200	[1050 ; 1370[	50
[1220 ; 1830[	700	[1370 ; 1690[	400
[1830 ; 2440[	1000	[1690 ; 2010[	1500
[2440 ; 3050[	100	[2010 ; 2330[	500

1. Calculer la moyenne et la valeur approchée arrondie à  $10^{-1}$  de l'écart-type de chacune des deux séries, en faisant l'approximation que tous les éléments d'une classe sont situés en son centre.

$$\bar{x}_A = 1830$$

$$\sigma_A \approx 452,39.$$

$$\bar{x}_B = 1850$$

$$\sigma_B \approx 214,42.$$

2. Si les deux entreprises vous proposaient le même emploi, avec le même salaire d'embauche, laquelle des deux aurait votre préférence ?

**L'entreprise B est plus intéressante car l'écart type est beaucoup plus faible que celui de l'entreprise A (avec une moyenne presque identique).**

## Compétence : Médiane

### Exercice 18 : Médiane

Déterminer la médiane, les premiers et troisièmes quartiles des séries statistiques proposées :

Série 1 : 1 ; 1 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10.

Série 2 : 3 ; 5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 14.

Série 3 : 12 ; 19 ; 13 ; 5 ; 8 ; 6 ; 6 ; 12 ; 19 ; 19 ; 12 ; 5.

1 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 8 ; 12 ; 12 ; 12 ; 13 ; 19 ; 19 ; 19

Série 4 : 6 ; 6 ; 6 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6000.

5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6000

Série 5 : 3 ; 5 ; 6 ; 6 ; 1 ; 7 ; 2 ; 5 ; 3 ; 1 ; 7 ; 1 ; 4 ; 5.

1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7

Série 6 : 5 ; 10 ; 7 ; 20 ; 18 ; 8 ; 1 ; 4 ; 2 ; 14 ; 10 ; 4 ; 18.

1 ; 2 ; 4 ; 4 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 10 ; 14 ; 14 ; 17 ; 18 ; 18 ; 20

Série 7 : 18,5 ; 12 ; 3 ; 18 ; 18,5 ; 18,5 ; 16,7 ; 18 ; 3 ; 10.

3 ; 3 ; 10 ; 12 ; 16,7 ; 18 ; 18 ; 18,5 ; 18,5 ; 18,5

Série 8 : 12 ; 8 ; -11 ; 20 ; 9 ; -1 ; 10 ; 12 ; -4 ; 12 ; 11.

-11 ; -4 ; -1 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 12 ; 20

#### Méthode :

- On met les nombres dans l'ordre croissant.
- On compte le nombre de nombres, c'est l'effectif total  $N$ .
- Si  $N$  est pair, la médiane est la moyenne entre la  $\frac{N}{2}$  et la  $\frac{N}{2} + 1$  ème valeur, le 1<sup>er</sup> quartile est la  $\frac{N}{4}$ -ème valeur (à arrondir à l'entier supérieur) et le 3<sup>ème</sup> quartile est la  $\frac{3N}{4}$  valeur (à arrondir à l'entier supérieur).
- Si  $N$  est impair, la médiane est la  $\frac{N+1}{2}$  ème valeur, pour les quartiles : voir au-dessus.

Série	Eff Total	Médiane	1 <sup>er</sup> Quartile	3 <sup>ème</sup> Quartile
1	$N = 7$ impair	$M_e = 6$	$Q_1 = 1$	$Q_3 = 8$
2	$N = 10$ pair	$M_e = 7,5$	$Q_1 = 6$	$Q_3 = 10$
3	$N = 13$ impair	$M_e = 12$	$Q_1 = 6$	$Q_3 = 13$
4	$N = 7$ impair	$M_e = 6$	$Q_1 = 6$	$Q_3 = 6$
5	$N = 14$ pair	$M_e = 4,5$	$Q_1 = 2$	$Q_3 = 6$
6	$N = 16$ pair	$M_e = 9$	$Q_1 = 4$	$Q_3 = 14$
7	$N = 10$ pair	$M_e = 16,7$	$Q_1 = 10$	$Q_3 = 18$
8	$N = 11$ impair	$M_e = 10$	$Q_1 = -1$	$Q_3 = 12$

### Exercice 19 : Médiane

#### Exercice 4

Taux de calcium (en mg/L)	[70; 80[	[80; 90[	[90; 100[	[100; 110[	[110; 120[	Total
Nombres d'analyses	11	21	14	13	1	60
ECC	11	32	46	59	60	
FCC	18%	53%	77%	98%	100%	



$M_e \approx 89$ .

Au moins 50% des analyses ont un taux de calcium inférieur ou égal à 89.

$Q_1 \approx 82$ .

Ainsi au moins 25% des analyses ont un taux de calcium inférieur ou égal à 82.

$Q_3 \approx 99$ .

Ainsi au moins 75% des analyses ont un taux de calcium inférieur ou égal à 99.

### Exercice 6 :

Un TD est noté sur 10. Les élèves ont obtenus les notes : 8 ; 5 ; 6 ; 8 ; 5 ; 5 ; 4 ; 5 ; 6 ; 6

Série mise dans l'ordre croissant : 4 ; 5 ; 5 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 8 ; 8.

$N = 10$  est pair.

$\frac{N}{2} = 5$  et  $\frac{N}{2} + 1 = 6$ . Ainsi  $M_e$  est la moyenne entre la 5<sup>ème</sup> valeur et la 6<sup>ème</sup> valeur. Ainsi  $M_e = \frac{5+6}{2} = 5,5$ .

Au moins 50% des élèves ont moins de 5,5 (/10).

$\frac{N}{4} = 2,5 \approx 3$ . Ainsi  $Q_1$  est la 3<sup>ème</sup> valeur. Ainsi  $Q_1 = 5$ . Au moins 25% des élèves ont moins de 5 (/10).

$\frac{3N}{4} = 7,5 \approx 8$ . Ainsi  $Q_3$  est la 8<sup>ème</sup> valeur. Ainsi  $Q_3 = 6$ . Au moins 75% des élèves ont moins de 6 (/10).

### Exercice 7 :

La poste d'une petite ville a noté le nombre de clients journalier sur deux semaines :

17 ; 12 ; 16 ; 5 ; 18 ; 25 ; 18 ; 6 ; 7 ; 13 ; 21 ; 10

Série mise dans l'ordre croissant : 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 12 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 18 ; 21 ; 25

$N = 12$  est pair.

$\frac{N}{2} = 6$  et  $\frac{N}{2} + 1 = 7$ . Ainsi  $M_e$  est la moyenne entre la 6<sup>ème</sup> valeur et la 7<sup>ème</sup> valeur. Ainsi  $M_e = \frac{13+16}{2} = 14,5$ .

Au moins 50% des jours à la poste sur deux semaines ont moins de 14,5 clients.

$\frac{N}{4} = 3$ . Ainsi  $Q_1$  est la 3<sup>ème</sup> valeur. Ainsi  $Q_1 = 7$ . Au moins 25% des jours à la poste sur deux semaines ont moins de 7 clients.

$\frac{3N}{4} = 9$ . Ainsi  $Q_3$  est la 9<sup>ème</sup> valeur. Ainsi  $Q_3 = 18$ . (...)

### Exercice 9 : Moyenne

Un médecin a relevé le nombre de visites de ses patients pendant le mois de juin 2010 :

Nombre de visites	1	2	3	4
Nombre de patients	132	82	42	19
ECC	132	214	256	275
FCC	48%	78%	93%	100%

#### 1<sup>ère</sup> méthode : Avec les ECC

$N = 275$  est impair.

- $\frac{N+1}{2} = \frac{276}{2} = 138$ . Ainsi  $M_e$  est la 138<sup>ème</sup> valeur.  
Ainsi  $M_e = 2$  (il faut prendre la première valeur où le ECC est supérieur à 138).  
Au moins 50% des patients visitent moins de 2 fois le médecin pendant le mois de juin 2010.
- $\frac{N}{4} = 68,75 \approx 69$ . Ainsi  $Q_1$  est la 69<sup>ème</sup> valeur. Ainsi  $Q_1 = 1$ .  
Au moins 25% des patients visitent moins d'une fois le médecin pendant le mois de juin 2010.
- $\frac{3N}{4} = 206,25 \approx 207$ . Ainsi  $Q_3$  est la 207<sup>ème</sup> valeur.  
Ainsi  $Q_3 = 2$ .  
Au moins 75% des patients visitent moins de 2 fois le médecin pendant le mois de juin 2010.


#### 2<sup>ème</sup> méthode : Avec les FCC

- 48% < 50% < 78%  
Ainsi la médiane  $M_e = 2$ .
- 0% < 25% < 48%  
Ainsi le 1<sup>er</sup> quartile  $Q_1 = 1$ .
- 48% < 75% < 78%  
Ainsi le 3<sup>ème</sup> quartile  $Q_3 = 2$

### Exercice 10 :

On a relevé les temps d'attente des skieurs sur une remontée mécanique pendant 1 heure :

Temps d'attente (en min)	[0; 2[	[2; 6[	[6; 10[	[10; 30]	Total
Nombre de skieurs	20	42	19	27	<b>108</b>
<b>ECC</b>	<b>20</b>	<b>62</b>	<b>81</b>	<b>108</b>	
<b>FCC</b>	<b>19%</b>	<b>57%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	



$$M_e \approx 5,24.$$

Au moins 50% des skieurs attendent moins de 5 minutes 14 secondes (environ).

$$Q_1 \approx 2,67.$$

Au moins 25% des skieurs attendent moins de 2 minutes 40 secondes (environ).

$$Q_3 = 10.$$

Au moins 75% des skieurs attendent moins de 10 minutes.

### Exercice 11 : Moyenne

Une enquête sur le nombre d'heures de cours hebdomadaires des lycéens a donné les résultats suivant pour les 1902 élèves de deux lycéens :

Nombre d'heures	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Total
Effectif	231	352	411	98	153	197	87	214	159	<b>1902</b>
<b>ECC</b>	<b>231</b>	<b>583</b>	<b>994</b>	<b>1092</b>	<b>1245</b>	<b>1442</b>	<b>1529</b>	<b>1743</b>	<b>1902</b>	
<b>FCC</b>	<b>12%</b>	<b>31%</b>	<b>52%</b>	<b>57%</b>	<b>65%</b>	<b>76%</b>	<b>80%</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	

#### 1<sup>ère</sup> méthode : Avec les ECC

$N = 1902$  est pair.

- $\frac{N}{2} = \frac{1902}{2} = 951$ . Ainsi  $M_e$  est la moyenne entre la 951<sup>ème</sup> et la 952<sup>ème</sup> valeur. Ainsi  $M_e = 29$ .  
Au moins 50% des lycéens ont moins de 29 heures de cours hebdomadaires.
- $\frac{N}{4} = 475,5 \approx 476$ . Ainsi  $Q_1$  est la 476<sup>ème</sup> valeur.  
Ainsi  $Q_1 = 28$ .  
Au moins 25% des lycéens ont moins de 28 heures de cours hebdomadaires.
- $\frac{3N}{4} = 1426,5 \approx 1427$ . Ainsi  $Q_3$  est la 1427<sup>ème</sup> valeur. Ainsi  $Q_3 = 32$ .  
Au moins 75% des lycéens ont moins de 32 heures de cours hebdomadaires.

#### 2<sup>ème</sup> méthode : Avec les FCC

- $31\% < 50\% < 52\%$   
Ainsi la médiane  $M_e = 29$ .
- $12\% < 25\% < 31\%$   
Ainsi le 1<sup>er</sup> quartile  $Q_1 = 28$ .
- $65\% < 75\% < 76\%$   
Ainsi le 3<sup>ème</sup> quartile  $Q_3 = 32$




### Exercice 12 : Moyenne

Un guide de restauration souhaite calculer le prix moyen des menus proposés par les restaurants d'une capitale européenne.

Afin de faciliter le calcul, le guide a regroupé les résultats dans le tableau suivant :

Prix moyen d'un menu	[10; 14[	[14; 22[	[22; 40[	[40; 80]	Total
Nombre de restaurants	196	96	73	21	386
ECC	196	292	365	386	
FCC	51%	76%	95%	100%	



$$M_e \approx 13,94.$$

Au moins 50% des restaurants ont un prix moyen d'un menu inférieur ou égal à 13€94.

$$Q_1 \approx 11,97.$$

Au moins 25% des restaurants ont un prix moyen d'un menu inférieur ou égal à 11€97.

$$Q_3 \approx 21,79.$$

Au moins 75% des restaurants ont un prix moyen d'un menu inférieur ou égal à 21€79.


### Compétence : Regroupement par classe

#### Exercice supplémentaire : Regroupement par classe

Pour les exercices 4 , 10 et 12 construire un histogramme.


#### Exercice 4

Même amplitude.




#### Exercice 10

Amplitude différente.



## Exercice 12

Amplitude  
différente.



### Compétence : Exercices bilan

#### Exercice 20 : Exercice bilan

Voici le bilan de la classe au dernier contrôle.

Notes	1	2	6	7	9	10	11	12	13	14	15	18	Total
Effectifs	1	1	3	2	3	2	2	2	2	1	2	1	22
ECC	1	2	5	7	10	12	14	16	18	19	21	22	
FCC	5%	9%	23%	32%	45%	55%	64%	73%	82%	86%	95%	100%	

1. Pour la série des notes, déterminer l'étendue, moyenne, médiane, quartiles.

L'étendue est  $e = 18 - 1 = 17$ .

La moyenne est  $\bar{x} = \frac{1 \times 1 + 2 \times 1 + \dots + 15 \times 2 + 18 \times 2}{22} \approx 9,81$

#### 1<sup>ère</sup> méthode : Avec les ECC

$N = 22$  est pair.

$\frac{N}{2} = 11$ .  $M_e$  est la moyenne entre la 11<sup>ème</sup> et la 12<sup>ème</sup> valeur. Ainsi la médiane  $M_e = 10$ .

#### 1<sup>ère</sup> méthode : Avec les ECC

•  $\frac{N}{4} = 5,5 \approx 6$ .  $Q_1$  est la 6<sup>ème</sup> valeur.

Ainsi le 1<sup>er</sup> quartile  $Q_1 = 7$ .

•  $\frac{3N}{4} = 16,5 \approx 17$ .  $Q_3$  est la 17<sup>ème</sup> valeur.

Ainsi le 3<sup>ème</sup> quartile  $Q_3 = 13$

#### 2<sup>ème</sup> méthode : Avec les FCC

$45\% < 50\% < 55\%$

Ainsi la médiane  $M_e = 10$ .

#### 2<sup>ème</sup> méthode : Avec les FCC

•  $23\% < 25\% < 32\%$

Ainsi le 1<sup>er</sup> quartile  $Q_1 = 7$ .

•  $73\% < 75\% < 82\%$

Ainsi le 3<sup>ème</sup> quartile  $Q_3 = 13$

2. a. Le professeur veut convoquer en soutien au moins la moitié de la classe ayant les notes les plus faibles.

Pour convoquer les élèves, quelle caractéristique utilisera-t-il et comment?

**On utilise la médiane, ainsi le professeur convoque les élèves dont la note est inférieure ou égale à 10.**

b. Le professeur décide que le quart le plus faible des devoirs devra être refait. Pour informer les élèves, quelle caractéristique utilisera-t-il et comment?


**On utilise le 1<sup>er</sup> quartile, ainsi le professeur convoque les élèves dont la note est inférieure ou égale à 7.**

c. Pour inviter au moins un quart des élèves qui ont eu les meilleures notes à participer à un rallye, quelle caractéristique utilisera-t-il et comment?

**On utilise le 3<sup>ème</sup> quartile, ainsi le professeur convoque les élèves dont la note est supérieure ou égale à 13.**

### Exercice 21 : Exercice bilan

Le diagramme en bâton suivant donne les âges de judokas participant à une compétition inter académique.



On traduit le graphique par un tableau d'effectifs.

Âges	14	15	16	17	18
Effectif	18	22	21	19	32
ECC	18	40	61	80	112
FCC	16%	36%	54%	71%	100%

1. Quel est le nombre de participants à la compétition ?

$N = 18 + 22 + 21 + 19 + 32 = 112$ . Il y a 112 participants à cette compétition.

2. Quel est l'âge moyen des participants ?

$$\bar{x} = \frac{14 \times 18 + 15 \times 22 + 16 \times 21 + 17 \times 19 + 18 \times 32}{112} \approx 16,22$$

3. Quel est l'âge médian des participants ?

**1<sup>ère</sup> méthode : Avec les ECC**

$N = 112$  est pair.

$\frac{N}{2} = 56$ . Ainsi  $M_e$  est la moyenne entre la 56<sup>ème</sup> et la

57<sup>ème</sup> valeur.  $M_e = 16$

**2<sup>ème</sup> méthode : Avec les FCC**

$$36\% < 50\% < 54\%$$


Ainsi la médiane  $M_e = 16$ .

4. Quel est le pourcentage de participants mineurs ?

$$\frac{80}{112} \approx 0,714 \approx 71,4\%$$

### Exercice 22 : Couple Médiane – Ecart-interquartile

On a relevé les températures mensuelles moyennes dans trois villes.



Quelles informations peut-on tirer de la comparaison de ces trois diagrammes ?

Les températures correspondant à la ville 1 sont les plus basses et les plus dispersées. Les températures correspondant à la ville 3 sont les plus élevées et les moins dispersées.

La ville 1 est une ville plutôt froide et pour laquelle les écarts de température sont importants.

La ville 3 correspond à une ville plutôt chaude et pour laquelle les écarts de température sont faibles.

La ville 2 correspond à une ville un peu moins chaude et aux températures un peu plus dispersées que celles de la ville 3.

### Exercice 23 : Couple Médiane – Ecart-interquartile

Pour tester l'efficacité d'un médicament destiné à faire baisser la proportion d'une substance dans le sang, on compare les résultats d'analyse dans le groupe de patients A recevant le médicament et le groupe B recevant un placebo :

GA	1,9	1,6	1,3	1,5	1,5	1,8	1,5
	1,8	2,1	1,7	1,7	1,7	1,5	1,4
	1,7	1,6	1,6	1,9	1,6	1,5	1,7
	1,6	1,8	1,8	1,6	1,5	1,8	1,5

GB	1,9	2,1	2,0	2,0	1,8	2,1	2,0
	1,8	1,7	2,1	1,9	1,9	2,1	1,8
	1,7	1,9	1,9	1,8	1,9	1,7	2,0
	1,9	2,4	2,4	1,9	1,8	1,5	2,1

1. Proposer un schéma permettant de comparer les deux séries

#### Gpe A :


1,3 ; 1,4 ; 1,5 ; 1,5 ; 1,5 ; 1,5 ; 1,5 ; 1,5 ; 1,6 ; 1,6 ;  
1,6 ; 1,6 ; 1,6 ; 1,6 ; 1,6 ; 1,7 ; 1,7 ; 1,7 ; 1,7 ; 1,7  
; 1,8 ; 1,8 ; 1,8 ; 1,8 ; 1,8 ; 1,9 ; 1,9 ; 2,1

$N = 28$  ;  $\min = 1,3$  ;  $Q_1 = 1,5$  ;  $M_e = 1,6$  ;  $Q_3 = 1,8$  ;  $\max = 2,1$

#### Gpe B :

1,5 ; 1,7 ; 1,7 ; 1,7 ; 1,8 ; 1,8 ; 1,8 ; 1,8 ; 1,8 ; 1,9 ; 1,9  
; 1,9 ; 1,9 ; 1,9 ; 1,9 ; 1,9 ; 1,9 ; 2,2 ; 2,2 ; 2,2 ; 2,1 ; 2,1 ;  
2,1 ; 2,1 ; 2,1 ; 2,4 ; 2,4

$N = 28$  ;  $\min = 1,5$  ;  $Q_1 = 1,8$  ;  $M_e = 1,9$  ;  $Q_3 = 2$  ;  $\max = 2,4$



2. Peut-on considérer que le médicament est efficace ?

**Chaque paramètre de la série A est inférieur à son correspondant dans la série B. On peut considérer que le médicament fait baisser la proportion de substance dans le sang.**

### Exercice 24 : Couple Médiane – Ecart-interquartile

On se propose de comparer les températures maximales moyennes en °C sur chaque mois de l'année pour deux communes de Haute-Savoie situées toutes les deux à 1000 mètres d'altitude : Chamonix et La Clusaz.

Mois	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Chamonix	1,5	4	7,5	12	15,5	20	23	22	19	14	6,5	2
La Clusaz	2,5	3,5	6	9,5	14	17	20,5	20	17	13	7	3,5


1. Tracer les diagrammes en boîte de ces deux séries.

**Chamonix : 1,5 ; 2 ; 4 ; 6,5 ; 7,5 ; 12 ; 14 ; 15,5 ; 19 ; 20 ; 22 ; 23**

$N = 12$  pair ; Médiane : 13 ; 1er quartile : 4 ; 3e quartile : 19.

**La Clusaz : 2,5 ; 3,5 ; 3,5 ; 6 ; 7 ; 9,5 ; 13 ; 14 ; 17 ; 17 ; 20 ; 20,5**

$N = 12$  pair ; Médiane : 11,25 ; 1er quartile : 3,5 ; 3e quartile : 17.



2. Interpréter les différences constatées.

**Pour les deux séries, l'écart interquartile est très important alors que les valeurs situées aux extrémités sont, elles,**

**beaucoup plus concentrées.**

**D'autre part, les températures à la Clusaz sont globalement plus basses qu'à Chamonix, même si la température minimale a été relevée à Chamonix.**

### Exercice 25 : Slogan

Un centre commercial cherche un slogan publicitaire mettant en avant le faible temps d'attente aux caisses. Une agence de communication propose deux slogans :

**Slogan 1 :** " Le temps d'attente est en moyenne inférieur à 5 minutes. "

**Slogan 2 :** " Dans plus de 50% des cas, vous attendrez moins de 5 minutes ! "

Pour choisir le slogan le plus proche de la réalité, le centre commercial a commandé une enquête sur les temps d'attente. Voici les résultats obtenus :

Temps d'attente	[0; 2[	[2; 5[	[5; 10[	[10; 20[	[20; 30[
Effectif	19	45	8	17	11
ECC	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>100</b>
FCC	<b>0,19</b>	<b>0,64</b>	<b>0,72</b>	<b>0,89</b>	<b>1</b>


1. Quels indicateurs proposez-vous de calculer pour déterminer si les slogans 1 et 2 sont corrects ?

**Pour le slogan 1, il faut calculer la moyenne.**

**Pour le slogan 2, il faut calculer la médiane.**

2. Calculer les fréquences cumulées croissantes.

3. Représenter graphiquement les fréquences cumulées croissantes et en déduire la valeur de la médiane.



$$M_e \approx 4,07$$

$$Q_1 = 2,4$$

$$Q_3 \approx 11,76$$

4. Calculer la valeur moyenne de cette série statistique.

$$\bar{x} = \frac{1 \times 19 + 3,5 \times 45 + 7,5 \times 8 + 15 \times 17 + 25 \times 11}{100} = \frac{766,5}{100} = 7,665$$

**min.**

5. Quel slogan faut-il choisir ?

**Il faut choisir le slogan 2.**

### Exercice supplémentaire : Couple Médiane – Ecart-interquartile

On a relevé l'enneigement de deux stations de ski pour les mois de février, avril et décembre de 2001 à 2009. Les données sont exprimées en centimètres

#### Courchevel :

39 ; 44 ; 57 ; 64 ; 65 ; 90 ; 101 ; 104 ; 104 ; 115 ; 121 ;  
122 ; 126 ; 127 ; 129 ; 131 ; 159 ; 164 ; 166 ; 175 ; 190 ;  
190 ; 195 ; 203 ; 208 ; 209 ; 216

#### Pyrénées :

29 ; 32 ; 40 ; 46 ; 47 ; 48 ; 51 ; 56 ; 56 ; 58 ; 64 ; 68 ;  
73 ; 74 ; 78 ; 78 ; 81 ; 87 ; 97 ; 98 ; 105 ; 108 ; 110 ;  
114 ; 194 ; 200 ; 200


1. Calculer la moyenne d'enneigement de chaque station.

$$\bar{x}_{\text{Courchevel}} = \frac{65+126+\dots+190+101}{27} \approx \mathbf{133,85}$$

$$\bar{x}_{\text{Pyrénées}} = \frac{32+78+\dots+74+114}{27} \approx \mathbf{84,89}$$

2. Recopier et compléter le tableau suivant:

	$\min$	$Q_1$	$M_e$	$Q_3$	$\max$
Courchevel	39	101	127	190	216
Pyrénées	29	51	74	105	200



3. Donner l'étendue de chaque série statistique.

$$e_{\text{Courchevel}} = 216 - 39 = \mathbf{177}$$

$$e_{\text{Pyrénées}} = 200 - 29 = \mathbf{171}$$

4. Donner l'écart interquartile de chaque série.

$$E_{Q_{\text{Courchevel}}} = 190 - 101 = \mathbf{89}$$

$$E_{Q_{\text{Pyrénées}}} = 105 - 51 = \mathbf{54}$$

5. Quelle station est la plus enneigée selon vous?

**Courchevel est la station la plus enneigée.**