



Tamizaje del Cáncer de Cuello Uterino en México

Dr. Elías Yused Argüello Esparza
Subdirector de Cáncer de la Mujer
CNEGSR




Programa de Acción Específico 2013-2018






Programa de prevención y control en México





Tamizaje en mujeres de 25 a 64 años




Objetivo: Prevenir la morbilidad y mortalidad por CaCu a través de la detección y tratamiento de lesiones precursoras



Tamizaje con pruebas de VPH en México


Tipo de prueba por entidad federativa,
2016





Acciones de detección


Cobertura de detección trienal de cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad en México





Acciones de detección


Cobertura de detección trienal de cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad en mujeres de la SS





Acciones de mejora de la calidad


Proporción de mujeres de 25 a 64 años con muestra adecuada en la citología de tamizaje en la Secretaría de Salud, 2015





Acciones de mejora de la calidad

Proporción de mujeres de 25 a 64 años con resultados anormales en la citología de tamizaje en la Secretaría de Salud, 2015




FUENTE: CNEGSR/Sistema de Información de Cáncer de la Mujer



Acciones de mejora de la calidad


Proporción de mujeres de 35 a 64 años con resultado positivo a prueba de VPH
en la citología de tamizaje en la Secretaría de Salud, 2015





Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino en la SS


Distribución de los genotipos de Virus de Papiloma Humano, 2015.





Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino en la SS


Cobertura de evaluación diagnóstica de casos sospechosos en el Tamizaje de Cáncer de Cuello uterino en la Secretaría de Salud, 2010-2015





Acciones de mejora de la calidad

Oportunidad de atención en el Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino en la Secretaría de Salud (Promedio de días), 2010-2015



Intervalo entre el resultado de biopsia e inicio de tratamiento oncológico (48 días)

Intervalo entre el diagnóstico citológico y la colposcopía (65 días)


Intervalo entre el resultado de VPH y el resultado del triage (65 días)

Intervalo entre la toma y procesamiento de la prueba de VPH (30 días)

Intervalo entre la toma de citología y la interpretación (22 días)




Clasificación de los casos de Cáncer de Cuello Uterino por etapa 2010-2014





Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino en la SS



Tasa de detección: 5.1
por 1000 estudios

- 5.6 en mujeres de 25 a 34 con citología
- 6.5 en mujeres de 35 a 64 con citología
- 3.1 con prueba de VPH



Programa de prevención y control en México

- ✓ Disminución de la mortalidad en más del 30% entre 2000 y 2015
- ✓ Tratamiento gratuito a todas las mujeres en las Instituciones de Seguridad Social y a través del Seguro Popular
- ✓ Inclusión de la vacuna contra VPH en el esquema de vacunación universal
- ✓ Incorporación de pruebas de alta tecnología para detección temprana



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



www.cnegsr.salud.gob.mx