Cuaterniones

Ricardo Victoria

octubre 2027

1. Conceptos

Los cuaterniones números hipercomplejos, son una extensión de los números complejos hacia un espacio de cuatro dimensiones, compuestos por una parte real y tres partes imaginarias distintas (i, j y k).

Un cuaternión se puede ver así:

$$a + bi + cj + dk \tag{1}$$

donde i, j y k son tres números imaginarios distintos; $a, b, c, d \in \mathbb{R}$; y los términos con i, j y k son las tres partes imaginarias distintas.

Si te preguntas, cuánto vale exactamente i, cuánto vale exactamente j y cuánto vale exactamente k en un cuaternión; la respuesta es que i, j y k ya son los valores exactos. Son elementos base irreductibles de este sistema algebraico de cuaterniones. En cuaterniones, $i \neq \sqrt{-1}$, sólo $i = i$, no se puede reducir a más, tampoco j y k se pueden reducir más.

Existe una relación muy importante entre esos 3 números imaginarios que define a los cuaterniones, y esa relación es la siguiente:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \tag{2}$$

Ojo. La ecuación anterior no implica que:

$$i = j = k = \sqrt{-1} \tag{3}$$

Pues, como se mencionó anteriormente, i, j y k no se pueden reducir más, no son variables que toman un valor en el conjunto de los números reales ni imaginarios. i, j y k son los llamados números **hipercomplejos**, un cuaternión es un número hipercomplejo.

Ahora bien, a pesar de que i, j y k no se pueden reducir a más, lo que sí podemos hacer es representarlos usando vectores de cuatro dimensiones. Podemos representarlas entonces como sigue:

$$i = (0, 1, 0, 0) \tag{4}$$
$$j = (0, 0, 1, 0) \tag{5}$$
$$k = (0, 0, 0, 1) \tag{6}$$

Y si quisiéramos representar a un número real (digamos, el número 1) como un vector de cuatro dimensiones también, entonces lo representaríamos así:

$$1 = (1, 0, 0, 0) \tag{7}$$

Usamos los cuaterniones porque, en robótica y en otras áreas (videojuegos y modelado 3D), nos permiten hacer **rotaciones** de objetos dentro de un espacio tridimensional. Al ser los cuaterniones objetos matemáticos de 4 dimensiones, nos permiten hacer estas rotaciones de forma mucho **más eficiente computacionalmente**. Al aplicar un cuaternión en sistemas de coordenadas, las partes imaginarias i, j y k las interpretamos como coordenadas en los ejes x, y y z en un espacio tridimensional. Es decir, aunque los cuaterniones son objetos de 4 dimensiones, les damos una aplicación en nuestro mundo de 3 dimensiones.

1.1. Representaciones de un Cuaternión

Entonces, un cuaternión es un llamado número **hipercomplejo**, pues consiste de una parte real y tres partes imaginarias distintas. Nótese que un cuaternión tiene 4 componentes.

Luego entonces, podemos representar a un cuaternión de las siguientes formas:

- Como un **Vector de Cuatro Componentes**.

$$(a, b, c, d)$$

- Como una **Extensión de los Números Complejos**, como un **Número Hipercomplejo**, es decir, muy similar a como se representan los

números complejos.

$$a + bi + cj + dk$$

- Como la **Unión de un Escalar y un Vector con Tres Componentes**.

$$\begin{aligned} &a + (b, c, d) \\ &= a + \vec{z} \end{aligned}$$

con $\vec{z} = (b, c, d)$

- Como un **Par ordenado de partes real e imaginaria**.

$$\begin{aligned} &(a, (b, c, d)) \\ &= (a, \vec{z}) \end{aligned}$$

con $\vec{z} = (b, c, d)$

Nótese que todas las notaciones anteriores son representaciones diferentes **de un mismo** objeto matemático con 4 componentes.

Nótese también que en todas las representaciones anteriores que tienen el símbolo +, el símbolo + no es una suma aritmética (e.g. no puedes sumar un escalar con un vector), es una *suma formal*. Una *suma formal* es una expresión que utiliza el símbolo de suma (+) para agrupar elementos (como símbolos, vectores, monomios o series) como una estructura algebraica, sin que exista necesariamente una operación numérica de adición calculable entre ellos. Es exactamente el mismo principio que se usa en los números complejos ($z = a + bi$). El operador + no pide que sumes a con bi, sino que los mantiene juntos como las dos dimensiones independientes de un solo número complejo. En el cuaternión, el + separa la dimensión real de las tres dimensiones imaginarias/vectoriales.

Nota: En cuaterniones, el número i es un cuaternión cuya parte real es cero y cuyas partes imaginarias j y k también son cero, excepto la parte con i, que vale 1.

$$i = 0 + 1i + 0j + 0k$$

1.1.1. Notación

Conociendo las diferentes formas en las que se puede representar un cuaternion mostrando sus 4 componentes, también podemos representar a un cuaternión con un sólo símbolo como sigue:

$$\tilde{q} \tag{8}$$

Es decir, podemos representar a un cuaternion (sus cuatro componentes) con una letra con virgulilla.

Entonces tenemos:

$$\tilde{q} = (q_0, q_1, q_2, q_3) = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k = q_0 + \vec{q} = (q_0, \vec{q}) \tag{9}$$

donde $\vec{q} = (q_1, q_2, q_3)$.

2. Operaciones en Cuaterniones

Podemos aplicar operaciones en los cuaterniones. Podemos sumar, multiplicar (equivalente al producto cruz) y aplicar el producto punto entre cuaterniones. También podemos calcular la norma y obtener el conjugado de un cuaternión.

No se cumple la conmutatividad en el producto de cuaterniones. Sin embargo, sí se cumple la distributividad.

En las siguientes subsecciones, veremos cómo aplicar estas operaciones.

2.1. Operaciones entre las Componentes Imaginarias

Para poder aplicar operaciones en cuaterniones, primero debemos saber cómo operar entre las componentes imaginarias. Es decir, necesitamos saber qué va a pasar cuando multipliquemos, por ejemplo, ij, o qué devolverá el producto ji, o el producto kj.

Las respuestas se obtienen de la relación:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \tag{10}$$

A partir de esta relación fundamental, podemos deducir paso a paso el resultado de estas multiplicaciones. Por ejemplo, para encontrar el valor de ij,

tomamos la ecuación $ijk = -1$ y multiplicamos ambos lados por la derecha por k:

$$(ijk)k = -1(k)$$
$$ij(k^2) = -k$$

Sabiendo que $k^2 = -1$, sustituimos y simplificamos:

$$ij(-1) = -k$$
$$ij = k$$

Dado que en los cuaterniones la multiplicación de diferentes componentes imaginarias es anticonmutativa, invertir el orden de los factores cambia el signo del resultado. Por lo tanto, si $ij = k$, deducimos directamente que $ji = -k$.

De manera análoga, utilizando las mismas relaciones cíclicas, podemos encontrar que $kj = -i$.

Para simplificar el cálculo y no tener que hacer estas deducciones cada vez, la siguiente tabla resume todas las posibles operaciones y resultados al multiplicar las componentes imaginarias en cuaterniones:

	i	j	k
i	-1	k	$-j$
j	$-k$	-1	i
k	j	$-i$	-1

Cuadro 1: Tabla resumen de la multiplicación de componentes imaginarias.

Esta tabla se lee cruzando el primer factor (ubicado en la primera columna) con el segundo factor (ubicado en la primera fila). Como resumen, nos muestra que cualquier componente multiplicada por sí misma resulta en -1, y multiplicada por otra distinta resulta en la tercera componente, con signo positivo o negativo dependiendo del orden de la multiplicación.

2.2. Suma

La suma de dos cuaterniones se realiza de manera directa operando componente a componente. Es decir, sumamos las partes reales entre sí, y cada una de las respectivas componentes imaginarias (i, j, k) con sus homólogas. Operativamente, este procedimiento es idéntico a la suma de vectores en $\mathbb{R}^4$.

Dados dos cuaterniones $\tilde{q_1}$ y $\tilde{q_2}$ de la forma:

$$\tilde{q_1} = a_1 + b_1 i + c_1 j + d_1 k$$
$$\tilde{q_2} = a_2 + b_2 i + c_2 j + d_2 k$$

Su suma se define por la siguiente expresión:

$$\tilde{q_1} + \tilde{q_2} = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i + (c_1 + c_2)j + (d_1 + d_2)k \tag{11}$$

Ejemplo:

Consideremos los cuaterniones $\tilde{q_1} = 3+2i-5j+k$ y $\tilde{q_2} = -1+4i+2j-3k$. Para calcular la suma, simplemente agrupamos y reducimos los términos correspondientes:

$$\tilde{q_1} + \tilde{q_2} = (3-1) + (2+4)i + (-5+2)j + (1-3)k$$
$$\tilde{q_1} + \tilde{q_2} = 2 + 6i - 3j - 2k$$

2.3. Producto

Existen principalemente tres formas de hacer una multiplicación entre cuaterniones, las tres son equivalentes:

- Como un producto entre polinomios
- Como escalar y vector
- Como una matriz por un vector

2.3.1. Producto de Dos Polinomios

El producto de cuaterniones se puede calcular tratándolos como polinomios de cuatro términos. Para realizar la operación, se aplica la propiedad distributiva término a término, lo que resulta en 16 multiplicaciones individuales. Finalmente, se simplifica la expresión agrupando términos semejantes

tras sustituir los productos de las componentes imaginarias de acuerdo con la tabla de multiplicación fundamental (por ejemplo, $i^2 = -1$, $ij = k$, $ji = -k$).

Sean $q_1 = a_1 + b_1 i + c_1 j + d_1 k$ y $q_2 = a_2 + b_2 i + c_2 j + d_2 k$. Su producto $q_1 q_2$ se desarrolla de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} q_1 q_2 &= (a_1 + b_1 i + c_1 j + d_1 k)(a_2 + b_2 i + c_2 j + d_2 k) \\ &= a_1 a_2 + a_1 b_2 i + a_1 c_2 j + a_1 d_2 k \\ &\quad + b_1 a_2 i + b_1 b_2 i^2 + b_1 c_2 ij + b_1 d_2 ik \\ &\quad + c_1 a_2 j + c_1 b_2 ji + c_1 c_2 j^2 + c_1 d_2 jk \\ &\quad + d_1 a_2 k + d_1 b_2 ki + d_1 c_2 kj + d_1 d_2 k^2 \end{aligned}$$

Al sustituir las identidades de las componentes imaginarias ($i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k$, $ji = -k$, etc.) y agrupar por cada componente, obtenemos la fórmula general:

$$\begin{aligned} q_1 q_2 = &(a_1 a_2 - b_1 b_2 - c_1 c_2 - d_1 d_2) \\ &+ (a_1 b_2 + b_1 a_2 + c_1 d_2 - d_1 c_2) i \\ &+ (a_1 c_2 - b_1 d_2 + c_1 a_2 + d_1 b_2) j \\ &+ (a_1 d_2 + b_1 c_2 - c_1 b_2 + d_1 a_2) k \end{aligned}$$

Ejemplo:

Dados los cuaterniones $q_1 = 2 + i + j$ y $q_2 = 1 - i + k$. (Notemos que $d_1 = 0$ y $c_2 = 0$).

$$\begin{aligned} q_1 q_2 &= (2 + i + j)(1 - i + k) \\ &= 2(1 - i + k) + i(1 - i + k) + j(1 - i + k) \\ &= 2 - 2i + 2k + i - i^2 + ik + j - ji + jk \end{aligned}$$

Aplicando las reglas de multiplicación de componentes imaginarias ($i^2 = -1$, $ik = -j$, $ji = -k$, $jk = i$):

$$\begin{aligned} q_1 q_2 &= 2 - 2i + 2k + i - (-1) + (-j) + j - (-k) + i \\ &= 2 - 2i + 2k + i + 1 - j + j + k + i \end{aligned}$$

Agrupando las partes reales y las componentes i, j, k:

$$\begin{aligned} q_1 q_2 &= (2+1) + (-2+1+1)i + (-1+1)j + (2+1)k \\ q_1 q_2 &= 3 + 0i + 0j + 3k \\ q_1 q_2 &= 3 + 3k \end{aligned}$$

2.3.2. Como Escalar y Vector

Una representación alternativa y muy compacta consiste en separar el cuaternión en una parte escalar $s \in \mathbb{R}$ y una parte vectorial $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$. De esta forma, un cuaternión $q = a + bi + cj + dk$ se expresa como $q = (s, \mathbf{v})$, donde $s = a$ y $\mathbf{v} = (b, c, d)$.

Esta notación es especialmente útil en cinemática y robótica para representar rotaciones espaciales, ya que permite expresar la multiplicación utilizando operaciones vectoriales tridimensionales estándar: el producto punto ($\cdot$) y el producto cruz ($\times$).

Dados dos cuaterniones $q_1 = (s_1, \mathbf{v}_1)$ y $q_2 = (s_2, \mathbf{v}_2)$, su producto (conocido como producto de Hamilton) se define de la siguiente manera:

$$q_1 q_2 = \big(s_1 s_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \,,\; s_1 \mathbf{v}_2 + s_2 \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\big) \tag{12}$$

El primer término resultante ($s_1 s_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$) corresponde a la nueva parte escalar, y el segundo término ($s_1 \mathbf{v}_2 + s_2 \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$) corresponde a la nueva parte vectorial.

Ejemplo:

Sean los cuaterniones $q_1 = 1 + 2i + k$ y $q_2 = i + j - k$.

Primero, los reescribimos en forma escalar y vectorial:

$$\begin{aligned} q_1 &= (1, \mathbf{v}_1) \quad \text{donde} \quad \mathbf{v}_1 = (2, 0, 1) \\ q_2 &= (0, \mathbf{v}_2) \quad \text{donde} \quad \mathbf{v}_2 = (1, 1, -1) \end{aligned}$$

Ahora, calculamos los componentes necesarios para la fórmula:

1. **Producto de escalares:** $s_1 s_2 = (1)(0) = 0$
2. **Producto punto:** $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = (2)(1) + (0)(1) + (1)(-1) = 2 + 0 - 1 = 1$

3. **Escalado de vectores:**

$$s_1\mathbf{v}_2 = 1(1,1,-1) = (1,1,-1)$$
$$s_2\mathbf{v}_1 = 0(2,0,1) = (0,0,0)$$

4. **Producto cruz:**

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= i(0-1) - j(-2-1) + k(2-0) \\ &= -i + 3j + 2k \quad \text{que equivale al vector } (-1,3,2)\end{aligned}$$

Sustituimos estos resultados en la fórmula general:

$$q_1 q_2 = \big(0 - 1\,,\ (1,1,-1) + (0,0,0) + (-1,3,2)\big)$$
$$q_1 q_2 = \big(-1\,,\ (0,4,1)\big)$$

Finalmente, devolviendo el resultado a la notación polinomial estándar, obtenemos:

$$q_1 q_2 = -1 + 4j + k$$

2.3.3. Como una Matriz por un Vector

Dado que la multiplicación por un cuaternión fijo es una transformación lineal en $\mathbb{R}^4$, el producto de dos cuaterniones $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ se puede escribir como el producto de una matriz por un vector. Dependiendo de cuál cuaternión se utilice para construir la matriz de 4×4, existen dos formas equivalentes de realizar esta operación.

Consideremos los cuaterniones definidos por sus componentes como $\tilde{p} = p_0 + p_1 i + p_2 j + p_3 k$ y $\tilde{q} = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$.

Primera forma: Matriz basada en el operando izquierdo ($\tilde{p}$)
El producto se puede expresar construyendo la matriz a partir de los componentes de $\tilde{p}$ y multiplicándola por el vector columna de $\tilde{q}$, lo cual se denota como $\tilde{p}^{\times}\tilde{q}$:

$$\tilde{p}\tilde{q} = \begin{bmatrix} p_0 & -p_1 & -p_2 & -p_3 \\ p_1 & p_0 & -p_3 & p_2 \\ p_2 & p_3 & p_0 & -p_1 \\ p_3 & -p_2 & p_1 & p_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \tilde{p}^{\times}\tilde{q} \tag{13}$$

Ejemplo 1:
Sean $\tilde{p} = 1 + 2i + 0j - k$ (donde $p_0 = 1, p_1 = 2, p_2 = 0, p_3 = -1$) y $\tilde{q} = 0 + i + 2j + k$ (donde $q_0 = 0, q_1 = 1, q_2 = 2, q_3 = 1$). Sustituyendo en la primera forma:

$$\tilde{p}\tilde{q} = \begin{bmatrix} 1 & -(2) & -(0) & -(-1) \\ 2 & 1 & -(-1) & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -(2) \\ -1 & -(0) & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (1)(0) + (-2)(1) + (0)(2) + (1)(1) \\ (2)(0) + (1)(1) + (1)(2) + (0)(1) \\ (0)(0) + (-1)(1) + (1)(2) + (-2)(1) \\ (-1)(0) + (0)(1) + (2)(2) + (1)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

El resultado corresponde al cuaternión $-1 + 3i - j + 5k$.

Segunda forma: Matriz basada en el operando derecho ($\tilde{q}$)
También es posible escribirlo construyendo la matriz a partir de los componentes de $\tilde{q}$ y multiplicándola por el vector columna de $\tilde{p}$. Esto se denota como ${}^{\times}\tilde{q}\tilde{p}$:

$$\tilde{p}\tilde{q} = \begin{bmatrix} q_0 & -q_1 & -q_2 & -q_3 \\ q_1 & q_0 & q_3 & -q_2 \\ q_2 & -q_3 & q_0 & q_1 \\ q_3 & q_2 & -q_1 & q_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = {}^{\times}\tilde{q}\tilde{p} \tag{14}$$

Ejemplo 2:
Utilizando los mismos cuaterniones del ejemplo anterior, $\tilde{p} = 1+2i+0j-k$ y $\tilde{q} = 0+i+2j+k$, aplicamos la segunda forma para comprobar que llegamos al mismo resultado:

$$\tilde{p}\tilde{q} = \begin{bmatrix} 0 & -(1) & -(2) & -(1) \\ 1 & 0 & 1 & -(2) \\ 2 & -(1) & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -(1) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (0)(1) + (-1)(2) + (-2)(0) + (-1)(-1) \\ (1)(1) + (0)(2) + (1)(0) + (-2)(-1) \\ (2)(1) + (-1)(2) + (0)(0) + (1)(-1) \\ (1)(1) + (2)(2) + (-1)(0) + (0)(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Como se observa, obtenemos exactamente el mismo vector columna, demostrando que ambas representaciones matriciales son equivalentes.

2.4. Conjugado

El conjugado de un cuaternión se obtiene cambiando el signo de todas sus componentes imaginarias, manteniendo intacta su parte escalar o real. Esta operación geométrica y algebraica es análoga al conjugado de un número complejo. Comúnmente se denota con un asterisco (q^*) o con una barra superior ($\bar{q}$).

Dado un cuaternión $q = a + bi + cj + dk$, su conjugado se define formalmente como:

$$q^* = a - bi - cj - dk \tag{15}$$

Si utilizamos la notación escalar-vectorial introducida anteriormente, donde $q = (s, \mathbf{v})$, el conjugado se expresa de forma muy directa invirtiendo el sentido del vector tridimensional:

$$q^* = (s, -\mathbf{v}) \tag{16}$$

El conjugado es una operación fundamental porque facilita la división entre cuaterniones al permitirnos calcular el inverso multiplicativo. Sabiendo que el producto de un cuaternión por su conjugado nos da el cuadrado de su norma ($qq^* = \|q\|^2$), el inverso de cualquier cuaternión no nulo se obtiene mediante la expresión $q^{-1} = \frac{q^*}{\|q\|^2}$.

Además, en el contexto de cinemática y navegación espacial en robótica, el conjugado de un cuaternión unitario es sumamente útil, ya que representa matemáticamente la rotación inversa a la que describe el cuaternión original.

Ejemplo:

Consideremos el cuaternión $q = 5-3i+2j-k$. Para obtener su conjugado, conservamos el 5 y simplemente invertimos el signo de las componentes que acompañan a i, j y k:

$$q^* = 5 - (-3)i - (2)j - (-1)k$$
$$q^* = 5 + 3i - 2j + k$$

2.5. Producto Punto

El producto punto (o producto escalar euclidiano) entre dos cuaterniones consiste en operarlos como si fueran vectores estándar en un espacio de cuatro dimensiones ($\mathbb{R}^4$). A diferencia de la multiplicación de Hamilton que vimos anteriormente, el producto punto devuelve un número real (un escalar) y sí cumple con la propiedad conmutativa ($q_1 \cdot q_2 = q_2 \cdot q_1$).

Dados dos cuaterniones $q_1 = a_1 + b_1 i + c_1 j + d_1 k$ y $q_2 = a_2 + b_2 i + c_2 j + d_2 k$, su producto punto se calcula multiplicando componente a componente y sumando los resultados:

$$q_1 \cdot q_2 = a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 + d_1 d_2 \tag{17}$$

Existe una relación algebraica fundamental entre este producto escalar y el producto de cuaterniones, ya que el producto punto equivale a extraer la parte real del producto de un cuaternión por el conjugado del otro:

$$q_1 \cdot q_2 = \mathrm{Re}(q_1 q_2^*) = \mathrm{Re}(q_1^* q_2) \tag{18}$$

Ejemplo:

Consideremos los cuaterniones $q_1 = 3 - 2i + j + 4k$ y $q_2 = 1 + 5i - 2j + 3k$. Para calcular su producto punto, operamos sus respectivas componentes escalares e imaginarias:

$$\begin{aligned} q_1 \cdot q_2 &= (3)(1) + (-2)(5) + (1)(-2) + (4)(3) \\ q_1 \cdot q_2 &= 3 - 10 - 2 + 12 \\ q_1 \cdot q_2 &= 3 \end{aligned}$$

Como era de esperarse, el resultado es el número escalar 3.

2.6. Norma

La norma (o magnitud) de un cuaternión representa su longitud métrica en el espacio euclidiano de cuatro dimensiones ($\mathbb{R}^4$). Se denota comúnmente como $\|q\|$ o $|q|$, y se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas sus componentes (reales e imaginarias).

Dado un cuaternión $q = a + bi + cj + dk$, su norma se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\|q\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \tag{19}$$

Esta operación está directamente relacionada con el producto punto que definimos en la sección anterior, así como con el conjugado de un cuaternión (q^*), cumpliéndose la siguiente identidad fundamental:

$$\|q\| = \sqrt{q \cdot q} = \sqrt{q q^*} \tag{20}$$

Cabe destacar que cuando $\|q\| = 1$, el cuaternión recibe el nombre de *cuaternión unitario*. Estos son de particular importancia en cinemática y robótica, ya que se utilizan para representar rotaciones espaciales puras sin aplicar ningún factor de escala.

Ejemplo:

Sea el cuaternión $q = 1+2i-2j+4k$. Para encontrar su norma, elevamos cada una de sus componentes al cuadrado, las sumamos y extraemos la raíz cuadrada del resultado:

$$\begin{aligned}\|q\| &= \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (-2)^2 + (4)^2} \\ \|q\| &= \sqrt{1 + 4 + 4 + 16} \\ \|q\| &= \sqrt{25} \\ \|q\| &= 5\end{aligned}$$

2.7. No Conmutatividad

A diferencia de los números reales y los números complejos, la multiplicación de cuaterniones no es conmutativa. Esto significa que, en general, el producto de dos cuaterniones depende estrictamente del orden en que se aplican los factores:

$$q_1 q_2 \neq q_2 q_1 \tag{21}$$

Esta propiedad se origina directamente en las reglas de multiplicación de sus componentes imaginarias base. Como detallamos en la tabla de operaciones, multiplicar elementos imaginarios distintos es una operación anticonmutativa; cambiar el orden invierte el signo del resultado (por ejemplo, $ij = k$, pero $ji = -k$).

Ejemplo:

Para demostrar esta propiedad de la manera más sencilla, consideremos dos cuaterniones puramente imaginarios: $q_1 = i$ y $q_2 = j$.

Si realizamos la multiplicación en un orden, obtenemos:

$$q_1 q_2 = (i)(j) = k$$

Pero si invertimos el orden de los factores, el resultado cambia de signo:

$$q_2 q_1 = (j)(i) = -k$$

Es evidente que $k \neq -k$, lo que demuestra formalmente que la operación no conmuta.

Implicación Física y Geométrica:
Lejos de ser una limitación matemática, esta característica algebraica es una representación precisa de la realidad física. Al modelar la cinemática de un cuerpo rígido o calcular la odometría y trayectoria de un robot móvil, los cuaterniones se utilizan para describir rotaciones espaciales. En el espacio tridimensional, rotar un objeto primero alrededor del eje X y luego alrededor del eje Y no produce la misma orientación final que si se realizaran las mismas rotaciones en orden inverso. La no conmutatividad del producto de cuaterniones captura matemáticamente este fenómeno secuencial de forma exacta.

2.8. Distributividad

A diferencia de la conmutatividad, los cuaterniones sí cumplen de manera estricta con la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Debido a que el producto no es conmutativo, es importante distinguir y respetar que esta propiedad se cumple de forma independiente tanto por la izquierda como por la derecha.

Dados tres cuaterniones cualesquiera q_1, q_2 y q_3, se satisfacen las siguientes igualdades:

- **Distributividad por la izquierda:**

$$q_1(q_2 + q_3) = q_1q_2 + q_1q_3 \tag{22}$$

- **Distributividad por la derecha:**

$$(q_1 + q_2)q_3 = q_1q_3 + q_2q_3 \tag{23}$$

Esta propiedad es fundamental al realizar manipulaciones algebraicas complejas, ya que nos permite factorizar y expandir expresiones polinomiales o matriciales con cuaterniones de manera segura, siempre y cuando seamos cuidadosos de no alterar el orden de los factores al distribuir.

Ejemplo:

Comprobemos la distributividad por la izquierda utilizando tres cuaterniones sencillos: $q_1 = 2i$, $q_2 = 1 + j$ y $q_3 = 3k$.

Primero, evaluamos el lado izquierdo de la igualdad sumando $q_2 + q_3$ y luego multiplicando el resultado por q_1:

$$\begin{aligned} q_1(q_2 + q_3) &= 2i\left((1 + j) + (3k)\right) \\ &= 2i\,(1 + j + 3k) \\ &= 2i(1) + 2i(j) + 2i(3k) \end{aligned}$$

Aplicando las reglas de los productos imaginarios ($ij = k$, $ik = -j$):

$$\begin{aligned} q_1(q_2 + q_3) &= 2i + 2k + 6(-j) \\ &= 2i - 6j + 2k \end{aligned}$$

Ahora, evaluamos el lado derecho distribuyendo primero la multiplicación y luego sumando ambos resultados:

$$\begin{aligned} q_1q_2 + q_1q_3 &= (2i)(1 + j) + (2i)(3k) \\ &= (2i + 2ij) + 6ik \\ &= (2i + 2k) + 6(-j) \\ &= 2i - 6j + 2k \end{aligned}$$

Como podemos observar, ambos caminos conducen exactamente al mismo resultado, demostrando formalmente que $q_1(q_2 + q_3) = q_1q_2 + q_1q_3$.

2.9. Producto de un Cuaternión por su Conjugado

Multiplicar un cuaternión por su conjugado es una operación notable, ya que todos los términos imaginarios se cancelan, resultando siempre en un número real puro y no negativo.

Sea un cuaternión general $q = a + bi + cj + dk$, cuyo conjugado está dado por $q^* = a - bi - cj - dk$. El producto qq^* se desarrolla aplicando la propiedad distributiva:

$$\begin{aligned} qq^* &= (a + bi + cj + dk)(a - bi - cj - dk) \\ &= a^2 - abi - acj - adk \\ &\quad + bai - b^2i^2 - bcij - bdik \\ &\quad + cai - cbji - c^2j^2 - cdjk \\ &\quad + dai - dbki - dckj - d^2k^2 \end{aligned}$$

Dado que los coeficientes escalares a, b, c, d pertenecen a los números reales (y por lo tanto conmutan entre sí), podemos agrupar y cancelar directamente todos los términos cruzados que involucran a a (por ejemplo, $-abi+bai = 0$). La expresión se simplifica a:

$$\begin{aligned} qq^* = a^2 - b^2i^2 - c^2j^2 - d^2k^2 \\ - bc(ij + ji) - bd(ik + ki) - cd(jk + kj) \end{aligned}$$

Recordando la anticonmutatividad de la multiplicación de componentes imaginarias ($ij = -ji$, $ik = -ki$, $jk = -kj$), sabemos que la suma de cada par cruzado es cero (por ejemplo, $ij + ji = k - k = 0$). Sustituyendo esto, junto con las identidades de los cuadrados ($i^2 = j^2 = k^2 = -1$), obtenemos:

$$\begin{aligned} qq^* &= a^2 - b^2(-1) - c^2(-1) - d^2(-1) \\ qq^* &= a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \end{aligned}$$

Este resultado es idéntico a la suma de los cuadrados de las componentes de q, lo que demuestra la relación fundamental con su magnitud:

$$qq^* = q^*q = \|q\|^2 \tag{24}$$

2.10. Inverso de un Cuaternión

Todo cuaternión no nulo ($q \neq 0$) posee un inverso multiplicativo, denotado como q^{-1}, el cual cumple con la condición de que al multiplicarse por el cuaternión original el resultado es el elemento neutro (el número 1):

$$qq^{-1} = q^{-1}q = 1 \tag{25}$$

Para deducir la fórmula matemática de este inverso, utilizamos directamente la propiedad demostrada en la subsección anterior respecto al producto de un cuaternión por su conjugado:

$$qq^* = \|q\|^2 \tag{26}$$

Dado que q es distinto de cero, el cuadrado de su norma ($\|q\|^2$) es un número real estrictamente positivo mayor a cero. Por lo tanto, podemos dividir ambos lados de la igualdad entre este valor escalar:

$$\frac{qq^*}{\|q\|^2} = \frac{\|q\|^2}{\|q\|^2} \tag{27}$$

Simplificando el lado derecho y aplicando la propiedad asociativa para aislar a q en el lado izquierdo:

$$q\left(\frac{q^*}{\|q\|^2}\right) = 1 \tag{28}$$

Al comparar esta expresión directamente con la definición del inverso multiplicativo ($qq^{-1} = 1$), deducimos que el término entre paréntesis corresponde exactamente a q^{-1}. Esto nos da la fórmula general:

$$q^{-1} = \frac{q^*}{\|q\|^2} \tag{29}$$

Ejemplo:
Encontremos el inverso del cuaternión $q = 1 + 2i - j + k$.
Primero, obtenemos su conjugado y calculamos el cuadrado de su norma:

$$\begin{aligned} q^* &= 1 - 2i + j - k \\ \|q\|^2 &= (1)^2 + (2)^2 + (-1)^2 + (1)^2 = 1 + 4 + 1 + 1 = 7 \end{aligned}$$

Ahora, sustituimos estos valores en la fórmula deducida, dividiendo cada componente del conjugado entre el escalar 7:

$$\begin{aligned} q^{-1} &= \frac{1 - 2i + j - k}{7} \\ q^{-1} &= \frac{1}{7} - \frac{2}{7}i + \frac{1}{7}j - \frac{1}{7}k \end{aligned}$$

Para comprobarlo mentalmente, si multiplicamos qq^{-1}, obtendremos $\frac{7}{7} = 1$.

2.11. Conjugado del Producto de Dos Cuaterniones

Una de las propiedades algebraicas más importantes de los cuaterniones es que el conjugado de un producto es igual al producto de los conjugados, pero en **orden inverso**. Matemáticamente, para dos cuaterniones cualesquiera p y q, esto se expresa como:

$$(pq)^* = q^*p^* \tag{30}$$

Para demostrar esta propiedad en abstracto, resulta muy conveniente utilizar la representación de escalar y vector. Sean los cuaterniones $p = (s_1, \mathbf{v}_1)$ y $q = (s_2, \mathbf{v}_2)$.

Primero, calculamos el producto pq con el producto de Hamilton y luego le aplicamos el conjugado (que, por definición, consiste en invertir el signo de la parte vectorial):

$$\begin{aligned} pq &= \big(s_1 s_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2\,,\ s_1\mathbf{v}_2 + s_2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\big) \\ (pq)^* &= \big(s_1 s_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2\,,\ -s_1\mathbf{v}_2 - s_2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\big) \end{aligned}$$

Ahora, evaluamos el lado derecho de la igualdad multiplicando los conjugados invertidos. Sabemos que los conjugados individuales son $q^* = (s_2, -\mathbf{v}_2)$ y $p^* = (s_1, -\mathbf{v}_1)$. Al multiplicarlos obtenemos:

$$q^*p^* = \big(s_2 s_1 - (-\mathbf{v}_2) \cdot (-\mathbf{v}_1)\,,\ s_2(-\mathbf{v}_1) + s_1(-\mathbf{v}_2) + (-\mathbf{v}_2) \times (-\mathbf{v}_1)\big)$$

Para simplificar esta expresión, aplicamos las propiedades de las operaciones de vectores en $\mathbb{R}^3$:

- El producto de escalares es conmutativo: $s_2 s_1 = s_1 s_2$
- El producto punto es conmutativo: $(-\mathbf{v}_2) \cdot (-\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$
- El producto cruz es anticonmutativo: $(-\mathbf{v}_2) \times (-\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_1 = -(\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)$

Sustituyendo estas equivalencias en nuestra ecuación de q^*p^*, reordenamos los términos:

$$\begin{aligned} q^*p^* &= \big(s_1 s_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2\,,\ -s_2\mathbf{v}_1 - s_1\mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)\big) \\ &= \big(s_1 s_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2\,,\ -s_1\mathbf{v}_2 - s_2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\big) \end{aligned}$$

Al comparar ambos desarrollos, resulta evidente que la expresión resultante es idéntica, quedando demostrado formalmente que $(pq)^* = q^*p^*$.

Implicación en Cinemática:
Esta propiedad geométrica es indispensable al trabajar con la cinemática de manipuladores seriales o en la odometría de robots móviles. Si el producto pq representa una concatenación de dos rotaciones en el espacio, su conjugado $(pq)^*$ representa deshacer esa rotación combinada para volver a la orientación original. Algebraicamente, esto se logra aplicando q^*p^*: es decir, deshaciendo primero la última rotación que se aplicó (p^*) y posteriormente deshaciendo la primera (q^*).

3. Representación de Rotaciones Espaciales

La aplicación más importante de los cuaterniones en la computación gráfica y la robótica es la representación de rotaciones tridimensionales. A diferencia de las matrices de rotación o los ángulos de Euler, los cuaterniones unitarios (aquellos cuya norma es $\|q\| = 1$) evitan el problema del *Gimbal Lock* (bloqueo del cardán), son más eficientes computacionalmente y permiten realizar interpolaciones esféricas (SLERP) de forma suave al calcular trayectorias.

3.1. Ángulos de Euler: Roll, Pitch y Yaw

Antes de introducir la fórmula con cuaterniones, es fundamental comprender la notación estándar de orientación utilizando ángulos de Euler, comúnmente llamada convención Roll-Pitch-Yaw. Esta convención describe la orientación de un cuerpo rígido en el espacio mediante tres rotaciones sucesivas alrededor de los ejes de un sistema de coordenadas de referencia:

- **Roll (Alabeo - ϕ):** Es la rotación alrededor del eje X. En un vehículo, describe la inclinación lateral (de lado a lado).
- **Pitch (Cabeceo - θ):** Es la rotación alrededor del eje Y. Describe la inclinación hacia adelante o hacia atrás.
- **Yaw (Guiñada - ψ):** Es la rotación alrededor del eje Z. En el cálculo de la odometría de una base móvil, este es el ángulo más importante, ya que define hacia dónde está apuntando (girando) en el plano horizontal.




Figura 1: Ángulos de Euler.

Es decir, para rotar un objeto utilizando los ángulos de Euler, debes de girar tres veces tu objeto: alrededor del eje x, alrededor del eje y, y al rededor del eje z. Con esos tres giros se alcanza la rotación final buscada (casi siempre).

Los ángulos de Euler tienen una debilidad, y es que, además de que los cuaterniones son más rápidos computacionalmente que los ángulos de Euler, resulta que los últimos tienen un error llamado **the gimbal lock**. **The gimbal lock** (bloqueo de Cardán) consiste en que cuando dos ángulos se sobreponen entre sí, se pierde un grado de libertad (ya no puedes girar alrededor de tres ejes, sino de dos ejes).




Figura 2: The gimbal lock, los ejes rojo y azul se sobreponen, por lo que se pierde un grado de libertad.

3.2. Cómo se rota con Cuaterniones

Los cuaterniones funcionan de una manera muy inteligente para rotar objetos. A diferencia de los ángulos de Euler donde se hacen tres rotaciones (sobre los ejes x, y, z) para alcanzar la posición final de la rotación; en cuaterniones sólo se hace un rotación.

Para rotar con cuaterniones necesitas dos cosas: un vector unitario ($\vec{v}$) y un ángulo de rotación (θ). Este vector unitario y el ángulo de rotación los definimos nosotros. Lo que se busca es rotar al objeto al rededor del vector unitario una cantidad del ángulo de rotación (rotar al objeto θ grados al rededor de $\vec{v}$). Con esa única rotación se puede alcanzar cualquier posición de rotación.




Figura 3: Objeto que se rota al rededor de un vector.

3.3. Rotación de un Vector con Cuaterniones

En esta subsección, explicaremos cómo rotar un vector utilizando cuaterniones.

Cuando mencionamos que queremos rotar un objeto, lo que realmente estamos buscando es obtener las coordenadas del objeto rotado respecto al sistema de coordenadas del mundo. Esto se puede hacer sólo rotando un vector (que representa el sistema de coordenadas del objeto) y luego obteniendo las coordenadas de este vector respecto al marco de referencia del mundo.

Para rotar un vector tridimensional $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ un ángulo θ alrededor de un eje de rotación arbitrario definido por un vector unitario $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$,

utilizamos un cuaternión unitario q.

El cuaternión q que codifica esta rotación se construye de la siguiente manera utilizando la notación escalar-vectorial:

$$q = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \mathbf{u}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \tag{31}$$

En su forma polinomial, esto equivale a:

$$q = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \left(u_x \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) i + \left(u_y \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) j + \left(u_z \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) k \tag{32}$$

Para aplicar la rotación al vector $\mathbf{v}$, primero debemos convertir dicho vector en un cuaternión puramente imaginario (es decir, con parte escalar igual a cero): $v_q = 0 + v_x i + v_y j + v_z k$.

Luego, el vector rotado $\mathbf{v}'$ se obtiene mediante el **producto de emparedado** (sandwich product) utilizando el cuaternión q y su conjugado q^*:

$$v'_q = q v_q q^* \tag{33}$$

El resultado v'_q será otro cuaternión puramente imaginario, cuyas componentes vectoriales corresponderán al vector $\mathbf{v}'$ rotado.

Ejemplo:

Imaginemos que estamos analizando la cinemática de un robot y queremos rotar un vector de posición inicial $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$ (apuntando a lo largo del eje X) aplicando un giro de 90° ($\frac{\pi}{2}$ radianes) puramente en Yaw (alrededor del eje Z).

1. Definimos el eje de rotación y el ángulo: $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$ y $\theta = \frac{\pi}{2}$.

2. Construimos el cuaternión unitario q: Dado que $\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, obtenemos:

$$q = \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) i + \left(0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) j + \left(1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) k = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} k$$

3. Calculamos el conjugado q^*:

$$q^* = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} k$$

4. Convertimos el vector a rotar en un cuaternión puro v_q:

$$v_q = 0 + 1i + 0j + 0k = i$$

5. Aplicamos la fórmula de rotación $v'_q = qv_q q^*$. Primero calculamos qv_q:

$$\begin{aligned} qv_q &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}k\right)(i) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}ki \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j \quad \text{(ya que } ki = j\text{)} \end{aligned}$$

6. Multiplicamos el resultado por q^*:

$$\begin{aligned} v'_q &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}k\right) \\ &= \frac{2}{4}i - \frac{2}{4}ik + \frac{2}{4}j - \frac{2}{4}jk \\ &= \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}(-j) + \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}(i) \quad \text{(sustituyendo } ik = -j,\ jk = i\text{)} \\ &= \frac{1}{2}i + \frac{1}{2}j + \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}i \\ &= j \end{aligned}$$

El cuaternión resultante es $0 + 0i + 1j + 0k$, lo cual corresponde al vector rotado $\mathbf{v}' = (0, 1, 0)$. Como era de esperarse físicamente, rotar el vector unitario del eje X un ángulo de $90°$ alrededor del eje Z hace que termine alineado exactamente sobre el eje Y.

3.4. Diagrama del Proceso de Rotación

Para consolidar los conceptos anteriores, el siguiente diagrama de bloques ilustra el flujo de cálculo computacional necesario para aplicar una rotación a un vector en el espacio utilizando cuaterniones. Esta estructura modular demuestra cómo los datos de entrada se transforman antes de operar el producto de emparedado.




Figura 4: Diagrama de bloques del flujo para rotar un vector utilizando cuaterniones.

3.5. Conversión entre Cuaterniones y Ángulos de Euler

Aunque los cuaterniones son computacionalmente superiores para operar rotaciones, los ángulos de Euler (Roll, Pitch, Yaw) son mucho más intuitivos para el análisis humano y son el formato estándar que entregan muchos sensores inerciales. Por ello, es indispensable saber convertir entre ambas representaciones.

Supongamos que tenemos un cuaternión unitario definido como $q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$ (donde q_0 es la parte escalar) y los ángulos de Euler definidos como Roll (ϕ), Pitch (θ) y Yaw (ψ).

3.5.1. De Ángulos de Euler a Cuaternión

Para construir un cuaternión a partir de tres rotaciones sucesivas, se calcula el cuaternión individual de cada eje y se multiplican en el orden específico

de la convención utilizada (generalmente Yaw, luego Pitch, luego Roll). El cuaternión resultante se calcula con las siguientes ecuaciones:

$$q_0 = \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\psi}{2}\right) + \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\psi}{2}\right) \tag{34}$$

$$q_1 = \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\psi}{2}\right) - \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\psi}{2}\right) \tag{35}$$

$$q_2 = \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\psi}{2}\right) + \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\psi}{2}\right) \tag{36}$$

$$q_3 = \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\psi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\psi}{2}\right) \tag{37}$$

3.5.2. De Cuaternión a Ángulos de Euler

Para extraer la orientación intuitiva a partir de un cuaternión, aplicamos trigonometría inversa sobre combinaciones específicas de sus componentes. En programación y robótica, es crucial utilizar la función $\text{atan2}(y, x)$ en lugar de arctan regular para preservar el cuadrante correcto de los ángulos:

$$\text{Roll } (\phi) = \text{atan2}\big(2(q_0q_1 + q_2q_3), 1 - 2(q_1^2 + q_2^2)\big) \tag{38}$$

$$\text{Pitch } (\theta) = \arcsin\big(2(q_0q_2 - q_3q_1)\big) \tag{39}$$

$$\text{Yaw } (\psi) = \text{atan2}\big(2(q_0q_3 + q_1q_2), 1 - 2(q_2^2 + q_3^2)\big) \tag{40}$$

Nota sobre singularidades: Cuando el ángulo Pitch (θ) se acerca a $\pm 90°$ ($\pm\frac{\pi}{2}$), el término dentro del arcoseno tiende a ± 1, lo que desencadena la singularidad conocida como *Gimbal Lock*. En las implementaciones prácticas de software, se suele incluir una condición para manejar este caso límite, forzando los valores de Roll y Yaw de manera manual para evitar inestabilidades numéricas.

4. Más información y recursos

Hay más información acerca de los cuaterniones un poco más confusa (como entender cómo cambia la rotación cuando modificamos de cierta forma el cuaternión).

A continuación enlisto recursos para poder profundizar más:

- Video con una excelente animación que muestra cómo se rota un objeto al rededor de un vector para cuaterniones, además menciona operaciones con cuaterniones.
  https://youtu.be/bKd2lPjl92c?si=SFdQKKBw52GRmvfu
- Video que muestra cómo los cuaterniones son muy buenos para estabilizar drones.
  https://youtu.be/0VAc_G79POE?si=obyKEZsFbEgx7MTy
- Sitio web interactivo para interactuar con los parámetros de los cuaterniones, y entender que realmente ocupamos la proyección en tres dimensiones de esos objetos de cuatro dimensiones.
  https://eater.net/quaternions
- Video que explica de forma más avanzada a los cuaterniones con gráficas.
  https://youtu.be/zjMuIxRvygQ?si=vCK2TTwtIhBJVCTi
- Video de cuaterniones de un sitio web muy bueno con temas de robótica.
  https://robotacademy.net.au/lesson/quaternions-representation-of-rotation-in-
- Gimbal lock
  https://youtu.be/BczeMqU_u2Y?si=5we_VuqaA7swElFU
- The Gimbal Lock, y algo de cuaterniones
  https://youtu.be/F5A-fRsp97M?si=VK6WnkpTdnHi4G6p
- https://youtu.be/Hhzgaq5PKPo?si=jHQNd__r97SSw7vK
- https://youtu.be/hZrBGiWkUyk?si=PZWSV-z_KTWCIt1H
- https://youtu.be/hZrBGiWkUyk?si=-yB_ZpOS66CgmcyF
- https://youtu.be/nvT5VDHi5xw?si=vxarLrQvnWpr5KFo