

Globale Optimierung

Übung

Prof. Dr. Oliver Stein

Sommersemester 2017

Karlsruher Institut für Technologie

Aufgabe 1.1.

Es sei V ein Vektorraum über \mathbb{R} . Eine Abbildung $\|\cdot\|: V \rightarrow [0, \infty)$ heißt Norm, wenn für alle $x, y \in V$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- 1) Definitheit: $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$.
- 2) Absolute Homogenität: $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$
- 3) Dreiecksungleichung: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Es sei $n \in \mathbb{N}$.

- a) Zeigen Sie dass für jede Norm in Bedingung 1) auch die Rückrichtung gilt

Beweis: Zu zeigen: $\|0\| = 0$, wobei zu beachten ist, dass die erste 0 ein Element im Vektorraum V darstellt und die zweite einen Skalar im zugrunde liegendem Raum.

Es gilt für alle $x \in V$:

$$\|0\| = \|0 \cdot x\| = 0 \cdot \|x\| = 0$$

□

- b) Zeigen Sie, dass die folgenden Abbildungen Normen auf \mathbb{R}^n sind:

(i) $\|\cdot\|_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sum_{i=1}^n |x_i|$

Beweis:

- Nicht-Negativität: $\sum_{i=1}^n \underbrace{|x_i|}_{\geq 0} \Rightarrow \sum_{i=1}^n |x_i| \geq 0$
- Definitheit: $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \xrightarrow{|\cdot| \geq 0} |x_i| = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$

$$\xrightarrow{\text{Definitheit}} x_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

- Absolute Homogenität: $\|\alpha x\|_1 = \sum_{i=1}^n |\alpha x_i| = \sum_{i=1}^n |\alpha| |x_i|$

$$= |\alpha| \sum_{i=1}^n |x_i| = |\alpha| \|x\|_1$$

- Dreieckungleichung: $\|x + y\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|)$

$$= \sum_{i=1}^n |x_i| + \sum_{i=1}^n |y_i| = \|x\|_1 + \|y\|_1$$

□

(ii) $\|\cdot\|_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$

Beweis:

- Nicht-Negativität: Wir definieren hierzu:

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)^n, (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1^2, \dots, x_n^2)$$

$$g: [0, \infty)^n \mapsto [0, \infty), y \mapsto \sum_{i=1}^n y_i$$

$$h: [0, \infty) \mapsto [0, \infty), z \mapsto \sqrt{z}$$

Somit ist: $\|\cdot\|_2 = (h \circ g \circ f): \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$

- Definitheit: $0 = \|x\|_2 \iff \|x\|_2^2 = 0 \iff \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$, wobei $x_i^2 \geq 0$

$$\Rightarrow x_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, n\} \iff x = 0$$

- Absolute Homogenität: Analog zu $\|\cdot\|_1$.
- Dreiecksungleichung: $\|x + y\|_2^2 = (x + y)^T (x + y) = x^T x + x^T y + y^T x + y^T y$

$$\begin{aligned} &= \|x\|_2^2 + 2x^T y + \|y\|_2^2 \\ &\leq \|x\|_2^2 + 2|x^T y| + \|y\|_2^2 \\ &\leq \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2 \\ &= (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2 \end{aligned}$$

□

(iii) $\|\cdot\|_\infty: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \max_{i=1}^n |x_i|$

Beweis:

- Nicht-Negativität: Analog zu $\|\cdot\|_1$ oder $\|\cdot\|_2$

- Definitheit: $0 = \|x\|_\infty \iff \max_{i=1}^n |x_i| = 0 \iff |x_i| = 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$


$$\iff x_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, n\} \iff x = 0.$$

- Absolute Homogenität: Analog zu $\|\cdot\|_1$ oder $\|\cdot\|_2$
- Dreiecksungleichung: $\|x + y\|_\infty = \max_{i=1}^n (|x_i + y_i|) = \max_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|)$

$$\leq \max_{i=1, \dots, n} \left(\max_{j=1}^n |x_j| + \max_{k=1}^n |y_k| \right) \leq \max_{j=1}^n |x_j| + \max_{k=1}^n |y_k| = \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$$

□



Aufgabe 1.2.



Aufgabe 1.3.

Gegeben seien eine Menge von zulässigen Punkten $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und eine Zielfunktion $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Zeigen Sie:

- Die globalen Maximalpunkte von f auf M sind genau die globalen Minimalpunkte von $-f$ auf M .



Beweis: Es gilt: x^* ist globaler Maximalpunkt von f auf M :

$$\iff f(x^*) \geq f(x) \quad \forall x \in M$$

$$\iff -f(x^*) \leq -f(x) \quad \forall x \in M$$

$$\iff x^* \text{ ist globaler Minimalpunkt von } -f \text{ auf } M$$

□

b) Sofern f globale Maximalpunkte besitzt, gilt für den globalen Maximalwert

$$\max_{x \in M} f(x) = -\min_{x \in M} (-f(x)).$$

Beweis: todo

□

Aufgabe 2.1

- a) Es seien $n \in \mathbb{N}$, $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Abbildung und $M := \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \leq 0\}$. Zeigen Sie, dass M abgeschlossen ist.

Beweis: $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \leq 0\}$, sei $(x_n)_n \subseteq M$, $\lim x_n = x^*$. Zu zeigen ist $x^* \in M$ bzw. $g(x^*) \leq 0$. Wir nutzen hierfür die Stetigkeit von g aus, denn damit ist:

$$g(x^*) = g(\lim x_n) = \lim \underbrace{g(x_n)}_{\leq 0} \leq 0$$

□

- b) Zeigen Sie, dass die Menge M aus Aufgabenteil a) nicht beschränkt sein muss.

Beweis: Als Gegenbeispiel sei $g(x) = -x^2$. Damit ist $M = \mathbb{R}$, was nicht beschränkt ist. □

- c) Es seien I eine beliebige Indexmenge, $n \in \mathbb{N}$, $g_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i \in I$, stetige Abbildungen und $M_i := \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0\}$. Zeigen Sie, dass

$$M := \bigcap_{i \in I} M_i$$

abgeschlossen ist.

Beweis: Sei $(x_n)_n \subseteq M$ mit $\lim x_n = x^*$. ZU zeigen ist $x^* \in M$. Da

$$(x_n)_n \subseteq M = \bigcap_{i \in I} M_i$$

folgt $(x_n)_n \subseteq M_i$ für alle $i \in I$. Da M_i für alle $i \in I$ abgeschlossen ist, folgt somit:

$$x^* \in M_i \quad \forall i \in I \iff x^* \in \bigcap_{i \in I} M_i \iff x^* \in M$$

□

Aufgabe 2.2

Zeigen oder widerlegen Sie die Koerzivität der folgenden Funktionen auf \mathbb{R}^2

a) $f(x_1, x_2) = x_1^3 - x_2$,

Beweis: Sei $(x_n)_n = (0, \nu)$. Damit ist $\|x_\nu\| = \nu \xrightarrow{\nu \rightarrow \infty} \infty$, allerdings

$$f(x_n) = -\nu \rightarrow -\infty$$

für $\nu \rightarrow \infty$. Ein anderes Beispiel wäre $(y_n)_n = (n, n^3)$, denn damit ist $\|y_n\| \rightarrow \infty$ und $f(y_n) = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. \square

b) $f(x_1, x_2) = (x_1^4 + x_2^4) e^{x_1^2 + x_2^2}$

Beweis: Wir können die Funktion nach unten hin abschätzen:

$$f(x) = (x_1^4 + x_2^4) \underbrace{e^{x_1^2 + x_2^2}}_{\geq 1} \geq (x_1^4 + x_2^4) = \|x\|_4^4$$

Damit ist für $(x_n)_n \subseteq \mathbb{R}^2$ mit $\|x\|_4 \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_4^4 \rightarrow \infty$$

\square

bzw. der folgenden Funktion auf \mathbb{R}^n

c) $f(x) = x^T A x$, mit $n \in \mathbb{N}$ und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ positiv definit aber *nicht notwendigerweise symmetrisch*.

Beweis: Es ist $f(x) = \langle x, Ax \rangle$ und damit

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} \langle x, Ax \rangle + \frac{1}{2} \langle x, Ax \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle x, Ax \rangle + \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle \\ &= \frac{1}{2} x^T A x + \frac{1}{2} x^T A^T x \\ &= x^T \underbrace{\left(\frac{A + A^T}{2} \right)}_{=: \tilde{A}} x \end{aligned}$$

Da aber \tilde{A} symmetrisch ist per Konstruktion, so folgt mit dem Hinweis die Behauptung da:

$$f(x) = x^T \tilde{A} x = \|x\|_{\tilde{A}}^2$$

□

Hinweis: Eine positiv definite *und symmetrische Matrix* $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ induziert mit $\langle xy \rangle_A := x^T A y$ ein Skalarprodukt, welches wiederum durch $\|x\|_A := \sqrt{\langle x, x \rangle_A}$ eine Norm induziert.

Aufgabe 2.3

Sei $p: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$p(x) = -\frac{1 + 4x_1^2}{1 + 2x_1^2} + 2x_2^2$$

Bestimmen Sie das Infimum von p auf der Menge $D = \{x \in \mathbb{R}^2 | x_1 \geq 1, x_2 > 0\}$ und zeigen Sie, dass das Infimum nicht als Minimalwert angenommen wird.

Beweis: Zu zeigen: $\forall x \in D : p(x) \geq -2$, $\inf_{x \in D} p(x) = -2$, $\nexists x \in D : p(x) = -2$

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{1 + 4x_1^2}{1 + 2x_1^2} + 2x_2^2 \\ &= -\frac{2 + 4x_1^2 - 1}{1 + 2x_1^2} + 2x_2^2 \\ &= -\frac{2(1 + 2x_1^2) - 1}{1 + 2x_1^2} + 2x_2^2 \\ &= -2 + \underbrace{\frac{1}{1 + 2x_1^2}}_{\geq 0} + \underbrace{2x_2^2}_{> 0} \geq -2 \end{aligned}$$

Wählen wir nun $(x_n)_n \subseteq M$ mit $x_n = \left(n, \frac{1}{n}\right)$

$$f(x_n) = -2 \frac{1}{1 + 2n^2} + 2 \frac{1}{n^2} \rightarrow$$

□