
(a) Frequentist Fit Improvement $\Delta\chi^2_{\rm MAP}$ vs. ΛCDM
Mirage DE (1 param)
BA / EXP / LOG (2 params)
CPL (w_0w_aCDM) (2 params)
JBP Param. (2 params)
Algebraic Thawing ($w \geq -1$, 2 params)
Calibrated Thawing (1 param)
Emergent DE (1 param)
3σ Threshold (1 dof / Mirage)
3σ Threshold (2 dof / CPL)
DESI DR2 + CMB + Pantheon+
DESI DR2 + CMB + Union3
DESI DR2 + CMB + DES-Y5
−20
−15
−10
−5
0
$\Delta\chi^2_{\rm MAP} = \chi^2_{\rm model} - \chi^2_{\Lambda\rm CDM}$
(b) Nested Sampling Bayes Factor Decomposition
Jeffreys Weak/Mod. ($\ln B = 1.0$)
Jeffreys Mod./Strong ($\ln B = 2.5$)
Jeffreys Strong/Decisive ($\ln B = 5.0$)
Goodness-of-Fit $\Delta\langle\ln\mathcal{L}\rangle_P$
Occam Penalty $-\mathcal{D}_{\rm KL}$
Net Bayes Factor $\ln B_{w_0w_a,\Lambda}$
$\Delta\ln\mathcal{Z}$ / Log-Likelihood Units
12.
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
Pantheon+ (DR2)
Union3 (DR2)
DES-Y5 (DR2)
Pantheon+ (DR1)
Union3 (DR1)
DES-Y5 (DR1)