

Algorithmique Avancée (avec solution)

Partie B. Résolution de problèmes combinatoires polynomiaux

Chap 5: Programmation Linéaire

Florence Bannay

Master Informatique – Université Paul Sabatier
2020-2021

I. Introduction par l'exemple

Un barman dispose de 30 l de jus d'orange, 24 l jus de pamplemousse et 18 l jus de framboise. Il propose deux cocktail :

- le “soleil couchant” à 8€ le litre, soit 80€ le bidon composé de 5l de jus d'orange, 2 l de jus de pamplemousse pour 1 l de jus de framboise et 2l d'eau
- le “balancé” à 6€ le litre, soit 60€ le bidon composé de 3l de jus d'orange, 3l de jus de pamplemousse et 3l de jus de framboise et 1l d'eau

Il désire préparer la quantité optimale de chaque cocktail afin de maximiser son gain.

Exercice 1 : Remplir le tableau suivant

Dispose de 30 l orange, 24 l pample. 18 l framboise. Veut maximiser son gain en préparant quantité optimale de chaque cocktail.

- “soleil couchant” (80€ le bidon)= 5l orange, 2 l pample, 1 l framb. (et 2l eau)
- “balancé” (60€ le bidon)= 3l orange, 3l pample et 3l framb. (et 1l eau)

Représentation in Extenso (forme canonique)

| | |
|-------------------------|---|
| Variables de décision : | x : nombre de bidons de “soleil couchant” (à 80€) y : nombre de bidons de “balancé” (à 60€) |
| Fonction Objectif : | $\max (z =x +y)$ |
| CONTRAINTES | $...x + ...y \leq ...$ (stock jus d'orange) $...x + ...y \leq ...$ (stock jus pample.) $...x + ...y \leq ...$ (stock jus de framboise) $x, y \geq 0$ (contraintes de positivité) |

Exercice 1 (solution)

Dispose de 30 l orange, 24 l pample. 18 l framboise. Veut maximiser son gain en préparant quantité optimale de chaque cocktail.

- “soleil couchant” (80€ le bidon)= 5l orange, 2 l pample, 1 l framb. (et 2l eau)
- “balancé” (60€ le bidon)= 3l orange, 3l pample et 3l framb. (et 1l eau)

Représentation

| | |
|-------------------------|--|
| Variables de décision : | x : nombre de bidons de “soleil couchant” (à 80€) y : nombre de bidons de “balancé” (à 60€) |
| Fonction Objectif : | $\max (z = 80x + 60y)$ |
| CONTRAINTES | $5x + 3y \leq 30$ (stock jus d’orange) $2x + 3y \leq 24$ (stock jus pample.) $1x + 3y \leq 18$ (stock jus de framboise) $x, y \geq 0$ (contraintes de positivité) |

Formes d'un programme linéaire

Un programme linéaire avec n variables et m contraintes peut s'écrire sous plusieurs formes.

Forme Générale

$$\min / \max \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{tel que :} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \preceq b_i \quad \forall i = 1, 2 \dots m$$

$$x_j \preceq 0 \quad \forall j \in \{1, 2 \dots n\}$$

avec $\preceq \in \{\leq, \geq, =\}$

Représentations in extenso/matricielle

| | Forme Canonique in extenso | Forme Standard in extenso | Forme Standard matricielle |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ | $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ | $\max z = C.X$ |
| $i = 1, 2 \dots m$ | $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$ | $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$ | $A.X = B$ |
| $j = 1, 2 \dots n$ | $x_j \geq 0$ | $x_j \geq 0$ | $X \geq \vec{0}$ |

avec i indice de la contrainte, j indice de la variable et

- $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ un vecteur lignes de gain c_j à maximiser,
- $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ un vecteur colonne de variables,
- A une matrice $m \times n$ de coefficients a_{ij} et
- $B = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$ un vecteur colonne des second membres b_i des contraintes.

Exercice 2

En quelle forme est le problème du barman avec le codage suivant ?

| | |
|-------------------------|--|
| Variables de décision : | x : nombre de bidons de “soleil couchant” (à 80€) y : nombre de bidons de “balancé” (à 60€) |
| Fonction Objective : | $\max (z = 80x + 60y)$ |
| CONTRAINTES | $5x + 3y \leq 30$ (stock jus d'orange) $2x + 3y \leq 24$ (stock jus pample.) $1x + 3y \leq 18$ (stock jus de framboise) $x, y \geq 0$ (contraintes de positivité) |

Exercice 2 (solution)

En quelle forme est le problème du barman avec le codage suivant ?

| | |
|-------------------------|--|
| Variables de décision : | x : nombre de bidons de “soleil couchant” (à 80€) y : nombre de bidons de “balancé” (à 60€) |
| Fonction Objective : | $\max (z = 80x + 60y)$ |
| CONTRAINTES | $5x + 3y \leq 30$ (stock jus d'orange) $2x + 3y \leq 24$ (stock jus pample.) $1x + 3y \leq 18$ (stock jus de framboise) $x, y \geq 0$ (contraintes de positivité) |

Ce programme est en **forme canonique in extenso**.

Transformations

- **inéquation** \rightarrow **équation** (ajout variable d'écart)

$$ax \leq b \quad \Leftrightarrow \quad ax + e = b \quad e \geq 0$$

$$ax \geq b \quad \Leftrightarrow \quad ax - e = b \quad e \geq 0$$

- **équation** \rightarrow **inéquation**

$$ax = b \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} ax \leq b \text{ et} \\ ax \geq b \end{cases}$$

- **contrainte supériorité** \rightarrow **infériorité**

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{j=1}^n -a_{ij} x_j \leq -b_i$$

- **min** \rightarrow **max** : $\max f(x) = -\min -f(x)$

- **variable non contrainte** \rightarrow **positive**

$$x \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = x^+ - x^- \\ x^+, x^- \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 3 (transformation)

Pour transformer la forme canonique suivante en forme standard, combien de lignes faut-il changer ?

Forme canonique :

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } 5x + 3y \leq 30$$

$$2x + 3y \leq 24$$

$$1x + 3y \leq 18$$

$$x, y \geq 0$$

Forme standard :

$$\max(z = \dots)$$

$$\text{tel que : } \dots = \dots$$

$$\dots = \dots$$

$$\dots = \dots$$

$$\dots \geq 0$$

Exercice 3 (solution)

Pour transformer la forme canonique suivante en forme standard, combien de lignes faut-il changer ?

Forme canonique :

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } 5x + 3y \leq 30$$

$$2x + 3y \leq 24$$

$$1x + 3y \leq 18$$

$$x, y \geq 0$$

Forme standard :

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } 5x + 3y + e_1 = 30$$

$$2x + 3y + e_2 = 24$$

$$1x + 3y + e_3 = 18$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

Il faut changer **4 lignes** puisqu'on ajoute des variables d'écart (qui doivent être positives).

Exercice 4 : supérieur \rightarrow inférieur

- Transformer $9x_1 + 6x_2 - 3x_3 \geq 17$
- en $\dots x_1 \dots x_2 \dots x_3 \leq \dots$

Exercice 4 : supérieur \rightarrow inférieur

- Transformer $9x_1 + 6x_2 - 3x_3 \geq 17$
- en $\dots x_1 \dots x_2 \dots x_3 \leq \dots$

Solution : $-9x_1 - 6x_2 + 3x_3 \leq -17$

Exercice 5 : standard in extenso -> standard matricielle

Donnez la forme matricielle associée à :

Standard in ext. :

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } 5x + 3y + e_1 = 30$$

$$2x + 3y + e_2 = 24$$

$$1x + 3y + e_3 = 18$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

Forme Standard Matricielle :

$$\max z = \begin{matrix} & C \\ (\dots & \dots & \dots & \dots & \dots) \end{matrix} \times \begin{matrix} X \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & A \\ \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \end{matrix} \times \begin{matrix} X \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} B \\ \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Exercice 5 (solution)

Donnez la forme matricielle associée à :

Standard in ext. :

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } 5x + 3y + e_1 = 30$$

$$2x + 3y + e_2 = 24$$

$$1x + 3y + e_3 = 18$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

Forme Standard Matricielle :

$$\begin{array}{c} \max z = \\ (80 \quad 60 \quad 0 \quad 0 \quad 0) \end{array} \overset{C}{\times} \begin{array}{c} X \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A \\ \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \times \begin{array}{c} X \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} B \\ \begin{pmatrix} 30 \\ 24 \\ 18 \end{pmatrix} \end{array}$$

Définition

Étant donné un programme linéaire P sous forme Matricielle Standard,

$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ est une

- solution de P ssi $A.X^T = B$
- solution réalisable de P ssi $A.X^T = B$ et $X \geq \vec{0}$
- solution optimale de P ssi c'est une solution réalisable qui donne à z une valeur maximale parmi toutes les solutions réalisables.

II. Résolution géométrique


Résolution géométrique

Interpréter les contraintes :

- $5x + 3y \leq 30$ demi-plan de \mathbb{R}^2 délimité par la droite $5x + 3y = 30$
- $2x + 3y \leq 24$ demi-plan délimité par $2x + 3y = 24$
- $1x + 3y \leq 18$ demi-plan délimité par $x + 3y = 18$
- $x \geq 0, y \geq 0$ demi-plans

Sol. réalisables = \cap
demi-plans.

Sol. optimale $\in //$
 $80x + 60y = 0$ dans
réalisables.




Exercice 6

- Donnez deux points de la droite $5x + 3y = 30$.
- Le point $(0,0)$ est-il dans le demi plan $5x + 3y \leq 30$?

Exercice 6 (solution)

Contraintes :

- $5x + 3y \leq 30$. droite $5x + 3y = 30$ passe par $(0, 10)$ et $(6, 0)$,
demi-plan **non** hachuré.



Exercice 7


- Donnez deux points de la droite $2x + 3y = 24$.
- Le point $(0,0)$ est-il dans le demi plan $2x + 3y \leq 24$?

Exercice 7 (solution)

Contraintes :

- $5x + 3y \leq 30$. droite $5x + 3y = 30$ passe par $(0, 10)$ et $(6, 0)$
- $2x + 3y \leq 24$ droite $2x + 3y = 24$ passe par $(0, 8)$ et $(12, 0)$

Solutions réalisables : intersection des demi-plans.




Solution optimale pour le barman

Contraintes :

- $5x + 3y \leq 30$. droite $5x + 3y = 30$ passe par $(0, 10)$ et $(6, 0)$
- $2x + 3y \leq 24$. droite $2x + 3y = 24$ passe par $(0, 8)$ et $(12, 0)$
- $1x + 3y \leq 18$. droite $x + 3y = 18$ passe par $(0, 6)$ et $(18, 0)$
- $x \geq 0, y \geq 0$ demi-plans

Sol. réalisables = \cap
demi-plans.

Sol. optimale $\in //$
 $80x + 60y = 0$ dans
réalisables.



III. Résolution algébrique et Simplexe Tableau

Système 1 : $\max(z = 80x + 60y)$

$$\text{tel que : } 5x + 3y + e_1 = 30$$

$$2x + 3y + e_2 = 24$$

$$x + 3y + e_3 = 18$$

- système à 3 équations et 5 inconnues
- donc plusieurs solutions (sauf si équations incompatibles)
- deux inconnues en trop

\Rightarrow choisir deux inconnues quelconques et exprimer les autres avec

Exercice 8 : complétez les équations

Système initial :

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } 5x + 3y + e_1 = 30$$

$$2x + 3y + e_2 = 24$$

$$x + 3y + e_3 = 18$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

Système 1 (on choisit : x et y)

$$\max(z = \dots x + \dots y)$$

$$\text{tel que : } e_1 = \dots \dots x \dots y$$

$$e_2 = \dots \dots x \dots y$$

$$e_3 = \dots \dots x \dots y$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

En déduire une solution réalisable évidente.

Exercice 8 (solution)

Système initial :

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } 5x + 3y + e_1 = 30$$

$$2x + 3y + e_2 = 24$$

$$x + 3y + e_3 = 18$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

Système 1 (on choisit : x et y)

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } e_1 = 30 - 5x - 3y$$

$$e_2 = 24 - 2x - 3y$$

$$e_3 = 18 - x - 3y$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

Solution réalisable évidente en fixant $x = 0$ et $y = 0$:

$$z = 0, \quad e_1 = 30, \quad e_2 = 24, \quad e_3 = 18$$

Présentation sous-forme de Tableau

- n variables (y compris m var d'écart), m contraintes
- X_{out} "variables hors-base" : $n - m$ var que l'on fixe à 0
- X_{in} "variables de base" : les m autres

Définition (Tableau(P))

- Le prog. linéaire P caractérisé par X_{in}, A, B, C et v
- où v = valeur de z quand var de X_{out} nulles

$$\text{Tableau}(P)[1..(m+1), 1..(n+1)] = \left(\begin{array}{c} A \begin{bmatrix} 1 & \dots & n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m & \dots & m, n \end{bmatrix} \quad B \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ m \end{bmatrix} \\ C \begin{bmatrix} 1 & \dots & n \end{bmatrix} \quad z - v \end{array} \right)$$

où chaque ligne i se lit $\sum_{j=1}^n T[i, j]X[j] = T[i, m+1]$

Tableau(Barman)

$$\text{Tableau}(\text{Barman}) : \left\{ \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c} & x & y & e_1 & e_2 & e_3 & B \\ \hline \text{variables de base} & & & & & & \\ \hline e_1 : & 5 & 3 & 1 & 0 & 0 & 30 \\ \hline e_2 : & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 24 \\ \hline e_3 : & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 18 \\ \hline C, v : & 80 & 60 & 0 & 0 & 0 & z \end{array} \right.$$

Lecture du tableau :

- $5x + 3y + e_1 = 30,$
- $2x + 3y + e_2 = 24,$
- $x + 3y + e_3 = 18,$
- $80x + 60y = z.$

Définition

Une solution de base associée à l'écriture d'un programme linéaire selon une base X_{in} est la solution particulière obtenue en posant $X_{out} = 0$, ce qui implique $X_{in} = B$.

Définition

Une base X_{in} est voisine d'une autre base X'_{in} ssi il existe une variable dite sortante s de X_{in} et une variable dite entrante e de X_{out} telle que $X'_{in} = X_{in} \setminus \{s\} \cup \{e\}$.

Exercice 9 : Première itération algébrique

Système 1

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } e_1 = 30 - 5x - 3y$$

$$e_2 = 24 - 2x - 3y$$

$$e_3 = 18 - x - 3y$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

solution de base : $z = 0$

| x | y | e_1 | e_2 | e_3 |
|-----|----|-------|-------|-------|
| (0, | 0, | 30, | 24, | 18) |

- Faire croître au maximum z
- Augmenter x car son coefficient est le plus fort dans z .
- De combien peut-on augmenter x sans violer les contraintes de positivité ($e_1, e_2, e_3 \geq 0$) ?

Exercice 9 (solution)

Système 1

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } e_1 = 30 - 5x - 3y$$

$$e_2 = 24 - 2x - 3y$$

$$e_3 = 18 - x - 3y$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

solution de base : $z = 0$

| x | y | e_1 | e_2 | e_3 |
|-----|----|-------|-------|-------|
| (0, | 0, | 30, | 24, | 18) |

- Faire croître au maximum z
- augmenter x car son coefficient est plus fort z .
- De combien peut-on augmenter x sans violer les contraintes de positivité ($e_1, e_2, e_3 \geq 0$) ?
- La valeur maximale pour x est 6 : rend e_1 nul.

Exercice 10 : nouvelle solution réalisable

Système 1

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } e_1 = 30 - 5x - 3y$$

$$e_2 = 24 - 2x - 3y$$

$$e_3 = 18 - x - 3y$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

- En remplaçant x par 6 et y par 0 dans le système 1.
- Quelle solution obtient-on ?

solution de base : $z = \dots$

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| x | y | e_1 | e_2 | e_3 |
| $(\dots,$ | $\dots,$ | $\dots,$ | $\dots,$ | $\dots)$ |

Exercice 10 (solution)

Système 1

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } e_1 = 30 - 5x - 3y$$

$$e_2 = 24 - 2x - 3y$$

$$e_3 = 18 - x - 3y$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

- En remplaçant x par 6 et y par 0 dans le système 1.
- Quelle solution obtient-on ?
- Solution de base : $z = 480$

| | | | | |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| x | y | e_1 | e_2 | e_3 |
| (6, | 0, | 0, | 12, | 12) |

Système 1

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } e_1 = 30 - 5x - 3y$$

$$e_2 = 24 - 2x - 3y$$

$$e_3 = 18 - x - 3y$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

- Pour savoir si la solution est maximale
- On reformule le Système 1 en fonction de y et e_1
- C'est à dire qu'on fait entrer x en base et sortir e_1
- Le pivot vaut 5 (coef de x dans l'équation de e_1).

Exercice 11 : Pivoter le Système 1 sur x et e_1

Compléter le tableau :

Système 1 : base e_1, e_2, e_3

$\max(z = 80x + 60y)$

tel que : $e_1 = 30 - 5x - 3y$

$e_2 = 24 - 2x - 3y$

$e_3 = 18 - x - 3y$

$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$

Système 2 : base x, e_2, e_3

$\max(z = \dots \dots y \dots e_1)$

tel que : $x = \dots \dots y \dots e_1$

$e_2 = \dots \dots y \dots e_1$

$e_3 = \dots \dots y \dots e_1$

$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$

- Retrouvez la solution de base associée.

Exercice 11 (solution)

Système 1 : base e_1, e_2, e_3

$$\max(z = 80x + 60y)$$

$$\text{tel que : } e_1 = 30 - 5x - 3y$$

$$e_2 = 24 - 2x - 3y$$

$$e_3 = 18 - x - 3y$$

$$x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0$$

Système 2 : base x, e_2, e_3

$$\max z = 480 + 12y - 16e_1$$

$$\text{tel que : } x = 6 - \frac{3}{5}y - \frac{1}{5}e_1$$

$$e_2 = 12 - \frac{9}{5}y + \frac{2}{5}e_1$$

$$e_3 = 12 - \frac{12}{5}y + \frac{1}{5}e_1$$

- Retrouvez la solution de base associée.
- solution de base : $z = 480$

| x | y | e_1 | e_2 | e_3 |
|-----|----|-------|-------|-------|
| (6, | 0, | 0, | 12, | 12) |

Première itération version Tableau :

Définition (choix du pivot)

- Colonne du pivot (variable entrante) = coeff. de z *le plus positif*
- Ligne du pivot (variable sortante), $\min \text{ rapport } B / \text{col pivot} > 0$

| | x | y | e_1 | e_2 | e_3 | B |
|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
| variables de base | | | | | | |
| $e_1 :$ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| $e_2 :$ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| $e_3 :$ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| $C, v :$ | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | z |

Première itération sur le tableau :

Définition (choix du pivot)

- Colonne du pivot (variable entrante) = coeff. de z *le plus positif*
- Ligne du pivot (variable sortante), min rapport $B / \text{col pivot} > 0$

| var de base | x : var entrante | y | e_1 | e_2 | e_3 | B | B/col pivot |
|-------------|------------------|----|-------|-------|-------|-----|-------------|
| e_1 : | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| e_2 : | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 |
| e_3 : | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| C, v : | 80 : coef max | 60 | 0 | 0 | 0 | z | |

Première itération sur le tableau :

Définition (choix du pivot)

- Colonne du pivot (variable entrante) = coeff. de z *le plus positif*
- Ligne du pivot (variable sortante), min rapport $B / \text{col pivot} > 0$

| var de base | x : var entrante | y | e_1 | e_2 | e_3 | B | B/col pivot |
|------------------|------------------|----|-------|-------|-------|-----|-------------|
| e_1 : sortante | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| e_2 : | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 |
| e_3 : | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| C, v : | 80 : coef max | 60 | 0 | 0 | 0 | z | |

Algorithme primal du simplexe tableau

Définition (Pivotage sur entrante e et sortante s)

La valeur du pivot est $A[s, e]$ et la réécriture du programme selon la base voisine revient à

1. Diviser la (ligne s) du pivot par le pivot $A[s, e]$:
$$(\text{nouvelle_ligne } s) = \frac{(\text{ligne } s)}{\text{pivot}}$$
2. Pour toute ligne i autre que s :
$$(\text{nouvelle_ligne } i) = (\text{ligne } i) - A[i, e] \times (\text{nouvelle_ligne } s)$$

 On soustrait à la nouvelle ligne s .

Définition (Algo du simplexe)

Faire un *choix de pivot* puis *pivoter* vers la base voisine tant que C contient des coef. positifs.

Exercice 12 : Simplexe Tableau

Faire pivoter le Système 1 sur entrante= x et sortante= e_1 .

| | x : var entrante | y | e_1 | e_2 | e_3 | B | $B/\text{col pivot}$ |
|------------------|------------------|-----|-------|-------|-------|-----|----------------------|
| var de base | | | | | | | |
| e_1 : sortante | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| e_2 : | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 |
| e_3 : | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| C, v : | 80 : coef max | 60 | 0 | 0 | 0 | z | |

Système 2 :

| | x | y | e_1 | e_2 | e_3 | B |
|----------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
| x : | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| e_2 : | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| e_3 : | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| C, v : | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Exercice 12 (solution)

Faire pivoter le Système 1 sur entrante= x et sortante= e_1 .

| | x : var entrante | y | e_1 | e_2 | e_3 | B | $B/\text{col pivot}$ |
|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------|
| var de base | | | | | | | |
| e_1 : <i>sortante</i> | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| e_2 : | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 |
| e_3 : | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| C, v : | 80 : coef max | 60 | 0 | 0 | 0 | z | |

Système 2 :

| | x | y | e_1 | e_2 | e_3 | B |
|----------|-----|--------|--------|-------|-------|-----------|
| x : | 1 | $3/5$ | $1/5$ | 0 | 0 | 6 |
| e_2 : | 0 | $9/5$ | $-2/5$ | 1 | 0 | 12 |
| e_3 : | 0 | $12/5$ | $-1/5$ | 0 | 1 | 12 |
| C, v : | 0 | 12 | -16 | 0 | 0 | $z - 480$ |

Théorème

S'il existe une solution réalisable pour un programme linéaire borné alors il existe une solution optimale de base réalisable pour ce programme.

Théorème

*Soit X_{in} une base réalisable non dégénérée ($B > 0$) d'un programme linéaire caractérisé par A , B , C et v , X_{in} est une base réalisable optimale ssi $\forall j \in I_{out}, C[j] \leq 0$.
 $C[j]$ est appelé le coût réduit de la variable hors-base x_j .*

Exercice 13 : Simplexe Tableau

On part maintenant du Système 2 :

| | x | y | e_1 | e_2 | e_3 | B | $B[i]/pivot$ |
|----------|-----|--------|--------|-------|-------|-----------|---------------|
| $x :$ | 1 | $3/5$ | $1/5$ | 0 | 0 | 6 | $30/3 = 10$ |
| $e_2 :$ | 0 | $9/5$ | $-2/5$ | 1 | 0 | 12 | $20/3 = 6.66$ |
| $e_3 :$ | 0 | $12/5$ | $-1/5$ | 0 | 1 | 12 | 5 |
| $C, v :$ | 0 | 12 | -16 | 0 | 0 | $z - 480$ | |

- Donnez le tableau suivant selon l'algo. du Simplexe version Tableau.

| var. de base | x | y | e_1 | e_2 | e_3 | B |
|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
| ... : | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... : | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... : | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| $C, v :$ | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Exercice 13 (solution)

On part du Système 2 :

| | x | y | e_1 | e_2 | e_3 | B | $B[i]/pivot$ |
|----------|-----|--------------------------|--------|-------|-------|-----------|---------------|
| $x :$ | 1 | $3/5$ | $1/5$ | 0 | 0 | 6 | $30/3 = 10$ |
| $e_2 :$ | 0 | $9/5$ | $-2/5$ | 1 | 0 | 12 | $20/3 = 6.66$ |
| $e_3 :$ | 0 | $12/5$ | $-1/5$ | 0 | 1 | 12 | 5 |
| $C, v :$ | 0 | 12 | -16 | 0 | 0 | $z - 480$ | |

Nouveau tableau :

| var. de base | x | y | e_1 | e_2 | e_3 | B |
|--------------|-----|-----|---------|-------|--------|-----------|
| $x :$ | 1 | 0 | $1/4$ | 0 | $-1/4$ | 3 |
| $e_2 :$ | 0 | 0 | $-1/4$ | 1 | $-3/4$ | 3 |
| $y :$ | 0 | 1 | $-1/12$ | 0 | $5/12$ | 5 |
| $C, v :$ | 0 | 0 | -15 | 0 | -5 | $z - 540$ |

Coeff. de z négatifs : optimum **$(3,5,0,3,0)$, $z=540$**