

Gestion de flux dans le réseau

TD n ° 5

Modélisation mathématique

Q4

Sibylle Roux

Juliette Arazo

Nicolas Le Gallo

Tanguy Thomas

23 novembre 2017

Table des matières

1	Essais randoms	3
1.1	3
2	Etude mathématique de la loi tente	3
2.1	Densité	3
2.1.1	Fonction	3
2.1.2	Représentation graphique	3
2.2	Fonction de répartition	4
2.2.1	Fonction	4
2.2.2	Représentation graphique	5
2.3	Inverse	5
2.3.1	Fonction	5
2.3.2	Représentation graphique	6
3	Inverse de la fonction de répartition de la loi exponentielle	6
3.1	Fonction	6
3.2	Représentation graphique	6
I	Conclusion	6
A	Etude mathématique de la loi tente	7
A.1	Représentation graphique de la densité	7
A.2	Représentation graphique de la fonction de répartition	7
A.3	Représentation graphique de la fonction inverse	7

1 Essais randoms

1.1


2 Etude mathématique de la loi tente

2.1 Densité

2.1.1 Fonction

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2.1.2 Représentation graphique



2.2 Fonction de répartition

2.2.1 Fonction

$$f(x) = \begin{cases} f(x) = 0 & \text{pour } x < -1 \\ f(x) = 1 + x & \text{pour } -1 < x < 0 \\ f(x) = 1 - x & \text{pour } 0 < x < 1 \\ f(x) = 0 & \text{pour } x > 1 \end{cases} \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 \, dx & \text{pour } x < -1 \\ \int_{-\infty}^{-1} 0 \, dx + \int_{-1}^x 1 + x \, dx & \text{pour } -1 < x < 0 \\ \int_{-\infty}^{-1} 0 \, dx + \int_{-1}^0 1 + x \, dx + \int_0^x 1 - x \, dx & \text{pour } 0 < x < 1 \\ \int_{-\infty}^{-1} 0 \, dx + \int_{-1}^0 1 + x \, dx + \int_0^1 1 - x \, dx + \int_1^x 0 \, dx & \text{pour } x > 1 \end{cases} \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < -1 \\ 0 + \int_{-1}^x 1 + x \, dx & \text{pour } -1 < x < 0 \\ 0 + \frac{1}{2} + \int_0^x 1 - x \, dx & \text{pour } 0 < x < 1 \\ 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \int_1^x 0 \, dx & \text{pour } x > 1 \end{cases} \quad (3)$$


$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < -1 \\ \int_{-1}^x 1 + x \, dx & \text{pour } -1 < x < 0 \\ \frac{1}{2} + \int_0^x 1 - x \, dx & \text{pour } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{pour } x > 1 \end{cases} \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < -1 \\ \frac{1}{2} + x + \frac{x^2}{2} & \text{pour } -1 < x < 0 \\ \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2} & \text{pour } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{pour } x > 1 \end{cases} \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < -1 \\ \frac{1}{2} \times (1 + 2x + x^2) & \text{pour } -1 < x < 0 \\ -\frac{1}{2} \times (-1 - 2x + x^2 + 1 - 1) & \text{pour } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{pour } x > 1 \end{cases} \quad (6)$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < -1 \\ \frac{(1+x)^2}{2} & \text{pour } -1 < x < 0 \\ \frac{2-(1-x)^2}{2} & \text{pour } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{pour } x > 1 \end{cases} \quad (7)$$

2.2.2 Représentation graphique



2.3 Inverse

2.3.1 Fonction

On va donc inverser les deux fonctions de répartitions de la loi tente

$$\begin{cases} y_1 = \frac{(1+x)^2}{2} & \text{pour } -1 < x < 0 \\ y_2 = \frac{2-(1-x)^2}{2} & \text{pour } 0 < x < 1 \end{cases} \quad (8)$$

$$y_1 = \frac{(1+x)^2}{2} \quad y_2 = \frac{2-(1-x)^2}{2} \quad (9)$$

$$2y_1 = (1+x)^2 \quad 2y_2 = 2 - (1-x)^2 \quad (10)$$

$$\sqrt{2y_1} = 1+x \quad 2-2y_2 = (1-x)^2 \quad (11)$$

$$x = \sqrt{2y_1} - 1 \quad x = 1 - \sqrt{2-2y_2} \quad (12)$$

Donc la fonction inverse est :

$$F^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{2x} - 1 & \text{pour } 0 < x < \frac{1}{2} \\ 1 - \sqrt{2 - 2x} & \text{pour } \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases} \quad (13)$$

2.3.2 Représentation graphique

3 Inverse de la fonction de répartition de la loi exponentielle

3.1 Fonction

$$y = 1 - e^{-\lambda t} \quad (14)$$

$$e^{-\lambda t} = 1 - y \quad (15)$$

$$-\lambda t = \ln(1 - y) \quad (16)$$

$$t = -\frac{\ln(1 - y)}{\lambda} \quad (17)$$

Donc la fonction inverse est :

$$F^{-1}(t) = -\frac{\ln(1 - y)}{\lambda} \quad (18)$$

3.2 Représentation graphique

Première partie

Conclusion

A Etude mathématique de la loi tente

A.1 Représentation graphique de la densité

```
t = linspace(-1, 1, 301);
T = t;
i1 = (t>=-1) & (t<=1);
i2 = t>1 & t<-1;
T(i1)=1-abs(T(i1));
T(i2)=0
plot2d(t,T,style=2)
legend("Fonction de densité de la loi tente")
```

A.2 Représentation graphique de la fonction de répartition

```
t = linspace(-1, 1, 301);
R=t;
i1 = t<-1;
i2 = (t>=-1) & (t<=0);
i3 = (t>0) & (t<=1);
i4 = t>1;
R(i1) = 0;
R(i2) = 0.5 + R(i2)+((R(i2)^2)/2)
R(i3) = 0.5 + R(i3)-((R(i3)^2)/2)
R(i4) = 1;
plot2d(t,R,style=2)
legend("Fonction de répartition de la loi tente")
```

A.3 Représentation graphique de la fonction inverse