

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

Documentación Técnica Oficial — NOVA Performance®

[Péptidos de Alta Pureza | Uso Exclusivo en Investigación (RUO)]



Péptidos
GLP-1 /
Triagonistas



Péptidos
Regenerativos
& Anti-Aging



Péptidos
Mitocondriales




Péptidos
GHRH / GHRP

Retatrutide 10mg

Complejo Peptídico Tri-Agonista Metabólico: GLP-1 / GIP / Glucagón



CLASE
Péptido
Triagonista



CATEGORÍA
Endocrinología /
Metabolismo



EVIDENCIA
Alta
(Fase III)



ESTATUS
Investigación
(RUO)



APLICACIONES PRINCIPALES EN INVESTIGACIÓN

- 1. Pérdida de Masa Grasa y Grasa Visceral.
- 2. Sensibilidad a la Insulina y Control Glucémico.
- 3. Aumento del Gasto Energético Basal y Lipólisis.

EVIDENCIA Y SEGURIDAD



Resumen de
Resultados de Ensayos
Clínicos de Fase III
(Alta Evidencia).

CONSIDERACIONES CLÍNICAS



Titulación gradual de la dosis recomendada según tolerancia GI.




Protocolo de reconstitución **aséptica** estéril.



Uso exclusivo para investigación de laboratorio (**RUO**).

CÓMO ACTÚA EN EL ORGANISMO



INFORMACIÓN PRÁCTICA RÁPIDA



VIDA MEDIA
~6 días



VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea (estudiada)




RECONSTITUCIÓN
Agua Bacteriostática
(0,9% Alcohol Bencílico)



ESTABILIDAD
Refrigerada 2-8°C /
28 días reconstituida



INTERACCIONES
Retraso en el
vaciado gástrico



MONITOREO
Perfil lipídico y
glucémico

REGULATORIO

FDA
Fase III

EMA
En Revisión

WADA
No Aprobada

RUO
100% Investigación

USO
Solo Laboratorio

Retatrutide 20mg

Complejo Peptídico Tri-Agonista Metabólico:
GLP-1 / GIP / Glucagón (Presentación de Alto Rendimiento)

[CLASE]

Péptido Triagonista

[CATEGORÍA]

Endocrinología / Metabolismo

[EVIDENCIA]

Alta (Fase III)

[ESTATUS]

Investigación (RUO)

APLICACIONES PRINCIPALES EN INVESTIGACIÓN




Protocolos Extendidos

Visceral Fat
Deep
OptimizationSensibilidad de
Insulina

1. Pérdida de Masa Grasa y Grasa Visceral.
2. Sensibilidad a la Insulina y Control Glucémico.
3. Aumento del Gasto Energético Basal y Lipólisis.


CÓMO ACTÚA EN EL ORGANISMO

GIP + GLP-1 + Glucagón



Receptores

Lipólisis acelerada

Efecto metabólico
sinérgico en tejido
adiposo y
saciedad central.**Vida Media**
~6 días**Vía de Administración**
Subcutánea
(estudiada)**Reconstitución**
Agua Bacteriostática
(0,9% Alcohol
Bencílico)**Concentración**
20mg/vial**Interacciones**
Retraso en el
vaciado gástrico**Estabilidad**
Refrigerada
2-8°C / 28 días
reconstituida**EVIDENCIA
ALTA****ATENCIÓN CLÍNICA**Alta concentración
sin transformarse
instantáneamente.
Reconstitución estéril.

REGULATORIO

FDA:
Fase III**EMA:**
En Revisión**WADA:**
No Aprobada**RUO:**
100% Investigación**USO:**
Solo Laboratorio

GHK-Cu 100mg

Complejo Tripéptido de Cobre:
Glicil-L-Histidil-L-Lisina (Regenerativo y Anti-Aging)

[CLASE]

Péptido de Cobre

[CATEGORÍA]

Dermatología / Regenerativo

[EVIDENCIA]

Alta (Estudios Clínicos))

[ESTATUS]

Investigación (RUO)

APLICACIONES PRINCIPALES EN INVESTIGACIÓN



Síntesis de Colágeno Aumentada



Regeneración Tisular Acelerada



Soporte Capilar y Crecimiento

1. Regeneración Completa de Tejidos Dañados.
2. Producción Sostenida de Colágeno y Elastina.
3. Efectos Anti-inflamatorios y Antioxidantes.

CÓMO ACTÚA EN EL ORGANISMO

Complejo Iónico Activo



Activación de Fibroblastos

- Producción de Fibroblastos
- Producción de Matriz Extracelular




Vida Media
(~4-6 horas vida plasmática)



Vía de Administración
Subcutánea (investigación)
Tópica (investigación)

Reconstitución
Agua Bacteriostática
(0,9% Alcohol Bencílico)

Concentración
100mg/vial



Interacciones
Interacción con Agentes Ácidos, Vitamina C



Estabilidad
Refrigerada
2-8°C / 28 días reconstituida



EVIDENCIA ALTA

ATENCIÓN CLÍNICA

Interacciones Potenciales con Agentes Ácidos (pH < 4.5) y Vitamina C Concentrada.

- ⚠ Evitar una formulación directa concurrentes.
- ⚠ Reconstitución Estéril.

REGULATORIO

FDA:

Status Research

EMA:

Evaluado

WADA:

No Prohibida

RUO:

100% Investigación

USO:

Exclusivo Laboratorio

BPC-157 10mg

Pentadecapéptido de Protección Gástrica
y Recuperación Tisular Musculoesquelética

[CLASE]

Pentadecapéptido

[CATEGORÍA]

Regenerativo / Gastroenterología

[EVIDENCIA]Alta (Extensa
Literatura Preclínica)**[ESTATUS]**

Investigación (RUO)

APLICACIONES PRINCIPALES EN INVESTIGACIÓN



Protección y Regeneración
Gastrointestinal



Recuperación
Musculo-
tendinosa



Efectos
Neuroprotectores

1. Curación de Lesiones en Tendones, Ligamentos y Músculos.
2. Reparación de Daño Gastrointestinal y Órganos (Úlceras, etc.).
3. Potencial Neuroprotector en Modelos de Daño Cerebral.

CÓMO ACTÚA EN EL ORGANISMO

Activación Nitric Pítrico

NO

Estimulación de
Angiogénesis

Aumento
Proliferación
Fibroblástica




Vida Media
(~4 horas)



**Vía de
Administración**
(Subcutánea /
Intramuscular)

Reconstitución
(Agua BAC 0,9%)

Estabilidad
(Refrigerada
2-8°C / 28 días)



Concentración
(10mg/vial)



Interacciones
(Investigación
continua)



**EVIDENCIA
ALTA**

ATENCIÓN CLÍNICA



SENSIBILIDAD A LA LUZ UV Y CALOR
(Evitar exposición directa y
temperaturas elevadas)



Reconstitución Estéril
Aséptica Obligatoria;
Práctica de Higiene Rigurosa

REGULATORIO

FDA:

Research Use Only

EMA:

No Aprobado

WADA:

No Prohibida

RUO:

100% Investigación

USO:

Exclusivo Laboratorio

MOTS-c 10mg

Péptido Mitocondrial Regulador del Metabolismo Energético y Homeostasis Celular

[CLASE]

Péptido Mitocondrial

[CATEGORÍA]

Metabolismo / Longevidad Celular


[EVIDENCIA]

Alta (Literatura Científica)

[ESTATUS]

Investigación (RUO)


APLICACIONES PRINCIPALES EN INVESTIGACIÓN



Regulación y Sensibilidad a la Glucosa e Insulina



Optimización de la Producción de Energía Mitocondrial (ATP)



Prevención del Envejecimiento y Longevidad Celular

1. Curación de Lesiones en Tendones, Ligamentos y Músculos.
2. Reparación de Daño Gastrointestinal y Órganos (Úlceras, etc.).
3. Potencial Neuroprotector en Modelos de Daño Cerebral.

CÓMO ACTÚA EN EL ORGANISMO



EVIDENCIA ALTA

ATENCIÓN CLÍNICA



SENSIBILIDAD A LA LUZ UV Y CALOR
(Evitar exposición directa y temperaturas elevadas)



RECONSTITUCIÓN ESTÉRIL
Aséptica Obligatoria;
Práctica de Higiene Rigurosa



Vida Media
(Corta: ~20-30 min)



Reconstitución
(Agua Bacteriostática / Estéril)



Concentración
(10mg/vial)



Vía de Administración
(Subcutánea / Intravenosa)

Estabilidad
(Refrigerada 2-8°C / Sensible)



Interacciones
(Investigación Continua)

REGULATORIO

FDA:

Research Use Only

EMA:

En Investigación

WADA:

No Prohibida

RUO:

100% Investigación

USO:

Exclusivo Laboratorio

Tesamorelin 10mg

Análogo Sintético del Factor Liberador de Hormona de Crecimiento (GHRH) — Secretagogo Fisiológico de GH

[CLASE]

Análogo GHRH

[CATEGORÍA]

Endocrinología / Hormona de Crecimiento


[EVIDENCIA]

Alta (FDA Aprobado)

[ESTATUS]

Investigación (RUO)

APLICACIONES PRINCIPALES EN INVESTIGACIÓN



Estimulación Pulsátil de GH Endógena




Reducción de Grasa Visceral Abdominal



Perfil Hormonal Limpio (**IGF-1 Mínimo Excesivo**)

1. Curación de Lesiones en Tendones, Ligamentos y Músculos.
2. Reparación de Daño Gastrointestinal y Órganos (Úlceras, etc.).
3. Potencial Neuroprotector en Modelos de Daño Cerebral.

CÓMO ACTÚA EN EL ORGANISMO



Vida Media
(Corta): ~30 min.



Solvente Recomendado:
Agua Bacteriostática



Concentración
10mg/vial



Vía de Administración
(Subcutánea)



Estabilidad
(Refrigerada 2-8°C,
PROTEGER DE LA LUZ)



Interacciones
(Evaluación de Interacciones con Medicamentos de la GH)



EVIDENCIA ALTA

ATENCIÓN CLÍNICA



MONITOREO DE IGF-1 Y GLUCOSA SÉRICA -



SENSIBILIDAD A LA AGITACIÓN MECÁNICA
(NO AGITAR, SOLO ROTAR)

REGULATORIO

FDA:

Approved HIV-LD

EMA:

Evaluado

WADA:

Prohibida

RUO:

100% Investigación

USO:

Exclusivo Laboratorio

Tesamorelin 20mg

Análogo Sintético GHRH de Alto Rendimiento —
Protocolos de Investigación Extendidos

CLASE: Análogo GHRH	CATEGORÍA: Endocrinología / Hormona de Crecimiento	EVIDENCIA: Alta (FDA Aprobado)	ESTATUS: Investigación (RUO)
-------------------------------	---	--	--

APLICACIONES PRINCIPALES EN INVESTIGACIÓN



High Performance / Double Rendimiento




GH Pulsatile Stimulation
Estimulación Pulsátil de GH Endógena



Reducción de Grasa Visceral
Abdominal y Adiposidad



CÓMO ACTÚA EN EL ORGANISMO






EVIDENCIA ALTA

ATENCIÓN CLÍNICA


- Dosis Concentrada (20mg/vial)
- Sensibilidad a la Agitación Mecánica (No agitar, Solo rotar)
- Monitoreo de IGF-1 y Glucosa Sérica

Vida Media (Corta): ~30 min	Vía de Administración Subcutánea
Solvente Recomendado: Agua Bacteriostática (con Alcohol Benellico)	Estabilidad: Refrigerada 2-8°C, PROTEGER DE LA LUZ
Concentración: 20mg/vial	Interacciones: (Evaluación de Interacciones con Medicamentos de la GH)

CJC-1295 sin DAC + Ipamorelin 10mg

Stack Sinérgico GHRH + GHRP — Liberación Pulsátil
Dual y Fisiológica de Hormona de Crecimiento**[CLASE:**
Stack CHRH +
GHRP**[CATEGORÍA:**
Endocrinología /
Secretagogo GH**[EVIDENCIA:**
Alta (Literatura
Clínica Combinada)**[ESTATUS:**
Investigación
(RUO)APLICACIONES PRINCIPALES
EN INVESTIGACIÓNSinergia Dual
Potenciada
GHRH/GHRPLiberación
Pulsátil de GH
EndógenaOptimización de
la Composición
Corporal

CÓMO ACTÚA EN EL ORGANISMO



ATENCIÓN CLÍNICA

• Integridad de la mezcla peptídica
GHRH/GHRP.• Sensibilidad a la temperatura;
Rango de 2-8°C.• Reconstitución estéril y técnica
aséptica.**Vida Media (CJC):**
~30min | (ipa): ~2h**Vía de Administración:**
Subcutanea**Solvente Recomendado:**
Agua Bacteriostática
(con Alcohol Bencilico)**Concentración:**
10mg (Total)**Estabilidad:**
Refrigerada 2-8°C,
Proteger de la Luz**Interacciones:**
Previsión con
Secretagogos de GH**FDA:**

Research Use Only

EMA:

En Investigación

WADA:

Prohibida

RUO:

100% Investigación

USO:

Exclusivo Laboratorio

Agua Bacteriostática 3ml

Solvente Estéril para Reconstitución Segura de Péptidos Liofilizados — Alcohol Bencílico al 0.9%

[CLASE:
Solvente Estéril

[CATEGORÍA:
Accesorios /
Reconstitución

[COMPATIBILIDAD:
Todos los
Péptidos


[ESTATUS:
Uso en
Investigación



**AGUA
BACTERIOSTÁTICA**



**Lyophilized
Peptide**



Reconstitución Aséptica


APLICACIONES PRINCIPALES EN INVESTIGACIÓN



**Solvente Oficial
de Grado USP
Reconstitución
Segura.**



**Contiene
Alcohol Bencílico
al 0.9% para
Preservar
Esterilidad.**



**Permite
Extracciones
Múltiples y
Seguras de Viales
Multidosis.**

CÓMO SE UTILIZA



Step 1: Limpiar
el Tapón de
Goma con Alcohol
Isopropílico.



Step 2: Extraer
la Cantidad
Requerida de Agua
Bacteriostática.



Step 3: Inyectar
Lentamente en
el Vial con el
Péptido.



Step 4: Rotar Suavemente
el Vial hasta Disolver
Totalmente (No Agitar).



Step 5: Verificar
Claridad de la Solución y
Refrigerar Inmediatamente.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL

ATENCIÓN CLÍNICA



• No Usar como Sustituto de Agua para Inyección Estéril.



• Verificar Turbidez; Desechar si la Solución está Turbia.



• No Agitar Violentemente; Podría Dañar los Péptidos.

Volume:
3ml (Total)

Agente:
Alcohol Bencílico 0.9%

Estabilidad: 28 días
(Después de Abrir,
en Refrigeración)

Técnica:
NO Agitar
(Rotar Suavemente)

Almacenamiento:
Refrigerada 2-8°C,
Proteger de la Luz

Caducidad:
Ver Vial

USP:
Grade Farmacéutico

BPF:
Estéril

ISO:
Calidad

RUO:
Investigación

NOVA:
100% Compatible