

Modelos Lineales y Lineales Generalizados

Manuel Gijón Agudo

Octubre 2018 -

Índice

1. Regresión lineal simple	2
1.1. Estimación de parámetros	4
2. ANOVA	4
2.0.1. Ejemplos	5
2.0.2. Ejercicios	5
2.1. ANCOVA	5
2.1.1. Ejemplos	5
2.1.2. Ejercicios	5
3. Regresión lineal generalizada	6
3.1. Genealidades	6
3.2. Binomial Response Models	6
3.3. Poisson Response Models	7

1. Regresión lineal simple

Objetivo: Nuestro objetivo será siempre explicar el comportamiento de una variable aleatoria Y en función de unos ciertos valores X_1, \dots, X_p .

Dado un $n \in \mathbb{Z}^+$ denominaremos Y_i a la muestra de Y obtenida cuando $X_j = x_{ij} \in \mathbb{R} \forall i, j$.

Definición: denominamos el **Modelo Lineal** como:

$$\forall i, \quad Y_i = \beta_0 + x_{i1}\beta_1 + \dots + x_{i(p-1)}\beta_{p-1} + e_i = \mu_i + e_i$$

donde β_0 es denominado **intercepto** (*intercept*) y los términos e_i los **errores**.

Hipótesis:

- $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, e_i \sim N(0, \sigma_i^2)$
- **Homeodasticidad** (*homeodasticity*): $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \sigma_i^2 = \sigma^2$
- $\forall i, y \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j$ e_i es **independiente** de e_j
- Los valores de X son fijos o variables aleatorias **independientes** de los errores.

En **forma matricial** escribiremos el modelo de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & x_{13} & \cdots & x_{1(p-1)} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & x_{23} & \cdots & x_{2(p-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & x_{n3} & \cdots & x_{n(p-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Siendo así, definimos $Y_{n \cdot 1} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)^t$, $X_{n \cdot p} = (x_{ij})$, $\beta_{p \cdot 1} = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{p-1})^t$, $e_{n \cdot 1} = (e_1, e_2, \dots, e_n)^t$ y escribimos el modelo como:

$$Y = X\beta + e \iff \mu = E(Y|X) = X\beta$$

$$Y|X \sim N(X\beta, \sigma^2 \cdot Id_n)$$

De la última línea se desprende lo siguiente:

$$E((Y - X\beta)(Y - X\beta)^t) = E\left(\begin{pmatrix} e_1^2 & e_1e_2 & e_1e_3 & \cdots & e_1e_n \\ e_2e_3 & e_2^2 & e_2e_3 & \cdots & e_2e_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ e_ne_1 & e_ne_2 & e_ne_3 & \cdots & e_n^2 \end{pmatrix}\right) = \sigma^2 \cdot Id_n$$

Observación: Las variables X_1, X_2, \dots, X_n pueden ser función de otro conjunto de variables. Por ejemplo, podríamos tener un conjunto $\{Z_1, Z_2, \dots, Z_m\}$ tales que, para $m \in \mathbb{N}$:

$$X_i = g_i(Z_1, Z_2, \dots, Z_m), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Ejemplos de modelos lineales:

- Comparamos la presión sanguínea (Y) en dos tipos de individuos, unos que han tomado cierta medicación y un grupo de control:

$$Y_{ij} = \mu_i + e_{ij}, \quad \forall i \in \{1, 2\}, \quad j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

En forma matricial lo podemos expresar de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} Y_{11} \\ \vdots \\ Y_{1n_1} \\ \vdots \\ Y_{2n_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{11} \\ \vdots \\ e_{1n_1} \\ \vdots \\ e_{2n_2} \end{pmatrix}$$

Los modelos conocidos como **modelos de regresión** son un caso particular de modelos lineales en los que las covariables son continuas o discretas, en ningún caso categóricas.

- Estudiamos el nivel de un determinado químico en una planta (Y) en función de su presencia en el suelo (X).

$$Y_i = \beta_1 + x_i\beta_2 + e_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

O en su forma matricial:

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Si las covariables son todas categóricas estaremos entonces ante un modelo **ANOVA** (*Analysis of Covariance*).

- Queremos estudiar el nivel de un determinado medicamento (Y) en función de su dosis (X_1) y del género del paciente (X_2).

$$Y_{ij} = \beta_{0i} + \beta_{1i}x_{ij} + e_{ij}, \quad i \in \{1, 2\}, \quad j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} Y_{11} \\ \vdots \\ Y_{1n_1} \\ Y_{21} \\ \vdots \\ Y_{2n_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & 0 & 0 \\ 1 & x_{12} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{1n_1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x_{21} \\ 0 & 0 & 1 & x_{22} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & x_{2n_2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_{01} \\ \beta_{11} \\ \beta_{02} \\ \beta_{12} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{11} \\ \vdots \\ e_{1n_1} \\ e_{21} \\ \vdots \\ e_{2n_2} \end{pmatrix}$$

Definimos el **Modelo Nulo** (*Null Model*) al más simple, el que tiene un único parámetro.

$$Y_i = \beta_0 + e_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Equivalentemente:

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (\beta_0) + \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Este modelo es equivalente a estudiar una muestra de una variable aleatoria.

Denominamos **Intercepto** (*intercept*) al elemento β_0 . En general consideraremos modelos con intercepto, lo que significa que el modelo nulo será un submodelo del susodicho.

Ejemplos de modelos no lineales:

- Queremos estudiar la producción de leche de unas vacas en Litros (Y_i) en función del número de días (x_i) que hace que nacieron.

$$Y_i = e^{\beta_0 + \beta_1 x_i + \log(x_i)} + e_i, \quad e_i \sim N(0, \sigma^2)$$

- Queremos estudiar la calidad de cierto material en función de su proveedor, de cada uno de ellos elegiremos aleatoriamente una muestra de tamaño b del material de las que nos quedaremos con n muestras seleccionadas aleatoriamente.

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_{j(i)} + e_{(ij)k}$$

$$i = 1, \dots, a, \quad j = 1, \dots, b, \quad k = 1, \dots, n, \quad e_{(ij)k} \sim N(0, \sigma^2)$$

1.1. Estimación de parámetros

Llegados a este punto es importante hablar de los diferentes tipos de modelos lineales con los que nos encontraremos en función del tipo de dato que sean las variables explicativas.

2. ANOVA

En este caso alguna de las covariables si no todas serán **factores** (también llamadas **variables categóricas**). Estos modelos se denominan **análisis de la varianza (ANOVA)**.

2.0.1. Ejemplos

2.0.2. Ejercicios

2.1. ANCOVA

En el caso de que los coeficientes

2.1.1. Ejemplos

Example 2.1 *Tenemos datos sobre coche que utilizan diesel o no.*

2.1.2. Ejercicios

3. Regresión lineal generalizada

3.1. Genealidades

3.2. Binomial Response Models

Una variable aleatorio es tal que $Y \sim B(p)$ (Bernulli), $0 \leq p \leq 1$, si y solo sí toma valores 1 ó 0 con las siguientes probabilidades:

$$P(Y = 1) = p \text{ and } P(Y = 0) = 1 - p$$

Una variable aleatoria es tal que $Y \sim Bin(n, p)$ (Binomial), con parámetros.... CONTINUAR AQUÍ

BALA BLA BLA BLA

Definimos los **odds** de una variable aleatoria Binomial como $\text{Odd} = \frac{p}{1-p} \in (0, +\infty)$, tal que verifica:

$$\text{Odd} = \begin{cases} 5 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 6x + 10 & \text{si } 2 < x < 5 \\ 4x - 15 & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

SUSTITUIR APROPIADAMENTE LA MIERDA DE AQUÍ ARRIBA IMPORTANTE!!

Para comparar p_1 con $p_2 \in (-1, 1)$ CONTINUAR A1UÍ BLA BLA BLA BLA

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 & \Longleftrightarrow H_0 : p_1 - p_2 = 0 \\ H_1 : p_1 \neq p_2 & \Longleftrightarrow H_1 : p_1 - p_2 \neq 0 \end{cases}$$

$$Y_i \sim Bin(m_i, p_i)$$

$$g(\mu) = X\beta \Leftrightarrow g(mp) = X\beta$$

Recordemos el link canónico, el parámetro de ddispersione y la función de varianza son respectivamente:

$$\theta_i = \log \left(\frac{p_i}{1 - p_i} \right)$$

$$\Phi = 1$$

$$V(\mu_i) = \mu_i \left(1 - \frac{\mu_i}{m_i} \right)$$

3.3. Poisson Response Models

La principal característica de estos modelos es que la variable respuesta sigue una distribución de Poisson.

$$Y_i \sim \text{Pois}(\mu_i)$$

$$g(\mu) = X\beta$$

Donde recordemos: $\text{Pois}(Y = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $E(Y) = \lambda$, $V(Y) = \lambda$.

El **índice de dispersión** será:

$$I(Y) = \frac{V(Y)}{E(Y)} = 1$$

— EXPLICAR MEJOR ESTA MIERDA Ejemplo de las placas de petri overdispersión: tendencia al agrupamiento Poisson: randomness Underdispersion: uno por casilla — Estimamos el parámetro $\Phi = 1$

- $\hat{\Phi} = \frac{X^2}{n-p} >> 1 \Rightarrow \text{overdispersión}$
- $<< 1 \Rightarrow \text{underdispersión}$
- $\approx 1 \text{ Poisson}$

In general $V(Y) = \Phi \cdot \mu$ quasi poisson lo usamos en overdispersion

Estimamos Φ con los datos and like this we will have a more accurate estimation of the true variance.

Una vez tengamos una tabla, si fijamos el parámetro n, lo que nos encontramos es una distribución multinomial. Si no lo fijamos seguimos contando con la distribucuin de poisson

Ejemplo de la tabla $\log(\mu_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 \text{Factor 1} + \beta_2 \text{Factor 2}$, en total $1 + a - 1 + b - 1 = a + b - 1$. Tenemos factores, luego puede haber interacciones, sea pues el siguiente modelo a considerar:

$$\beta_0 + \beta_1 \text{Factor 1} + \beta_2 \text{Factor 2} + \beta_3 \text{Interacción}$$

con un total de $a + b - 1 + (a - 1)(b - 1) = \text{RELLENAR} = ab$ luego se corresponde con el modelo completo (*full model*), lo que no tiene sentido considerar.