

2. Linearfaktordarstellung

Beispiel:

$f(x) = \frac{1}{2}(x - 1)(x + 2)(x + 3)$
 $g(x) = \frac{1}{2}x^3 + 2x^2 + \frac{x}{2} - 3$



| | f(x) | g(x) |
|-------------|---------------------------------------|--------------|
| Grad | auszurechnen | ablesbar |
| | | grad(f) = 3 |
| Nullstellen | ablesbar | auszurechnen |
| | $n_1 = -3$ $n_2 = -2$ $n_3 = 1$ | |
| Aufbau | Produkt von Linearfaktoren | Polynom |

Definition:

Bestehen Faktoren einer Multiplikation aus linearen Elementen der Form $ax + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, so bezeichnet man die Faktoren als Linearfaktoren.

Schauen wir uns die Funktionsgraphen der Fuktion f und g an:

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x14868b920>]



Satz 1:

- a Jede ganzrationale Funktion in Linearfaktordarstellung lässt sich durch ausmultiplizieren in eine Polynomfunktion umformen.
- b Nicht jede ganzrationale Funktion besitzt eine Linearfaktordarstellung.

Beweis:

a klar

b Gegenbeispiel: $f(x) = x^2 + 1$

Satz 2:

Ist eine ganzrationale Funktion f vom Grad n und der Nullstelle c gegeben, so gibt es eine ganzrationale Funktion g vom Grad $n-1$, so dass gilt:

$$f(x) = (x - c) \cdot g(x)$$

Beweis:

Gegeben:

- ganzrationale Funktion f
- $\text{grad}(f) = n$
- c Nullstelle von f

Verschiebung der Nullstelle c in den Ursprung durch Verschieben des Graphen von f entlang der x -Achse um $-c$ erzeugt eine neue Funktion h :

$$h(x) = f(x - (-c)) = f(x + c)$$

Eigenschaften von h:

- h ist auch eine ganzrationale Funktion mit $h(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$
- $x_0 = 0$ ist eine Nullstelle von h, d.h. $h(0) = f(0 + c) = f(c) = 0$

Es folgt damit: $a_0 = 0$

und es gilt:

$$\begin{aligned} h(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x \\ &= x \cdot (a_n x^{n-1} + a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1) \\ &= x \cdot k(x) \end{aligned}$$

Eigenschaften von k(x):

- ganzrationale Funktion
- Gleichung $k(x) = a_n x^{n-1} + a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1$
- $\text{grad}(k) = n - 1$

Zurückverschiebung des Graphen von h um c entlang der x-Achse ergibt den Graphen von f und es gilt:

$$\begin{aligned} f(x) &= h(x - c) \\ &= (x - c) \cdot k(x - c) \\ &= (x - c) \cdot g(x), \quad \text{mit } g(x) = k(x - c) \end{aligned}$$

mit $\text{grad}(g) = \text{grad}(k) = n - 1 \square$

Satz 3:

Eine ganzrationale Funktion f vom Grad n hat höchstens n Nullstellen.

Beweis:

Gegeben:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

mit $\text{grad}(f) = n$

\Rightarrow Es gibt ein c_1 , so das gilt:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - c_1) \cdot (a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) \\ &= (x - c_1) \cdot g(x) \end{aligned}$$

$\Rightarrow \text{grad}(g) = \text{grad}(f) - 1 = n - 1$

Sei c_2 weiter Nullstelle von $f(x)$.

\Rightarrow

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - c_1)(x - c_2) (a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1x + a_0) \\ &= (x - c_1)(x - c_2) \cdot h(x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \text{grad}(h) = \text{grad}(f) - 2 = n - 2$$

Die Durchführung dieser Schritte ist insgesamt maximal n -mal möglich. \square