DERMATOLOGICOS:

AFTA BUCAL

USO EM MUCOSA ORAL:

OMCILON-A ORABASE---01 UNIDADE

Aplicar uma pequena quantidade sobre a lesão oral, até que se desenvolva uma película fina, 2-3x/dia, depois das refeições

RESSECAMENTO LABIAL

USO LABIAL:

AQUAPHOR SOS LIPS REPAIR (EUCERIM) OU DERMON CREME (GENOM) OU CICABIO LIP REPAIRS (BIODERMA) OIU BEPANTOL DERMA LABIAL---01 UNIDADE

Aplicar em labios quantas vezes forem necessarias durante o dia. Sempre reaplicar antes de dormir.

HIDRATANTE FACIAL

USO FACIAL:

AMILIA REPAIR (THERASKIN) OU LOÇÃO HIDRATANTE FACIAL (CERAVE) OU EPIDRAT CALM B5 (MANTECORP) ---01 UNIDADE

Aplicar em face quantas vezes forem necessarias durante o dia. Sempre reaplicar antes de dormir.

RESSECAMENTO DE ÁREAS DE ATRITO

GELEIA DE VASELINA (VASENOL) 100G---01 UNIDADE

Aplicar em região ressecada quantas vezes forem necessarias durante o dia. Sempre reaplicar antes de dormir.

Dra. Milena Lopes

DERMATOVIROSES

HERPES SIMPLES

USO ORAL:

VALACICLOVIR 500 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos, de 12/12h, por 5 dias

OU

USO ORAL:

ACICLOVIR 200 MG---- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 4/4h, por 5 dias (se reativação).

Tomar 01 comprimido de 4/4h, por 7 dias (se primo-infecção).

Observação: se recorrencia, >6 episodios ano, fazer uso diario por 4 as 6 meses

RECORRENTE

USO ORAL:

RESIST (CLORIDRATO DE LISINA) 500 MG---- 01 CAIXA

Tomar 3x/dia, junto às refeições, por 6 meses

OU

USO ORAL:

LISIVIR (CLORIDRATO DE LISINA) 500 MG---- 01 CAIXA

HERPES ZOSTER

USO ORAL:

ACICLOVIR 200 MG---- 01 CAIXA

Tomar 02 comprimidos de 4/4h, por 10 dias.

OU

USO ORAL:

VALACICLOVIR 500 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos, de 8/8 horas, por 7 dias

PREDNISONA 20 MG , PREDNISONA 10 MG , PREDNISONA 5 MG ---- 01 CAIXA CADA

Tomar 3 comprimidos de 20 mg 1x/dia, pela manhã, por 3 dias
Após os 3 primeiros dias, tomar 1 comprimido de 20 mg + 1 comprimido de 10 mg por 3 dias
Após, tomar 1 comprimido de 10 mg + 1 comprimido de 5 mg por 3 dias

Após, tomar 1 comprimido de 5 mg por 3 dias
Suspender o uso (totalizando 12 dias de tratamento)

IVERMECTINA 6 MG---- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido dose única. Repetir o tratamento após 15 dias.

USO TÓPICO:

TOPERMA (PATCH DE LIDOCAÍNA 5%) ---- 01 CAIXA

Aplicar em local de lesão, de 2/12h, se dor intensa

LARVA MIGRANS / BICHO-GEOGRAFICO

ADULTOS:

USO ORAL:

ALBENDAZOL 400 MG/COMPRIMIDO --- 01 CAIXA

Tomar 1 comprimido após almoço, 5 dias

USO TÓPICO:

TIABENDAZOL 5% --01 POMADA

Aplicar na lesão 3x/dia, por 5 dias

CRIANÇAS:

USO ORAL:

ALBENDAZOL 400 MG/10 ML --- 01 FRASCO

Dar ml após o almoço, por 3 dias.

USO TÓPICO:

TIABENDAZOL 5% --01 POMADA

Aplicar na lesão 2x/dia, por 5 dias

BROMIDROSE

USO TÓPICO:

SABONETE LIQUIDO SOAPEX 100ML ANTISSÉPTICO OU DARROW SOAPELLE 140ML----01 FRASCO

Lavar axilas com o sabonete, 1x ao dia, por 60 dias

PERSPIREX DESODORANTE----01 UNIDADE

Aplicar após banho, todos os dias

RECEITA ESPECIAL:

USO TÓPICO:

VERUTEX 20 MG/G ----01 POMADA

Aplicar em axilas à noite, por 30 dias

MANIPULADO ESPECIAL

USO TÓPICO:

CLINDAMICINA GEL (1%) **----01 POMADA**

Aplicar na região afetada à noite, por 21 dias

DERMATITE ATOPICA

USO TOPICO:

ADVANTAN----01 POMADA

Aplicar na em região de tronco e braços 2x ao dia, por 10 dias

ELIDEL (PIMECROLIMO 10 MG/G) ---01 POMADA

Aplicar na em região face 2x ao dia, por 10 dias

OU

TACROLIMO (0,1% POMADA) **---01 POMADA**

Aplicar na em região face 2x ao dia, por 10 dias

DERMATITE DE CONTATO / DESIDROSE

USO TOPICO:

ADVANTAN----01 POMADA

Aplicar na região afetada à noite, por 10 dias

OU

USO TOPICO:

MOMETASONA CREME----01 POMADA

Aplicar na região afetada à noite, por 10 dias

SE INFECÇÃO SECUNDARIA:

ADINOS GEN ----- 01 POMADA

Aplicar na região afetada à noite, por 10 dias

ESCABIOSE:

USO TOPICO:

PERMETRINA 5% --- 01 FRASCO

Aplicar no corpo todo 3 noites consecutivas. Lavar o corpo na manhã seguinte. Repetir o esquema em 7 dias.

USO ORAL:

IVERMECTINA 6 MG ----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido em dose única. Repetir a dose em 7 dias.

IMPETIGO/ FURUNCULO

PEDIATRIA:

USO ORAL:

CEFALEXINA 250 MG/5 ML --- 01 FRASCO

Dar mL, por via oral, a cada 6 horas, por 7 dias

USO TOPICO:

MUPIROCINA 2% ---- 01 POMADA

Aplicar a pomada nas lesões infectadas, a cada 8 horas (três vezes ao dia). O tempo de tratamento é de 7 dias.

ADULTO:

USO ORAL:

CEFALEXINA 500 MG --- 01 FRASCO

Tomar 01 comprimido, por via oral, a cada 6 horas, por 7 dias

USO TOPICO:

MUPIROCINA 2% ---- 01 POMADA

Aplicar a pomada nas lesões infectadas, a cada 8 horas (três vezes ao dia). O tempo de tratamento é de 7 dias.

ECZEMA / DERMATITE GRAVE:

USO IM:

BETATRINTA (dipropionato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona) --- 01 AMPOLA

Aplicar 1 ampola IM agora, dose única

USO TOPICO:

Trok-G (dipropionato de betametasona + sulfato de gentamicina) ---01 POMADA

Aplicar fina camada 2x ao dia, em face, colo e braços (áreas de lesões), por 14 dias

Nutriol intensivo ----01 frasco

Aplicar 2x ao dia em face, colo e braço (áreas de lesões)

USO ORAL:

ALEKTOS (BISLATINA) 20 MG-----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido a noite, por 7 dias

PRURIDO

USO ORAL:

EBASTEL 10 MG (EBASTINA) -----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido a noite, por 7 dias

OU

ALEKTOS (BISLATINA) 20 MG-----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido a noite, por 7 dias

OU

ALLEGRA 120 MG-----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido a noite, por 7 dias

OU

ZINA 5 MG -----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido a noite, por 7 dias

MICOSES

ONICOMICOSE

MÃO

USO TÓPICO:

CICLOPIROX OLAMINA 8% -- 01 ESMALTE

Aplicar na unha acometida 1x/dia, por 24 semanas/ 6 meses. Remover semanalmente com removedor de esmalte 1x/semana.

USO ORAL:

ITRACONAZOL 100 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos após almoço, por 60 dias/2 meses.

PÉ

USO TÓPICO:

CICLOPIROX OLAMINA 8% -- 01 ESMALTE

Aplicar na unha acometida 1x/dia, por 48 semanas/ 12 meses. Remover semanalmente com removedor de esmalte 1x/semana.

USO ORAL:

ITRACONAZOL 100 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos após almoço, por 120 dias/4 meses.

DERMATITE E FUNGO

CANDICORT --- 01 POMADA

Aplicar uma fina camada sobre a área afetada, de 12/12h, por 7 dias

TINEA CORPORIS / MICOSE PELE

USO ORAL:

ITRACONAZOL 100 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos após almoço, por 30 dias/1 mês

USO TÓPICO:

ICADEN (ISOCONAZOL)--- 01 POMADA

Aplicar 1x/dia sobre a área afetada da pele. Por 3 semanas.

TINEA CAPITS / MICOSE CAPILAR

MANIPULADO

CRIANÇA >6 ANOS:

USO ORAL:

GRISEOFULVINA XAROPE – 01 FRASCO

Dar ml, após almoço, por 45 dias.

USO TÓPICO:

CICLOPIROX OLAMINA XAMPU 1% --- 01 XAMPU

Aplicar no couro cabeludo 3x/semana, por 4 semanas, ou até a cura clínica. Deixar agir por 5-10 minutos antes de enxaguar.

CRIANÇA <6 ANOS

USO ORAL:

GRISEOFULVINA XAROPE – 01 FRASCO

Dar ml, após almoço, por 45 dias.

USO TÓPICO:

CETOCONAZOL XAMPU 2% --- 01 XAMPU

Aplicar no couro cabeludo 3x/semana, por 4 semanas, ou até a cura clínica. Deixar agir por 5-10 minutos antes de enxaguar.

ADULTO:

USO ORAL:

GRISEOFULVINA 500 MG/COMPRIMIDO ---- 60 COMPRIMIDOS

Tomar 01 comprimido após almoço, por 60 dias

USO TÓPICO:

CICLOPIROX OLAMINA XAMPU 1% --- 01 XAMPU

Aplicar no couro cabeludo 3x/semana, por 4 semanas, ou até a cura clínica. Deixar agir por 5-10 minutos antes de enxaguar.

PITIRÍASE VERSICOLOR

USO TOPICO:

CETOCONAZOL 2% XAMPU---- 01 CAIXA

Aplicar no couro cabeludo e nos locais das lesões 1x/dia, por 4 semanas, e deixar agir por 5-10 minutos antes de enxaguar

USO ORAL:

ITRACONAZOL 100 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos após almoço, por 7 dias.

ROSÁCEA

ACIDOS AZELAICO

ZELLA 150MG A / ZELAN EM CREME 200MG / AZELAN GEL 150MG - GEL 15% OU CREME 20%

Aplicar fina camada 2x/dia por, no mínimo, 8-12 semanas:

IVERMECTINA 1% CREME (SOLANTRA/GALDERMA)

Aplicar 1x/dia por, pelo menos, 8-12 semanas. (uso noturno)

BRIMONIDINA (ALFA-AGONISTA ANTI GLAUCOMA) GEL 0,33%

1 vez ao dia

MIRVASO 3 MG/G (GEL 0,5%)

Aplicar no rosto 1x/dia até melhora clínica

CLORIDRATO DE OXIMETAZOLINA (CREME 1%)

Aplicar no rosto 1x/dia até melhora clínica

ESTRIAS

USO TÓPICO:

VITACID 0,5 MG/G --- 01 CREME

Aplicar uma fina camada do produto na região com estrias à noite, de preferência antes de dormir, lavar pela manhã, usar por 3 meses

ÓLEO CORPORAL BIO-OIL ANTIESTRIAS E CICATRIZANTE 125ML --- 01 FRASCO

Aplicar uma fina camada do produto na região com estrias 2x ao dia

MANIPULADO

USO TOPICO:

TRETINOINA 0,05% + LUMINESCENCE 10% + OAT LIPID 3% + CREME QSP 50 G --- 01 POMADA

Aplicar à noite e lavar pela manhã, por 3 meses

FOTOPROTEÇÃO

COM COR EFEITO MAKE

USO FACIAL:

PROTETOR SOLAR FACIAL ANTHELIOS ULTRA COVER+ FPS 85 (LA ROCHE-POSAY) OU PROTETOR SOLAR FACIAL DE ALTA COBERTURA COVERAGE FPS 60 (ISDIN)--- 01 UNIDADE

Aplicar em rosto pela manhã e reaplicar durante o dia

COM COR SECO

PROTETOR SOLAR FACIAL FUSION WATER (ISDIN) --- 01 UNIDADE

Aplicar em rosto pela manhã e reaplicar durante o dia

ACNE

ACNE FACIAL

USO TÓPICO:

Vitacid 0,25 mg/g (tretinoína) --- 01 creme

Vitacid 0,50 mg/g --- 01 creme

USO TÓPICO:

EPIDUO GEL ------- 01 creme

Aplicar uma fina camada no rosto, à noite. Evitar exposição ao sol durante o uso do medicamento. Usar protetor solar diariamente

ISDIN ACNIBEN SABONETE LÍQUIDO FACIAL ANTIOLEOSIDADE EM GEL OU GEL DE LIMPEZA FACIAL DARROW ACTINE PELE OLEOSA E ACNEICA

Uso para lavar a face de manhã e à noite

ACNE NAS COSTAS

USO DERMATOLOGICO:

VITACID XT 1 MG/G --- 01 CREME

Aplicar uma fina camada do produto em dorso à noite, de preferência antes de dormir, lavar pela manhã, usar por 3 meses

OU

EUCERIN CREME CORPORAL ANTIACNE DERMO PURE EFEITO TRIPLO 200ML--- 01 CREME

Aplicar uma fina camada do produto em dorso pela manhã e à noite, de preferência antes de dormir, usar por 3 meses

SABONETE DERMOTIVIN SALIX OU ACTINE DARROW OU PANOXYL ACNE FOAMING WASH---01 SABONETE

Usar durante o banho em região de dorso, deixar agir por 2 minutos e enxaguar em seguida.

ACNE COM ISOTRETINOINA

USO LABIAL:

AQUAPHOR SOS LIPS REPAIR (EUCERIM) OU DERMON CREME (GENOM) OU CICABIO LIP REPAIRS (BIODERMA) OIU BEPANTOL DERMA LABIAL---01 UNIDADE

Aplicar em labios quantas vezes forem necessarias durante o dia. Sempre reaplicar antes de dormir.

USO FACIAL:

AMILIA REPAIR (THERASKIN) OU LOÇÃO HIDRATANTE FACIAL (CERAVE) OU EPIDRAT CALM B5 (MANTECORP) ---01 UNIDADE

Aplicar em face quantas vezes forem necessarias durante o dia. Sempre reaplicar antes de dormir.

GELEIA DE VASELINA (VASENOL) 100G ---01 UNIDADE

Aplicar em região ressecada quantas vezes forem necessarias durante o dia. Sempre reaplicar antes de dormir.

GEL DE LIMPEZA FACIAL PROFUSE NUTREL SENSITIVE OU DARROW SUAVIÉ SABONETE LÍQUIDO FACIAL---01 UNIDADE

Uso para lavar a face de manhã e à noite

PIGMENTAÇÃO

MELASMA

USO DERMATOLOGICO:

EUCERIM DUAL SERUM --- 01 CREME

Aplicar uma fina camada em face de manhã e à noite. Evitar exposição ao sol durante o uso do medicamento. Usar protetor solar diariamente

MANCHA DE ACNE

USO DERMATOLOGICO:

EUCERIN DERMOPURE SERUM TRIPLO EFEITO--- 01 CREME

Aplicar uma fina camada em face de manhã e à noite. Evitar exposição ao sol durante o uso do medicamento. Usar protetor solar diariamente

MANCHA NO CORPO

SOLAQUIN (HIDROQUINONA 4%) --- 01 CREME

Aplicar uma fina camada na área a ser tratada, à noite. Evitar exposição ao sol durante o uso do medicamento. Usar protetor solar diariamente

MANCHA NO ROSTO

USO TÓPICO:

EUCERIN ANTI-PIGMEN DUAL OU BLANCY 8 ---- 01 FRASCO

Aplicar em face pela manhã e a noite, todos os dias. Usar protetor solar durante o dia e evitar exposição solar.

QUEIMADURAS / LESÃO DE PELE GRAVE:

USO TOPICO:

DERMACERIUM 1 + 0,4%----01 TUBO

Aplicar fina camada, de 12/12h, por 7 dias

GELEIA DE VASELINA VASENOL ORIGINAL 100G---01 UNIDADE

Aplicar na área lesionada, quantas vezes forem necessárias durante o dia

QUEIMADURA SOLAR / FITOFOTODERMATITE

USO TÓPICO:

LÍQUIDO DE BUROW (ACETATO DE ALUMÍNIO) --- 01 FRASCO

Fazer compressas geladas, 3x ao dia

PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,05% CREME ----01 TUBO

Aplicar nas lesões 1x/dia, por 7 dias

GELEIA DE VASELINA (VASENOL) 100G---01 UNIDADE

Aplicar na área lesionada, quantas vezes forem necessárias durante o dia

PROTETOR SOLAR ≥ 60 FPS --- 01 FRASCO

Aplicar em todo corpo, reaplicar várias vezes ao dia.TODOS OS DIAS.

USO ORAL:

ALLEGRA (FEXOFENADINA) 60 MG----01 CAIXA

Dar 1 comprimido, por via oral, a cada 12 horas

IBUPROFENO 600MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias

LEISHMANIOSE

USO EV:

1) ANTIMONIATO DE MEGLUMINA (N-METILGLUCAMINA) 81MG - 2 AMPOLAS (5ML)

Diluir medicação em 250 ml soro glicosado a 5%, fazer lento, em 1 hora. Fazer medicação diariamente, por 20 dias.

#ORIENTAÇÕES:

1. Durante a medicação: avaliar sinais vitais, arritmias, precordialgia, dispneia, náuseas, vômitos e dor abdominal;

2. Solicitar eletrocardiograma semanalmente durante o tratamento;

3. Solicitar exames laboratoriais basais semanalmente**:**

- Hemograma completo;

- Ureia e creatinina;

- AST/TGO e ALT/TGP;

- Bilirrubinas totais e frações;

- Fosfatase alcalina;

- Amilase e lipase;

- Glicemia;

- Sódio, potássio, magnésio e cálcio.

COURO CABELUDO SENSÍVEL

USO CAPILAR:

XAMPU DARROW DOCTAR SENSI OU VICHY DERCOS SENSI-SCALP OU VICHY DERCOS SENSI-SCALP + PROBIOTIC FRACTIONS ------01 XAMPU

Aplique o shampoo no couro cabeludo úmido. Massageie gentilmente o couro cabeludo com as pontas dos dedos (evite usar as unhas). Deixe o produto agir por 5 minutos para que os ativos calmantes façam efeito. Enxágue abundantemente com água

LESÃO NA PELE LEVE

USO TÓPICO:

CICAPLAST BAUME B5+ LA ROCHE-POSAY) ---- 01 CREME

Aplicar em local da lesão, 2x ao dia, até cicatrização completa

LESÃO NA PELE MODERADA

USO TÓPICO:

CICALFATE (AVÈNE) OU AQUAPHOr POMADA REPARADORA (EUCERIN)---- 01 CREME

Aplicar em local da lesão, 2x ao dia, até cicatrização completa