Dra. Milena Lopes

DORES

DOR SIMPLES

USO ORAL:

DIPIRONA SÓDICA 500MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 06/06 horas, se dor ou febre.

PARACETAMOL 750 MG---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 06/06 horas, se dor ou febre.

IBUPROFENO 600MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias

PEDIATRIA

USO ORAL:

IBUPROFENO 50 MG/ML---------- 01 FRASCO

Dar gotas de 08/08 horas, por 5 dias

PARACETAMOL 200MG/ML ---------- 01 FRASCO

Dar gotas de 06/06 horas, se dor ou febre

PREDNISOLONA 3 MG/ML----------01 FRASCO

Dar ml 1x ao dia, de manhã, por 5 dias

LOMBALGIA

USO ORAL:

XEFO 8 MG *(lornoxicam)*----------01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 12/12h, por 5 dias

OU

MELOXICAM 7,5 MG (*Bioflac*)----------01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 12/12h, por 5 dias

DIPIRONA SÓDICA 500mg ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 06/06 horas, se dor ou febre.

CICLOBENZAPRINA 10 MG -----01 caixa

Tomar 01 comprimido a noite, por 5 dias

DOR FORTE AGUDA

USO ORAL:

PACO (PARACETAMOL + CODEÍNA 500/75MG) ---------- 24 COMPRIMIDOS

TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 8/8 HORAS HORAS SE DOR FORTE/INSUPORTAVEL

DOR FORTE CRONICA

USO ORAL:

PREGABALINA 75 MG----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido a noite, todos os dias (nos primeiros 5 dias tomar somente metade do comprimido)

USO ORAL:

AMITRIPTILINA 25 MG----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido a noite, todos os dias (nos primeiros 5 dias tomar somente metade do comprimido)

USO ORAL:

DULOXETINA 30 MG--01 CAIXA

Tomar 01 comprimido a noite, todos os dias (nos primeiros 5 dias tomar somente metade do comprimido)

GASTROINTESTINAL

DIARREIA

USO ORAL:

DIPIRONA SÓDICA 500mG ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 06/06 horas, se dor ou febre

MULTI-BI OU 20-BI ---------- 01 CX

Tomar 01 cápsula de 12/12 horas durante 05 dias.

ONDANSETRONA 8MG (*Vonau Flash)* ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 08/08 horas, se sentir náuseas ou vômitos

BUSCOPAN SIMPLES ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 08/08 horas, se cólica

SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G ---------- 10 SACHÊS

Diluir 2 sanches em 2 litros de água mineral. Tomar durante todo o dia. Durante 5 dias.

RECOMENDAÇÕES: Tomar durante o dia 2 l de líquidos (água, suco ou água de coco) durante 5 dias.

PEDIATRIA

USO ORAL:

PARACETAMOL 200MG/ML ---------- 01 FRASCO

Dar gotas de 06/06 horas, se dor ou febre

BIFILAC GERMINA ZN---------- 01 CX

Dar 01 flaconete por dia, durante 05 dias.

ONDANSETRONA ---------- 01 FRASCO

Dar gotas de 08/08 horas, se sentir náuseas ou vômitos

BUSCOPAN COMPOSTO ---------- 01 FRASCO

Dar gotas de 08/08 horas, se cólica

LUFTAL ---------- 01 FRASCO

Dar gotas de 08/08 horas, se gases

SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G ---------- 10 SACHÊS

Diluir 1 sache em 1 litros de água mineral. Tomar durante todo o dia. Durante 5 dias.

DRGE / GASTRITE

USO ORAL:

DEXILANT (DEXLANSOPRAZOL) 60 MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de manhã, em jejum, somente comer ou deitar após 30 minutos do uso da medicação. Tomar por 60 dias

BROMOPRIDA 10 MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 12/12h, por 7 dias

H. PYLORI

USO ORAL:

VONOPRAZANA 20 MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 12/12 horas.

USO ORAL:

AMOXICILINA 500 MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos de 12/12 horas por 14 dias.

CLARITROMICINA 500 MG---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 12/12 horas por 14 dias.

RESPIRATÓRIO

ASMA

USO INALATÓRIO:

BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML ----------01 FRASCO

Fazer nebulização com 25 gotas de ipratrópio + 5 ml de soro fisiológico 0,9% de 8/8 horas por 07 dias

CLENIL HFA SPRAY 200 mcg ---------- 01 FRASCO

Inalar 01 dose pela boca, de 12/12 horas. Lavar a boca e fazer gargarejo com água e enxaguante bucal após o uso.

ALENIA 6 + 200 microgramas----------01 FRASCO

Inalar 1 jatos, de 12/12h

AEROLIN SPRAY---------- 01 FRASCO

USAR SOMENTE SE NECESSÁRIO (em caso de falta de ar, crise de tosse ou chieira no peito).

Inalar 03 doses pela boca, até de 04/04 horas, entre as doses do clenil. Aguardar um intervalo de 10 segundos entre a 1ª e a 2ª dose.

USO ORAL:

PREDNISOLONA 3 MG/ML----------1 FR

ADMINISTRAR ML DE 12/12 HORAS POR 05 DIAS

AMBROXOL 3 MG/ML ----------1 FR

ADMINISTRAR ML DE 8/8 HORAS POR 07 DIAS

DIPIRONA 500 MG/ML----------1 FR

ADMINISTRAR GOTAS DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

TOSSE:

USO ORAL:

ACETILCISTEINA GRANULOS 200 MG/5G----------01 CAIXA

Dissolva o conteúdo de um envelope em água em temperatura ambiente, misture bem e beba imediatamente. Tomar de 12/12 horas, por 05 dias

OU

DROPROPIZINA XAROPE 3 MG/ML----------01 FRASCO

Tomar 10 mL VO, 8/8h, por 07 dias

PREDNISONA 20 MG----------01 CAIXA

Tomar 01 comprimido por dia, pela manha, por 05 dias

USO INALATORIO:

IPRATROPIO -----01 FRASCO

DILUIR 20 GOTAS EM 5 ML DE SORO FISIOLOGICO E INALAR, DE 8/8H, POR 5 DIAS

RINITE / SINUSITE:

USO ORAL:

ALLEGRA D 60 + 120 MG--- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 12/12h, por 5 dias

PREDNISONA 20 MG----------01 CAIXA

Tomar 01 comprimido por dia, pela manha, por 05 dias

USO NASAL:

AVAMYS 27,5 MCG --- 01 FRASCO

Aplicar 2 jatos em cada narina, de 12/12h, por 5 dias

OU

NASONEX 50 MCG --- 01 FRASCO

Aplicar 2 jatos em cada narina, de 12/12h, por 5 dias

RINOSORO JET XT--- 01 FRASCO

Aplicar nas narinas, 3x ao dia

MAXIDRATE GEL NASAL 6 MG/G ---- 01 TUBO

Aplicar nas narinas, 4x ao dia

ARBOVIROSES

DENGUE

USO ORAL:

MULTI-BI OU 20-BI ---------- 01 CX

Tomar 01 cápsula de 12/12 horas durante 05 dias.

DIPIRONA 500 MG ---------- 01 cx

Tomar 01 comprimido de 06/06 horas em caso de dor ou febre.

BROMOPRIDA 10 MG ---------- 01 cx

Tomar 01 comprimido de 08/08 horas se náuseas ou vômitos.

CICLOBENZAPRINA 10 MG-----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido a noite, por 5 dias

SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL ---------- 05 SACHÊS
Diluir 01 sachê em 1L de água mineral durante o dia. Descartar se mais de 24h depois de preparado. Conservar em geladeira. Tomar por 5 dias

NEUROLÓGICO

CRISE DE ENXAQUECA:

USO ORAL:

DIPIRONA SÓDICA 500MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 06/06 horas, se dor ou febre.

NAPROXENO 550 MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 3 dias

METOCLOPRAMIDA 10 MG---01 CAIXA

Dar 1 comprimido, por via oral, a cada 8 horas, se nausea ou vomito

NARAMIG 2,5 MG (NARATRIPTNA) -----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido durante crise enxaqueca, caso necessario. pode repetir mais uma dose após 4h. Não podendo ultrapassar o uso de 2 comprimidos por dia

ZEFURUS 40 MG (ELETRIPTANA) -----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido durante crise enxaqueca, caso necessario. pode repetir mais uma dose após 4h. Não podendo ultrapassar o uso de 2 comprimidos por dia

OFTALMOLOGICOS:

CONJUNTIVITE:

USO OFTALMICO:

TOBRACORT (TOBRAMICINA + DEXAMETASONA)SOLUÇÃO OFTÁLMICA———-01 COLÍRIO

Aplicar 1 gota 4x/dia por 7 dias

USO ORAL:

ALLEGRA (FEXOFENADINA) 60 MG----01 CAIXA

Dar 1 comprimido, por via oral, a cada 12 horas

COLÍRIOS LUBRIFICANTES

LAXIME (HIALURONATO DE SÓDIO A 0,15%)———-01 COLÍRIO

Aplicar 1 gota em ambos os olhos quando sentir o olho seco, até 6x ao dia

Ou

HILUROPT (HIALURONATO DE SÓDIO 0,15%)———01 COLÍRIO

Aplicar 1 gota em ambos os olhos quando sentir o olho seco, até 6x ao dia

BLEFARITE / OFTALMO:

USO OFTALMICO:

TOBRACORT (TOBRAMICINA + DEXAMETASONA)SOLUÇÃO OFTÁLMICA———-01 COLÍRIO

Aplicar 1 gota 4x/dia por 7 dias

BLEPHAGEL 40 G OU JOHNSONS BABY --- GEL DE LIMPEZA

Lavar região ocular, com agua, 2x ao dia

OTOLOGICO

CERUME IMPACTADO

USO OTOLOGICO:

CERUMIN (HIDROXIQUINOLINA + TROLAMINA) ----01 FRASCO

Aplicar 5 gotas no ouvido afetados de 8/8horas, por 5 dias (Manter deitado, com o ouvido afetado voltado para cima, por 5 minutos após a aplicação)

OTITE EXTERNA

USO OTOLOGICO:

OTOSYLASE (FLUOCINOLONA ACETONIDA + POLIMIXINA B + NEOMICINA + LIDOCAÍNA) ----01 FRASCO

Aplicar 3 gotas no ouvido afetados de 8/8horas, por 7 dias (Manter deitado, com o ouvido afetado voltado para cima, por 5 minutos após a aplicação).

USO OTOLOGICO:

OTOCIRIAX (CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA) ----01 FRASCO

Aplicar 3 gotas no ouvido afetados de de 12/12 horas, por 7 dias. dias (manter deitado, com o ouvido afetado voltado para cima, por 5 minutos após a aplicação).

OTITE MEDIA

VIA ORAL:

AMOXICILINA + CLAVULANATO 875 MG + 125 MG -----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de de 12/12 horas, por 10 dias.

VERTIGEM / LABIRINTITE / VPPB

USO ORAL:

CINARIZINA 75 MG ----01 CAIXA

Tomar 1 comprimido por dia, por 5 dias

OU

BETAISTINA 16 MG ----01 CAIXA

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas, por 3 dias

OU

FLUNARIZINA 10 MG----01 CAIXA

Tomar 1 comprimido à noite, por 3 noites

DICLORIDRATO DE MECLOZINA (*Meclin)* 25 MG _____01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 12/12 horas, por 3 dias

Dra. Milena Lopes

DERMATOLOGICOS:

HERPES

USO ORAL:

VALACICLOVIR 500 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos, de 8/8 horas, por 7 dias

PREDNISONA 20 MG , PREDNISONA 10 MG , PREDNISONA 5 MG ---- 01 CAIXA CADA

Tomar 3 comprimidos de 20 mg 1x/dia, pela manhã, por 5 dias
Após os 5 primeiros dias, tomar 1 comprimido de 20 mg + 1 comprimido de 10 mg por 5 dias
Após, tomar 1 comprimido de 10 mg + 1 comprimido de 5 mg por 5 dias
Após, tomar 1 comprimido de 5 mg por 5 dias
Suspender o uso

IVERMECTINA 6 MG---- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido dose única. Repetir o tratamento após 15 dias.

PITIRÍASE VERSICOLOR

USO TOPICO:

CETOCONAZOL 2% XAMPU---- 01 CAIXA

Aplicar no couro cabeludo e nos locais das lesões 1x/dia, por 4 semanas, e deixar agir por 5-10 minutos antes de enxaguar

USO ORAL:

ITRACONAZOL 100 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos após almoço, por 7 dias.

QUEIMADURAS / LESÃO DE PELE GRAVE:

USO TOPICO:

DERMACERIUM 1 + 0,4%----01 TUBO

Aplicar fina camada, de 12/12h, por 7 dias

GELEIA DE VASELINA VASENOL ORIGINAL 100G---01 UNIDADE

Aplicar na área lesionada, quantas vezes forem necessárias durante o dia

QUEIMADURA SOLAR / FITOFOTODERMATITE

USO TÓPICO:

LÍQUIDO DE BUROW (ACETATO DE ALUMÍNIO) --- 01 FRASCO

Fazer compressas geladas, 3x ao dia

PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,05% CREME ----01 TUBO

Aplicar nas lesões 1x/dia, por 7 dias

GELEIA DE VASELINA VASENOL ORIGINAL 100G---01 UNIDADE

Aplicar na área lesionada, quantas vezes forem necessárias durante o dia

PROTETOR SOLAR ≥ 60 FPS --- 01 FRASCO

Aplicar em todo corpo, reaplicar 2x ao dia. Ou de 2/2h.TODOS OS DIAS.

USO ORAL:

ALLEGRA (FEXOFENADINA) 60 MG----01 CAIXA

Dar 1 comprimido, por via oral, a cada 12 horas

IBUPROFENO 600MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias

LARVA MIGRANS / BICHO-GEOGRAFICO

ADULTOS:

USO ORAL:

ALBENDAZOL 400 MG/COMPRIMIDO --- 01 CAIXA

Tomar 1 comprimido após almoço, 5 dias

USO TÓPICO:

TIABENDAZOL 5% --01 POMADA

Aplicar na lesão 3x/dia, por 5 dias

CRIANÇAS:

USO ORAL:

ALBENDAZOL 400 MG/10 ML --- 01 FRASCO

Dar ml após o almoço, por 3 dias.

USO TÓPICO:

TIABENDAZOL 5% --01 POMADA

Aplicar na lesão 2x/dia, por 5 dias

BROMIDROSE

USO TÓPICO:

SABONETE LIQUIDO SOAPEX 100ML ANTISSÉPTICO OU DARROW SOAPELLE 140ML----01 FRASCO

Lavar axilas com o sabonete, 1x ao dia, por 60 dias

PERSPIREX DESODORANTE----01 UNIDADE

Aplicar após banho, todos os dias

RECEITA ESPECIAL:

USO TÓPICO:

VERUTEX 20 MG/G ----01 POMADA

Aplicar em axilas à noite, por 30 dias

MANIPULADO ESPECIAL

USO TÓPICO:

CLINDAMICINA GEL (1%) **----01 POMADA**

Aplicar na região afetada à noite, por 21 dias

DERMATITE DE CONTATO / DESIDROSE

USO TOPICO:

ADVANTAN----01 POMADA

Aplicar na região afetada à noite, por 10 dias

OU

USO TOPICO:

MOMETASONA CREME----01 POMADA

Aplicar na região afetada à noite, por 10 dias

SE INFECÇÃO SECUNDARIA:

ADINOS GEN ----- 01 POMADA

Aplicar na região afetada à noite, por 10 dias

ESCABIOSE:

USO TOPICO:

PERMETRINA 5% --- 01 FRASCO

Aplicar no corpo todo 3 noites consecutivas. Lavar o corpo na manhã seguinte. Repetir o esquema em 7 dias.

USO ORAL:

IVERMECTINA 6 MG ----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido em dose única. Repetir a dose em 7 dias.

IMPETIGO/ FURUNCULO

PEDIATRIA:

USO ORAL:

CEFALEXINA 250 MG/5 ML --- 01 FRASCO

Dar mL, por via oral, a cada 6 horas, por 7 dias

USO TOPICO:

MUPIROCINA 2% ---- 01 POMADA

Aplicar a pomada nas lesões infectadas, a cada 8 horas (três vezes ao dia). O tempo de tratamento é de 7 dias.

ADULTO:

USO ORAL:

CEFALEXINA 500 MG --- 01 FRASCO

Tomar 01 comprimido, por via oral, a cada 6 horas, por 7 dias

USO TOPICO:

MUPIROCINA 2% ---- 01 POMADA

Aplicar a pomada nas lesões infectadas, a cada 8 horas (três vezes ao dia). O tempo de tratamento é de 7 dias.

ECZEMA / DERMATITE GRAVE:

USO IM:

BETATRINTA (dipropionato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona) --- 01 AMPOLA

Aplicar 1 ampola IM agora, dose única

USO TOPICO:

Trok-G (dipropionato de betametasona + sulfato de gentamicina) ---01 POMADA

Aplicar fina camada 2x ao dia, em face, colo e braços (áreas de lesões), por 14 dias

Nutriol intensivo ----01 frasco

Aplicar 2x ao dia em face, colo e braço (áreas de lesões)

USO ORAL:

Ebastel 10 mg (ebastina) -----01 caixa

Tomar 01 comprimido a noite, por 30 dias

ONICOMICOSE

MÃO

USO TÓPICO:

CICLOPIROX OLAMINA 8% -- 01 ESMALTE

Aplicar na unha acometida 1x/dia, por 24 semanas/ 6 meses. Remover semanalmente com removedor de esmalte 1x/semana.

USO ORAL:

ITRACONAZOL 100 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos após almoço, por 60 dias/2 meses.

PÉ

USO TÓPICO:

CICLOPIROX OLAMINA 8% -- 01 ESMALTE

Aplicar na unha acometida 1x/dia, por 48 semanas/ 12 meses. Remover semanalmente com removedor de esmalte 1x/semana.

USO ORAL:

ITRACONAZOL 100 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos após almoço, por 120 dias/4 meses.

TINEA CORPORIS / MICOSE PELE

USO ORAL:

ITRACONAZOL 100 MG---- 01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos após almoço, por 30 dias/1 mês

USO TÓPICO:

ICADEN (ISOCONAZOL)--- 01 POMADA

Aplicar 1x/dia sobre a área afetada da pele. Por 3 semanas.

TINEA CAPITS / MICOSE CAPILAR

MANIPULADO

CRIANÇA >6 ANOS:

USO ORAL:

GRISEOFULVINA XAROPE – 01 FRASCO

Dar ml, após almoço, por 45 dias.

USO TÓPICO:

CICLOPIROX OLAMINA XAMPU 1% --- 01 XAMPU

Aplicar no couro cabeludo 3x/semana, por 4 semanas, ou até a cura clínica. Deixar agir por 5-10 minutos antes de enxaguar.

CRIANÇA <6 ANOS

USO ORAL:

GRISEOFULVINA XAROPE – 01 FRASCO

Dar ml, após almoço, por 45 dias.

USO TÓPICO:

CETOCONAZOL XAMPU 2% --- 01 XAMPU

Aplicar no couro cabeludo 3x/semana, por 4 semanas, ou até a cura clínica. Deixar agir por 5-10 minutos antes de enxaguar.

ADULTO:

USO ORAL:

GRISEOFULVINA 500 MG/COMPRIMIDO ---- 60 COMPRIMIDOS

Tomar 01 comprimido após almoço, por 60 dias

USO TÓPICO:

CICLOPIROX OLAMINA XAMPU 1% --- 01 XAMPU

Aplicar no couro cabeludo 3x/semana, por 4 semanas, ou até a cura clínica. Deixar agir por 5-10 minutos antes de enxaguar.

ESTRIAS

USO TOPICO:

VITACID 0,05% ----- 01 POMADA

Aplicar nas estrias à noite e lavar pela manhã, por 3 meses

MANIPULADO

USO TOPICO:

TRETINOINA 0,05% + LUMINESCENCE 10% + OAT LIPID 3% + CREME QSP 50 G --- 01 POMADA

Aplicar à noite e lavar pela manhã, por 3 meses

GINECOLOGICOS / OBSTETRICOS

CANDIDÍASE

USO ORAL:

FLUCONAZOL 150 MG ------01 CAIXA

Tomar 01 comprimido em dose única;

USO VAGINAL:

MICONAZOL CREME VAGINAL 20 MG/G----01 POMADA

Inserir 01 aplicador via vaginal à noite, por 7 dias

CANDIDIASE RESISTENTE:

USO ORAL:

Itraconazol 100 mg------01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos VO, 2x/dia(após refeição), por 3 dias

USO VAGINAL:

Miconazol creme vaginal 20 mg/g----01 POMADA

Inserir 01 aplicador via vaginal à noite, por 14 dias

VAGINOSE BACTERIANA/ TRICOMONIASE

USO ORAL:

Metronidazol 250 mg------01 CAIXA

Tomar 2 comprimidos VO de 12/12 horas por 7 dias

USO VAGINAL:

Metronidazol ginecológico 100 mg/g ------01 CAIXA

Inserir 01 aplicador via vaginal à noite, por 5 dias

RESSECAMENTO VAGINAL

USO VAGINAL:

HIDRAFEMME 24G --- 01 GEL HIDRATANTE VAGINAL

Com o auxílio do aplicador, aplique o Hidrafemme no interior da vagina. Aplicar apenas duas vezes por semana (exemplo: terça e sexta).

GESTANTE SOS

USO ORAL:

DRAMIN_____01 CAIXA
TOMAR 01 CP DE 08/08 HORAS, SE SENTIR NÁUSEAS OU VÔMITOS.

DICLORIDRATO DE MECLOZINA (*Meclin)* 25 MG _____01 CAIXA
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS, SE SENTIR NÁUSEAS OU VÔMITOS SEM MELHORA AO USO DE DRAMIN

PARACETAMOL 500 MG_____01 CAIXA
TOMAR 01 CP DE 06/06 HORAS, SE DOR /FEBRE.

BUSCOPAN SIMPLES_____01 CAIXA
TOMAR 01 CP DE 08/08 HORAS, SE CÓLICA.

SIMETICONA 40 MG_____01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 08/08 HORAS, SE QUEIMAÇÃO.

SUPLEMENTO GESTANTE

USO ORAL:

GESTAPS, REGENESIS, MATERNA, FEMINIS_____01 CAIXA

Tomar 01 todos os dias, até 3 meses após o parto

COLICA / METRORRAGIA / DISMENORREIA

USO ORAL:

TRANSAMIN 250MG---01CX

Tomar 01 cps de 8/8 horas por 05 dias.

PONSTAN ----------01CX

Tomar 01cp de 8/8 horas por 05 dias

BUSCOPAN COMPOSTO ---------- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 08/08 horas, se cólica abdominal

USO SUBLINGUAL:

TORAGESIC OU VÓRIC---------- 01 CAIXA

Colocar 01 unidade embaixo da língua, até absorção do medicamento, de 08/08 horas, por 2 dias

DISLIPIDEMIAS

COLESTEROL

USO ORAL:

ROSUVASTATINA 40 MG------01 CAIXA

Tomar 01 comprimido por dia, a noite, todos os dias

TREZETE 20 MG + 10 MG (ROSUVASTATINA + EZETIMIBA) -----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido por dia, a noite, todos os dias

TRIGLICERÍDEOS

FENOFIBRATO 160 MG -----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido por dia, ,durante o jantar, todos os dias

OU

CIPROFIBRATO 100 MG -----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido por dia, durante o jantar, todos os dias

VASCULAR / PROCTO/URO

HEMORROIDA / CONSTIPAÇÃO

USO RETAL:

PROCTYL (POLICRESULENO + CLORIDRATO DE CINCHOCAÍNA) ---------- 01 POMADA

Aplicar fina camada na região afetada 2-3x/dia até melhora dos sintomas.

DIOSMINA + HESPERIDINA 500 MG/COMPRIMIDO---------- 01 CAIXA

tomar 6 comprimidos/dia, nos primeiros 4 dias, seguidos de 4 comprimidos/dia, por 3 dias, e, em seguida, 2 comprimidos/dia, por 3 meses

USO ORAL:

LACTULOSE (667 MG/120 ML) ---------- 01 frasco

Tomar 15 mL VO a cada 8 horas, por 3 dias

OU

PEG-LAX---------- 01 CAIXA

Dissolver um envelope em um copo com água (200 ml) e tomar uma vez ao dia, por 5 dias

MULTI-BI FIBRAS OU PROLIVE FIBRAS ---------- 01 CAIXA

Como tomar multi-bi fibras: diluído em água ou em outro líquido de sua preferência, mexendo até total dissolução. Tomar 1x ao dia, por 5 dias

Como tomar prolive fibras: tomar 1x ao dia, por 5 dias

VARIZES:

USO ORAL:

DIOSMINA + HESPERIDINA 500 MG/COMPRIMIDO---------- 01 CAIXA

tomar 6 comprimidos/dia, nos primeiros 4 dias, seguidos de 4 comprimidos/dia, por 3 dias, e, em seguida, 2 comprimidos/dia, por 3 meses

USO TÓPICO:

DIOSMIN CREME---------- 01 FRASCO

Aplique uma fina camada sobre a pele limpa e seca das pernas e pés, duas vezes ao dia. Espalhe o produto com movimentos circulares e ascendentes (de baixo para cima), dos pés em direção às coxas, massageando suavemente até a completa absorção.

FIMOSE

USO TÓPICO:

POSTEC 20G ---------- 01 POMADA

Aplicar fina cama em prepucio, de 12/12h, por 10 dias

CARDIOLOGICOS

HIPERTENSÃO

USO ORAL:

LOSARTANA 50 MG (*Corus*)----- 02 CAIXAS

Tomar 01 comprimido de manhã e 01 comprimido a noite, todos os dias

HIDROCLOROTIAZIDA----- 02 CAIXAS

Tomar 01 comprimido de manhã, todos os dias

ANLODIPINO 5 MG----- 02 CAIXAS

Tomar 01 comprimido a noite, todos os dias

INSUFICIÊCIA CARDIACA:

ENALAPRIL 10 MG----- 02 CAIXAS

Tomar 01 comprimido a de manhã e 01 a noite, todos os dias

OU

ENTRESTO 24/26 MG *(sacubitril/valsartana)* ----- 02 CAIXAS

Tomar 01 comprimido a de manhã e 01 a noite, todos os dias

ESPIRONOLACTONA 25 MG (*Aldactone*)----- 02 CAIXAS

Tomar 01 comprimido de manhã, todos os dias

DAPAGLIFLOZINA 10 MG *(Forxiga*)----- 02 CAIXAS

Tomar 01 comprimido de manhã, todos os dias

CARVEDILOL 12,5, MG----- 02 CAIXAS

Tomar 01 comprimido a de manhã e 01 a noite, todos os dias

ENDOCRINOLOGICOS

DIABETES

USO ORAL:

GLIFAGE XR 850 MG -----02 CAIXAS

Tomar 01 comprimido, de 8/8h, após a refeição, todos os dias

DAPAGLIFOZINA 10 MG-----01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de manhã, todos os dias

VITAMINA D

COLECALCIFEROL 50.000 UI ----- 01 CAIXA

Tomar 01 comprimido de 50.000 UI 1x na semana, por 2 meses

COLECALCIFEROL 7.000 UI ----- 01 CAIXA

Após os 2 meses do uso da dose de 50.000, irá iniciar somente a dose de 7.000. Tomar 01 comprimido de 7.000 UI 1x na semana, por 1 mês

FERRO

USO ORAL:

SULFATO FERROSO (40 MG DE FERRO ELEMENTAR)----- 01 CAIXA

Tomar 02 comprimidos, 1 hora antes ou 2 horas após a refeição; em caso de intolerância gastrointestinal, pode ser administrado com as refeições. Tomar com suco de laranja ou limão.

USO ENDOVENOSO:

SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO (NORIPURUM - BLANVER) 100 MG/5 ML ------ 10 UNIDADES

Diluir 2 ampolas em 250 ml de soro fisiológico, infundir lento em 1 hora. Uma vez por semana, por 5 semanas

B12

USO INTRAMUSCULAR:

CIANOCOBALAMINA 1.000 MICROGRAMAS/AMPOLA ----- 04 AMPOLAS

Aplicar 1 ampola IM 1x/dia por 1 semana. Depois, 1.000 microgramas/semana por 4 semanas.

OU

USO ORAL:

CIANOCOBALAMINA 5.000 MICROGRAMAS/COMPRIMIDO)

Tomar 01 comprimido de 5.000 mcg, 1x na semana, por 2 meses

OSTEOPENIA

USO ORAL:

PROSSO KM MDK TABLETES CARAMELO -------02 CAIXAS

Mastigar 1 tablete por dia, após almoço, por 60 dias

PSIQUIATRICOS

ANSIEDADE:

USO ORAL:

ZOLOFT (SERTRALINA 50 MG) --------60 COMPRIMIDOS (USO CONTÍNUO)

Tomar 01 comprimido, todos os dias (nos primeiros 5 dias tomar somente metade do comprimido)

FLUOXETINA 20 MG --------60 COMPRIMIDOS (USO CONTÍNUO)

Tomar 01 comprimido, todos os dias (nos primeiros 5 dias tomar somente metade do comprimido)

DESVENLAFAXINA 50 MG --------60 COMPRIMIDOS (USO CONTÍNUO)

Tomar 01 comprimido, todos os dias (nos primeiros 5 dias tomar somente metade do comprimido). SEMPRE TOMAR NO MESMO HORÁRIO.

PAROXETINA 20 MG --------60 COMPRIMIDOS (USO CONTÍNUO)

Tomar 01 comprimido, todos os dias (nos primeiros 5 dias tomar somente metade do comprimido)

INSÔNIA

USO ORAL:

SINTOCALMY 600 MG

Tomar 01 comprimido a noite, quando houver insônia

SUPLEMENTOS PARA QUEDA DE CABELO

USO ORAL:

NEOSIL ATTACK ---- 03 caixas

Tomar 01 todos os dias, por 90 dias

ALOPECIA ANDROGENETICA

USO ORAL:

ESPIRONOLACTONA 25 MG---- 60 COMPRIMIDOS

Tomar 1x/dia, de manhã, por 60 dias

Observação: usar método contraceptivo de barreira e hormonal para não engravidar durante o uso

USO ORAL:

MINOXIDIL 0,5 MG/COMPRIMIDO---- 60 COMPRIMIDOS

Tomar 1x/dia, de manhã, por 60 dias

Observação: retornar na consulta médica após 60 dias para reajuste da dose

ATB - ANTIBIOTICOS

NITROFURANTOINA 100 mg ----------01 caixa

Tomar 01 comprimido de 6/6 horas, por 10 dias, de preferência após se alimentar

CIPROFLOXACINO 500MG ----------01 CAIXA

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias

AMOXICILINA + CLAVULANATO 875/125MG ---------- 01 CAIXA

tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias

AZITROMICINA 500MG ---------- 01 CAIXA

Tomar 1 comprimido ao dia por 7 dias

BACTRIM 800/160MG ---------- 01 CAIXA

tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5 dias

USO IM:

BENZILPENICILINA BENZATINA (*BENZETACIL)* 1.200.000 UI ------- 06 AMPOLAS

Aplicar IM, 1 ampola em cada glúteo (totalizando 2.400.000 UI), 1x na semana por 3 semanas