

Отговори, упътвания, решения

Задача 1. Нека измеренията на правоъгълен паралелепипед са a, b, c . Тогава обемът му е $V = abc$, а лицето на повърхнината е $S = 2(ab + bc + ca)$. От неравенството между средното аритметично и средното геометрично за положителни числа a, b, c имаме:

$$ab + bc + ca \geq 3\sqrt[3]{ab \cdot bc \cdot ca},$$

като равенството се достига само когато $ab = bc = ca$, т.е. само при $a = b = c$. Така получаваме

$$S = 2(ab + bc + ca) \geq 6\sqrt[3]{a^2b^2c^2} \text{ или } S \geq 6\sqrt[3]{V^2}.$$

Оттук следва, че най-малката стойност на S е $6\sqrt[3]{V^2}$ и тя се достига само при $a = b = c = \sqrt[3]{V}$, т.е. само за куба с дължина $\sqrt[3]{V}$ на ръбовете.

Задача 2. От предната задача използваме означенията и неравенство $S \geq 6\sqrt[3]{V^2}$, което е равносилно на $V^2 \leq \frac{S^3}{216}$ или $V \leq \frac{S\sqrt{S}}{6\sqrt{6}}$. Оттук вече следва, че най-голямата

стойност на V е $\frac{S\sqrt{S}}{6\sqrt{6}}$ и тя се достига само при $a = b = c = \sqrt{\frac{S}{6}}$, т.е. само за куба с дължина $\sqrt{\frac{S}{6}}$ на ръбовете.

Задача 3. Означаваме с a и b дължините на ръбовете при основите на прав паралелепипед, с γ – мярката на ъгъла между тях, а с c дължините на околните ръбове. Тогава лицето на основата е $B = ab \cdot \sin \gamma$, обемът е $V = B \cdot c = ab \cdot \sin \gamma \cdot c$, а лицето на повърхнината е $S = 2(ab \cdot \sin \gamma + bc + ca)$. Тъй като $0^\circ < \gamma < 180^\circ$, то $0 < \sin \gamma \leq 1$ и от неравенството между средното аритметично и средното геометрично имаме

$$ab \cdot \sin \gamma + bc + ca \geq 3\sqrt[3]{ab \cdot \sin \gamma \cdot bc \cdot ca} \geq 3\sqrt[3]{a^2 b^2 \cdot \sin^2 \gamma \cdot c^2}, \text{ понеже } 1 \geq \sin \gamma \geq \sin^2 \gamma > 0.$$

Така получаваме $S = 2(ab \cdot \sin \gamma + bc + ca) \geq 6\sqrt[3]{V^2}$, като равенството се достига само когато $\sin \gamma = 1$, т.е. $\gamma = 90^\circ$ и $a = b = c = \sqrt[3]{V}$. Следователно най-малката стойност на S е $6\sqrt[3]{V^2}$ и тя се достига само за правоъгълен паралелепипед с дължина $\sqrt[3]{V}$ на ръбовете, т.е. само за куба с тези ръбове.

Задача 4. Както в решението на предната задача и при същите означения получаваме неравенството $S \geq 6\sqrt[3]{V^2}$. То е равносилно на $V^2 \leq \frac{S^3}{216}$ или $V \leq \frac{S\sqrt{S}}{6\sqrt{6}}$ и оттук следва, че най-голямата стойност на V е $\frac{S\sqrt{S}}{6\sqrt{6}}$ и тя се достига само за правоъгълен паралелепипед с дължина $\sqrt{\frac{S}{6}}$ на ръбовете, т.е. само за куба с тези ръбове.

Задача 5. Означаваме с a, b, c дължините на страните на основите-триъгълници с даден периметър $2p$. За тяхното лице B е изпълнено неравенството $B \leq \frac{\sqrt{3}}{9} p^2$, доказано в [3] – задача 1, а за височината h на призмата имаме $h \leq l$. Обемът V на призмата се определя чрез формулата $V = B \cdot h$ и за него е в сила неравенството $V \leq \frac{\sqrt{3}}{9} p^2 l$, като равенството се достига само когато $a = b = c = \frac{2}{3} p$ и $h = l$. Оттук следва, че най-голям обем има тази права триъгълна призма, чиито основи са равностранни триъгълници с дължини $\frac{2}{3} p$ на страните и дължина l на височината, т.е. търсената триъгълна призма е правилна.

Задача 6. Използваме означенията от решението на предната задача. Лицето S на повърхнината на призмата се определя по формулата $S = 2B + S_1 + S_2 + S_3$, където S_1, S_2, S_3 са лицата на околните стени-успоредници с дължини на страните съответно a и l, b и l, c и l .

Ако $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ са съответните ъгли между тях, то $0^0 < \varphi_1 < 180^0$, $0^0 < \varphi_2 < 180^0$, $0^0 < \varphi_3 < 180^0$, $0 < \sin\varphi_1 \leq 1$, $0 < \sin\varphi_2 \leq 1$, $0 < \sin\varphi_3 \leq 1$ и имаме $S_1 = a.l.\sin\varphi_1 \leq a.l$, $S_2 = b.l.\sin\varphi_2 \leq b.l$, $S_3 = c.l.\sin\varphi_3 \leq c.l$. Така получаваме неравенството $S \leq \frac{2\sqrt{3}}{9}.p^2 + (a + b + c).l$ или $S \leq \frac{2\sqrt{3}}{9}.p^2 + 2p.l$, като равенството се достига само когато $a = b = c = \frac{2}{3}p$ и $\sin\varphi_1 = \sin\varphi_2 = \sin\varphi_3 = 1$, т.е. $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = 90^0$ и околните ръбове са перпендикулярни на основите. Оттук следва, че най-голямо лице на повърхнината има същата правилна триъгълна призма от Задача 5.

Задача 7. Означаваме с a, b, c, d дължините на страните на основите, които са четириъгълници с даден периметър $2p$. За тяхното лице B е изпълнено неравенството $B \leq \frac{1}{4}p^2$, доказано в [4] – задача 5, а за височината h на призмата имаме $h \leq l$. Обемът V на призмата се определя чрез формулата $V = B.h$ и за него е в сила неравенството $V \leq \frac{1}{4}p^2.l$, като равенството се достига само за права призма с основи квадрати с дължини на страните $a = b = c = d = \frac{1}{2}p$ и $h = l$. Оттук следва, че най-голям обем има тази права четириъгълна призма, чиито основи са квадрати с дължини $\frac{1}{2}p$ на страните и дължина l на височината, т.е. търсената четириъгълна призма е правилна.

Задача 8. Използваме означенията от решението на предната задача. Лицето S на повърхнината на призмата се определя по формулата $S = 2B + S_1 + S_2 + S_3 + S_4$, където S_1, S_2, S_3, S_4 са лицата на околните стени-успоредници с дължини на страните съответно a и l, b и l, c и l, d и l . Ако $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ са съответните ъгли между тях, то $0^0 < \varphi_1 < 180^0$, $0^0 < \varphi_2 < 180^0$, $0^0 < \varphi_3 < 180^0$, $0^0 < \varphi_4 < 180^0$, $0 < \sin\varphi_1 \leq 1$, $0 < \sin\varphi_2 \leq 1$, $0 < \sin\varphi_3 \leq 1$, $0 < \sin\varphi_4 \leq 1$ и имаме $S_1 = a.l.\sin\varphi_1 \leq a.l$, $S_2 = b.l.\sin\varphi_2 \leq b.l$, $S_3 = c.l.\sin\varphi_3 \leq c.l$, $S_4 = d.l.\sin\varphi_4 \leq d.l$. Така получаваме следното неравенство:

$$S \leq \frac{1}{2}p^2 + (a + b + c + d).l \text{ или } S \leq \frac{1}{2}p^2 + 2p.l,$$

като равенството се достига само за призма с основи квадрати с дължини на страните $a = b = c = d = \frac{1}{2}p$ и $\sin\varphi_1 = \sin\varphi_2 = \sin\varphi_3 = \sin\varphi_4 = 1$, т.е. $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \varphi_4 = 90^0$ и околните ръбове са перпендикулярни на основите. Оттук вече следва, че най-голямо лице на повърхнината има същата правилна четириъгълна призма от Задача 7.

Задача 9. Означаваме с a_1, a_2, \dots, a_n дължините на страните на основите, които са n -ъгълници ($n \geq 3$) с даден периметър P . За тяхното лице B е изпълнено неравенството

$$B \leq \frac{1}{4n} \cotg \frac{\pi}{n} \cdot P^2, \text{ доказано в [5] – задача 7,}$$

а за височината h на призмата имаме $h \leq l$. Обемът V на призмата се определя чрез формулата $V = B \cdot h$ и за него е в сила неравенството $V \leq \frac{1}{4n} \cotg \frac{\pi}{n} \cdot P^2 \cdot l$, като равенството се достига само за права призма с основи правилни n -ъгълници ($n \geq 3$) с дължини на страните $a_1 = a_2 = \dots = a_n = \frac{1}{n} P$ и $h = l$. Оттук вече следва, че най-голям обем има тази права n -ъгълна призма, чиито основи са правилни n -ъгълници ($n \geq 3$) с дължини $\frac{1}{n} P$ на страните и дължина l на височината, т.е. търсената n -ъгълна призма е правилна.

Задача 10. Използваме означенията от решението на предната задача. Лицето S на повърхнината на призмата се определя по формулата $S = 2B + S_1 + S_2 + \dots + S_n$, където S_1, S_2, \dots, S_n са лицата на околните стени-успоредници с дължини на страните съответно a_1 и l, a_2 и l, \dots, a_n и l . Ако $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ са съответните ъгли между тях, то $0^\circ < \varphi_1 < 180^\circ, 0^\circ < \varphi_2 < 180^\circ, \dots, 0^\circ < \varphi_n < 180^\circ, 0 < \sin \varphi_1 \leq 1, 0 < \sin \varphi_2 \leq 1, \dots, 0 < \sin \varphi_n \leq 1$ и имаме $S_1 = a_1 \cdot l \cdot \sin \varphi_1 \leq a_1 \cdot l, S_2 = a_2 \cdot l \cdot \sin \varphi_2 \leq a_2 \cdot l, \dots, S_n = a_n \cdot l \cdot \sin \varphi_n \leq a_n \cdot l$. Така получаваме следното неравенство:

$$S \leq \frac{1}{2n} \cotg \frac{\pi}{n} \cdot P^2 + (a_1 + a_2 + \dots + a_n) \cdot l \quad \text{или} \quad S \leq \frac{1}{2n} \cotg \frac{\pi}{n} \cdot P^2 + P \cdot l,$$

като равенството се достига само за призма с основи правилни n -ъгълници с дължини на страните $a_1 = a_2 = \dots = a_n = \frac{1}{n} P$ и $\sin \varphi_1 = \sin \varphi_2 = \dots = \sin \varphi_n = 1$, т.е. $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \dots = \varphi_n = 90^\circ$ и околните ръбове са перпендикулярни на основите. Оттук вече следва, че най-голямо лице на повърхнината има същата правилна n -ъгълна ($n \geq 3$) призма от Задача 9.

ЛИТЕРАТУРА

1. К. Коларов, Хр. Лесов, Сборник от задачи по геометрия VII–XII клас, Част втора, Издателство „Интеграл“, Добрич, 2015.
2. К. Коларов, Хр. Лесов, Сборник от задачи по стереометрия, Издателство „Интеграл“, Добрич, 2017.
3. Хр. Лесов, Неравенства и екстремални задачи за триъгълник, списание „Математика плюс“, кн. 4, 2013, стр. 48 – 51.
4. Хр. Лесов, Неравенства и екстремални задачи за четириъгълник, списание „Математика плюс“, кн. 4, 2015, стр. 28 – 32.
5. Хр. Лесов, Неравенства и екстремални задачи за многоъгълник, списание „Математика плюс“, кн. 1, 2015, стр. 27–31.