



# ЗАДАЧИ М+

В тази рубрика, която се води от доц. д-р Веселин Ненков, се публикуват задачи за ученици от горните класове, за студенти и учители. Основният признак за подбор е оригиналност. Това не означава задължителна новост, защото твърдението, че една задача е нова, остава в сила до доказване на противното. Оригиналността включва естетичност и остроумие, а решаването на задачи с подобни качества изисква инициативност, откривателски подход, интелектуално усилие. Рубриката разчита на активното Ви участие както с решения, така и с предложения на задачи. Изпращайте ги на адрес:

1618 София,  
ул. "Гусла" № 1  
ВУЗФ  
Радмила Златкова

В писмата си посочвайте училището (университета) и класа (курса), ако сте ученик (студент). Желателно е предлаганите задачи да са напечатани в два екземпляра с кратки, но пълни решения. Ще отбелязваме имената на тези, които са направили предложенията. Ако задачата е заета, посочете източника. В писмото си поставете празен плик с точния Ви адрес. Без да извършва класиране, М+ ще обсъжда изпратените решения, а най-хубавите от тях ще намерят място на страниците на рубриката и ще бъдат награждавани.

**М+577.** Две от цифрите на седемцифреното число  $N$  са деветки, а останалите са различни от 9 и по между си. Да се намери най-малкото  $N$ , което се дели на всичките си цифри.

(Милен Найденов, гр. Варна)

**М+578.** Дадени са четири поредни реда с нули и единици:

0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1

Да се определи правилото, по което всеки следващ ред се получава от предходния и да се запише петият ред.

(Росеп Николаев, гр. Варна)

**М+579.** Реалните числа  $x$  и  $y$  са корени съответно на:

$$8x^5 - 60x^4 + 184x^3 - 288x^2 + 231x - 84 = 0 \text{ и}$$

$$81y^5 - 270y^4 + 378y^3 - 276y^2 + 107y - 8 = 0.$$

Да се намери стойността на израза  $2x + 3y$ .

(Сава Гроздев, София и Веселин Ненков, Бели Осъм)

**М+580.** Точките  $M$ ,  $N$  и  $P$  са среди съответно на страните  $AB$ ,  $BC$  и  $CA$  на неравнобедрен триъгълник  $ABC$ . Ако  $O$  е центърът на описаната около  $\triangle MNP$  окръжност, да се докаже, че  $O$  лежи върху ъглополовящата на  $\angle ACB$  тогава и само тогава, когато  $\angle ACB = 60^\circ$ .

(Тодор Митев, гр. Русе)

**М+581.** Точката  $X$  лежи в равнината на  $\triangle ABC$ , като  $\angle BAC = \alpha$  и  $\angle BXC = x$ . Ако  $Y$  е точка, за която са изпълнени равенствата  $\angle ABY = \angle CBX$  и  $\angle BCY = \angle ACX$ ,

да се докаже, че  $AY = \frac{\sin x}{\sin(x - \alpha)} AX$ .

(Хаим Хаимов, гр. Варна)

**М+582.** Основата на четириъгълна пирамида е правоъгълник с периметър  $2,8 \text{ dm}$ . Дължините на страните на основата в сантиметри са различни прости числа, а дължината на височината към основата в сантиметри е равна на най-малкото съставно число. В пирамидата са разположени 25 точки, като никои три от тях не лежат на една права и никои четири не лежат в една равнина. Да се докаже, че съществува тетраедър с върхове в някои от тези точки, чийто обем е не по-голям от  $5,5 \text{ cm}^3$ .

(Христо Лесов, гр. Казанлък)

Краен срок за изпращане на решения: 15.04.2018 г.