GeoNews — KW 42/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftdynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 12. Oktober 2026

> **Was ist GeoNews?** Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.
>
> Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.
>
> Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: 🔴 ab 75 Must-read · 🟡 50–74 relevant · 🟢 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Rund drei Dutzend bewertete Arbeiten, diese Woche **fünf 🔴 Must-reads** — vier davon abstract-gestützt, einer auf Basis von Titel und Journal. An der Spitze steht ein direkter Primärtreffer aus dem Profilzentrum: eine *Quaternary-Science-Reviews*-Studie zum **$^{87}Sr/^{86}Sr$-Rekord des Paläosees Chew Bahir** (südlicher Äthiopischer Rift, letzte ~40 ka). Laut Abstract entkoppeln sich ab etwa 9,8 ka die lokale Wasserbilanz (Kalium-Proxy, präzessionsnah) und die Wasserherkunft (Sr-Isotope, eher an glazial-interglaziale Randbedingungen gebunden) — die Verbindung zum äthiopischen Hochland bleibt bestehen, während die Tieflandbilanz negativ wird.

Die weiteren 🔴: eine *Communications-Earth-&-Environment*-Synthese aus Modellläufen und 191 Paläoarchiven zu **breitengradabhängigen Feucht-/Trocken-Mustern seit dem Letzten Glazialen Maximum**; ein **hybrides Wasserbilanzmodell (DeepGR4J + Regionalisierung) für den Tanasee** in Äthiopien; ein **zweitausendjähriger Kaspi-Seespiegelrekord** aus der Anzali-Lagune (Iran); und ein **4000-jähriger Paläohochwasserrekord vom mittleren Mississippi** (⚠ *Titel-basiert*). Der 🟡-Block reicht von seespiegelbezogenen Rekorden (Chaohu, Nam Co, Kaspisches Meer seit dem Spätglazial) über eine quantitative Bølling-Sommertemperatur-Rekonstruktion für Mitteleuropa bis zu einer Modellstudie zur **Modulation des präzessionsgetriebenen afrikanischen Monsuns durch die Obliquität** und fossilen Hölzern aus dem **unteren Omo-Tal** (Turkana-Becken).

Zur Entstehung. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war wie üblich blockiert; Crossref (Kandidaten, `created`-Daten) und **OpenAlex (Abstracts, auch für Elsevier-Titel)** wurden über die integrierte Browser-Schnittstelle abgefragt. Dadurch sind diese Woche deutlich weniger Einträge nur titel-basiert; wo OpenAlex kein Abstract führt, ist das mit ⚠ markiert.

Förderseitig drängt die Zeit: **ANR-DFG-Vorregistrierung (13.10.2026)** und **ERC Starting Grant 2027 (14.10.2026)**; der **ERC Consolidator Grant 2027** ist seit 24.09. offen (Deadline **12.01.2027**). Forschungspolitisch hat der **Bundesrat** zur **WissZeitVG-Novelle** Stellung genommen, der Bundestag hat die **WissFG-Novelle** (Lockerung des Besserstellungsverbots) beschlossen, und die **Exzellenzstrategie** hat fünf neue Standorte ausgewählt — bei unverändertem Gesamttopf.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Crossref-`created`-Datum ab dem 28. September 2026, die nicht bereits in einer früheren Ausgabe gelistet waren. Bereits gelistete DOIs sind ausgeschlossen. Für jeden Eintrag mit einsehbarem Abstract (Crossref, OpenAlex oder Verlagsseite) stützt sich die Einordnung auf dieses Abstract; Titel ohne verfügbares Abstract sind mit ⚠ *Titel-basiert* markiert.

● Must-read (ab 75)

1. Decoupled hydroclimate dynamics in eastern Africa as revealed by the Sr isotope record of paleolake Chew Bahir · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 93** $^{87}Sr/^{86}Sr$ als Tracer von Wasserherkunft und hydrologischer Konnektivität im Chew-Bahir-Becken (südlicher Äthiopischer Rift), gemessen an biogenen und authigenen Materialien aus mehreren Kernen über die letzten ~40 ka. Befund laut Abstract: Das Sr-Signal bildet die beckenweite Seewasserzusammensetzung weitgehend substratunabhängig ab und erfasst Beiträge aus dem äthiopischen Hochland. Bis zum Beginn des Holozäns laufen Wasserherkunft (Sr) und lokale Hydrologie (K-Gehalt) ähnlich; ab etwa 9,8 ka divergieren sie: Kalium zeigt zunehmende Aridität (besonders nach ~6 ka), während Sr eine fortbestehende Anbindung an das Hochland trotz zunehmend negativer lokaler Niederschlags-Verdunstungs-Bilanz anzeigt. Eine Sr-Massenbilanz-Sensitivitätsanalyse ergibt, dass die Wassermenge allein die niedrigsten holozänen Werte nicht erklärt — nötig ist eine Verschiebung der Herkunft und/oder der Quellwasserzusammensetzung. Die Autor:innen ordnen die lokale Bilanz der Präzession zu, das Sr-Signal eher glazial-interglazialen Randbedingungen. Profilzentrum: Chew Bahir, African Humid Period, Wasserbilanz — und eine methodische Vorlage, Herkunfts- und Bilanzproxys gemeinsam zu modellieren. *Themen 40 · Methode 22 · Venue 11 · Anschluss 10 · Aktualität 10 (created 05.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110308

2. Strong latitudinal contrasts in global wet/dry patterns since the Last Glacial Maximum and under future warming · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 82** Globale Klimasimulationen kombiniert mit 191 Paläoklimaarchiven (u. a. Seespiegelrekorde) zu terrestrischen Feuchteänderungen über die letzten 21.000 Jahre. Befund laut Abstract: fortschreitende Befeuchtung in hohen nördlichen Breiten vom LGM bis zum Vorindustriellen; westwindgeprägte mittlere Breiten sind in kalten Phasen feuchter, niedrigbreitige Monsunregionen in warmen Phasen. Als Ursachen werden saisonale Niederschlags- und Verdunstungsänderungen sowie Zirkulationsverschiebungen durch Eisschilde, Treibhausgase und Insolation genannt; eine ähnliche breitenabhängige Struktur zeige sich in modernen Beobachtungen. Zukunftssimulationen projizieren Trocknung in vielen subtropischen und

mittleren Breiten. Anschlussfähig als Rahmen für ostafrikanische Seespiegel- und AHP-Rekorde (Monsunregion „feucht in Warmphasen") und als Daten-Modell-Vergleich auf Basis von Seespiegeln. Frei zugänglich. *Themen 38 · Methode 18 · Venue 12 · Anschluss 8 · Aktualität 6 (created 03.10.2026)* · DOI: 10.1038/s43247-026-04078-7

3. A hybrid DeepGR4J and regionalization framework for lake water balance assessment in data-scarce regions: Application to Lake Tana, Ethiopia · *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 2026 · **Score 77** Gegenwartshydrologische Wasserbilanz des Tanasees (äthiopisches Hochland, Quelle des Blauen Nils) für 2000–2020: das konzeptionelle GR4J-Abflussmodell mit LSTM-basierter Fehlerkorrektur (DeepGR4J), kombiniert mit regressionsbasierter Regionalisierung für ungemessene Teileinzugsgebiete (CHIRPS, ERA5, Hargreaves-Verdunstung). Befund laut Abstract: mittlerer Zufluss ~12,6 km³/a, Abflussterm ~12,7 km³/a, Netto-Speicherabnahme ~0,2 km³/a; die beobachteten Seespiegel werden laut Autor:innen gut reproduziert (NSE ~0,94), ungemessene Einzugsgebiete tragen stark bei. Kein Paläo-Paper — aber dieselbe methodische Frage wie in der Paläo-Seespiegelmodellierung ostafrikanischer Riftseen: Wie schließt man eine Wasserbilanz bei lückenhaften Eingangsdaten? Übertragbar als Kalibrier- und Vergleichsrahmen. *Themen 34 · Methode 18 · Venue 7 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 07.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.ejrh.2026.104046

4. Two millennia of Caspian Sea level change and Hyrcanian forest dynamics: A multi-proxy record from the Anzali Lagoon, northern Iran · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 76** Multiproxy-Analyse eines 5-m-Kerns aus der Anzali-Lagune (SW-Kaspiküste): Kaspi-Seespiegel und Vegetation der hyrkanischen Wälder über ~2000 Jahre. Befund laut Abstract: Hochstände (u. a. Parthisch–frühsassanidisch, frühe und späte Kleine Eiszeit) sind durch kaspische Indikatororganismen (Dinozysten, Foraminiferen, Muscheln) belegt und deuten auf Durchbrüche der Anzali-Nehrung; Tiefstände (sassanidisch–frühmittelalterlich, spätmittelalterlich) zeigen Lagunenisolation und Süßwassereinfluss. Die spätmittelalterliche Warm-/Trockenphase prägt die Vegetation deutlich; zwei Episoden wahrscheinlich anthropogener Entwaldung werden identifiziert. Anschlussfähig als Seespiegelarchiv eines abflusslosen Großsees mit Mensch-Umwelt-Signal — strukturell vergleichbar mit Riftseebilanzen. *Themen 34 · Methode 15 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 09.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110327

5. A 4000-year paleoflood record from the middle Mississippi River valley · *Geomorphology*, 2026 · **Score 76** · ⚠ *Titel-basiert* Paläohochwasserrekord über ~4000 Jahre aus dem mittleren Mississippi-Tal. Kernthema des Profils (Paläohochwasser, fluviale Geomorphologie); methodisch potenziell relevant für die Frage, wie lange Hochwasserrekorde die Wiederkehrstatistik instrumenteller Reihen ergänzen — dieselbe Frage wie in mitteleuropäischen Paläohochwasserstudien. Ohne einsehbares Abstract (weder Crossref noch OpenAlex; Verlagsseite nicht erreichbar) beruht die Einordnung auf Titel, Journal und Thema; Archivtyp, Datierung und Befunde stehen unter Vorbehalt. *Themen 38 · Methode 13 · Venue 9 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 10.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.geomorph.2026.110573

Relevant (50–74)

6. Lake-level fluctuations and human adaptation over the past 14 ka in Chaohu Lake basin, eastern China · *Anthropocene*, 2026 · **Score 72** · ⚠ *Titel-basiert* Seespiegelschwankungen und menschliche Anpassung im Chaohu-Becken (Ostchina) über 14.000 Jahre. Thematisch nah am Profil (Seespiegel, Mensch-Umwelt-Kopplung über Spätglazial und Holozän). Ohne einsehbares Abstract; Methodik, Chronologie und Kausalaussagen stehen unter Vorbehalt. *Themen 36 · Methode 13 · Venue 7 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 07.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.ancene.2026.100592

7. High summer temperatures in Central Europe during the Bølling period (~14.6-14.0 cal ka BP) inferred from plant macrofossils using a novel European calibration dataset · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 70** Erste makrofossilbasierte quantitative Sommertemperatur-Rekonstruktion für Mitteleuropa (Santovka-PB und Hanšpíle, nördliches Pannonisches Becken, SW-Slowakei) mit einem neuen paneuropäischen Kalibrierdatensatz für Wasser- und Feuchtgebietspflanzen. Befund laut Abstract: probabilistische (CREST) und regressionsbasierte Verfahren (WA, WA-PLS) liefern konsistente Juli-Temperaturen; Erwärmung beginnt vor dem Bølling (16–17 °C um ~16,2 cal ka BP), extreme Sommerwärme im Bølling (~20 °C), deutliche Abkühlung in der Älteren Dryas. Anschlussfähig für mitteleuropäische Seesedimentarchive und als Beispiel für den Vergleich probabilistischer und regressionsbasierter Transferfunktionen. *Themen 27 · Methode 16 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 08.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110301

8. Modulation of precession-forced Asian–African monsoon and arid climate variability by obliquity · *npj Climate and Atmospheric Science*, 2026 · **Score 70** Modellstudie zur Kombination von Präzession und Obliquität über den asiatisch-afrikanischen Monsun- und Trockengebieten. Befund laut Abstract: Bei hoher Obliquität ist die präzessionsbedingte Niederschlagszunahme in den Monsunregionen abgeschwächt, in den angrenzenden nördlichen Trockenregionen dagegen verstärkt — erklärt über eine stärkere Nordverlagerung der regionalen Hadley-Zirkulation; über Asien wirken zusätzlich Wolken-Strahlungs-Rückkopplungen und eine abgeschwächte Erwärmung des Tibetplateaus. Anschlussfähig an die Interpretation präzessionsgetakteter ostafrikanischer Feuchtphasen (inkl. African Humid Period): Die Obliquität kann die räumliche Ausprägung derselben Präzessionsphase verschieben. Reine Modellarbeit; kein Proxyvergleich im Abstract. *Themen 30 · Methode 10 · Venue 11 · Anschluss 9 · Aktualität 10 (created 07.10.2026)* · DOI: 10.1038/s41612-026-01566-7

9. Late Quaternary high-altitude lake water-depth variability in Nam Co, central Tibetan Plateau · *Global and Planetary Change*, 2026 · **Score 69** · ⚠ *Titel-basiert* Spätquartäre Wassertiefenvariabilität des Hochgebirgssees Nam Co (zentrales Tibetplateau). Profilthema Seespiegel/Wasserbilanz eines großen geschlossenen Sees. Ohne einsehbares Abstract; Proxyansatz und Zeitumfang stehen unter Vorbehalt. *Themen 36 · Methode 13 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (created 01.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.gloplacha.2026.105733

10. Plio-Pleistocene wood from the Lower Omo Valley, Ethiopia: paleoenvironnemental implications for paleoanthropological and paleontological sites · *Geodiversitas*, 2026 · **Score 67** Anatomische Bestimmung von 65 fossilen Holzproben aus der Shungura-Formation im unteren Omo-Tal (3,6–1,7 Ma), jeweils über die etablierte Stratigraphie datiert. Befund laut (französischsprachigem) Abstract: 17 Familien, 26 Gattungen, durchweg tropische Taxa; die Hölzer belegen einen dauerhaften, artenreichen Galeriewald mit über die Zeit wechselnder Zusammensetzung, im späten Pliozän mit Taxa des feuchten Regenwalds. Anschlussfähig an die Paläoumwelt hominider Fundstellen im Turkana-Becken; liegt zeitlich vor dem quartären Fokus, regional aber im Zentrum. *Themen 38 · Methode 8 · Venue 5 · Anschluss 10 · Aktualität 6 (created 29.09.2026)* · DOI: 10.5252/geodiversitas2026v48a18

● Radar

- **Hydroclimatic evolution of the Caspian Sea since the Late Glacial: a sub-centennial multi-proxy record from deep-sea Core 7** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **67** 🟡 · ⚠ *Titel-basiert* · Subzentennischer Multiproxy-Rekord zur Kaspi-Hydroklimatik seit dem Spätglazial; ergänzt Rang 4 auf längerer Zeitskala. DOI: 10.1016/j.palaeo.2026.114248 · created 28.09.2026

- **Reconstructing a mid-Holocene hydrographic network in the great Rann of Kutch and its role in Dholavira's maritime links** · *Quaternary Science Reviews* · **66** · OSL, Korngrößen und Provenienz (detritische Zirkone U-Pb, Sr-Nd) rekonstruieren ein ephemeres Flusssystem (wahrscheinlich Nara-Distributär), das im mittelholozänen Meeresspiegelhochstand einen Ästuarkorridor zur Arabischen See bildete; als mögliche Handelsverbindung Dholaviras interpretiert. Mensch-Umwelt-Kopplung mit monsungesteuerter Fluvialdynamik. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110305 · created 07.10.2026
- **A high-resolution stalagmite record of hydrological drought in northern China around 6.6 ka BP** · *Quaternary Science Reviews* · **66** · Stalagmit aus der Lianhua-Höhle mit ~2–5-jähriger Auflösung ($\delta^{13}C$, $\delta^{18}O$, Mg/Ca): ~130-jährige, W-förmige Dürre um 6,6 ka; Spektralanalyse zeigt 60–120-Jahres-Perioden, die Autor:innen vermuten solare Taktung mit interner Verstärkung (Hypothese). DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110326 · created 09.10.2026
- **Hydroclimate of northeast Mexico since the Last Glacial Maximum and possible influence of the Caribbean Low-Level Jet** · *Global and Planetary Change* · **64** · Multiproxy-Rekord aus dem Cieneguilla-Becken: feuchtere Deglaziation, trockeneres Holozän; wasserbilanzgesteuerte Erosion und verdunstungsbedingte Salinität als Proxyrahmen. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2026.105756 · created 09.10.2026
- **The Holocene Northeast Monsoon enigma: Multi-proxy reconstruction from Pulicat lagoon sediments** · *Quaternary Science Reviews* · **63** · Südindischer Nordost-Monsun ~10,7–6,4 cal ka BP: starke frühholozäne Aktivität mit Spitzen um ~10,2, 9,3 und 8,2 ka, danach marin dominierte Ablagerung durch Meeresspiegelanstieg. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110292 · created 08.10.2026
- **Mid-Pleistocene formation of the Yellow River fluvial megafan** · *Earth and Planetary Science Letters* · **63** · Geomorphologische und sedimentologische Belege plus paläomagnetisches Altersmodell: Megafan-Bildung um ~1,5 Ma, zeitgleich mit der Zunahme der 100-kyr-Zyklen; die Autor:innen schlagen klimatisch gesteuerte Integration von Mittel- und Unterlauf vor. Fluviale Geomorphologie mit Hochwasserbezug. DOI: 10.1016/j.epsl.2026.120378 · created 02.10.2026
- **Environmental Context of Hominin Foot Evolution** · *American Journal of Biological Anthropology* · **62** · Phylogenetische und biogeographische Analysen mit Paläoumweltproxys: Ursprung des Bipedalismus vermutlich in Phasen zunehmender Aridität, abgeleitete Merkmale später eher in feuchten/gemischten Umwelten. Ergebnisse modellabhängig (mehrere Topologien geprüft). DOI: 10.1002/ajpa.70340 · created 03.10.2026
- **Global mean sea-level fall from late Marine Isotope Stage 3 into the Last Glacial Maximum inferred from Great Barrier Reef large benthic foraminiferal assemblages** · *Earth and Planetary Science Letters* · **61** · Bayes'sches statistisches Modell auf Paläowassertiefen großer Benthosforaminiferen: GMSL von ~−101 m (~39 ka) über ~−119 m (~30 ka) auf ~−137 m im LGM; steiler Abfall von ~17 m ab ~35 ka. DOI: 10.1016/j.epsl.2026.120379 · created 03.10.2026
- **Transient variability in global oceanic oxygen during the Last Interglacial Period** · *Nature Geoscience* · **61** · Thalliumisotope (Arabisches Meer, Südkalifornien) zeigen ein frühes MIS-5e-Sauerstoffmaximum nahe heutigen Werten und anschließenden Rückgang — ein transienter, kein stabiler Interglazialzustand; Südozeanventilation als Haupttreiber vorgeschlagen. DOI: 10.1038/s41561-026-02120-z · created 07.10.2026
- **Detrital-to-evaporitic facies shifts in playa lakes sediments reveal Late Quaternary hydroclimatic variability in the southern Iberian Peninsula** · *Palaeogeography,*

Palaeoclimatology, Palaeoecology · **60** 🟡 · ⚠ *Titel-basiert* · Faziesbasierte Hydroklimarekonstruktion aus Playa-Seen. DOI: 10.1016/j.palaeo.2026.114285 · created 08.10.2026

- **Chronology of a late Pleistocene sedimentary sequence at Lommel (Belgium): Insights from luminescence profiling and quartz OSL dating** · *Aeolian Research* · **59** 🟡 · pOSL-Profiling und Quarz-OSL an einer Coversand-Abfolge: fluviale Basis (Mindestalter ~211 ka), fluvio-äolisch ~25–18 ka, äolisch ~17–13 ka. Anschlussfähig an mitteleuropäische Lumineszenzchronologie. DOI: 10.1016/j.aeolia.2026.101087 · created 05.10.2026
- **Continental-scale reorganization of North American pollen assemblages since the Last Glacial Maximum** · *Earth History and Biodiversity* · **58** 🟡 · >50.000 Pollenspektren aus 1.384 Neotoma-Standorten, eingeschränktes Clustering nach Zusammensetzung und Klima; transiente Assoziationen ohne modernes Analog. Methodisch interessant für Multiproxy-Klassifikation. DOI: 10.1016/j.hisbio.2026.100049 · created 05.10.2026
- **Episodic isolation of the Arctic Mediterranean from the North Atlantic during late Pleistocene glacials** · *Communications Earth & Environment* · **58** 🟡 · Reaktives $^{10}Be/^{9}Be$ als sedimentationsunabhängiger Wassermassentracer stützt eine glaziale Isolation von Arktis und Nordmeeren. DOI: 10.1038/s43247-026-04133-3 · created 11.10.2026
- **Response of Chilika Lake to monsoon dynamics and sea level fluctuations since ~28,000 cal yr BP** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **58** 🟡 · ⚠ *Titel-basiert* · Lagunen-/Seearchiv an der indischen Ostküste. DOI: 10.1016/j.palaeo.2026.114269 · created 06.10.2026
- **New insight into the context of late Quaternary climate from Sri Lanka** · *Quaternary Science Reviews* · **57** 🟡 · Palynologie, Glühverlust und Tonminerale aus drei Geoarchiven (45,6 ka bis heute); ITCZ-gesteuerte Niederschlagsänderungen mit orbitaler und SST-Kopplung. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110304 · created 02.10.2026
- **Planetary foresight: envisioning an early warning system for climate tipping points** · *Critical Insights in Climate Change* · **56** 🟡 · Perspektivbeitrag (keine Primärdaten): Konzept eines Frühwarnsystems für Klimakipppunkte am Beispiel des subpolaren Wirbels, mit Sensornetzen, KI und physikalischen Modellen samt Unsicherheitsquantifizierung. DOI: 10.1080/29931495.2026.2732804 · created 28.09.2026
- **Holocene-like summer climate during Marine Isotope Stage 11 in northwestern Greenland** · *Climate of the Past* · **55** 🟡 · Biomarker unter dem Eisschild (Camp Century): MIS-11-Sommer ähnlich dem mittleren Holozän, ~4,7 ± 3,2 °C wärmer als im 20. Jh. Frei zugänglich. DOI: 10.5194/cp-22-1757-2026 · created 28.09.2026
- **An Ensemble Kalman Smoother for Online Paleoclimate Data Assimilation** · *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* · **54** 🟡 · Integrierter hybrider Ensemble-Kalman-Smoother mit zeitübergreifenden Fehlerkovarianzen (Deep-Learning-Surrogat) und raumzeitlicher Lokalisierung; Vorteil wächst mit dünnerem Proxynetz. Methodisch anschlussfähig an Bayes'sche Rekonstruktion. DOI: 10.1029/2025ms005730 · created 28.09.2026
- **Beyond the Intertropical Convergence Zone: A regional synthesis of Late Pleistocene hydroclimate in the northern Tropical Americas** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **53** 🟡 · Review von 166 Standorten (241 Studien); stellt das einfache Schema „warm-feucht vs. kalt-trocken" für MIS 5 bis LGM in Frage. DOI: 10.1016/j.palaeo.2026.114250 · created 29.09.2026

- **Arctic climate tipping points under delayed CO2 emissions mitigation** · *Communications Earth & Environment* · **53** 🟡 · Erdsystemmodell-Ensembles mit Emissionsstopp bei 800–2000 PgC: bifurkationsartiges Arktisverhalten, oberhalb ~1700 PgC abrupte Abkühlung durch AMOC-Beinahe-Kollaps; die Autor:innen sprechen von stochastischem Kippverhalten. DOI: 10.1038/s43247-026-03872-7 · created 10.10.2026
- **Southern Portugal hydroclimate of the last millennium from near-annually resolved speleothem records** · *Journal of Quaternary Science* · **53** 🟡 · $\delta^{13}C/\delta^{18}O$-Komposit dreier Stalagmiten (Algarve): trocken/warme Mittelalterliche Klimaanomalie, feuchter/kühler früher Kleiner Eiszeit-Abschnitt. DOI: 10.1002/jqs.70121 · created 03.10.2026
- **Revealing hidden structural regimes in fluvial stage–discharge relationships using time-series imaging** · *Journal of Hydrology* · **51** 🟡 · 75 Jahre Pegel-Abfluss-Daten (Lijin, unterer Gelber Fluss), Markov-Transition-Field-Kodierung plus CNN und Clustering: jährliches Verhalten fällt in wiederkehrende Regime statt eines Kontinuums. Methodisch verwandt mit Rekurrenz-/Regimeanalysen. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2026.136487 · created 30.09.2026
- **Historical climate extremes in Europe and the connection between spring precipitation and summer heat** · *Climate of the Past* · **51** 🟡 · ModE-RA-Paläoreanalyse und 11.760 Jahre Atmosphärensimulationen: negative Korrelation Winter-/Frühjahrsniederschlag vs. Sommertemperatur bei 36–48° N. DOI: 10.5194/cp-22-1863-2026 · created 07.10.2026
- **Hominin dispersals: causes, conditions, and outcomes** · *Journal of the Royal Anthropological Institute* · **49** 🟢 · Konzeptioneller Review: Habitat-Tracking vs. adaptiv bedingte Ausbreitung im Pleistozän. DOI: 10.1111/1467-9655.70215 · created 02.10.2026
- **Multiproxy dataset for the Holocene sedimentary record of the Sado Valley, southwest Portugal** · *Scientific Data* · **47** 🟢 · Offener Rohdatensatz (Textur, Suszeptibilität, TOC/TN, C/N, $\delta^{13}C$, $\delta^{15}N$). DOI: 10.1038/s41597-026-08382-x · created 28.09.2026
- **Stratigraphic separation of Laacher See Tephra and a discrete Younger Dryas Boundary fallout layer in southernmost Sweden** · *ScienceOpen Research* (Preprint-Plattform) · **46** 🟢 · Bayes'sch datierte Abfolge (Körslättamossen) trennt LST und eine PGE-reiche Lage ~150 Jahre später. ⚠ Die Impakt-Interpretation (YDB-Hypothese) ist in der Fachliteratur stark umstritten; hier nur wegen der Tephrochronologie notiert. DOI: 10.14293/s2199-1006.1.sor.2026.0004.v1 · created 30.09.2026
- **Holocene landscape evolution and settlement development in the surroundings of the ancient Egyptian city of Bubastis („Tell Basta"), southeastern Nile Delta** · *E&G Quaternary Science Journal* · **45** 🟢 · Dissertations-Kurzfassung (Universität Würzburg) zu Avulsionen, Sedimentation und Siedlungsstabilität im Nildelta. DOI: 10.5194/egqsj-75-169-2026 · created 30.09.2026
- **Deep coalescent history of the hominin lineage** · *Genetics* · **42** 🟢 · T2T-Genome erweitern koaleszenzbasierte Inferenz auf 3–6 Ma; die Autor:innen deuten parallele Populationsgrößen-Peaks bei Mensch, Schimpanse und Bonobo als Hinweis auf komplexe Artbildung. DOI: 10.1093/genetics/iyag271 · created 01.10.2026
- **Spaceborne multi-sensor tracking reveals hydrologic decoupling during the record-breaking Sahara flood** · *GIScience & Remote Sensing* · **40** 🟢 · Multisensor-Analyse des Sahara-Hochwassers 2024 (Überflutung, GRACE-Speicher): räumliche Entkopplung von Überflutung und Speicherantwort. Moderner Bezug zu Feuchtphasen in hyperariden Becken. DOI: 10.1080/15481603.2026.2740867 · created 03.10.2026

Regional- und Zeitrand: Nicht gelistet bzw. nur notiert: eine Kommentar-Erwiderung zum europäischen Acheuléen (QSR), eine Methan-Oxidationsstudie an 79 afrikanischen Seen (*Nature*

Communications, 10.1038/s41467-026-78255-9; nicht quartär, aber Riftseen-Limnologie) sowie ein Review zur Isotopenhydrologie in datenarmen afrikanischen Becken (*Scientific African*, 10.1016/j.sciaf.2026.e03680). Bereits in der Vorausgabe gelistet und daher ausgeschlossen: die Bayes'sche Alpen-Klimarekonstruktion (QSR 110287).

Teil B — Fördertöpfe & Calls

ANR-DFG 2027 (Natur-, Lebens- und Ingenieurwissenschaften) — Vorregistrierung 13.10.2026, 17:00. Deutsch-französische Projekte im Rahmen der DFG-Sachbeihilfe; Lead Agency ist 2027 die ANR. Die Vorregistrierung durch die französische Projektkoordination ist Voraussetzung für den Vollantrag (voraussichtlich Ende März 2027); auf deutscher Seite ist keine Entsprechung nötig. Quelle: DFG — Information für die Wissenschaft Nr. 71.

ERC Starting Grant 2027 — Deadline 14.10.2026. Bis zu 1,5 Mio. € über fünf Jahre (plus bis zu 1 Mio. € für begründete Zusatzkosten). Quelle: ERC — Starting Grant.

ERC Consolidator Grant 2027 — offen seit 24.09.2026, Deadline 12.01.2027. Für die Planung über den Jahreswechsel relevant; Eignungsdetails gemäß ERC Work Programme 2027. Quelle: ERC — Consolidator Grant.

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics" (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, rund 14 Mio. € für etwa zwei Projekte (Stand Vorausgabe, unverändert). Quellen: Topic-Seite · CL5 Work Programme 2026–2027 (PDF).

DFG — neues Programm „Open-Access-Publikationsförderung". Einrichtungsanträge jährlich bis **4. Mai** für das Folgejahr, erstmals **04.05.2027** (elan-Registrierung bis 27.04.2027). Betrifft die Publikationskostenplanung von Arbeitsgruppen über die jeweilige Einrichtung. Quelle: DFG — Information für die Wissenschaft Nr. 68.

ICDP — Proposal-Zyklus. Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; für 2027 noch nicht formal bestätigt. Quelle: ICDP — Proposals.

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — Bundesrat hat Stellung genommen. Im ersten Durchgang am 25.09.2026 hat der Bundesrat zur Novelle Stellung genommen (Drucksache 456/26 B). Übernommen wurde nur eine Forderung: Wird die Mindestvertragslaufzeit ungerechtfertigt unterschritten, soll der Vertrag als auf die gesetzliche Mindestlaufzeit befristet gelten — nicht als unbefristet. Weitergehende Ausschussempfehlungen (u. a. Hinweise des Finanzausschusses auf fehlende Haushaltsflexibilität; Wunsch des Sozialausschusses nach verbindlichen Karriereperspektiven nach der Promotion) fanden keine Mehrheit. Nächste Schritte: Gegenäußerung der Bundesregierung, dann Beratung im Bundestag. Kern des Entwurfs bleiben Mindestlaufzeiten (drei Jahre für Erstverträge Promovierender, zwei Jahre für PostDocs). Einordnung: Für Drittmittelprojekte mit kürzerer Laufzeit bleibt die Frage der Anschlussfinanzierung praktisch relevant. Quelle: Forschung & Lehre — Bundesrat fordert Nachbesserung bei BAföG- und WissZeitVG.

Wissenschaftsfreiheitsgesetz — Bundestag lockert Besserstellungsverbot. Am 24.09.2026 beschloss der Bundestag die WissFG-Novelle: Projektgeförderte, gemeinnützige Forschungseinrichtungen dürfen wissenschaftliches Personal besser bezahlen als vergleichbare

Bundesbeschäftigte, sofern dies aus Drittmitteln finanziert wird; künftig sollen dafür auch EU-Fördermittel nutzbar sein, andere öffentliche Mittel ausdrücklich nicht. Quelle: Forschung & Lehre — Bundestag verabschiedet Novelle.

Exzellenzstrategie — fünf neue Standorte, gleicher Topf. Am 02.10.2026 wählte die Exzellenzkommission fünf neue Exzellenzstandorte aus; ab 01.01.2027 werden damit 15 Standorte gefördert. Weil der Gesamttopf (rund 208 Mio. € jährlich) nicht wächst und drei Verbünde mit bis zu 28 Mio. € dabei sind, erhalten alle Standorte weniger. Laut Bericht gab es um die Mittelhöhe Diskussionen zwischen Bund und Ländern. Quellen: DFG — Pressemitteilung Nr. 40 · Forschung & Lehre — Fünf neue Exzellenzstandorte.

Bundeshaushalt 2027 — Beratungen laufen. Der Haushaltsausschuss hört am 12.10.2026 Sachverständige zum Haushaltsbegleitgesetz 2027. Stand des Regierungsentwurfs: BMFTR-Kernhaushalt rund 22 Mrd. €, nominal etwa +0,7 % gegenüber 2026; Zuwächse vor allem im Sondervermögen. Quellen: Bundestag — Anhörungen KW 42 · Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt.

Teil D — Community & Termine

- **ANR-DFG 2027 NLE** — Vorregistrierung (französische Seite) bis **13.10.2026**, 17:00.
- **ERC Starting Grant 2027** — Deadline **14.10.2026**.
- **PAGES** — sucht eine:n **Data Scientist** für das International Project Office in Bern; Sichtung der Bewerbungen ab **02.11.2026**. Quelle: PAGES — News.
- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
- **AGU Fall Meeting 2026** — **07.–11.12.2026**, San Francisco. Quelle: AGU.
- **ERC Consolidator Grant 2027** — Deadline **12.01.2027**.
- **ICDP** — nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027** (Muster der Vorjahre, nicht bestätigt).
- **EGU General Assembly 2027** — **04.–09.04.2027**, Wien und online; das vorläufige Sessionprogramm ist online, die Abstract-Frist war zum Redaktionsschluss nicht verifizierbar (erfahrungsgemäß Mitte Januar). Quelle: EGU27 — Programm.

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war blockiert. Die Crossref REST API wurde über die integrierte Browser-Schnittstelle (`fetch()`) abgefragt: ISSN-Abfragen der Kernjournale (QSR, Climate of the Past, Quaternary Science Advances, GPC, EPSL, Boreas, JQS, Quaternary Research, P³, Nature Communications, Nature Geoscience, Communications Earth & Environment) mit `from-created-date:2026-09-28` und `created`-Sortierung, ergänzt um Themen-Queries (paleoclimate, Quaternary lake sediment, East African Rift/Turkana, African Humid Period, paleoflood fluvial, Bayesian age-depth chronology,

early-warning tipping point, lake level water balance, hominin paleoenvironment, ICDP drilling, tephra chronology, LGM u. a.). Für die Kandidaten wurden Abstracts anschließend über die **OpenAlex-API** (rekonstruiert aus dem `abstract_inverted_index`) sowie einzelne Verlagsseiten (Nature Portfolio, Copernicus) eingeholt.

Was das für die Abdeckung bedeutet. Erstmals sind auch die meisten Elsevier-Titel abstract-gestützt
eingeordnet. Wo weder Crossref noch OpenAlex ein Abstract führen, ist der Eintrag mit ⚠ *Titel-basiert* markiert; es wurden keine Ergebnisse über den Titel hinaus erfunden. Die angegebenen Daten sind Crossref-`created`-Daten (Registrierung), die vom Online-Publikationsdatum um wenige Tage abweichen können. Themen-Queries über Crossref liefern viel fachfremdes Rauschen; die Vorauswahl erfolgte über Schlüsselbegriffe und anschließend manuell, sodass einzelne relevante Arbeiten außerhalb der Kernjournale fehlen können.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.