GeoNews — KW 43/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftdynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 19. Oktober 2026

> **Was ist GeoNews?** Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.
>
> Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.
>
> Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: 🔴 ab 75 Must-read · 🟡 50–74 relevant · 🟢 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Rund drei Dutzend bewertete Arbeiten, diese Woche **vier** 🔴 **Must-reads**, alle abstract-gestützt. Ein direkter Primärtreffer aus dem Ostafrikanischen Rift fehlt diesmal; der Schwerpunkt liegt auf **Zeitreihenmethodik an Seen- und Höhlenarchiven** und auf **Bohrkernen alpiner Seen**.

An der Spitze steht eine *Quaternary-Science-Reviews*-Studie, die aus **fünf hochauflösenden Seerekorden Chinas** mit einer EMD-Variante und Hilbert-Transformation **dekadische Trocken-Feucht-Umschwünge** des letzten Jahrtausends quantifiziert; laut Abstract steigt deren Häufigkeit mit dem Kontrast des centennialen Hintergrundzustands. Die weiteren 🔴: ein **ICDP-Kern aus dem Lago-Maggiore-System** mit einem plötzlichen Seespiegelabfall um ~9 ka, die **nicht-stationäre Kopplung des Ostasiatischen Sommermonsuns** an Pazifik und Nordatlantik aus drei laminierten Stalagmiten, und **Etheria-elliptica-Muscheln aus dem mittleren Atbara** (Ostsudan, Einzugsgebiet des äthiopischen Hochlands), die laut Abstract eine seit mindestens ~200 ka persistente Niederschlagssaisonalität nahelegen.

Im 🟡-Block: ein **abrupter Regimewechsel zu heißerem, trockenerem Klima in der westeurasischen Steppe** (*Nature Geoscience*; Frühwarn-Rahmung), eine pollenbasierte LGM-bis-heute-Rekonstruktion aus einem **warvierten Maarsee**, Proxy-Withholding-Experimente zur **Bedeutung einzelner Archivtypen in der Paläo-Datenassimilation**, demographische Reaktionen auf die **Kikai-Akahoya-Eruption** und eine neue **1,5-Myr-Kompilation glazialer und interglazialer Intensitäten** über die Mittelpleistozäne Wende.

Förderseitig ist nach dem ERC-Starting-Grant-Stichtag (14.10.) der **ERC Consolidator Grant (12.01.2027)** der nächste große Termin; der **Horizon-Europe-Paläoklima-Call** öffnet am **17.11.2026**. Forschungspolitisch: Die **WissZeitVG-Novelle** hatte am **08.10.2026 ihre erste Lesung** im Bundestag; die Bundesregierung lehnt die zentrale Forderung des Bundesrats ab. Der **Europäische Rat** hat am 15./16.10. am MFR 2028–2034 weiterverhandelt — Ziel bleibt eine Einigung bis Jahresende.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Crossref-`created`-Datum ab dem 5. Oktober 2026, die nicht bereits in einer früheren Ausgabe gelistet waren. Für jeden Eintrag mit einsehbarem Abstract (OpenAlex, Crossref oder Verlagsseite) stützt sich die Einordnung auf dieses Abstract; Titel ohne verfügbares Abstract sind mit ⚠ *Titel-basiert* markiert.

Must-read (ab 75)

1. Tracking decadal dry–wet shifts over the past millennium in China: Insights from five high-resolution lake records · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 87** Fünf gut datierte, hochauflösende Niederschlagsrekorde aus Seesedimenten (Gonghai, Nvshan, Jiangcuo, Kusai, Sihailongwan) werden mit einer regenerierten, phasenverschobenen sinusunterstützten empirischen Moden-Zerlegung (RPSEMD) und Hilbert-Transformation zerlegt, um dekadische Hydroklimavariabilität zu extrahieren und Trocken-Feucht-Umschwünge quantitativ zu identifizieren. Befund laut Abstract: regionale Kohärenz bei lokaler Divergenz — häufigere Umschwünge in der Mittelalterlichen Klimaanomalie in Gonghai, dagegen konzentriert in der Kleinen Eiszeit in Nvshan, Kusai und Sihailongwan; in Jiangcuo kaum Unterschied. Die Häufigkeit dekadischer Umschwünge korreliert positiv mit dem Kontrast des centennialen Hintergrundzustands; die Autor:innen schließen daraus, dass längerfristige Zustände Häufigkeit und Amplitude höherfrequenter Variabilität beeinflussen können (Interpretation; Mechanismus offen, Einfluss von Monsun, Westwinden und lokaler Hydrologie). Methodisch direkt übertragbar auf hochaufgelöste Riftseerekorde: dieselbe Frage nach zustandsabhängiger Variabilität, die auch Kipppunkt- und Regimeanalysen stellen. *Themen 38 · Methode 22 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 14.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110338

2. New constraints on the postglacial evolution of Lago Maggiore, Northern Italy · *Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 78** Ein 58 m langer **ICDP-Kern** aus dem unteren Ossolatal (übertieftes Tal am Alpensüdrand, ~500 m Füllung), ausgewertet mit Sedimentologie, Geotechnik, Lumineszenz- und Radiokarbondatierung, eingebettet in Reflexionsseismik. Befund laut Abstract: grobkörnige Basis, darüber ~35 m Silte und Sande als Eisrückzugs- und glaziolakustrine Abfolge; ein deutlicher Wechsel zu sandigeren, heterogeneren Seeablagerungen wird einem Dammbruch mit Seespiegelabfall und plötzlicher Deltaprogradation um ca. 9 ka zugeschrieben. Eine Häufung von Massenbewegungen in anderen Alpenseen bei 9,5–10 ka könnte auf ein großes Erdbeben als gemeinsame Ursache hindeuten (von den Autor:innen als Möglichkeit formuliert); um ca. 7 ka fiel der Standort trocken. Die Ursachen der Seespiegelabfälle bleiben laut Abstract offen. Anschlussfähig für ICDP-Seekern-Chronologien und mitteleuropäische Seesedimentarchive. *Themen 36 · Methode 16 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 12.10.2026)* · DOI: 10.1002/jqs.70122

3. Non-stationary evolution of centennial to decadal East Asian summer monsoon variability modulated by trans-oceanic interactions over the last millennium ·

Quaternary Science Reviews, 2026 · **Score 77** $\delta^{18}O$-Rekorde dreier jährlich laminierter, replizierter Stalagmiten aus Ostchina über das letzte Jahrtausend. Befund laut Abstract: Eine segmentierte Korrelationsanalyse zeigt vier Stadien im räumlichen Muster des Monsunniederschlags, synchron zur Temperatur der Nordhemisphäre (meridionale Verlagerung des Frontalregengürtels). Die erste Hauptkomponente ist nicht-stationär: In Warmphasen dominiert eine 20–40-jährige, an die PDO gekoppelte Periodizität; in der Kleinen Eiszeit schwächt sich diese Kopplung ab, und eine ~50-jährige Periodizität mit Bezug zur Atlantischen Multidekadischen Variabilität tritt hervor. CESM-Last-Millennium-Simulationen schreiben diese Atlantikvariabilität überwiegend vulkanischem Antrieb zu. Anschlussfähig als Beispiel für zeitabhängige Spektral- und Kopplungsanalysen an Proxyreihen — methodisch nah an nichtlinearer Zeitreihenanalyse. *Themen 30 · Methode 20 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 13.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110309

4. Paleoseasonality through serial stable isotope analysis of Pleistocene to recent *Etheria elliptica* shells from the middle Atbara River, eastern Sudan · *E&G Quaternary Science Journal*, 2026 · **Score 76** Serielle $\delta^{18}O$- und $\delta^{13}C$-Analysen an 11 fossilen und drei modernen Schalen der Nilauster *Etheria elliptica* aus dem mittleren Atbara (Ostsudan; der Atbara entwässert das äthiopische Hochland), die fossilen Stücke OSL-datiert auf ~224 bis ~17 ka; dazu eine lokale meteorische Wasserlinie aus sieben Flusswasserproben. Befund laut Abstract: Die fossilen Schalen sind in $\delta^{18}O$ angereichert (möglicherweise trockener/evaporativer im Pleistozän — die Autor:innen nennen aber auch Staudämme als Ursache abgereicherter moderner Werte); $\delta^{13}C$-Unterschiede werden u. a. mit atmosphärischem CO_2 in Verbindung gebracht, alternative Erklärungen (Vegetation, Verwitterung, biologische Faktoren) bleiben offen. Gesamtschluss der Autor:innen: eine ausgeprägte Niederschlagssaisonalität besteht in Ostsudan wahrscheinlich seit mindestens ~200 ka. Regional anschlussfähig an Hochland-Abflussrekorde und die Frage, wie stark Saisonalität und Jahresmittel in nordostafrikanischen Feuchtphasen getrennt variierten. *Themen 38 · Methode 13 · Venue 7 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 14.10.2026)* · DOI: 10.5194/egqsj-75-173-2026

Relevant (50–74)

5. An abrupt shift towards a hotter and drier climate regime in the Western Eurasian Steppe · *Nature Geoscience*, 2026 · **Score 74** Reanalysen sowie Large-Ensemble- und Multimodell-Simulationen identifizieren einen abrupten Regimewechsel in der westeurasischen Steppe mit beispielloser Sommertrocknung jenseits der natürlichen Variabilität des letzten Jahrhunderts; im Beobachtungszeitraum (1901–2024) keine Erholung. Laut Abstract liefert der externe Antrieb den Hintergrundtrend, interne Variabilität verstärkt ihn seit den frühen 1990er Jahren; sinkende Bodenfeuchte verstärkt über eine Land-Atmosphäre-Rückkopplung Hitze und Defizite. Die Autor:innen sehen die Region als Frühwarnsignal für andere Trockengebiete der mittleren Breiten. Kein Paläo-Paper — aber dieselbe Frage wie in der Paläo-Kipppunktforschung: Wann wird aus einem Trend ein persistenter Zustandswechsel? *Themen 28 · Methode 15 · Venue 15 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 12.10.2026)* · DOI: 10.1038/s41561-026-02125-8

6. High-Resolution Temperature and Precipitation Variability in Northeast Asia Since the Last Glacial Maximum Recorded in an Annually Laminated Maar Lake · *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2026 · **Score 74** Pollenbasierte Rekonstruktionen von Jahresmitteltemperatur und -niederschlag aus dem Xiaolongwan-Maarsee vom LGM bis heute. Befund laut Abstract: vom LGM zum mittleren Holozän ~9,0 ± 2,2 °C und ~470 ± 121 mm Zunahme; zwischen ~19,0 und 17,0 kyr b2k sinkt die Temperatur deutlich, während der Niederschlag innerhalb der Unsicherheit bleibt — eine Entkopplung, die die Autor:innen

unterschiedlichen Antrieben zuschreiben (Hochbreiten vs. Monsun/Westpazifik-SST). Über Bølling-Allerød, Jüngere Dryas und frühes Holozän verschieben sich beide rasch und weitgehend gleichzeitig. Relevant für Proxyansätze, die implizit eine Kopplung von Temperatur und Niederschlag annehmen. *Themen 34 · Methode 13 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 12.10.2026)* · DOI: 10.1029/2026jd047113

7. Differential Impacts of Proxy Archives on Paleoclimate Reconstruction Performance · *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2026 · **Score 73** Proxy-Withholding-Experimente in der Paläo-Datenassimilation quantifizieren den Grenzbeitrag von acht Archivtypen (Korallen, Baumringe, Speläotheme, Dokumente, Seesedimente, Meeressedimente, Gletscher, Bodeneis) zu ENSO, Indischem-Ozean-Dipol, globaler Mitteltemperatur und globalem Niederschlag. Befund laut Abstract: Assimilation verbessert die Güte durchweg, das Multimodell-Ensemble als Prior am stabilsten; Korallen sind für alle Indizes unverzichtbar, Dokumente und Speläotheme liefern Schlüsselinformation in monsunsensitiven, datenarmen Regionen; einzelne Archive haben überproportionalen Einfluss relativ zu ihrer Abdeckung. Anschlussfähig für die Frage, welchen Mehrwert zusätzliche Seesedimentrekorde in datenarmen Regionen wie Ostafrika für Rekonstruktionen hätten. *Themen 30 · Methode 16 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 12.10.2026)* · DOI: 10.1029/2025jd045958

8. Divergent demographic responses to the Kikai-Akahoya volcanic catastrophe in mid-Holocene Japan · *Science Advances*, 2026 · **Score 71** Statistische Modelle zu demographischen und ökologischen Folgen der K-Ah-Eruption (vor ~7300 Jahren) für Jōmon-Gemeinschaften. Befund laut Abstract: Bevölkerungseinbruch in den unmittelbar angrenzenden Regionen, aber Zunahme in einigen proximalen Populationen; manche distale Gemeinschaften waren von bisher übersehenen Umweltfolgen betroffen. Die Autor:innen lesen das als kontingente statt deterministische Reaktion auf einen Schock. Methodisch übertragbar auf Mensch-Umwelt-Fragen in Feucht-Trocken-Übergängen (etwa am Ende der African Humid Period). *Themen 25 · Methode 15 · Venue 15 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 14.10.2026)* · DOI: 10.1126/sciadv.aeh7197

9. Glacial and interglacial intensities across the Mid-Pleistocene Transition from a new 1.5 Myr long compilation of marine and terrestrial records · *EGUsphere* (Preprint, Diskussionsphase), 2026 · **Score 70** Kompilation von 29 Paläoklimarekorden über 1,5 Myr, je zur Hälfte marin und terrestrisch, mit Intensitätsmaßen für jedes Glazial und Interglazial. Befund laut Abstract: glaziale Verstärkung ab MIS 22 (~930 ka) in marinen wie terrestrischen Archiven; kein konsistenter Trend der Interglazialstärke in terrestrischen Rekorden; MIS 13a schwach in marinen, aber stark in mehreren terrestrischen Rekorden; seit der Mid-Brunhes-Wende eine lineare Beziehung zwischen Interglazialstärke und vorangehendem Glazial im benthischen $\delta^{18}O$, nicht aber in anderen Archivtypen. Mit interaktivem Dashboard. Anschlussfähig für lange terrestrische Bohrkernrekorde und deren Synchronisation. Noch nicht begutachtet. *Themen 34 · Methode 16 · Venue 4 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 13.10.2026)* · DOI: 10.5194/egusphere-2026-6154

10. Late Quaternary evolution of river Nile at Wadi Kubbaniya, Egypt: Insights from mineralogy and geochemistry proxies · *Journal of African Earth Sciences*, 2026 · **Score 70** · ⚠ *Titel-basiert* Spätquartäre Entwicklung des Nils bei Wadi Kubbaniya (Oberägypten) aus Mineralogie- und Geochemieproxys. Profilnah über fluviale Geomorphologie und den Nil als Integrator ostafrikanischer Hochlandniederschläge. Ohne einsehbares Abstract (weder OpenAlex noch Crossref; Verlagsseite nicht erreichbar) beruht die Einordnung auf Titel, Journal und Thema; Zeitumfang, Datierung und Befunde stehen unter Vorbehalt. *Themen 34 · Methode 13 · Venue 7 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 12.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.jafrearsci.2026.106406

Radar

- **Hydroclimatic changes in southeastern Mongolia from the earlier Late Pleistocene to the mid-Holocene: a multi-proxy record from a glacier-decoupled closed-basin sedimentary sequence in Bayan Tohom Gobi** · *Quaternary International* · **69** · 3,88-m-Profil aus einem abflusslosen Becken, AMS-^{14}C und OSL, Endmember-Modellierung und PCA: effektive Feuchte und Sedimentmobilität über Niederschlag, Abfluss, Grundwasser und Verdunstung; Vergleich mit Ulaan und Orog Nuur betont die Rolle der Einzugsgebiete. DOI: 10.1016/j.quaint.2026.110498 · created 15.10.2026
- **Palaeoclimate constraints narrow uncertainty in future Arctic winter sea ice projections** · *Nature Geoscience* · **68** · Arktisweite mittelholozäne Biomarker-Datenbank plus Bayes'sches Gewichtungsschema der Modelle (Proxy-System-Modell, Modellabhängigkeit, nicht-stationäre Proxysaisonalität): laut Abstract Unsicherheitsreduktion um 85 %, gewichtete Projektionen fast 1 Mio. km² weniger Wintereis. Methodisch interessant für Bayes'sche Daten-Modell-Vergleiche. DOI: 10.1038/s41561-026-02123-w · created 16.10.2026
- **Human-enhanced tsunami hazard in large lakes** · *Nature Communications* · **66** · Lago d'Iseo: zwei Jahrtausende intensivierter Landnutzung verdreifachten den Sedimentfluss und übersteilten das Delta; Erdbeben 1117 und 1222 CE lösten laut Geologie und Modellierung subaquatische Deltarutschungen mit Run-ups bis ~50 m aus. Mensch-Umwelt-Kopplung in einem alpinen Seearchiv. DOI: 10.1038/s41467-026-78272-8 · created 15.10.2026
- **Hydroclimatic thresholds and state-dependent vegetation responses in the Mediterranean during the intensification of Northern Hemisphere glaciation** · *Global and Planetary Change* · **65** · ⚠ *Titel-basiert* · Schwellen und zustandsabhängige Vegetationsantworten im Mittelmeerraum während der nordhemisphärischen Vereisungsintensivierung; Bezug zu Kipppunkt-/Schwellenkonzepten, Befunde unter Vorbehalt. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2026.105759 · created 12.10.2026
- **Reconstructing early hominin behavioural ecology: a modelling approach** · *Frontiers in Ecology and Evolution* · **62** · Klimagetriebene Zeitbudgetmodelle (abgeleitet von Pavian- und Schimpansenmodellen) sagen die bekannte Verbreitung der Australopithecinen nur mit einem eigenen Modell voraus; laut Autor:innen Nutzung lakustriner und fluvialer Überflutungsebenen und rückläufige Gruppengrößen nach ~2,4 Ma. Modellannahmen prägen die Schlüsse. DOI: 10.3389/fevo.2026.1891539 · created 15.10.2026
- **Hydroclimate Variability in the Western Pacific Warm Pool Over the Last 15 kyr** · *Paleoceanography and Paleoclimatology* · **62** · Pflanzenwachs-δD/δ^{13}C und Elementverhältnisse eines Kerns vor Papua-Neuguinea plus isotopenfähige CESM-Läufe; laut Abstract ein ausgeprägtes mittelholozänes Signal. DOI: 10.1029/2026pa005515 · created 17.10.2026
- **Hydroclimate variability in southern Portugal during marine isotope stage 4** · *Journal of Quaternary Science* · **61** · Stalagmit (δ^{13}C, δ^{18}O, Mg) aus Südportugal: hochaufgelöster kontinentaler Rekord für MIS 4, ergänzt die bisher grob aufgelösten iberischen Archive. DOI: 10.1002/jqs.70128 · created 16.10.2026
- **Evaluation of the Rb/Sr ratio as an indicator of chemical weathering: a case study from five sedimentary sections in Northeast China** · *Boreas* · **61** · Vergleich von Rb/Sr mit gängigen Verwitterungsindizes (CIA, CIW, PIA u. a.) an fünf terrestrischen Profilen; relevant für die Interpretation von XRF-Elementverhältnissen in Sedimentkernen. DOI: 10.1111/bor.70087 · created 15.10.2026

- **Chronology of the short-term climate changes during the Holocene in northwestern Russia and its correlation with the solar activity variations** · *Radiocarbon* · **61** 🟠 · Bayes'sche Altersmodellierung (OxCal, Bronk Ramsey) bestehender ^{14}C-Serien dreier Hochmoore, um kurzfristige ^{14}C-Schwankungen (Datierfehler bis ~300 Jahre) zu berücksichtigen; die Solarkorrelation ist Interpretation der Autor:innen. DOI: 10.1017/rdc.2026.10268 · created 19.10.2026
- **Climate warming redistributes the seasonality of inland open-water evaporation** · *Global and Planetary Change* · **60** 🟠 · CLM-Seemodell (RCP8.5): Verdunstung freier Wasserflächen steigt v. a. in warmen Jahreszeiten arider und gemäßigter Klimate; Nettostrahlung dominiert, Wind sekundär. Relevant für saisonal aufgelöste Seewasserbilanzen. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2026.105750 · created 07.10.2026
- **A long-term trend toward wetter conditions during MIS 2 inferred from modern-monitoring-based stalagmite multi-proxy records from Remi Cave, Central China** · *Quaternary Science Reviews* · **60** 🟠 · Vierjähriges Höhlenmonitoring plus Multiproxy-Stalagmit (~25,7–14,5 kyr BP) zur Hydroklimadebatte im Jangtse-Tal. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110324 · created 07.10.2026
- **A mosaic of technologies: Chronological and lithic evidence for late Middle Pleistocene population dynamics in Sudanese Nubia (Northeast Africa)** · *Quaternary International* · **60** 🟠 · ⚠ *Titel-basiert* · Chronologie und Lithik zur Populationsdynamik im späten Mittelpleistozän Nordostafrikas. DOI: 10.1016/j.quaint.2026.110487 · created 16.10.2026
- **Late Holocene transition from natural to anthropogenic forcing of lake archaeal community dynamics in semi-arid northern China** · *Quaternary Science Reviews* · **59** 🟠 · Sedimentäre DNA aus dem Gouchi-See: holozäne Archaeengemeinschaften, dominiert von halophilen Taxa, mit Übergang zu anthropogenem Einfluss im Spätholozän. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110325 · created 14.10.2026
- **Hydroclimatic instability during the late Roman Warm Period–early Dark Ages Cold Period transition in the eastern Mediterranean** · *EGUsphere* (Preprint) · **58** 🟠 · Nahezu jährlich aufgelöster Stalagmit (Börtlüce-Höhle, Westtürkei, 154–529 CE): ausgeprägte multidekadische Variabilität im Übergang 290–430 CE. DOI: 10.5194/egusphere-2026-5713 · created 14.10.2026
- **High- and Low-Latitude Insolation Forcing Drives the Half-Precession Cycle in Winter Arctic Sea Ice** · *Geophysical Research Letters* · **56** 🟠 · Transiente 800-kyr-Simulation: exzentrizitätsmodulierter Halbpräzessionszyklus im arktischen Wintereis. Bezug zu Halbpräzessionssignalen in tropischen Rekorden. DOI: 10.1029/2026gl125062 · created 05.10.2026
- **The co-evolution of hominins and Stone Age culture** · *Proceedings of the Royal Society B* · **55** 🟠 · Review (keine Primärdaten) zur Gen-Kultur-Koevolution seit vor ~3,3 Ma. DOI: 10.1098/rspb.2026.0772 · created 14.10.2026
- **Palynological and geochemical records of glacial-interglacial differences in River Terraces: A case study of the Qingyi River, Eastern Qinghai-Xizang Plateau** · *Geomorphology* · **55** 🟠 · ⚠ *Titel-basiert* · Flussterrassen als glazial-interglaziale Archive. DOI: 10.1016/j.geomorph.2026.110577 · created 17.10.2026
- **Using ocean surface paleo-density to evaluate PMIP3 and PMIP4 Last Glacial Maximum climate simulations** · *Climate of the Past* · **51** 🟠 · δ^{18}Oc-basierte

Oberflächendichte als Prüfgröße für PMIP-LGM-Läufe. Frei zugänglich. DOI: 10.5194/cp-22-1803-2026 · created 06.10.2026

- **Hominin behavior, strategies, and environmental conditions in Southern Europe (Marine Isotope Stage 17–15): The 100-ka sequence of Notarchirico (Italy, 700–600 ka)** · *Journal of Human Evolution* · **49** ● · Technologische Stabilität mit seltenen Bifaces über eine 100-ka-Abfolge. DOI: 10.1016/j.jhevol.2026.103897 · created 15.10.2026
- **LIPOTHERM: A Calibration Framework for GDGT Paleothermometry Based on Machine Learning** · *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* · **48** ● · ML-basierte GDGT-SST-Kalibrierung mit Berücksichtigung nicht-thermischer Einflüsse. DOI: 10.1029/2026gc013071 · created 05.10.2026
- **From manual classification to transformer-based language models: assessing the quality and consistency of historical convective event records** · *Climate of the Past* · **48** ● · Historische Gewitter- und Hagelberichte, strukturiert und mit multilingualem BERT ausgewertet. DOI: 10.5194/cp-22-1833-2026 · created 07.10.2026
- **Geochemical profiling, pedogenesis, and paleoclimate: Understanding stone age archaeological context of Dulung River Valley, Eastern India** · *Archaeological Research in Asia* · **48** ● · Paläobodengeochemie als Umweltkontext fluvialer Fundstellen. DOI: 10.1016/j.ara.2026.100757 · created 17.10.2026
- **Grain Size Analysis of Karewa Palaeolake Sediments and its implication on depositional dynamics** · *Journal of Earth System Science* · **47** ● · ⚠ *Titel-basiert* · Korngrößen eines Paläosees im Kaschmirtal. DOI: 10.1007/s12040-026-02981-3 · created 05.10.2026
- **First assessment of Pleistocene and Holocene archaeological sites at Tchitundu-Hulu, Namibe Province, Angola** · *L'Anthropologie* · **41** ● · Erste techno-typologische Bewertung der Fundstellen am Nordostrand der Namib. DOI: 10.1016/j.anthro.2026.103526 · created 10.10.2026

Nicht gelistet bzw. nur notiert: Bereits in früheren Ausgaben gelistet und daher ausgeschlossen sind u. a. die Chew-Bahir-Sr-Studie (QSR 110308), der Kaspi-Rekord (QSR 110327), die Chilika- und Playa-Rekorde (P³ 114269, 114285) und die npj-Obliquitätsstudie. Nicht aufgenommen: ein *Nature-Communications*-Kurzbeitrag „Early warnings of earthquakes" (kein Paläobezug, kein Primärartikel) sowie zahlreiche Treffer der Themen-Queries ohne Geobezug („early warning", „Rift Valley Fever").

Teil B — Fördertöpfe & Calls

ERC Consolidator Grant 2027 — Deadline 12.01.2027. Offen seit 24.09.2026; Eignung gemäß ERC Work Programme 2027 (in der Regel 7–12 Jahre nach der Promotion). Quelle: ERC — Consolidator Grant.

ERC 2027 — weitere Termine. Laut Zusammenfassung des Work Programme 2027: **Proof of Concept** öffnet 12.11.2026 (erste Frist 10.03.2027), **Synergy Grant** 17.02.–11.05.2027, **Advanced Grant** 27.05.–26.08.2027. Daten bitte vor Planung auf der ERC-Seite prüfen. Quelle: Hezelburcht — ERC Work Programme 2027.

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics" (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**,

Research and Innovation Action, rund 14 Mio. € für etwa zwei Projekte (Stand Vorausgabe, unverändert). Quelle: Topic-Seite.

ICDP — Proposal-Zyklus 2027. Wiederkehrende Frist **15. Januar** für Pre-, Workshop-, Full- und Fast-Track-Proposals; ICDP empfiehlt Pre-Proposals mindestens zwei Monate früher einzureichen, Fast-Track-Absichtserklärungen „spätestens Anfang November". Datum für 2027 nicht formal bestätigt. Quelle: ICDP — Proposal Preparation.

ICDP — Reisezuschüsse AGU 2026 für Early-Career-Forschende — Deadline 08.11.2026. Mehrere Zuschüsse à 300 US$ für die Präsentation ICDP-bezogener Arbeiten beim AGU Fall Meeting (CV + angenommenes Abstract). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.

DFG — Open-Access-Publikationsförderung. Einrichtungsanträge erstmals bis **04.05.2027** (Stand Vorausgabe). Quelle: DFG — Information für die Wissenschaft Nr. 68.

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — erste Lesung im Bundestag, Regierung lehnt Bundesratsforderung ab. Der Regierungsentwurf zur „Modernisierung des Befristungsrechts im Wissenschaftsbereich" (BT-Drs. 21/8281 vom 30.09.2026) wurde am **08.10.2026** in erster Lesung beraten und zusammen mit einem Antrag der Linken zur Abschaffung des Sonderbefristungsrechts (21/8384) an den Forschungsausschuss überwiesen. Kernpunkte des Entwurfs: Mindestlaufzeiten für Erstverträge (drei Jahre vor, zwei Jahre nach der Promotion), familienbedingte Verlängerungen auch bei Drittmittelbefristung, eine neue Pflegeverlängerung um zwei Jahre, mindestens ein Viertel der regulären Arbeitszeit bei Qualifizierungsverträgen, Höchstdauer für studentische Beschäftigung acht statt sechs Jahre, Evaluation 2032. Die Forderung des Bundesrats, Verträge unterhalb der Mindestlaufzeit als für diese Mindestlaufzeit befristet gelten zu lassen, lehnt die Bundesregierung ab und verweist auf das allgemeine Arbeitsrecht. Auf der Tagesordnung des Forschungsausschusses vom 14.10.2026 stand der Beschluss über eine öffentliche Anhörung. Einordnung: Für drittmittelfinanzierte PostDoc-Stellen mit kurzer Projektlaufzeit bleibt die Mindestlaufzeit die praktisch wichtigste Stellschraube. Quellen: Bundestag — Textarchiv KW 41 · BT-Drs. 21/8281 (PDF) · Tagesordnung Forschungsausschuss 14.10.2026 (PDF).

Bundeshaushalt 2027 — Forschungsausschuss gutachtlich beteiligt. Der Ausschuss befasste sich am 14.10.2026 nichtöffentlich mit dem Haushaltsgesetz 2027 (BT-Drs. 21/7300); federführend bleibt der Haushaltsausschuss. Stand des Regierungsentwurfs: BMFTR-Kernhaushalt rund 22 Mrd. €, nominal etwa +0,7 % (Stand Vorausgabe). Quellen: Tagesordnung Forschungsausschuss (PDF) · Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt.

EU — Europäischer Rat verhandelt MFR 2028–2034 weiter. Beim Gipfel am 15./16.10.2026 diskutierten die Staats- und Regierungschefs auf Basis einer aktualisierten Negotiating Box der irischen Ratspräsidentschaft; Ziel bleibt eine Einigung vor Ende 2026, damit die Rechtsakte 2027 verabschiedet werden können und die Förderung ab Januar 2028 ohne Unterbrechung läuft. Nach Bericht von Agence Europe wird eine Einigung erst nach 2026 inzwischen nicht mehr ausgeschlossen. Für das nächste Forschungsrahmenprogramm (FP10) hat der Rat seine Position bereits im Juni festgelegt; Hochschulverbände fordern weiterhin deutlich höhere Budgets (die österreichische uniko etwa 200 Mrd. €). Einordnung: Solange der MFR offen ist, bleibt auch das FP10-Budget — und damit der ERC-Umfang ab 2028 — unbestimmt. Quellen: Europäischer Rat — Schlussfolgerungen 15./16.10.2026 · Agence Europe · Rat — Position zu FP10 (26.06.2026) · TOP News — uniko zu FP10.

Teil D — Community & Termine

- **EGU General Assembly 2027** — **04.–09.04.2027**, Wien; die Abstract-Einreichung öffnet laut PAGES-Newsletter am **28.10.2026** (Frist erfahrungsgemäß Mitte Januar, nicht verifiziert). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.
- **PAGES** — Stelle **Data Science Officer** im International Project Office in Bern; laut Vorausgabe Sichtung der Bewerbungen ab **02.11.2026**. Quelle: PAGES — News.
- **ICDP-Reisezuschüsse AGU 2026** — Deadline **08.11.2026**.
- **ERC Proof of Concept** — Öffnung **12.11.2026**.
- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
- **AGU Fall Meeting 2026** — **07.–11.12.2026**, San Francisco. Quelle: AGU.
- **ERC Consolidator Grant 2027** — Deadline **12.01.2027**.
- **ICDP** — Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**.
- **PAGES-Termine 2027** — Workshop „Coastal Hypoxia through the Common Era" **27.–29.04.2027** (Qingdao); PALSEA-Next **24.–26.06.2027** (Dartmouth College); **PMIP-Konferenz 30.08.–03.09.2027** (Rio de Janeiro). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.
- **IPCC AR7** — Expert Review des Erstentwurfs von Arbeitsgruppe II sollte laut IPCC-Vorsitz „Anfang Oktober" öffnen; genaue Fristen konnten zum Redaktionsschluss nicht verifiziert werden. Quelle: IPCC — 2026.

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war blockiert. **OpenAlex** (ISSN-Abfragen der Kernjournale mit `from_publication_date:2026-10-05`, Themen- und Titelsuchen; Abstracts rekonstruiert aus dem `abstract_inverted_index`) und die **Crossref REST API** (ISSN-Abfragen inkl. Quaternary International, The Holocene, J. African Earth Sci., Geomorphology, J. Human Evolution, GRL, G-cubed, Paleoceanography and Paleoclimatology; Themen-Queries; `created`-Daten aller gelisteten Arbeiten) wurden über die integrierte Browser-Schnittstelle (`fetch()`) abgefragt; ein Abstract stammt von der Verlagsseite (Nature Portfolio). ScienceDirect-Landingpages waren nicht erreichbar.

Was das für die Abdeckung bedeutet. Wo weder OpenAlex noch Crossref ein Abstract führen, ist der Eintrag mit ⚠ *Titel-basiert* markiert; es wurden keine Ergebnisse über den Titel hinaus erfunden. Die angegebenen Daten sind Crossref-`created`-Daten (Registrierung), die vom Online-Publikationsdatum um wenige Tage abweichen können. Themen-Queries liefern viel fachfremdes Rauschen; die Vorauswahl erfolgte über Schlüsselbegriffe und anschließend manuell, sodass einzelne relevante Arbeiten außerhalb der Kernjournale fehlen können.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine

unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.