

GeoNews — KW 38/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftodynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 18. September 2026

Was ist GeoNews? Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.

Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.

Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: ● ab 75 Must-read · ● 50–74 relevant · ● 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Achtzehn bewertete Arbeiten, diese Woche **zwei ● Must-reads**. An der Spitze eine peer-reviewte, frei zugängliche *Communications-Earth-&-Environment*-Studie zu **Sommer- und Wintertemperaturen des Holozäns in Ostmitteleuropa** aus fünf Pollenrecords der Karpaten: getrennte saisonale Rekonstruktionen über die letzten 12.000 Jahre, statistisch auf Trends und kurze Ausschläge geprüft — methodisch unmittelbar an quartäre Zeitreihenfragen anschlussfähig. Dahinter eine hydrologisch-fluviale Arbeit zu einem **holozänen Extremhochwasser am Danjiang (Zentralchina)**, rekonstruiert aus Slackwater-Ablagerungen in einer Löss-Paläoboden-Sequenz — dieselbe methodische Frage wie in mitteleuropäischen Paläohochwasserstudien.

Der ●-Block ist diese Woche breit: paläozeanographische Rekonstruktionen (holozäne Labradorstrom-Variabilität, boren-isotopische Tiefsee-Ventilation der letzten Eiszeit im Arktischen Ozean), See- und Seespiegelarchive (arider Zentralasien-Seespiegel, Great-Basin-Feuer/Klima, ein Late-Glacial-Paarsee-Ansatz auf dem Schweizer Mittelland), eine Mensch-Umwelt-Studie aus dem levantinischen Korridor sowie eine deglaziale Moränen-Chronologie in Irland. Die Radar-Liste ergänzt Monsun-, Löss- und Speläothem-Archive; regional nennenswert eine neue **Ost-Turkana-Geochronologie (Buluk, Kenia)** und eine geomorphologische Arbeit aus dem Tanganjika-Kivu-Riftabschnitt.

Zur Entstehung — diese Woche mit vollem Literaturzugriff. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war wie üblich blockiert (Proxy-403); die Crossref-Abfrage lief in diesem Lauf

jedoch erfolgreich über die integrierte Browser-Schnittstelle (`fetch()`), sodass die systematische ISSN-Abfrage der Kernjournale **inklusive Elsevier, Wiley und der Nature-Familie** durchgeführt werden konnte — eine deutlich breitere Abdeckung als in den zurückliegenden Open-Access-only-Wochen. Elsevier liefert weiterhin keine Abstracts; die betreffenden Titel sind mit $\triangle$ *Titel-basiert* markiert und ihre inhaltliche Aussage steht unter Vorbehalt.

Förderseitig sind die nächsten Termine eng getaktet: **PAGES Early-Career Award 2027 (29.09.2026)**, **DFG-Communicator-Preis 2027 (30.09.2026)**, die **DEUQUA-Tagung** in Freiburg (**28.09.-02.10.2026**) und der **ERC Starting Grant 2027 (14.10.2026)**. Forschungspolitisch ist die **WissZeitVG-Novelle** nach der Sommerpause in erster Lesung beraten und zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen worden.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Crossref- `created` -Datum ab dem 4. September 2026, die nicht bereits in einer früheren Ausgabe gelistet waren. Bereits gelistete DOIs sind ausgeschlossen. Für jeden Eintrag mit einsehbarem Abstract stützt sich die Einordnung auf dieses Abstract; Titel ohne verfügbares Abstract (v. a. Elsevier) sind mit $\triangle$ *Titel-basiert* markiert.

● **Must-read (ab 75)**

1. Holocene summer and winter temperature trends and excursions in East-Central Europe from Carpathian pollen records · *Communications Earth & Environment*, 2026 ·

Score 88 Rekonstruktion getrennter Sommer- und Wintertemperaturen für Ostmitteleuropa über die letzten 12.000 Jahre aus Pollenrecords von fünf mittelhohen Standorten in den Karpaten. Die saisonalen Reihen werden zu Kompositen zusammengeführt und statistisch auf langfristige Trends und kurze Ausschläge geprüft. Befund laut Abstract: beide Jahreszeiten mit ausgeprägter früher holozäner Erwärmung, danach gegenläufig — die Sommertemperatur erreicht ihr Maximum bei 7,2 ka (rund 1,4 °C über dem Holozän-Mittel) und sinkt anschließend, während die Wintertemperatur bis zu einem spätholozänen Maximum bei 2,1 ka (etwa 1,7 °C über dem Mittel) weiter steigt und erst in den letzten zwei Jahrtausenden zurückgeht. Die Autor:innen lesen die gegenläufigen Trends als fortschreitende Abnahme der Kontinentalität über die letzten 6.000 Jahre; das 8,2-ka-Ereignis ist der einzige statistisch signifikante Kurzausschlag (etwa –2 °C im Sommer, –2,4 °C im Winter). Direkt im Profilzentrum (quartäre Paläoklimarekonstruktion) und methodisch anschlussfähig: die Trennung saisonaler Signale und die statistische Detektion von Trends und Ausschlägen in langen Proxy-Zeitreihen ist dieselbe Werkzeugfrage, die auch für Kippunkt- und Übergangsanalysen zentral ist. Frei zugänglich (Nature-Portfolio). *Themen 38 · Methode 20 · Venue 12 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (publ. 14.09.2026) · DOI: [10.1038/s43247-026-04041-6](https://doi.org/10.1038/s43247-026-04041-6)*

2. Hydrological reconstruction and climatic background of the Holocene extreme paleoflood event in the Danjiang River, central China · *Open Geosciences*, 2026 · **Score 87**

Paläohochwasser-Rekonstruktion im Danjiang-Einzugsgebiet, dem Wasserspender der mittleren Route des chinesischen Süd-Nord-Wassertransfers. Am Standort Dihua (Danfeng) wurde eine holozäne Löss-Paläoboden-Sequenz mit einer eingeschalteten Slackwater-Ablagerung (SWD) identifiziert. Proxys wie magnetische Suszeptibilität und Korngrößenverteilung zeigen laut Abstract, dass die SWD durch Absatz suspendierter Sedimente in einem relativ ruhigen Ablagerungsmilieu entstand; über die Paläohochwasser-Hydrologie wird der holozäne

Hochwasser-Datensatz des Einzugsgebiets verlängert, als Grundlage für Hochwasserrisiko und Betriebsführung. Kernthema des Profils (Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie) mit hoher Anschlussfähigkeit: die Rekonstruktion von Extremabflüssen aus Slackwater-Sedimenten ist methodisch dieselbe Frage wie in mitteleuropäischen Paläohochwasserstudien (u. a. Ahr). Schwächster Punkt ist der Venue-Wert (kleineres Journal); Themen- und Methodennähe tragen den Score. *Themen 40 · Methode 22 · Venue 5 · Anschluss 10 · Aktualität 10 (publ. 15.09.2026)* · DOI: [10.1515/geo-2025-1015](https://doi.org/10.1515/geo-2025-1015)

● Relevant (50-74)

3. Long-term ecological stability in the Pleistocene central Levantine corridor revealed by enamel isotopes from Lebanon · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 72**

Sequenzielle und Bulk- $\delta^{13}\text{C}$ -/ $\delta^{18}\text{O}$ -Werte aus Zahnschmelz von acht Herbivorenarten an drei libanesischen Fundstellen (Naame, Nahr Ibrahim, Ras el-Kelb), etwa 400.000 bis 100.000 Jahre. Die Levante war ein wiederholt genutzter Ausbreitungskorridor der Homininen, einschließlich der Expansion des modernen Menschen aus Afrika. Befund laut Abstract: die zentrale Levante hielt über mehrere Glazial-Interglazial-Zyklen eine bemerkenswert stabile mediterrane Saisonalität — konsistente Sommer-Winter-Differenzen und minimale Amplitudenänderung trotz ausgeprägter regionaler und globaler Klimaschwankungen. Anschlussfähig als quartäre Mensch-Umwelt-Studie (Tier 2): saisonal aufgelöste Isotopie zur Rekonstruktion von Vegetation, Hydrologie und Temperaturregime berührt dieselbe Multiproxy-Frage wie kontinentale Klimaarchive, hier über biogenes Karbonat statt Sediment. *Themen 28 · Methode 15 · Venue 12 · Anschluss 7 · Aktualität 10 (publ. 14.09.2026)* · DOI: [10.1038/s43247-026-03925-x](https://doi.org/10.1038/s43247-026-03925-x)

4. Contrasting lake-level dynamics drive divergent ecological trajectories in arid Central Asian lakes since 1800 CE · *Global and Planetary Change*, 2026 · **Score 72** · Δ Titel-basiert Vergleich der Seespiegeldynamik arider zentralasiatischer Seen seit 1800 und ihrer divergierenden ökologischen Entwicklungspfade. Kernthema des Profils (Seespiegel- und Wasserbilanzarchive) und übertragbar auf die Wasserbilanzmodellierung ostafrikanischer Riftbecken, in denen dieselbe Kopplung von Niederschlag-Verdunstung, Seespiegel und ökologischem Zustand zentral ist. Ohne einsehbares Abstract (Elsevier) beruht die Einordnung auf Titel, Journal und Themenbezug; die konkreten Methoden und die quantitative Aussage stehen unter Vorbehalt. *Themen 36 · Methode 14 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 6 (publ. 09.09.2026)* · DOI: [10.1016/j.gloplacha.2026.105709](https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2026.105709)

5. Alternative savanna states during the Last Interglacial: non-eucalypt dominance in northern Australia's monsoon tropics · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 70** · Δ Titel-basiert Rekonstruktion alternativer Savannenzustände im Letzten Interglazial in den Monsuntropen Nordaustraliens, mit einer im Titel benannten Dominanz nicht-eukalyptischer Vegetation. Thematisch im Quartär (Monsundynamik, Ökosystemzustände) und konzeptionell anschlussfähig an Kippunkt- und Multistabilitätsfragen: die Existenz alternativer Vegetationszustände unter interglazialen Randbedingungen ist dieselbe Frage nach nichtlinearen Systemantworten, die auch in afrikanischen Feuchtphasen diskutiert wird. Ohne einsehbares Abstract (Elsevier), daher Titel-basiert und unter Vorbehalt. *Themen 30 · Methode 12 · Venue 11 · Anschluss 7 · Aktualität 10 (publ. 15.09.2026)* · DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110269](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110269)

6. Responses of primary producers, anoxia, and chemical feedback to Late Glacial climate change: Insights from a paired lake approach · *Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 70** Untersuchung der Reaktion von Primärproduzenten, Schichtung und Nährstoffkreislauf in einem kleinen mitteleuropäischen See (Übeschisee, Schweizer Mittelland) auf raschen Klimawandel in der Spätglazialzeit (17–11 ka). Befund laut Abstract: nach 16,2 ka (Heinrich-

Stadial 1) und während des Bølling/Allerød-Interstadials natürliche Eutrophierung im Zuge sommerlicher Erwärmung und Vegetationsentwicklung im Einzugsgebiet; systematisch etablierten sich Anoxie-Ereignisse mit Schwefelbakterienblüten in den kälteren Phasen (HS1 um 16,5 ka, Ältere Dryas um 14 ka, Gerzensee-Oszillation um 13,2 ka, Jüngere Dryas 12,7–11,7 ka). Anschlussfähig als mitteleuropäische Seesediment- und Multiproxy-Arbeit (Tier 2): die Kopplung von rascher Klimaänderung an Eutrophierung, Deoxygenierung und Rückkopplungen ist methodisch dieselbe Frage nach Seereaktionen auf abrupte Übergänge, die auch in kontinentalen Wasserbilanzarchiven zentral ist. *Themen 30 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 6* (publ. 10.09.2026) · DOI: [10.1002/jqs.70115](https://doi.org/10.1002/jqs.70115)

7. Fire, fuel, and climate in the Great Basin from the Middle Holocene to present from the sediments of Blue Lake, NV · *Quaternary Research*, 2026 · **Score 69** Hochauflösender Seesedimentrekord aus dem Great Basin, der physikalische Sedimentologie mit Holzkohleanalyse verbindet, um Seespiegel und Biomasseverbrennung über die letzten 7.000 Jahre zu dokumentieren. Befund laut Abstract: anhaltend niedrige Seespiegel im mittleren Holozän (7.000–4.000 cal BP), zwei ausgeprägte Tiefstände (4.200–3.800 und 2.600–2.400 cal BP) in dokumentierten Phasen abrupten Umweltwandels; die erste Hauptkomponente der μ -XRF-Daten (über 75 % der Varianz) korreliert signifikant mit einer Grannenkiefern-Temperaturrekonstruktion, was wärmere Temperaturen als wesentlichen Treiber der reduzierten Niederschlag-Verdunstungs-Bilanz nahelegt. Spektralanalyse zeigt interannuelle und multidekadische Periodizitäten des pazifischen Ozean-Atmosphäre-Systems. Anschlussfähig über Seespiegel/Wasserbilanz und die spektrale Zeitreihenauswertung. *Themen 30 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 7 · Aktualität 6* (publ. 09.09.2026) · DOI: [10.1017/qua.2026.10114](https://doi.org/10.1017/qua.2026.10114)

8. Boron Isotope Evidence for Reduced Ventilation of the Deep Arctic Ocean During the Last Glacial Period · *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2026 · **Score 66** Paläo-pH-Rekonstruktion des tiefen Arktischen Ozeans über die letzten 45.000 Jahre im Vergleich zu einem Oberflächenrecord der Nordischen Meere. Befund laut Abstract: die pH-Differenz zwischen den oberflächennahen Nordischen Meeren und dem tiefen Arktischen Ozean war während der letzten Eiszeit (45–11 ka) größer als im frühen und mittleren Holozän (11–5 ka), was auf eine reduzierte glaziale Ventilation des tiefen Arktischen Ozeans über die oberflächennahen Nordischen Meere hindeutet. Anschlussfähig als quartär-paläozeanographische Arbeit (Tier 2): die Ventilation der Tiefsee steuert die Speicherung von Ozeankohlenstoff und berührt dieselbe Kohlenstoffkreislauf-Frage, die auch für glaziale CO₂-Zerlegungen zentral ist. *Themen 25 · Methode 16 · Venue 9 · Anschluss 6 · Aktualität 10* (publ. 17.09.2026) · DOI: [10.1029/2026pa005533](https://doi.org/10.1029/2026pa005533)

9. Labrador Coastal Current Variability During the Holocene · *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2026 · **Score 66** Rekonstruktion der holozänen Strömungsgeschwindigkeit des Labradorstroms über den sortable-Silt-Index an zwei Kernstandorten vor Nord- und Zentral-Labrador. Befund laut Abstract: über die Zeit ähnliche Geschwindigkeiten an beiden Standorten, gesteuert durch den Ausstrom der Hudson Bay, mit einer rund 1.500-jährigen Zyklizität konsistent zur Arktischen Oszillation; die Oberflächensedimente deuten auf eine jüngste Beschleunigung des Stroms hin, konsistent mit erhöhtem arktischem Süßwasserexport und einer möglichen jüngsten Abschwächung der atlantischen Umwälzzirkulation. Anschlussfähig als holozäne, zyklizitäts-orientierte paläozeanographische Arbeit (Tier 2). *Themen 25 · Methode 16 · Venue 9 · Anschluss 6 · Aktualität 10* (publ. 17.09.2026) · DOI: [10.1029/2026pa005586](https://doi.org/10.1029/2026pa005586)

10. The West Corrib moraine system as evidence for a brief glacial readvance in Ireland during overall Heinrich Stadial 1 deglaciation · *Quaternary Research*, 2026 · **Score 64** Geomorphologische Kartierung, Sedimentologie und kosmogene ¹⁰Be-Oberflächenexpositionsdatierung eines Endmoränensystems im westlichen Lough-Corrib-Becken

(Irland). Befund laut Abstract: das West-Corrib-Moränensystem wurde um etwa 16,5 ka von aus Connemara nach Osten fließendem Eis abgelagert und markiert eine kurze Phase eismarginaler Stabilität oder eines Wiedervorstoßes, die den allgemeinen Rückzug während des Heinrich-Stadials 1 (18,2–14,7 ka) unterbrach — trotz topografischer Prominenz war das Ereignis relativ zur rund 3.000-jährigen Dauer von HS1 kurzlebig. Anschlussfähig als deglaziale Chronologie eines abrupten, kurzlebigen Vorstoßes. *Themen 25 · Methode 15 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 10* (publ. 16.09.2026) · DOI: [10.1017/qua.2026.10091](https://doi.org/10.1017/qua.2026.10091)

● Radar

- **Chironomid-based Holocene summer temperature variability in Lake Prokoško, Vranica Mountains, Bosnia and Hercegovina** · *Quaternary Science Reviews* · **64** ● · △ *Titel-basiert* · Chironomiden-basierte Rekonstruktion sommerlicher Temperaturvariabilität aus einem Bergsee des westlichen Balkans; als mitteleuropäisch-anchlussfähige Seesedimentarbeit notiert. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110255](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110255) · publ. 10.09.2026
- **Changing hydroclimate seasonality in SW Iberia over the Last Deglaciation and Holocene revealed using leaf-wax isotopes** · *Quaternary Science Reviews* · **62** ● · △ *Titel-basiert* · Blattwachs-Isotopie zur Saisonalität des Hydroklimas über Deglaciation und Holozän in Südwest-Iberien. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110254](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110254) · publ. 10.09.2026
- **Hydroclimate complexity across the last glacial cycle in tropical Australia: reassessing the uniqueness of the Holocene** · *Quaternary Science Reviews* · **61** ● · △ *Titel-basiert* · Neubewertung der hydroklimatischen Variabilität über den letzten Glazialzyklus in den Tropen Australiens. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110253](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110253) · publ. 10.09.2026
- **Contrasting responses of the eastern and western Chinese Loess Plateau to Heinrich events** · *Quaternary Science Reviews* · **60** ● · △ *Titel-basiert* · Gegensätzliche Reaktion von Ost- und West-Lössplateau auf Heinrich-Ereignisse; als millennial-abrupte Arbeit notiert. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110260](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110260) · publ. 04.09.2026
- **Holocene vegetation dynamics of Grande Terre (Kerguelen Islands) inferred from sedimentary ancient DNA** · *Journal of Quaternary Science* · **59** ● · Sedimentäre alte DNA (sedaDNA) über die letzten rund 11.080 Jahre; ein Vegetationswechsel um etwa 8.700 cal BP fällt mit einer aus Pollen abgeleiteten Nordverschiebung der Südhemisphären-Westwinde zusammen. Als subantarktische Multiproxy-Paläoökologie notiert. DOI: [10.1002/jqs.70101](https://doi.org/10.1002/jqs.70101) · publ. 10.09.2026
- **Differential responses of Asian summer monsoon circulation and local hydroclimate during the Holocene** · *Quaternary International* · **59** ● · △ *Titel-basiert* · Entkopplung von großräumiger Monsunzirkulation und lokalem Hydroklima im Holozän. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quaint.2026.110454](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2026.110454) · publ. 16.09.2026
- **Dansgaard-Oeschger cycles of the penultimate glacial period recorded in a stalagmite from northern China** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **56** ● · △ *Titel-basiert* · Spieläthem-Aufzeichnung millennialer Dansgaard-Oeschger-Zyklen des vorletzten Glazials. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114197](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114197) · publ. 03.09.2026
- **Geochronology and sedimentology / Terrestrial paleoenvironments and paleoclimate — Buluk fossil site, East Turkana, Kenya (Miocene climate optimum)** ·

Geological Society of America Bulletin · **52** ● · △ Titel-basiert · Zwei gepaarte Arbeiten zur Geochronologie/Sedimentologie und zu den terrestrischen Paläoumwelten eines hominoidenführenden Fundplatzes in Ost-Turkana. Geografisch im Profilverzweigung (Ostafrikanischer Rift/Turkana), zeitlich jedoch im Miozän (tiefzeitlich) — daher als regionaler Radareintrag geführt. DOI: [10.1130/b38609.1](https://doi.org/10.1130/b38609.1) · [10.1130/b38610.1](https://doi.org/10.1130/b38610.1) · publ. 18.09.2026

Regional- und Methodenrand: eine geomorphologische Arbeit zu tiefgründigen Rutschungen im nördlichen Tanganjika-Kivu-Riftabschnitt (*Geomorphology*, **46** ●, △ Titel-basiert, publ. 14.09.2026, DOI: [10.1016/j.geomorph.2026.110546](https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2026.110546)) berührt das Riftgebiet, bleibt aber methodisch (Hangstabilität, Tier 3) am Rand; der Wasserbilanz-Reanalysedatensatz **HERA-WB** für Europa 1951–2020 (*ESSD*-Preprint, **45** ●, publ. 03.09.2026, DOI: [10.5194/essd-2026-674](https://doi.org/10.5194/essd-2026-674)) ist thematisch instrumentell-hydrologisch statt paläoklimatisch, methodisch aber für Wasserbilanzfragen notierenswert.

Außerhalb des Zeitfensters, aber thematisch einschlägig: Die vielbeachtete Nature-Geoscience-Analysis „Planetary energy budget during abrupt glacial climate events set by Atlantic Ocean heat valve“ (Buizert et al., DOI: [10.1038/s41561-026-02070-6](https://doi.org/10.1038/s41561-026-02070-6)) argumentiert, die AMOC-Stärke wirke bei abrupten glazialen Klimaereignissen als „Wärmeventil“ der planetaren Energiebilanz. Sie datiert auf den 10.08.2026 und liegt damit außerhalb des 14-Tage-Fensters; die zugehörige *Research Briefing* (DOI: [10.1038/s41561-026-02086-y](https://doi.org/10.1038/s41561-026-02086-y), 07.09.2026) ist ein Zusammenfassingsformat und zählt nicht als Primärstudie. Zur Einordnung genannt, nicht als Neuerscheinung der Woche gelistet.

Teil B — Fördertöpfe & Calls

PAGES — Early-Career Award 2027, Deadline 29.09.2026. Die Bewerbung würdigt herausragende Nachwuchsforschende (PhD abgeschlossen oder PostDoc, in der Regel bis fünf Jahre nach der Promotion; begründete Ausfallzeiten verlängern) für exzellente Wissenschaft in Verbindung mit Koordination, Outreach und Community-Engagement; Preis ist unter anderem eine Einladung zum Open Science Meeting samt Konferenzzuschuss. Die vorherige **Workshop- und Working-Group-Förderrunde (Deadline 11.09.2026) ist verstrichen**; eine neue reguläre Deadline ist noch nicht veröffentlicht (PAGES ruft üblicherweise zweimal jährlich auf). Endorsement-Anträge (ohne Fördermittel) werden im Januar, April, Juli und Oktober geprüft. Quellen: [PAGES — Early-Career Award 2027](#) · [PAGES — Workshop/meeting support](#).

ERC Starting Grant 2027 — Deadline 14.10.2026. Der Call (ERC-2027-STG) ist seit dem 22.07.2026 offen (Einreichung bis 14.10.2026, 17:00 Brüsseler Zeit). Fördervolumen bis zu 1,5 Millionen Euro über fünf Jahre (plus bis zu 1 Million für Startausstattung); indikatives Budget des 2027-Calls rund 594 Millionen Euro bei etwa 373 erwarteten Grants. Step-1-Ergebnisse im April 2027, Interviews und Step-2-Ergebnisse im August 2027. Die Eignungsfenster-Regelung ist für 2027 angepasst; maßgeblich ist die offizielle ERC-Seite. Quellen: [ERC — Starting Grant](#) · [ERC — Applying in the 2027 competitions](#).

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics“ (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, Budget rund **14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte**, also circa 7 Millionen je Konsortium. Ziel laut Ausschreibungstext: belastbare Information zu Paläoklimazuständen und -ereignissen außerhalb der Variabilität der letzten Jahrhunderte, als Grundlage für die Weiterentwicklung von Erdsystemmodellen. Bei nur zwei geförderten Projekten

europaweit ist die Konkurrenz hart; Konsortialgespräche gehören entsprechend früh angesetzt. Quellen: [Topic-Seite](#) · [CL5 Work Programme 2026–2027 \(PDF\)](#).

ICDP — Proposal-Zyklus. Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; der Zyklus für 2027 dürfte demselben Muster folgen, eine formale Ankündigung liegt noch nicht vor. Workshop-Calls laufen unterjährig. Quelle: [ICDP — Proposals](#).

DFG — veränderte Rahmenbedingungen. Kein neuer paläoklimaspezifischer Call. Für die Planung relevant: Die **Programmpauschale steigt ab 2027 von 22 auf 25 Prozent**; die nächste **Schwerpunktprogramm-Antragsrunde** findet erst **Ende 2026** statt, mit Förderbeginn ab **2028**. Bewerbungen für den **DFG-Communicator-Preis 2027** (Wissenschaftskommunikation) sind noch bis **30.09.2026** möglich. Quellen: [Forschung & Lehre — 25 statt 22 Prozent ab 2027](#) · [DFG — Pressemitteilungen 2026](#).

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — Novelle in erster Lesung beraten, Beratung im Ausschuss. Nach dem Kabinettsbeschluss vom 29.07.2026 ist der Gesetzentwurf zur Modernisierung des Befristungsrechts in der Wissenschaft nach der Sommerpause im Bundestag in erster Lesung beraten und zur weiteren Beratung an den **Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung** überwiesen worden. Kern des Entwurfs sind erstmals verbindliche **Mindestvertragslaufzeiten: drei Jahre für Erstverträge Promovierender, zwei Jahre für PostDocs**; die Höchstbefristungsdauer in der PostDoc-Phase wird auf **sechs Jahre vereinheitlicht**. Für **studentische Hilfskräfte** ist eine Mindestlaufzeit von einem Jahr sowie eine Anhebung der Höchstbefristungsdauer von sechs auf acht Jahre vorgesehen. Als Einordnung, nicht als Faktenlage: Mindestlaufzeiten verbessern die Planbarkeit früher Verträge, während die Vereinheitlichung der PostDoc-Höchstdauer individuelle Übertragungsspielräume verengt; der weitere parlamentarische Weg und der Zeitplan sind offen. Quellen: [BMFTR — Bundeskabinett beschließt Änderung des WissZeitVG](#) · [Bundestag — Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes](#) · [Forschung & Lehre — Schwerpunkt WissZeitVG](#).

Bundeshaushalt 2027 — Kabinettsbeschluss vom 06.07.2026, parlamentarische Beratung im Herbst. Der Regierungsentwurf steht seit dem 6. Juli 2026. Der Kernhaushalt des BMFTR liegt bei rund **22 Milliarden Euro** — ein nominales Plus von nur etwa **0,7 Prozent** gegenüber 2026. Reale Zuwächse gibt es fast ausschließlich im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, dessen FuE-Investitionen 2027 gegenüber 2026 deutlich steigen. Die erste Lesung im Bundestag steht im Herbst an. Als Einordnung: Der reguläre Haushalt stagniert bei den aktuellen Tarif- und Sachkostensteigerungen real, was die operative Lage der Förderorganisationen unter Druck hält. Quellen: [Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt](#) · [Table.Briefings — Haushalt 2027](#).

DFG-Einschnitte auf der PostDoc-Ebene bleiben in Kraft. Wegen hoher Tarifsteigerungen sowie gestiegener Geräte- und Verbrauchskosten, die die zugesagten jährlichen Mittelaufwüchse nicht decken, hat die DFG bei den Graduiertenkollegs den Förderbeginn von Einrichtungsanträgen verschoben und die **Bewilligung von PostDoc-Stellen ausgesetzt**. Für PostDoc-Karrierewege in den Geowissenschaften fällt damit ein Finanzierungspfad vorerst aus, was den Druck auf Sachbeihilfe- und EU-Mittel erhöht. Quelle: [Fakultätentag Informatik](#).

Teil D — Community & Termine

- **PAGES Early-Career Award 2027 — 29.09.2026.** Die PAGES-Workshop-/Working-Group-Runde (11.09.2026) ist verstrichen; nächste reguläre Deadline noch offen.
 - **DFG-Communicator-Preis 2027 —** Bewerbungsschluss **30.09.2026.**
 - **DEUQUA-Tagung 2026 — 28.09. bis 02.10.2026 in Freiburg im Breisgau,** Motto „Environmental Records and Landscape Change“, mit Ganztagesexkursionen am 28.09. und 02.10. (u. a. Schwarzwald-/Vogesen-Vergletscherung, Löss im Rheintal, fluviale Dynamik im Oberrheingraben). Quelle: [DEUQUA 2026](#).
 - **ERC Starting Grant 2027 —** Deadline **14.10.2026.**
 - **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call —** Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027.**
 - **AGU Fall Meeting 2026 — 7.-11.12.2026 in San Francisco;** die Abstract-Deadline (05.08.2026) ist verstrichen. Quelle: [AGU](#).
 - **EGU General Assembly 2027 — 04. bis 09.04.2027 in Wien,** hybrid. Abstract-Deadline noch nicht veröffentlicht; erfahrungsgemäß Mitte Januar. Quelle: [EGU](#).
 - **ICDP —** nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**, nach dem Muster der Vorjahre und noch nicht bestätigt.
-

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe — Crossref-Zugriff über die Browser-Schnittstelle. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war wie in den Vorwochen blockiert (Proxy-403). Die Crossref REST API wurde in diesem Lauf jedoch erfolgreich über die integrierte Browser-Schnittstelle (`fetch()` gegen `api.crossref.org`) abgefragt. Damit ließ sich die systematische ISSN-Abfrage der Kernjournale (u. a. QSR, EPSL, GPC, P³, Quaternary Research, JQS, Quaternary International, Paleoceanography and Paleoclimatology, Nature-Familie) mit `from-created-date` -Filter und `created` -Sortierung durchführen, ergänzt um Themen-Queries und eine Preprint-Sichtung (posted-content). Für Nature-Portfolio-Titel ohne Crossref-Abstract wurde die Verlags-Landingpage eingesehen.

Was das für die Abdeckung bedeutet. Die Abdeckung ist diese Woche breiter als in den Open-Access-only-Wochen und schließt Elsevier- und Wiley-Kernjournale wieder ein. Elsevier liefert weiterhin keine Abstracts über Crossref; die betreffenden Einträge sind mit [△ Titel-basiert](#) markiert, ihre inhaltliche Aussage steht bis zur Einsicht des Originals unter Vorbehalt, und es wurden keine Ergebnisse über den Titel hinaus erfunden. Die angegebenen Daten sind Crossref-`created` -Daten (Registrierung), die vom Online-Publikationsdatum um wenige Tage abweichen können. Ein direkter afrikanischer Ostafrika-/Rift-/AHP-Primärtreffer mit quartärem Fokus war im Fenster nicht auffindbar; die Region wird diese Woche über eine miozäne Ost-Turkana-Geochronologie (Buluk) und eine Riftgeomorphologie (Tanganjika-Kivu) bedient. Zur Einordnung wurde eine thematisch einschlägige, aber außerhalb des Fensters liegende Nature-Geoscience-Analysis (AMOC-„Wärmeventil“, 10.08.2026) geprüft und ausgeschlossen.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.