

# GeoNews — KW 40/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftodynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 28. September 2026

**Was ist GeoNews?** Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.

Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.

Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: ● ab 75 *Must-read* · ● 50–74 *relevant* · ● 30–49 *Radar*. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

## Kurzfassung

Über zwei Dutzend bewertete Arbeiten, diese Woche **drei ● Must-reads** — zwei davon abstract-gestützt, einer auf Basis von Titel und Journal. An der Spitze eine *Paleoceanography-and-Paleoclimatology*-Studie zur **saisonalen Struktur der pazifischen Walker-Zirkulation im Holozän**: transiente Simulationen trennen orbitalen und Treibhausgas-Antrieb und zeigen, dass die orbitale Steuerung den zonalen SST-Gradienten saisonal gegenläufig verschiebt (Winter schwächer, Sommer stärker), während der anthropogene Treibhausgas-Anstieg seit dem mittleren Holozän diese Rhythmik überprägt. Direkt im Profilzentrum: eine quartäre Klimadynamik-Frage über die Trennung natürlicher und anthropogener Signale in einer langen Antriebs-Antwort-Kette.

Der zweite ● ist regional hoch anschlussfähig: eine *Quaternary-Research*-Modellstudie argumentiert, dass der **Kollaps der „Grünen Sahara“ die holozäne Abkühlung antreibt** — genau die Land-Oberflächen-Rückkopplung der African Humid Period, die im Zentrum dieses Profils steht und die Standard-Klimamodelle bislang verfehlen. Der dritte ● ist eine *Quaternary-Science-Reviews*-Arbeit zur **multiproxy-Paläoumweltrekonstruktion des frühesten Oldowan von Nyayanga (Westkenia)** — ostafrikanische Mensch-Umwelt-Kopplung im Riftkontext; da Elsevier kein Abstract liefert, beruht die Einordnung auf Titel, Journal und Region und ist mit △ *Titel-basiert* gekennzeichnet.

Der ●-Block ist methodisch breit: eine Erdsystemmodell-Studie zu marinen Radiokohlenstoff-Reservoiraltern (kosmogene  $^{14}\text{C}$ -Produktion vs. glazial-interglaziale Steuerung), eine holozäne

Feuchte-Rekonstruktion aus einem portugiesischen See, die Erstidentifikation der isländischen Vedde-Asche in einem tschechischen Paläosee, ein ~100-kyr-Quecksilberrekord aus dem ICDP-Kratersee El'gygytgyn, eine westafrikanische Vegetations-Klima-Studie über 12.500 Jahre sowie eine Bayes'sche Tageklima-Rekonstruktion für die Alpen. Regional wird das Profil diese Woche über **Nordafrika (Grüne Sahara, See Iffer/Mittlerer Atlas) und Ostafrika (Nyayanga)** bedient; ein quartärer Primärtreffer aus Chew Bahir, Turkana oder ein direktes African-Humid-Period-Proxyarchiv war im 14-Tage-Fenster nicht auffindbar.

**Zur Entstehung — mit vollem Literaturzugriff.** Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war wie üblich blockiert (Proxy-403); die systematische Crossref-Abfrage lief in diesem Lauf jedoch erfolgreich über die integrierte Browser-Schnittstelle ( `fetch()` ), sodass die ISSN-Abfrage der Kernjournale **inklusive Elsevier, Wiley und der Nature-Familie** durchgeführt werden konnte. Elsevier liefert weiterhin keine Abstracts; die betreffenden Titel sind mit  $\triangle$  *Titel-basiert* markiert und ihre inhaltliche Aussage steht unter Vorbehalt.

Förderseitig ist die Woche eng getaktet: **PAGES Early-Career Award 2027 (29.09.2026)**, **DFG-Communicator-Preis 2027 (30.09.2026)**, die **DEUQUA-Tagung** in Freiburg (**28.09.-02.10.2026**, beginnt am Erscheinungstag) und der **ERC Starting Grant 2027 (14.10.2026)**. Forschungspolitisch bleibt die **WissZeitVG-Novelle** in der parlamentarischen Beratung, und der **Bundeshaushalt 2027** steht in der Herbst-Lesung.

---

## Teil A — Paper der Woche

---

Erfasst wurden Arbeiten mit Crossref- `created` -Datum ab dem 14. September 2026, die nicht bereits in einer früheren Ausgabe gelistet waren. Bereits gelistete DOIs sind ausgeschlossen. Für jeden Eintrag mit einsehbarem Abstract stützt sich die Einordnung auf dieses Abstract; Titel ohne verfügbares Abstract (v. a. Elsevier) sind mit  $\triangle$  *Titel-basiert* markiert.

### ● **Must-read (ab 75)**

**1. Anthropogenic Disruption of Orbital-Scale Seasonal Asynchrony in the Tropical Pacific Walker Circulation During the Holocene** · *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2026 · **Score 85** Ein Paar transienter Holozän-Simulationen trennt den reinen Orbital-Antrieb vom Orbital-plus-Treibhausgas-Antrieb, um die saisonale Architektur des zonalen Meeresoberflächentemperatur-Gradienten (SSTG) im äquatorialen Pazifik zu untersuchen. Befund laut Abstract: Der reine Orbital-Antrieb erzeugt eine grundlegende saisonale Asymmetrie — Abschwächung des SSTG im Winter, Verstärkung im Sommer —, verstärkt durch die orbitale Modulation der Mischungsschichttiefe und die unterschiedliche thermische Empfindlichkeit der ostpazifischen Kaltzunge. Der anthropogene Treibhausgas-Anstieg seit dem mittleren Holozän stört diese natürliche Rhythmik: Er erwärmt den Ostpazifik saisonübergreifend, wirkt der orbital getriebenen sommerlichen Verstärkung entgegen und beschleunigt den winterlichen Rückgang. Direkt im Profilzentrum: quartäre Klimadynamik über eine transiente Antriebs-Antwort-Kette, mit sauberer Trennung natürlicher und anthropogener Anteile — dieselbe Frage nach der Attribution langfristiger, nichtlinearer Systemantworten, die für Zeitreihen- und Kippunktanalysen zentral ist. Frei zugänglich (AGU). *Themen 36 · Methode 20 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 26.09.2026) · DOI: [10.1029/2026pa005663](https://doi.org/10.1029/2026pa005663)

**2. Green Sahara collapse drives Holocene cooling** · *Quaternary Research*, 2026 · **Score 84** Transiente Holozän-Simulationen mit dem vollgekoppelten CESM1.2 (dynamische Vegetation) und ein idealisiertes „Green-Sahara“-Experiment, in dem die früh- bis mittelholozänen Wüstenböden

der Sahara durch Bodeneigenschaften angrenzender Nicht-Wüstenregionen ersetzt werden, um verstärkte Landoberflächen-Begrünung nachzubilden. Befund laut Abstract: Das Green-Sahara-Experiment simuliert eine globale Jahresmitteltemperatur-Anomalie von 0,28 °C über dem vorindustriellen Niveau sowie eine etwa neunfache Zunahme des Jahresniederschlags über der Sahara — beides konsistent mit Proxy-Rekonstruktionen und unabhängigen geologischen Belegen. Die Autor:innen argumentieren, dass die verbreitete Unfähigkeit von Klimamodellen, die dokumentierte holozäne Abkühlung zu reproduzieren (statt einer einseitigen Erwärmung), mit der fehlenden Green-Sahara-Landoberflächen-Rückkopplung zusammenhängt: Deren Kollaps treibt die Abkühlung. Regional und thematisch im Profilzentrum — African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, direkt anschlussfähig an ostafrikanische AHP- und Chew-Bahir-Fragestellungen. Themen 38 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 10 · Aktualität 10 (created 23.09.2026) · DOI: [10.1017/qua.2026.10116](https://doi.org/10.1017/qua.2026.10116)

**3. Contextualising early hominin environments: A multi-proxy palaeoenvironmental reconstruction of the earliest Oldowan at Nyayanga, western Kenya** · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 83** ·  Titel-basiert Multiproxy-Paläoumweltrekonstruktion des frühesten Oldowan-Fundplatzes von Nyayanga in Westkenia. Kernthema des Profils: ostafrikanische Mensch-Umwelt-Kopplung im Riftkontext, quartäre Geoarchäologie und Paläoökologie, in einem Top-Fachjournal. Ohne einsehbares Abstract (Elsevier) beruht die Einordnung auf Titel, Journal und Region; die konkreten Proxydaten und quantitativen Befunde stehen unter Vorbehalt. Der hohe Score reflektiert die unmittelbare regionale und thematische Passung sowie die Venue — nicht ein geprüftes Ergebnis. Themen 38 · Methode 15 · Venue 11 · Anschluss 9 · Aktualität 10 (created 22.09.2026) · DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110288](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110288)

### ● Relevant (50-74)

**4. Cosmogenic radiocarbon production and glacial cycles control marine radiocarbon archive variations** · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 74** Ein Erdsystemmodell mittlerer Komplexität mit Radiokohlenstoff simuliert marine Reservoiralter über die letzten 50.000 Jahre. Befund laut Abstract: Die simulierten Reservoiralter reichen von 400 bis 1.200 Jahren an der Meeresoberfläche und liegen systematisch niedriger als frühere Schätzungen aus ungekoppelten Modellen — Folge stärkerer vertikaler Durchmischung und höherer Luft-See-CO<sub>2</sub>-Austauschraten. Kurzfristige Variationen der Reservoiralter werden von Änderungen der kosmogenen Radiokohlenstoff-Produktion dominiert, während glazial-interglaziale Klimaschwankungen langsamer und gedämpft wirken. Der interhemisphärische atmosphärische Radiokohlenstoff-Gradient während der Laschamp-Exkursion war demnach bis zu doppelt so groß wie bislang angenommen. Anschlussfähig als methodische Chronologie-Arbeit (Tier 2): Reservoiralter-Korrekturen berühren dieselbe Frage wie Bayes'sche Alters-Tiefen- und <sup>14</sup>C-Kalibrationsmodelle. Frei zugänglich (Nature-Portfolio). Themen 26 · Methode 19 · Venue 12 · Anschluss 7 · Aktualität 10 (created 22.09.2026) · DOI: [10.1038/s43247-026-04073-y](https://doi.org/10.1038/s43247-026-04073-y)

**5. North Atlantic Ocean-Atmosphere Dynamics Controlled the Hydroclimate in Western Iberia During the Holocene** · *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2026 · **Score 73** Erste quellenaufgelöste Rekonstruktion der zentennisch- bis millennial-skaligen Feuchtevariabilität über die letzten 11.000 Jahre aus dem See Peixão (Portugal), gestützt auf verbindungsspezifische Wasserstoff- und Kohlenstoffisotope von Pflanzenwachs-n-Alkanen, ergänzt um Bulk-Geochemie und kontinuierliche XRF-Elementdaten. Befund laut Abstract: ein feuchtes frühes Holozän, ein fortschreitender mittelholozäner Trocknungstrend mit Ariditätsmaximum um etwa 4.000 Jahre vor heute und ein Übergang zu allgemein feuchteren, aber variableren spätholozänen Bedingungen, teils durch anthropogene Landnutzung geprägt. Die Trends werden als orbital gesteuert im

Rahmen nordatlantischer Ozean-Atmosphäre-Dynamik interpretiert. Anschlussfähig als paläohydrologisches Seesediment-Archiv mittlerer Breiten: die quellenaufgelöste Feuchterekonstruktion berührt dieselbe methodische Frage wie mitteleuropäische Wasserbilanz- und Seesedimentstudien. *Themen 26 · Methode 18 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 22.09.2026) · DOI: [10.1029/2026pa005517](https://doi.org/10.1029/2026pa005517)

#### **6. First finding of Icelandic tephra in Czechia: Vedde Ash identified in palaeolake sediments of Stará Jímka**

*Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 72** Erstnachweis der isländischen Vedde-Asche (~12 ka) im Böhmerwald, identifiziert in Paläosee-Sedimenten von Stará Jímka (Tschechien) — die erste isländische Tephralage überhaupt in Tschechien. Befund laut Abstract: In zwei parallelen lakustrinen Kernen wurden zwei diskrete Tephrahorizonte gefunden — die Laacher-See-Tephra (~13 ka BP) und, in beiden Kernen, die Vedde-Asche (~12 ka BP), zugeordnet über kombinierte stratigraphische, chronologische und geochemische Evidenz. Diese Lagen liefern chronostratigraphische Marker und einen belastbaren Rahmen zur Korrelation und Datierung spätglazialer Sedimentarchive über Mittel- und Nordeuropa; zudem eröffnet der Nachweis die Möglichkeit einer unabhängigen Prüfung der Grönland-Europa-Klimakopplung. Anschlussfähig als quartäre Tephrochronologie und Chronologie-Werkzeug für mitteleuropäische Seesedimente (Tier 2). *Themen 27 · Methode 19 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 25.09.2026) · DOI: [10.1002/jqs.70120](https://doi.org/10.1002/jqs.70120)

#### **7. Mercury cycling during the last glacial period in Arctic Lake El'gygytgyn, NE Russia**

*Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 72** Einer der längsten (~100-kyr) lakustrinen Quecksilber-Akkumulationsrekorde der Arktis, aus dem ICDP-Kratersee El'gygytgyn im entlegenen Nordosten Russlands. Befund laut Abstract: Trotz der isolierten Lage weisen anomal hohe Hintergrund-Hg-Werte auf eine lokale, nicht-atmosphärische Quelle hin — vermutlich aufsteigendes Hg entlang von Störungen unter dem Seeboden (tektonisch mobilisiertes Quecksilber). Diesem hohen Hintergrund sind zentennisch- bis millennisch-skalierte Umweltsignale überlagert. Die Arbeit zeigt, dass tektonische Hg-Flüsse die Interpretation sedimentärer Hg-Rekorde in tektonisch aktiven Regionen erschweren können. Anschlussfähig als langer ICDP-Bohrkern-Rekord (Profilkernthema) und als methodischer Hinweis für Multiproxy-Interpretation in Riftbecken, wo tektonische Überprägung ebenfalls zu erwarten ist. *Themen 30 · Methode 17 · Venue 8 · Anschluss 7 · Aktualität 10* (created 24.09.2026) · DOI: [10.1002/jqs.70118](https://doi.org/10.1002/jqs.70118)

#### **8. Climate variability over the past 12,500 years has shaped vegetation dynamics differently across West African savannas and forests**

*The Holocene*, 2026 · **Score 72** Pollen-basierte kompositionelle und funktionelle Analyse der Vegetationsdynamik westafrikanischer Savannen und Wälder von der jüngeren Dryas bis heute. Befund laut Abstract: Fossile Pollenspektren wurden ökologischen Domänen zugeordnet und mit TRY-Merkmalen (u. a. spezifische Blattfläche, Holzdicke, Samenmasse) harmonisiert; funktionelle Dispersion (FDis), Squared-Chord-Distance und Hauptkoordinatenanalyse dienten der Mustererkennung. Sahel- und Sudan-Savannen sind kompositionell unterscheidbar, funktionell aber nur schwach differenziert; die funktionelle Dispersion nimmt im Sahel über die Zeit signifikant zu, im Sudan nicht. Waldspektren zeigen höhere funktionelle Dispersion und stärkeren kompositionellen Umsatz als Savannen. Anschlussfähig als afrikanische Vegetations-Klima-Studie über glazial-interglaziale bis holozäne Zeitskalen — methodisch übertragbar auf ostafrikanische pollenbasierte Rekonstruktionen und die Mensch-Umwelt-Kopplung im Riftraum. *Themen 30 · Methode 16 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 25.09.2026) · DOI: [10.1177/09596836261487403](https://doi.org/10.1177/09596836261487403)

#### **9. Climate and paleoseismicity co-recorded in a tectono-karstic Lake: a multi-proxy late Pleistocene-Holocene record from Lake Iffer (Middle Atlas, Morocco)**

*Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2026 · **Score 72** ·  Titel-basiert Multiproxy-

Rekonstruktion aus einem tektono-karstischen See im Mittleren Atlas (Marokko), die Klima- und Paläoseismizitätssignale über das späte Pleistozän und Holozän gemeinsam erfasst. Kernthema: nordafrikanisches Seesediment-Archiv, quartäre Paläoumwelt, Kopplung von Klima und Tektonik — direkt anschlussfähig an Riftsee-Fragestellungen, in denen tektonische und klimatische Signale ebenfalls entflochten werden müssen. Ohne einsehbares Abstract (Elsevier), daher Titel-basiert und unter Vorbehalt. *Themen 30 · Methode 15 · Venue 9 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 22.09.2026) · DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114236](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114236)

**10. Tree-ring-anchored analog reconstruction of daily climate distributions from instrumental data with Bayesian distributional regression: Application to the European Alps** · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 71** ·  Titel-basiert Analog-Rekonstruktion täglicher Klimaverteilungen aus Instrumentendaten, verankert an Baumringen und modelliert über Bayes'sche distributionale Regression, angewandt auf die europäischen Alpen. Methodisch im Profilzentrum: Bayes'sche Statistik und Zeitreihenrekonstruktion mit hoher zeitlicher Auflösung — direkt zitierbar in der methodischen Arbeit an nichtparametrischen und Bayes'schen Rekonstruktionsverfahren. Ohne einsehbares Abstract (Elsevier), daher Titel-basiert; die konkrete Umsetzung und die Validierungsergebnisse stehen unter Vorbehalt. *Themen 26 · Methode 16 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 28.09.2026) · DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110287](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110287)

## ● Radar

- **Trends in south pole particle concentrations imply Holocene westerly wind strengthening** · *Climate of the Past* · **71** ● · Holozäne Staub-Mikropartikelrekorde aus dem South Pole Ice Core (SPC14) als physikalischer Proxy der Südhemisphären-Westwinde: sinkende Konzentrationen (1,1–5,1 µm) und steigender Grobpartikelanteil über das Holozän, interpretiert als Windverstärkung. Frei zugänglich. DOI: [10.5194/cp-22-1741-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1741-2026) · publ. 28.09.2026
- **Dating of Late Pleistocene sediments along the coast of Brittany (W France) by OSL and palaeodose estimates with BayLum** · *Quaternary Geochronology* · **68** ● ·  Titel-basiert · OSL-Datierung spätpleistozäner Küstensedimente mit Bayes'scher Paläodosisschätzung (BayLum); methodisch anschlussfähig an Bayes'sche Lumineszenz-Chronologie. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quageo.2026.101770](https://doi.org/10.1016/j.quageo.2026.101770) · publ. 21.09.2026
- **Climate-driven shifts in lake connectivity and carbon accumulation in the upper Rio Negro Basin evidenced by a multi-proxy record over the past 7000 years** · *Quaternary Science Reviews* · **68** ● ·  Titel-basiert · Multiproxy-Seesedimentrekord über 7.000 Jahre zu Seekonnektivität und Kohlenstoffakkumulation; quartäres lakustrines Archiv. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110291](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110291) · publ. 22.09.2026
- **Stable isotope analysis of freshwater gastropod carbonates from Swanscombe: Insights into climate stability and seasonality during MIS 11c** · *Journal of Quaternary Science* · **68** ● ·  $\delta^{18}\text{O}/\delta^{13}\text{C}$  an Süßwassermollusken (*Bithynia*, *Valvata*) aus fluvialen Sedimenten des Hoxnian-Interglazials (MIS 11c) im unteren Themse-Tal; geringe systematische Änderung über das thermische Maximum, Hinweis auf stabile Umweltbedingungen. Anschlussfähig als interglaziale Saisonalitätsstudie. DOI: [10.1002/jqs.70112](https://doi.org/10.1002/jqs.70112) · publ. 21.09.2026
- **Centennial salinity variability recorded in early Holocene deposits in the Yangtze River Delta and implications for hydroclimatic change of the East Asian Summer Monsoon** · *Quaternary Science Reviews* · **67** ● ·  Titel-basiert · Zentennische Salinitätsvariabilität im frühholozänen Yangtse-Delta und ihre Kopplung an den ostasiatischen

Sommermonsun. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110293](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110293) · publ. 23.09.2026

- **Glaciers fluctuations during the Lateglacial and the Holocene in Georgian Greater Caucasus from  $^{10}\text{Be}$  moraine dating** · *The Holocene* · **66** ● · Rekonstruktion der Gletscherschwankungen im georgischen Großen Kaukasus über  $^{10}\text{Be}$ -Datierung von 51 Proben aus 12 Moränen: eine spätglaziale Moräne (~16 ka), fünf holozäne Stände (~5,6/2,3/1,5/1,0 ka) und mehrere Kleine-Eiszeit-Vorstöße; kleine frühholozäne Ausdehnung. DOI: [10.1177/09596836261477276](https://doi.org/10.1177/09596836261477276) · publ. 23.09.2026
- **Electron probe microanalysis of extremely fine-grained tephra: new protocols and insights for analyses at the 1  $\mu\text{m}$  scale** · *Journal of Quaternary Science* · **66** ● · Quantitatives EPMA-WDS-Verfahren ( $\mu\text{m}/1\text{ nA}$ ) zur geochemischen Charakterisierung ultradistaler Kryptotephra in Eiskernen und Meeressedimenten; validiert an der Zavaritskii-1831-Kryptotephra. Methodisch anschlussfähig an quartäre Tephrochronologie. DOI: [10.1002/jqs.70117](https://doi.org/10.1002/jqs.70117) · publ. 25.09.2026
- **Redefining Last Glacial Maximum environmental conditions in northeastern Brazil: pollen-based evidence of open and moist-adapted vegetation cover** · *Quaternary Science Reviews* · **65** ● ·  $\triangle$  Titel-basiert · Pollenbasierte Belege für offene, feuchteangepasste Vegetation im LGM Nordost-Brasiliens. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110197](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110197) · publ. 25.09.2026
- **Influence of the western Pacific warm pool and East Asian climate on late Holocene typhoon activities affecting Taiwan** · *Quaternary Science Reviews* · **65** ● ·  $\triangle$  Titel-basiert · Spätholozäne Taifunaktivität um Taiwan und ihre Kopplung an den westpazifischen Warmpool; paläotempestologische Extremwertfrage. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110282](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110282) · publ. 21.09.2026
- **First foraminiferal record and multi-proxy reconstruction of paleoenvironmental changes in the Gulf of Gdańsk (SE Baltic Sea) over the last 5000 years** · *The Holocene* · **64** ● · Multiproxy-Rekord über 5.000 Jahre aus der Danziger Bucht: Störung um 4 ka (Sturmaktivität, reduzierter Flusseintrag), Aussüßung 3–1,7 ka, Salinitätsabfall und mögliche Hypoxie um 1,4 ka. Als holozäne Multiproxy-Küstenarbeit notiert. DOI: [10.1177/09596836261487376](https://doi.org/10.1177/09596836261487376) · publ. 21.09.2026
- **Coupling of dust activity and loess accumulation with East Asian summer monsoon precipitation along the lower reaches of the Yellow River during the Last Glacial period** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **64** ● ·  $\triangle$  Titel-basiert · Kopplung von Staubaktivität und Löss-Akkumulation an den ostasiatischen Sommermonsun im letzten Glazial. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114241](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114241) · publ. 22.09.2026
- **Enhanced Last Glacial Aridity in the Western Pampean Plains Inferred From Southern South American Loess** · *Paleoceanography and Paleoclimatology* · — ·  $\triangle$  Hinweis: Diese Arbeit ist die überarbeitete Fassung eines am selben Tag **zurückgezogenen** früheren Artikels (Retraction von 10.1029/2025PA005304, Grund: Inkonsistenzen bei aus Korngrößenverteilungen abgeleiteten Parametern; Autor:innen haben neu gerechnet). Inhaltlich: multiproxy-Rekonstruktion der Staubakkumulation im pampeanischen Löss über 43.000 Jahre (Lumineszenzdatierung, Paläoklimasimulationen). Wegen der Retraktions-Historie hier nur mit ausdrücklichem Vorbehalt und nicht regulär eingeordnet. DOI (revidiert): [10.1029/2026pa005524](https://doi.org/10.1029/2026pa005524) · publ. 23.09.2026

*Regional- und Zeitrand:* Weitere quartäre Treffer am Profilrand, hier nur zur Einordnung: eine holozäne Vegetationsstudie vom Tibetplateau (Pollen; DOI [10.1016/j.palaeo.2026.114242](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114242)), holozäne Mensch-Umwelt-Archive aus dem Großen Rann von Kachchh (Indien; [10.1016/j.palaeo.2026.114240](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114240)), aus dem Santiago-Becken (Zentralchile; [10.1016/j.quaint.2026.110456](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2026.110456)) und aus dem Pantanal (Brasilien; [10.1016/j.quaint.2026.110455](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2026.110455)). Zwei einschlägige, aber tiefzeitliche *Paleoceanography-and-Paleoclimatology*-Arbeiten (pliozäne nordadriatische Sapropel-Runoff-Studie, [10.1029/2026pa005503](https://doi.org/10.1029/2026pa005503); präzessionsgesteuerte eozäne Nordpazifik-Tiefenwasserbildung, [10.1029/2026pa005598](https://doi.org/10.1029/2026pa005598)) liegen außerhalb des quartären Fensters und sind nur methodisch (Orbitaltuning) notierenswert. Ein quartärer Primärtreffer aus Chew Bahir, Turkana oder ein direktes African-Humid-Period-Proxyarchiv war im 14-Tage-Fenster nicht auffindbar; die Region wird diese Woche über die Grüne-Sahara-Modellstudie (Rang 2), Nyayanga (Rang 3), die westafrikanische Vegetationsstudie (Rang 8) und den See Iffer im Mittleren Atlas (Rang 9) bedient.

---

## Teil B — Fördertöpfe & Calls

---

**PAGES — Early-Career Award 2027, Deadline 29.09.2026.** Die Bewerbung würdigt herausragende Nachwuchsforschende (PhD abgeschlossen oder PostDoc, in der Regel bis fünf Jahre nach der Promotion; begründete Ausfallzeiten verlängern) für exzellente Wissenschaft in Verbindung mit Koordination, Outreach und Community-Engagement; zum Preis gehört unter anderem eine Einladung zum Open Science Meeting samt Konferenzzuschuss. Die Frist läuft am Tag nach Erscheinen dieser Ausgabe ab. Endorsement-Anträge (ohne Fördermittel) werden im Januar, April, Juli und Oktober geprüft. Quellen: [PAGES — Early-Career Award](#) · [PAGES — Meeting support](#).

**DFG — Communicator-Preis 2027, Bewerbungsschluss 30.09.2026.** Der mit 50.000 Euro dotierte Preis für Wissenschaftskommunikation ist noch bis zum 30.09.2026 offen. Quelle: [DFG — Pressemitteilungen 2026](#).

**ERC Starting Grant 2027 — Deadline 14.10.2026.** Der Call (ERC-2027-STG) ist offen; Einreichung bis 14.10.2026, 17:00 Brüsseler Zeit. Fördervolumen bis zu 1,5 Millionen Euro über fünf Jahre (plus bis zu 1 Million für Startausstattung). Für die 2027-Runde gilt das erweiterte Eignungsfenster: antragsberechtigt ist, wessen Promotion höchstens zehn Jahre vor dem Stichtag abgeschlossen wurde (volles 0-10-Jahre-Fenster; maßgeblich bleibt die offizielle ERC-Seite). Quellen: [ERC — Starting Grant](#) · [ERC — Work Programme 2027](#).

**Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics“ (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08).** Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, Budget rund **14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte** (circa 7 Millionen je Konsortium). Ziel laut Ausschreibungstext: belastbare Information zu Paläoklimazuständen und -ereignissen außerhalb der Variabilität der letzten Jahrhunderte, als Grundlage für die Weiterentwicklung von Erdsystemmodellen. Bei nur zwei geförderten Projekten europaweit ist die Konkurrenz hart; Konsortialgespräche gehören früh angesetzt. Quellen: [Topic-Seite](#) · [CL5 Work Programme 2026-2027 \(PDF\)](#).

**ICDP — Proposal-Zyklus.** Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; der Zyklus für 2027 dürfte demselben Muster folgen, eine formale Ankündigung liegt noch nicht vor. Workshop-Calls laufen unterjährig. Quelle: [ICDP — Proposals](#).

**DFG — veränderte Rahmenbedingungen.** Kein neuer paläoklimaspezifischer Call. Für die Planung relevant: Die **Programmpauschale steigt ab 2027 von 22 auf 25 Prozent**; die nächste **Schwerpunktprogramm-Antragsrunde** findet erst **Ende 2026** statt, mit Förderbeginn ab **2028**. Quelle: [Forschung & Lehre — 25 statt 22 Prozent ab 2027](#).

---

## Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

---

**WissZeitVG — Novelle in der parlamentarischen Beratung.** Nach dem Kabinettsbeschluss vom 29.07.2026 ist der Gesetzentwurf zur Modernisierung des Befristungsrechts in der Wissenschaft in der parlamentarischen Beratung (Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung). Kern des Entwurfs sind erstmals verbindliche **Mindestvertragslaufzeiten: drei Jahre für Erstverträge Promovierender, zwei Jahre für PostDocs**; die Höchstbefristungsdauer in der PostDoc-Phase wird vereinheitlicht. Für **studentische Hilfskräfte** ist eine Mindestlaufzeit von einem Jahr sowie eine Anhebung der Höchstbefristungsdauer vorgesehen. Als Einordnung, nicht als Faktenlage: Mindestlaufzeiten verbessern die Planbarkeit früher Verträge, während die Vereinheitlichung der PostDoc-Höchstdauer individuelle Übertragungsspielräume verengen kann; der weitere parlamentarische Weg und der Zeitplan sind offen. Quellen: [BMFTR — Bundeskabinett beschließt Änderung des WissZeitVG](#) · [Forschung & Lehre — Schwerpunkt WissZeitVG](#).

**Bundeshaushalt 2027 — parlamentarische Beratung im Herbst.** Der Regierungsentwurf steht seit dem 06.07.2026. Der Kernhaushalt des BMFTR liegt bei rund **22 Milliarden Euro** — ein nominales Plus von nur etwa **0,7 Prozent** gegenüber 2026. Reale Zuwächse gibt es fast ausschließlich im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, dessen FuE-Investitionen 2027 gegenüber 2026 deutlich steigen. Die Lesungen im Bundestag laufen im Herbst. Als Einordnung: Der reguläre Haushalt stagniert bei den aktuellen Tarif- und Sachkostensteigerungen real, was die operative Lage der Förderorganisationen unter Druck hält. Quellen: [Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt](#) · [Table.Briefings — Haushalt 2027](#).

**DFG-Einschnitte auf der PostDoc-Ebene bleiben in Kraft.** Wegen hoher Tarifsteigerungen sowie gestiegener Geräte- und Verbrauchskosten, die die zugesagten jährlichen Mittelaufwüchse nicht decken, hat die DFG bei den Graduiertenkollegs den Förderbeginn von Einrichtungsanträgen verschoben und die **Bewilligung von PostDoc-Stellen ausgesetzt**. Für PostDoc-Karrierewege in den Geowissenschaften fällt damit ein Finanzierungspfad vorerst aus, was den Druck auf Sachbeihilfe- und EU-Mittel erhöht. Quelle: [Fakultätentag Informatik](#).

---

## Teil D — Community & Termine

---

- **DEUQUA-Tagung 2026 — 28.09. bis 02.10.2026 in Freiburg im Breisgau**, Motto „Environmental Records and Landscape Change“, mit Ganztagesexkursionen am 28.09. und 02.10. (u. a. Schwarzwald-/Vogesen-Vergletscherung, Löss im Rheintal, fluviale Dynamik im Oberrheingraben). Beginnt am Erscheinungstag dieser Ausgabe. Quelle: [DEUQUA 2026](#).
- **PAGES Early-Career Award 2027** — Bewerbungsschluss **29.09.2026**.
- **DFG-Communicator-Preis 2027** — Bewerbungsschluss **30.09.2026**.
- **ERC Starting Grant 2027** — Deadline **14.10.2026**.

- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
- **AGU Fall Meeting 2026** — **07. bis 11.12.2026 in San Francisco**; die Abstract-Deadline (05.08.2026) ist verstrichen. Quelle: [AGU](#).
- **EGU General Assembly 2027** — in Wien (Frühjahr 2027), hybrid; Termin und Abstract-Deadline sind der EGU-Seite zu entnehmen (erfahrungsgemäß Abstract-Frist Mitte Januar). Quelle: [EGU](#).
- **ICDP** — nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**, nach dem Muster der Vorjahre und noch nicht bestätigt.

---

## Methodik & Quellen

---

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

**Zur Entstehung dieser Ausgabe — Crossref-Zugriff über die Browser-Schnittstelle.** Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war wie in den Vorwochen blockiert (Proxy-403). Die Crossref REST API wurde in diesem Lauf jedoch erfolgreich über die integrierte Browser-Schnittstelle ( `fetch()` gegen `api.crossref.org` ) abgefragt. Damit ließ sich die systematische ISSN-Abfrage der Kernjournale (u. a. QSR, EPSL, GPC, P<sup>3</sup>, Quaternary Research, JQS, Quaternary International, Quaternary Geochronology, Paleoceanography and Paleoclimatology, The Holocene, Communications Earth & Environment, Nature Geoscience, Nature Communications) mit `from-created-date`-Filter und `created`-Sortierung durchführen, ergänzt um Themen-Queries (paleoclimate, Quaternary lake sediment, East African Rift/Turkana, Chew Bahir, African Humid Period, paleoflood fluvial, Bayesian age-depth chronology, early-warning tipping point, lake water balance, ICDP drilling). Climate of the Past wurde zusätzlich über Container-Title- und Prefix-Abfragen erfasst. Für Nature-Portfolio- und Copernicus-Titel wurde das Crossref-Abstract herangezogen, sofern vorhanden.

**Was das für die Abdeckung bedeutet.** Die Abdeckung schließt Elsevier- und Wiley-Kernjournale wieder ein. Elsevier liefert weiterhin keine Abstracts über Crossref; die betreffenden Einträge sind mit  *Titel-basiert* markiert, ihre inhaltliche Aussage steht bis zur Einsicht des Originals unter Vorbehalt, und es wurden keine Ergebnisse über den Titel hinaus erfunden. Die angegebenen Daten sind Crossref- `created` -Daten (Registrierung), die vom Online-Publikationsdatum um wenige Tage abweichen können. Das genuin neue Material dieser Woche konzentriert sich schwerpunktmäßig auf den Zeitraum 21.–28.09.2026, ergänzt um zuvor noch nicht gelistete Arbeiten der Tage davor.

*GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.*