

GeoNews — KW 31/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftodynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 27. Juli 2026

Was ist GeoNews? Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Jeden Montag durchsucht ein Recherche-Workflow die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.

Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.

Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: ● ab 75 Must-read · ● 50–74 relevant · ● 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Acht relevante Arbeiten, vier auf dem Radar, dazu zehn Titel-Nachweise aus den Elsevier-Kernjournalen — ein Must-read ist diesmal nicht darunter. Der Crossref-Zugriff war im Montagslauf blockiert, ließ sich am selben Tag jedoch wiederherstellen; die Kernabdeckung wurde daraufhin vollständig nachgezogen (QSR, EPSL, GPC, P³, Nature Geoscience, Boreas, JQS, The Holocene, Quaternary Research, Geomorphology, Catena, Earth-Science Reviews). Bestehen bleibt eine strukturelle Lücke: Elsevier hinterlegt bei Crossref keine Abstracts, und ScienceDirect ist aus der Rechenumgebung nicht abrufbar — diese Treffer stehen deshalb in einem eigenen Block, mit Titel, Journal, Datum und DOI, aber ohne Inhaltsannotation und ohne Score.

Inhaltlich am nächsten am Kern liegt ein **EGUsphere-Preprint zur Abruptheit des Endes der Grünen Sahara** (Claussen et al.): eine quantitative, änderungspunktbasierte Analyse aus MPI-ESM-Transientsimulation plus Staub- und Pollenproxies, die den langjährigen Streit „Kollaps versus gradueller Rückgang“ auflöst — großräumig graduelle Wüstenausdehnung, auf Ökosystemebene aber abrupte, sprunghafte Übergänge. Das Preprint liegt außerhalb des 7–14-Tage-Fensters (gepostet 20.05.2026), ist aber aktuell im aktiven Review (Autor-Antworten 15.07.2026) und deshalb aufgenommen. Aus dem echten Fenster kommen eine **Nature-Familie-Arbeit zur mittel- bis spätholozänen Abkühlung und ihrem Einfluss auf den Ackerbau auf dem Tibetplateau** (Monte-Carlo-gestützte Temperaturrekonstruktion, Mensch-Umwelt-Kopplung) und eine **Climate-of-the-Past-Arbeit, die kosmogene Mehrfachnuklide mit proglazialen**

Seesedimenten koppelt, um die Holozängeschichte einer kleinen skandinavischen Eiskappe zu rekonstruieren — methodisch die interessanteste Kombination der Woche. Aus dem Crossref-Nachlauf kommen zwei weitere Arbeiten mit direktem Profilbezug: eine **quantitative Multiproxy-Rekonstruktion der letzten Deglaziation aus dem koreanischen Paläensee Gonggeomji**, die Vegetation, Feuer und Hydroklima in einem Record koppelt, und eine **CEE-Arbeit, die neuronale Netze auf einen physikalisch definierten Zirkulationsindex des westafrikanischen Monsuns ansetzt** und Modelle nach Prozessorstreue gewichtet statt nach Trefferquote.

Förderseitig unverändert im Fokus: der dedizierte Horizon-Paläoklima-Call **HORIZON-CL5-2027-01-D1-08** (Öffnung 17.11.2026, Deadline 04.03.2027), der **ERC Starting Grant 2027** (15.10.2026) und die **PAGES-Anträge** (11.09.2026). Kurzfristig: **AGU-Abstract-Deadline 05.08.2026**. Forschungspolitisch konkretisiert sich der Bundeshaushalt: Das Kabinett hat den Entwurf 2027 bereits **am 06.07.2026** beschlossen — der BMFTR-Kernhaushalt wächst nominal nur um rund 0,7 Prozent, reale Zuwächse gibt es fast ausschließlich im Sondervermögen.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit  created - bzw. Online-Datum ab dem 13.07.2026, ergänzt um ein aktuell im Review befindliches Preprint außerhalb dieses Fensters (klar gekennzeichnet). Bereits in KW 30 gelistete DOIs sind ausgeschlossen. Die bewerteten Einträge in den Kategorien  und  stützen sich sämtlich auf Abstract oder Kurzzusammenfassung; der abschließende Block  listet Arbeiten, für die kein Abstract zugänglich war — ohne Score und ohne Inhaltsaussage. Ein  Must-read ist diese Woche nicht darunter.

Relevant (50-74)

1. How abruptly did the Holocene Green Sahara end? · *EGUsphere (Preprint, im Review bei Climate of the Past)*, 2026 · **Score 74** —  *Preprint, außerhalb des Fensters (gepostet 20.05.2026)*, *aktuell im aktiven Review (Autor-Antworten 15.07.2026)* Quantitative Neubewertung der Termination der African Humid Period im Sahara-Raum. Die Autorinnen und Autoren charakterisieren die Abruptheit von Vegetationsänderungen in einer transienten Simulation des MPI-Erdsystemmodells und in Proxydaten (Staubfluss, Pollen) über die letzten 8000 Jahre mit einem Änderungspunkt-Ansatz. Kernbefund: In einem nordwest-südost orientierten Streifen zeigen sich sprunghafte, stufenartige Übergänge der Kahlflächen, die im Mittel rund viermal schneller ablaufen als der näherungsweise lineare Trend des Orbitalforings; der rekonstruierte Staubfluss ist noch abrupter, die Pollenrecords überwiegend gradueller. Die Arbeit stützt damit die These, dass es keinen „Kollaps“ der Grünen Sahara gab und dass graduelle und abrupte Signale in verschiedenen Archiven kein Widerspruch sind. Doppelt anschlussfähig: African Humid Period einerseits, methodisch die Quantifizierung von Abruptheit in Zeitreihen andererseits — genau die Frage, die auch für die AHP-Termination mit Frühwarnsignalen bearbeitet wird. *Themen 40 · Methode 20 · Venue 4 · Anschluss 8 · Aktualität 2 (gepostet 20.05.2026)* · DOI: [10.5194/egusphere-2026-2587](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-2587)

2. Mid-late Holocene cooling shaped agricultural transformation on the Tibetan Plateau · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 72** Rekonstruktion der mittel- bis spätholozänen Temperaturvariabilität aus neuen und publizierten Proxydaten, mit Monte-Carlo-Simulationen zur Unsicherheitsbehandlung. Ergebnis: Die Abkühlung treibt einen Wechsel von wärmeliebendem Hirseanbau zu einem kältetoleranten Weizen-Gerste-System; die *Rate* der

Temperaturänderung — nicht nur ihr Betrag — steuert die agrarische Stabilität, wobei Phasen erhöhter Variabilität mit Ertragsrückgängen zusammenfallen. Anschlussfähig als sauber quantifiziertes Beispiel für Mensch-Umwelt-Kopplung im Holozän und damit konzeptionell übertragbar auf die Frage nach Umweltschwellen in der Besiedlungsgeschichte, wie sie auch für ostafrikanische Kontexte gestellt wird. *Themen 25 · Methode 18 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 27.07.2026) · DOI: [10.1038/s43247-026-03838-9](https://doi.org/10.1038/s43247-026-03838-9)

3. Riukojetna, a small low-altitude ice cap that may have persisted through the Holocene: evidence from combining cosmogenic multi-nuclide dating and lacustrine sediment records · *Climate of the Past*, 2026 · **Score 68** Rekonstruktion der Holozängeschichte einer flachen, niedrig gelegenen Plateau-Eiskappe in Nordschweden. Kombiniert werden kosmogene Mehrfachnuklide (in-situ ^{14}C , ^{10}Be , ^{26}Al) im Festgestein — die Expositions- und Verschüttungsphasen einschränken — mit indirekten Belegen glazialer Aktivität aus proglazialen Seesedimenten und einem anschließenden Vorwärtsmodell. Befund: Die Eiskappe überdauerte das Holozäne Thermische Maximum (ca. 8–5 ka), entgegen früheren Annahmen eines vollständigen Abschmelzens skandinavischer Gletscher, vermutlich infolge erhöhter Niederschläge. Methodisch die interessanteste Arbeit der Woche: Die Kopplung kurz- und langlebiger kosmogener Nuklide mit Seesedimentchronologie ist als Architektur direkt auf andere hochbreitige und alpine Quartärarchive übertragbar. *Themen 25 · Methode 17 · Venue 11 · Anschluss 5 · Aktualität 10* (created 27.07.2026) · DOI: [10.5194/cp-22-1363-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1363-2026)

4. Last deglaciation hydroclimatic environment on the central inland of the Korean Peninsula based on pollen and microscopic charcoal records · *Quaternary Research*, 2026 · **Score 66** Multiproxy-Rekonstruktion aus dem Paläosee Gonggeomji in Zentral-Südkorea über die letzte Deglaciation (ca. 17–10 ka). Kombiniert werden pollenbasierte quantitative Schätzungen von Jahresmitteltemperatur und Niederschlag, Palynomorphen-Assemblagen, sedimentäre Holzkohle und Lithologie. Befund: Während Heinrich-Stadial 1 herrschen kalt-trockene Bedingungen — von den Autoren auf eine abgeschwächte atlantische Umwälzzirkulation und einen verstärkten ostasiatischen Wintermonsun zurückgeführt — mit borealen Nadelwäldern, reduzierter Vegetationsbedeckung sowie erhöhter Feuerfrequenz und Bodenerosion. Das Bølling-Allerød bringt rasche Erwärmung, höhere Feuchte und warm-temperierte Laubwälder, die Jüngere Dryas eine kurze Umkehr mit erneuter Feueraktivität bei moderat bleibender Feuchte; die Wiederbewaldung nach Feuer folgt einer klassischen Sukzession. Anschlussfähig als Paläosee-Archiv mit quantitativer Klimarekonstruktion und explizit gekoppelter Vegetations-Feuer-Hydroklima-Dynamik — dieselbe Auswertungsarchitektur, die auch an Riftseen-Sedimenten gefahren wird, und ein sauberes Beispiel dafür, wie hoch- und niederbreitige Antriebe in einem einzelnen Record zusammenlaufen. *Themen 25 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 5 · Aktualität 10* (created 20.07.2026) · DOI: [10.1017/qua.2026.10099](https://doi.org/10.1017/qua.2026.10099)

5. Constraining high-emission future West African monsoon with physics-weighted deep learning ensembles · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 65** Physikgeführte neuronale Netze lernen den Zusammenhang zwischen den fünf Luftdruckfeldern des Sahelian Monsoon Ocean-Pressure Index (SMOPI) und dem Monsunniederschlag der Monate Juni bis September — einzeln trainiert auf elf CMIP6-Modellen und anschließend alle mit derselben JRA-55-Reanalyse angetrieben. Die so gemessene physikalische Treue der gelernten Telekonnektionen dient dann als Gewicht im Ensemble. Ergebnis: Die Modellspreizung am Jahrhundertende sinkt um 20 Prozent bei den Modellen mit hoher Güte, um 33 Prozent bei den übrigen und um 30 Prozent im Gesamtensemble, ohne die Ensemble-Diversität zu kollabieren. Bemerkenswert für die Methodik: Die Autoren zeigen ausdrücklich, dass eine hohe Korrelation des Index allein keine korrekte Physik belegt — ein Modell kann aus den falschen Gründen richtig

liegen. Für dieses Profil weniger wegen der Zukunftsprojektionen interessant als wegen der Architektur: nichtlineares Lernen auf einem physikalisch definierten Zirkulationsindex plus Gewichtung nach Prozessstreuung statt nach Trefferquote — die Frage, welche Modelle man für Paläo-Monsunphasen überhaupt gewichten sollte, ist dieselbe. *Themen 25 · Methode 13 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 21.07.2026)* · DOI: [10.1038/s43247-026-03839-8](https://doi.org/10.1038/s43247-026-03839-8)

6. Pleistocene benthic foraminifera bioevents in the Central Arctic Ocean:

stratigraphic and paleoceanographic implications · *Climate of the Past*, 2026 · **Score 62**

Biostratigraphische Gliederung des zentralarktischen Pleistozäns anhand benthischer Foraminiferen-Bioevents, mit paläozeanographischer Deutung. Relevant als quartäre Multiproxy-/Biostratigraphie-Referenz: Die Konstruktion belastbarer Ereignisstratigraphien in schwer datierbaren marinen Sequenzen ist methodisch verwandt mit der Frage, wie sich in terrestrischen Kernen ohne durchgehende absolute Datierung Ereignismarker verankern lassen. *Themen 25 · Methode 13 · Venue 11 · Anschluss 3 · Aktualität 10 (created 21.07.2026)* · DOI: [10.5194/cp-22-1305-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1305-2026)

7. Climatic, tectonic and landslide-dam signals preserved in alluvial terraces of the

Naryn Basin, Kyrgyzstan · *EGUsphere (Preprint, im Review bei Earth Surface Dynamics)*, 2026 ·

Score 60 —  *Preprint* Kartierung, Datierung und Modellierung fluvialer Terrassen am Naryn im zentralasiatischen Tian Shan. Die Arbeit trennt drei überlagerte Signale — klimatische Terrassenbildung, tektonische Hebung und die rasche Entleerung eines bergsturzgestauten Sees — und findet ein räumlich begrenztes Ausbruchsfluss-Signal gegenüber einem regional wirksamen klimatischen Terrassentreiber. Dieselbe methodische Kernfrage stellt sich in der Paläohochwasserforschung: Wie unterscheidet man klimatisch getriebene von nicht-klimatischen (hier: ausbruchsbedingten) Extremabflüssen in einem geomorphologischen Archiv — ein direkter Kontrastfall zu klimatisch getriebener Hochwassergenese. *Themen 25 · Methode 17 · Venue 4 · Anschluss 8 · Aktualität 6 (gepostet 14.07.2026)* · DOI: [10.5194/egusphere-2026-3489](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-3489)

8. A multiproxy reconstruction of changes in sea ice and primary productivity at IODP Site U1339 (Umnak Plateau, Bering Sea) during Marine Isotope Stage 11 · *Quaternary Research*, 2026 · **Score 59**

Multiproxy-Record aus Sedimentologie, Diatomeen und organischer Geochemie am IODP-Standort U1339 in der südöstlichen Beringsee, der Meereis und Primärproduktion vom Ende von MIS 12 bis zum Beginn von MIS 10 abdeckt (430–368 ka). Befund: Im späten MIS 12 herrscht ausgedehnte saisonale Meereisbedeckung mit Frühjahrskonzentrationen nahe 100 Prozent; während der Deglaziation wird der Standort ganzjährig eisfrei, im interglazialen Optimum stößt das Meereis jedoch erneut vor — anders als im Holozän, in dem am Umnak-Plateau kein Meereis auftritt. Die Produktivität bleibt über das Interglazial nicht hoch, sondern sinkt unabhängig von Meereis und Auftrieb, möglicherweise durch zunehmende Nährstofflimitierung. Relevant als Referenz für MIS 11 — jenes Interglazial, das regelmäßig als Holozän-Analogon herangezogen wird — und als Beleg dafür, dass Proxies innerhalb eines Interglazials auseinanderlaufen können, statt einem gemeinsamen Klimasignal zu folgen. *Themen 25 · Methode 13 · Venue 8 · Anschluss 3 · Aktualität 10 (created 17.07.2026)* · DOI: [10.1017/qua.2026.10094](https://doi.org/10.1017/qua.2026.10094)

● Radar

• Ice core nitrogen isotopes archive dramatic changes in West Antarctic Ice Sheet thinning · *Climate of the Past* · **45** ● · Neuer Stickstoffisotopen-Proxy im Eiskern zur

Rekonstruktion der Ausdünnung des Westantarktischen Eisschildes; methodisch interessant, thematisch am Rand des Profils. DOI: [10.5194/cp-22-1291-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1291-2026)

- **Sediment storage and routing in bedrock canyons** · *Earth Surface Dynamics* · **41** ● · Wiederholte Gerinnebettvermessungen quantifizieren Sedimentspeicherung in tiefen Felsschluchten (vertikale Änderungen bis 15 m); übertragbar auf die Interpretation von Sedimentliefer- und Speicherprozessen in fluvialen Systemen. DOI: [10.5194/esurf-14-553-2026](https://doi.org/10.5194/esurf-14-553-2026)
- **ImageGrains 2.0: Improved precision and generalization for grain segmentation** · *Earth Surface Dynamics* · **40** ● · Aktualisiertes Bildsegmentierungs-Framework zur automatischen Korngrößenbestimmung; als offenes Werkzeug für sedimentologische Bild- und Scan-Auswertung nutzbar. DOI: [10.5194/esurf-14-527-2026](https://doi.org/10.5194/esurf-14-527-2026)
- **The geomorphology of burrowing bioturbation in the Central French Pyrenees** · *EGUsphere (Preprint, im Review bei Earth Surface Dynamics)* · **35** ● · Grabende Säugetiere als geomorphologischer Faktor in Bergwiesen; Randthema, methodisch als Beispiel für Bioturbations-Effekte auf Oberflächenprozesse notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-2910](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-2910)

◦ Ohne Abstract gesichtet — Elsevier-Kernjournale

Diese zehn Arbeiten stammen aus den Elsevier-Journalen des Profils und liegen im Fenster. Crossref erfasst sie mit Titel, Journal, DOI und `created`-Datum, hinterlegt für Elsevier aber grundsätzlich keine Abstracts; ScienceDirect ist aus der Rechenumgebung nicht abrufbar, und die Artikel sind zu jung, um in Suchindizes aufzutauchen. Sie stehen deshalb **ohne Score und ohne inhaltliche Annotation** — der Zusatz nennt nur den Themenbezug, der aus dem Titel folgt. Was in den Arbeiten steht, entscheidet der Volltext.

Paläohochwasser und fluviale Extremereignisse

- **Post-glacial landforms dictate fluvial sediment dynamics during extreme floods: Morphological adjustments and flood hazard implications** · *Geomorphology*, created 21.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Sedimentdynamik und morphologische Anpassung bei Extremhochwässern in glazial vorgeprägten Talsystemen. DOI: [10.1016/j.geomorph.2026.110457](https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2026.110457)
- **Quantitative reconstruction of the damming and outburst processes of the Temi Palaeolandslide in the Upper Jinsha River, Southeastern Tibetan Plateau, China** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created 16.07.2026 · Themenbezug laut Titel: quantitative Rekonstruktion von Dammbildung und Ausbruch — Kontrastfall zu klimatisch getriebenen Extremabflüssen, thematisch parallel zur Naryn-Arbeit oben. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114068](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114068)

Seesedimente und Paläohydrologie

- **Millennial-scale carbon-source changes revealed by sedimentary radiocarbon in Arctic lakes** · *Quaternary Science Reviews*, created 21.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Kohlenstoffquellen in Seesedimenten über Radiokohlenstoff — berührt Reservoir- und Alterseffekte, wie sie in Seechronologien auftreten. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110121](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110121)
- **Evidence of a Weichselian MIS 3 proglacial lake south of Dogger Bank (southern North Sea)** · *Quaternary Science Reviews*, created 26.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Nachweis eines proglazialen Sees im MIS 3. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110190](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110190)
- **Millennial cold-dry events during marine isotope stage 11a based on sedimentary records from the Heqing Basin and their global climatic dynamical responses** · *Global and Planetary Change*, created 23.07.2026 · Themenbezug laut Titel: millennische Kalt-Trocken-Ereignisse in einem Seebecken-Record, MIS 11a. DOI: [10.1016/j.gloplacha.2026.105634](https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2026.105634)

- **Mid- to late holocene palaeoenvironmental and palaeoecological dynamics in Lake Azaplı (Gölbaşı Basin, SE Türkiye): Insights from pollen and non-pollen palynomorph records** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created 22.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Pollen und Nicht-Pollen-Palynomorphe aus einem Seearchiv, mittleres bis spätes Holozän. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114085](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114085)

Proxies, Chronologie und Sedimentbudget

- **Assessing GDGT-derived (sub)surface temperature proxies in Arctic fjord sediments: A 14 kyr record from the Kongsfjorden Trough, Svalbard** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created 23.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Prüfung organisch-geochemischer Temperaturproxies an einem 14-ka-Record. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114070](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114070)
- **Cave-based chronology of valley incision in the glaciated Northern Carpathians** · *Earth and Planetary Science Letters*, created 23.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Datierung von Taleintiefung über Höhlenniveaus. DOI: [10.1016/j.epsl.2026.120229](https://doi.org/10.1016/j.epsl.2026.120229)
- **Disentangling diffuse vs. concentrated erosion in total soil exports over the Holocene: combining erosion models, sediment proxies, remote sensing and geophysics** · *Catena*, created 25.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Aufteilung des Holozän-Sedimentbudgets auf Erosionsprozesse, Modelle und Proxies kombiniert. DOI: [10.1016/j.catena.2026.110450](https://doi.org/10.1016/j.catena.2026.110450)
- **Rivers in motion: a wavelet-based remote sensing approach to spatio-temporal hydro-geomorphic analysis** · *Catena*, created 22.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Wavelet-Analyse als Zeit-Raum-Methodik auf fluvialen Fernerkundungsdaten. DOI: [10.1016/j.catena.2026.110451](https://doi.org/10.1016/j.catena.2026.110451)

Teil B — Fördertöpfe & Calls

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics“ (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, Budget rund **14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte**, also circa 7 Millionen je Konsortium. Ziel laut Ausschreibungstext: belastbare Information zu Paläoklimazuständen und -ereignissen außerhalb der Variabilität der letzten Jahrhunderte, als Grundlage für die Weiterentwicklung von Erdsystemmodellen. Bei zwei geförderten Projekten europaweit ist die Konkurrenz hart, Konsortialgespräche gehören entsprechend früh angesetzt. Quellen: [Topic-Seite](#) · [CL5 Work Programme 2026–2027 \(PDF\)](#).

ERC Starting Grant 2027 — Deadline 15.10.2026. Step-1-Ergebnisse im April 2027, Interviews und Step-2-Ergebnisse im August 2027. Eligibility: PhD-Verteidigung höchstens zehn Jahre vor dem 01.01.2027, verlängerbar bei Eltern- und Pflegezeiten. Neu ab den 2027-Calls: höchstens ein Starting und ein Consolidator Grant pro Karriere sowie verschärfte Antragsregeln. Der **ERC Consolidator 2027** wird für Januar 2027 erwartet. Quellen: [ERC — Applying in the 2027 competitions](#) · [ERC — Changes to the 2026 and 2027 Work Programmes](#).

PAGES — Working-Group- und Workshop-Förderung, Deadline 11.09.2026. Nächste Antragsrunde für Workshops, Meetings, neue Arbeitsgruppen und Verlängerungen bestehender Gruppen. Im Vorfeld des Horizon-Paläoklima-Calls ein günstiges Instrument, um ein Konsortium sichtbar zu formieren. Zusätzlich: **PAGES Early-Career Award 2027**, Bewerbungsschluss **29.09.2026**. Quellen: [PAGES — Workshop/meeting support](#) · [PAGES Newsletter Juli 2026](#).

ICDP — Proposal-Zyklus. Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; der Zyklus für 2027 dürfte demselben Muster folgen, eine formale Ankündigung liegt noch nicht vor. Workshop-Calls laufen unterjährig. Quelle: [ICDP — Proposals](#).

DFG — veränderte Rahmenbedingungen. Kein neuer paläoklimaspezifischer Call. Wichtig für die Planung: Die **Programmpauschale steigt ab 2027 von 22 auf 25 Prozent**; die nächste **Schwerpunktprogramm-Antragsrunde** findet erst **Ende 2026** statt, mit Förderbeginn ab **2028**. Quelle: [Forschung & Lehre](#).

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

Bundeshaushalt 2027 — Kabinettsbeschluss bereits am 06.07.2026. Anders als in der Vorwoche noch erwartet, hat das Kabinett den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2027 schon am 6. Juli 2026 beschlossen. Der Kernhaushalt des BMFTR liegt bei rund **22 Milliarden Euro** — ein nominales Plus von nur etwa **0,7 Prozent** gegenüber 2026. Aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen rund 764 Millionen Euro (plus circa 45 Millionen), und die im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität vorgesehenen FuE-Investitionen steigen 2027 gegenüber 2026 um rund 60 Prozent. Als Einordnung, nicht als Faktenlage: Der reguläre Haushalt stagniert damit bei den aktuellen Tarif- und Sachkostensteigerungen real, während die Zuwächse fast ausschließlich in das befristete Sondervermögen wandern — was die operative Lage der Förderorganisationen zusätzlich unter Druck setzt. Quellen: [Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt](#) · [Table.Briefings — Haushalt 2027](#) · [Bundesfinanzministerium — Regierungsentwurf 2027](#).

DFG kürzt auf der PostDoc-Ebene. Wegen hoher Tarifsteigerungen sowie gestiegener Geräte- und Verbrauchskosten, die die zugesagten jährlichen Mittelaufwüchse nicht decken, hat die DFG bei den Graduiertenkollegs den Förderbeginn von Einrichtungsanträgen verschoben und die **Bewilligung von PostDoc-Stellen ausgesetzt**. Für PostDoc-Karrierewege in den Geowissenschaften fällt damit ein Finanzierungspfad vorerst aus, was den Druck auf Sachbeihilfe- und EU-Mittel erhöht. Quelle: [Fakultätentag Informatik](#).

WissZeitVG — Referentenentwurf des BMFTR liegt vor. Kern des Entwurfs sind **Mindestvertragslaufzeiten von drei Jahren für Erstverträge Promovierender und zwei Jahren für PostDocs** in der jeweiligen Qualifizierungsphase. Die Höchstbefristungsdauer bleibt bei sechs Jahren je Phase; die „vier plus zwei“-Regelung aus dem gescheiterten Ampel-Entwurf ist vom Tisch. Für die PostDoc-Phase ungünstig: Die bisherige Bonusregelung entfällt, nach der nicht genutzte Befristungszeit aus der Promotionsphase übertragen werden konnte. Praktische Konsequenz: Wer Restzeit aus der Promotionsphase mitführt, sollte prüfen, wie sich der Entwurf auf das persönliche Befristungskonto auswirkt. Quellen: [Wiarda-Blog](#) · [Forschung & Lehre](#).

Teil D — Community & Termine

- **AGU Fall Meeting 2026 — 7.-11.12.2026 in San Francisco**; Abstract-Deadline **05.08.2026** (23:59 EDT). Quelle: [AGU](#).
- **PAGES Working-Group- und Workshop-Anträge — 11.09.2026** · **PAGES Early-Career Award 2027 — 29.09.2026**.

- **DEUQUA-Tagung 2026 — 28.09. bis 02.10.2026 in Freiburg im Breisgau**, mit Ganztagesexkursionen am 28.09. und 02.10. Die ursprünglich für 2026 geplante Göttinger Tagung ist auf 2028 verschoben. Quelle: [DEUQUA](#).
- **ERC Starting Grant 2027 — Deadline 15.10.2026**.
- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call — Öffnung 17.11.2026, Deadline 04.03.2027**.
- **EGU General Assembly 2027 — 04. bis 09.04.2027 in Wien**, hybrid. Abstract-Deadline noch nicht veröffentlicht; erfahrungsgemäß Mitte Januar. Quelle: [EGU](#).
- **ICDP — nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich 15.01.2027**, nach dem Muster der Vorjahre und noch nicht bestätigt.

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung nutzt normalerweise die Crossref REST API mit themen- und ISSN-basierten Abfragen und dem Filter `from-created-date`. Bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs werden nicht erneut aufgeführt. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe. Der Montagsslauf lief zunächst ohne Crossref: Der API-Zugriff aus der Rechenumgebung war blockiert (Proxy-403) und der vorgesehene Browser-Fallback nicht verfügbar. Die erste Fassung stützte sich deshalb allein auf die Vorschaulisten der Open-Access-Journale (*Climate of the Past*, *Earth Surface Dynamics*, *Geochronology*, *EGUsphere*) und die Artikelliste von *Communications Earth & Environment*. Am selben Tag war Crossref wieder erreichbar; die Kernabdeckung wurde daraufhin journalweise per ISSN nachgezogen — *Quaternary Science Reviews*, *Earth and Planetary Science Letters*, *Global and Planetary Change*, *Palaeogeography*, *Palaeoclimatology*, *Palaeoecology*, *Nature Geoscience*, *Communications Earth & Environment*, *Boreas*, *Journal of Quaternary Science*, *Quaternary Geochronology*, *The Holocene*, *Quaternary Research*, *Geomorphology*, *Catena*, *Earth-Science Reviews*, *Journal of Human Evolution* — und die Ausgabe um die Treffer aus diesem Nachlauf ergänzt. Der Deckungsgrad entspricht damit wieder dem normalen Wochenlauf.

Was offen bleibt. Elsevier hinterlegt bei Crossref keine Abstracts. Der übliche Ausweg über die Verlagsseite entfiel: ScienceDirect antwortet aus dieser Umgebung mit einer Bot-Prüfung, und die Arbeiten sind wenige Tage alt und damit noch nicht in Suchindizes. Statt aus Titeln Ergebnisse abzuleiten, stehen diese zehn Arbeiten in einem eigenen, entsprechend gekennzeichneten Block ohne Score und ohne Inhaltsaussage. Für die bewerteten Einträge gilt unverändert: Jede inhaltliche Aussage stützt sich auf ein eingesehenes Abstract. Ergänzend wurde die EGU-sphere-Preprint-Ebene einbezogen und jedes Preprint als solches gekennzeichnet. Nicht erneut aufgeführt sind DOIs, die bereits in KW 30 gelistet waren — das betrifft in diesem Fenster unter anderem die Mojave-Paläohydrologie-Arbeit, die Dadu-Ausbruchsfluten und die Nature-Geoscience-Arbeit zur Kernbildgebung.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.