

BỆNH ÁN NGOẠI KHOA

C.S.: H.C.M.: H.C.: 4,66 T/l; H.b. 181 G/l
B.C.: 16,4 G/l

- HSM: Glucose: 11 mmol/L
 AST: 114 U/L; ALT: 35 U/L; LDH-L: 5.2 mmol/L
 Cholesterol: 14,2 mmol/L; TG: 32,4 mmol/L; Amylase: 422/4 U/L
 K⁺: 4,74 mmol/L; Na⁺: 131,3 mmol/L
 - Chụp CT bụng - tiền bụng. Hg quy (1.32 cấp)
 Hết ảnh tổn thương viêm tụy cấp thể phủ
 (A. diễn theo Balthazar). Viêm ruột non. Răng ngang
 vùng bụng (T).

⇒ Δ thủng thủng; VTL do tăng triglycerid / DHP typ II u.a. BQ
 Phương pháp vô cảm: gây tê tại chỗ
 Kỹ thuật thủng: thay huyết tương
 Sau khi đã test máy
 Hết ảnh tổn BN với máy
 Dùng chất để đo máu và dịch
 Heparin bolus: 500 IU/L
 Heparin duy trì: 1000 IU/L
 Kết thúc thủ
 Cho HA trước & sau khi bắt đầu lọc 30p
 Khi đủ gian lọc tiến hành ngưng lọc
 Giám sát tốc độ máu
 Dùng máu về BN
 Bảo vệ catheter bằng 12000 heparin
 Cho vi khuẩn về máu HA
 Δ sau thủ thuật: Viêm tụy cấp
 + tiếp tục theo dõi theo dõi diễn tiến giải
 Giám sát acid độ chấy (P.P.X)
 Hạ đường máu (Insulin)
 - Lọc PRX lần 2.

.....Hiện tại sau 3 ngày điều trị, BN còn đau bụng
quanh rốn, bên ổ chức bụng, không buồn nôn, không
đi tiểu tiện bình thường

4. Tiền sử

.....ĐTD: Typ D
Viêm gan B
Không có dị

II. KHÁM BỆNH

1. Toàn thân

.....BN tỉnh, tiếp xúc tốt
Da niêm mạc hồng tốt, không có nốt
không phù, không vàng da
Đ: Hạch ngoại vi không sờ thấy
M: 80 kg
HA: 120/80 mmHg
Th: 36,7 °C
Th: 18 l/p

2. Bộ phận

..... Tuần hoàn: Máu đến cấp CNS V... đường... giữa... đầu (T)...
..... Tổng... tìm... đầu... T1, T2... số...
..... Chưa phát... hiện... tổng... tìm... bình... lý!

..... Hô hấp: Lồng ngực 2 bên cân đối, di động theo nhịp thở
..... 2 phổi... RPN... số... Phổi... không... sụn...

..... Tuần hoá: Bụng... chứng... nhẹ
..... Ấn... đau... quanh... sườn... Gan... lá... không... s... thay...
..... Gõ... vùng... quanh... sườn...

..... Thân kết niệu: Hô... thở... 2... bên... không... đầy...
..... Chạm... thân... (-), bập... bủ... thân... (-)

..... ~~Cơ... vận... động~~... Các... cơ... quan... khác: Chưa phát... hiện... bệnh... lý!

2. Chẩn đoán xác định

..... Sau thủ thuật thay huyết khối 3 ngày, ... hiện tại bệnh
..... não ổn định

3. Chẩn đoán phân biệt:

V. Hướng điều trị tiếp theo:

- - Bù dịch, điện giải
- - Theo dõi ~~Angiotensin~~ men gan, men gan, chức năng
- - Giám sát acid dạ dày
- - Ổn định đường máu
- - lọc PBX lần 2