

CHÂN THƯỜNG SƠ NÃO (TBI) NGUY CƠ THẤP

- Chân thường sơ não (TBI) nguy cơ thấp hay chân thường sơ não nhẹ gấp 3-5 lần so với chân thường nặng. Ở tiếp xúc vỡ hoặc tái động tăng / giảm tốc.
- BN có điểm GCS từ 13-15 khoảng 30 phút sau tai nạn. Thuốc chân thường sơ não nguy cơ thấp; GCS từ 9-12 là nguy cơ trung bình.
- Chân động não là một tổn thương não - màng tủy tinh sinh lý bệnh phuộc tập يؤدي tăng vào não, dẫn đến tổn thương sinh học ở chân thường.

④ Chân động não:

- Triệu chứng lâm sàng:
 - +) Lẩn lẩn và quên, đôi khi kèm theo mất tư giác. Xuất hiện ngay hoặc sau vài phút. Mất tư nhớ và lú lẫn xảy ra thường song song cả về hiện tượng và sau chân thường.
 - +) Triệu chứng sớm: Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn. Thay đổi về tâm trạng, tinh thần, nhạy cảm với ánh sáng - tiếng động và lú lẫn giấc ngủ.
 - +) Cơ giật

⑤ Sang chấn sơ là ảnh hưởng đến hộp sọ.

