

# به نام خدا

خطه درس: 3698925 و 3698926




دکتر سمیه ایزدی

ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان درس: مبانی آنالیز عددی

جلسه چهارم



عنوان جلسه چهارم

درونیابی

بخش دوم

مشتق گیری و انتگرال گیری عددی

## مشتق‌گیری و انتگرال‌گیری عددی

### مقدمه

در ابتدای این فصل روشهای پیدا کردن تقریبهایی برای  $f'(x)$  به ازای مقادیر مختلف  $x$  را ارائه کنیم. سپس به تعیین تقریب برای

$$\int_a^b f(x) dx$$

می‌پردازیم. همان‌گونه که می‌دانید توابع فراوانی موجودند که تابع اولیه ندارند، یعنی تابعی چون  $F(x)$  نیست که به ازای  $a \leq x \leq b$

$$F'(x) = f(x).$$

از این رو، محاسبه این انتگرالها با روش عادی امکان‌پذیر نیست. از این جمله‌اند انتگرالهای زیر که اغلب کاربردهای عملی دارند.

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

$$\int_{-2}^2 e^{-x^2} dx$$

## مشتقگیری عددی

برای مشتقگیری عددی، همان طور که قبلاً اشاره شد، از چند جمله ای درونیاب استفاده می کنیم.

چند جمله ای درونیاب  $f$  در  $x_i$ ،  $x_{i+1}$ ، ...،  $x_{i+k}$  را چنین به دست آوردیم:

$$p(x) = f_i + \theta \Delta f_i + \frac{\theta(\theta-1)}{2!} \Delta^2 f_i + \frac{\theta(\theta-1)(\theta-2)}{3!} \Delta^3 f_i + \frac{\theta(\theta-1)(\theta-2)(\theta-3)}{4!} \Delta^4 f_i + \dots + \frac{\theta(\theta-1)\dots(\theta-k+1)}{k!} \Delta^k f_i \quad (1.5)$$

که در آن،  $x = x_i + \theta h$  و  $x_{i+1} - x_i = h$  برای  $i = 0, 1, \dots, n-1$  چون  $P(x)$  بر حسب  $\theta$  ارائه شده است

می نویسیم

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} \simeq \frac{dP(x)}{dx} = \frac{dP(x)}{d\theta} \times \frac{d\theta}{dx} \quad (2.5)$$

اما داریم،  $dx = h d\theta$  که در نتیجه

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{1}{h} \quad (3.5)$$

بنابراین، با مشتقگیری از (1.5) و در نظر گرفتن (2.5) و (3.5)

$$f'(x) \simeq \frac{1}{h} \left[ \Delta f_i + \left(\theta - \frac{1}{2}\right) \Delta^2 f_i + \left(\frac{\theta^2}{2} - \theta + \frac{1}{3}\right) \Delta^3 f_i + \left(\frac{\theta^3}{6} - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\Delta\theta}{12} - \frac{1}{4}\right) \Delta^4 f_i + \dots \right] \quad (4.5)$$

اگر قرار دهیم  $\theta = 0$ ، با توجه به  $x = x_i + \theta h$ ، داریم  $x = x_i$  و از (4.5) نتیجه می شود

$$f'(x_i) = f'_i \simeq \frac{1}{h} \left[ \Delta f_i - \frac{1}{2} \Delta^2 f_i + \frac{1}{3} \Delta^3 f_i - \frac{1}{4} \Delta^4 f_i + \dots \right]$$

معمولاً برای محاسبه تقریبی از  $f'_i$  یک یا چند جمله‌ای از سمت راست انتخاب می‌شود. مثلاً،

$$f'_i \simeq \frac{1}{h} \Delta f_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{h} \quad (5.5)$$

و یا

$$f'_i \simeq \frac{1}{h} \left[ \Delta f_i - \frac{1}{2} \Delta^2 f_i \right] = \frac{1}{h} \left[ f_{i+1} - f_i - \frac{1}{2} (f_{i+2} - 2f_{i+1} + f_i) \right],$$

که در نتیجه

$$f'_i \simeq \frac{2f_{i+1} - \frac{1}{2}f_{i+2} - \frac{3}{2}f_i}{h} \quad (6.5)$$

ضمناً، اگر قرار دهیم  $\theta = \frac{1}{\gamma}$ ، با توجه به  $x = x_i + \theta h$  به دست می‌آوریم  $x = x_i + \frac{1}{\gamma} h$  و از (4.5) نتیجه می‌شود:

$$f' \left( x_i + \frac{h}{\gamma} \right) \simeq \frac{1}{h} \left( \Delta f_i - \frac{1}{24} \Delta^2 f_i + \frac{1}{720} \Delta^4 f_i + \dots \right)$$

از این رو، اگر تنها جمله اول داخل پرانتز سمت راست را انتخاب کنیم:

$$f' \left( x_i + \frac{h}{\gamma} \right) \simeq \frac{\Delta f_i}{h} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h} \quad (7.5)$$

و اگر دو جمله اول را منظور کنیم

$$f' \left( x_i + \frac{h}{\gamma} \right) \simeq \frac{1}{h} \left( \Delta f_i - \frac{1}{24} \Delta^2 f_i \right) \quad (8.5)$$



### مثال

با توجه به جدول زیر تقریبی از  $f'_i$ ،  $i=0,1,2,3$  را یک بار با استفاده از فرمول (۵.۵) و بار دیگر با استفاده از (۶.۵) حساب کنید.

$x_i$	۰/۱	۰/۱۵	۰/۲	۰/۲۵	۰/۳
$f_i$	۱/۱۰۵۱۷	۱/۱۶۱۸۳	۱/۲۲۱۴۰	۱/۲۸۴۰۳	۱/۳۴۹۸۶

از این رو، با توجه به فرمولهای (۵.۵) و (۶.۵) داریم ( $h = ۰/۰۵$ ):

$f_i$	$f'_i \approx \frac{\Delta f_i}{h}$	$f'_i \approx \frac{\Delta f_i - \frac{1}{2} \Delta^2 f_i}{h}$
۱/۱۰۵۱۷	۱/۱۳۳۲	۱/۱۰۴
۱/۱۶۱۸۳	۱/۱۹۱۴	۱/۱۶۰۸
۱/۲۲۱۴۰	۱/۲۵۲۶	۱/۲۲۰۶
۱/۲۸۴۰۳	۱/۳۱۶۶	—

اعداد  $f_i$  که در این مثال داده شده اند مربوط به تابع  $f(x)=e^x$  هستند که مشتق آن با خودش برابر است. بنابراین، در جدول اخیر، باید اعداد موجود در هر سه ستون یکسان باشند! که نیستند. البته مشاهده می شود اعدادی که از فرمول (۶.۵) به دست آمده اند، دقیقتر از اعدادی هستند که از (۵.۵) به دست می آیند.

حل: جدول تفاضلات  $f$  را با توجه به جدول بالا تشکیل دهیم.

$x_i$	$f_i$	$\Delta f_i$	$\Delta^2 f_i$	$\Delta^3 f_i$
۰/۱	۱/۱۰۵۱۷	۰/۰۵۶۶۶		
۰/۱۵	۱/۱۶۱۸۳	۰/۰۵۹۵۷	۰/۰۰۲۹۱	۰/۰۰۰۱۵
۰/۲	۱/۲۲۱۴۰	۰/۰۶۲۶۳	۰/۰۰۳۰۶	۰/۰۰۰۱۴
۰/۲۵	۱/۲۸۴۰۳	۰/۰۶۵۸۳	۰/۰۰۳۲۰	
۰/۳	۱/۳۴۹۸۶			

### مثال

با توجه به تابع جدولی مثال (۱-۱-۵) تقریبهایی از  $f'(x_i + \frac{h}{4})$ ، با به کار بردن (۷.۵) و (۸.۵) حساب کنید.

حل: با توجه به جدول تفاضلاتی که در مثال (۱-۱-۵) به دست آوردیم، داریم:

$x_i + \frac{h}{4}$	$f\left(x_i + \frac{h}{4}\right)$	$f'\left(x_i + \frac{h}{4}\right) \simeq \frac{\Delta f_i}{h}$	$f'\left(x_i + \frac{h}{4}\right) \simeq \frac{\Delta f_i - \frac{1}{24}\Delta^2 f_i}{h}$
۰/۱۲۵	۱/۱۳۳۱۵	۱/۱۳۳۲	۱/۳۳۸۰
۰/۱۷۵	۱/۱۹۱۲۵	۱/۱۹۱۴	۱/۱۹۱۲۸
۰/۲۲۵	۱/۲۵۲۳۲	۱/۲۵۲۶	—
۰/۲۷۵	۱/۳۱۶۵۳	۱/۳۱۶۶	—

در جدول بالا دو ستون از سمت چپ فقط برای مقایسه مقادیر به دست آمده، درج شده‌اند. ضمناً، در ستون آخر به دلیل عدم وجود  $\Delta^2 f_2$  و  $\Delta^2 f_3$  بقیه فقره‌ها حساب نشده‌اند. نتایج این جدول، با توجه به این‌که  $f(x) = f'(x)$  نشان می‌دهند که  $\frac{\Delta f_i}{h}$  بسیار نزدیک به  $f'\left(x_i + \frac{h}{4}\right)$  هستند. به عبارت دیگر،  $\frac{\Delta f_i}{h}$  که هم تقریبی از  $f'(x_i)$  و هم تقریبی از  $f'\left(x_i + \frac{h}{4}\right)$  است به  $f'\left(x_i + \frac{h}{4}\right)$  نزدیکتر است تا به  $f'(x_i)$ .

برای پیدا کردن خطای فرمولهای مختلفی که از (۴.۵) برای  $f'(x)$  حاصل می شود از بسط تیلر استفاده می کنیم. مثلاً،

$$f_{i+1} = f(x_{i+1}) = f(x_i + h)$$

در نتیجه،

$$f_{i+1} = f_i + hf'_i + \frac{h^2}{2} f''_i + \frac{h^3}{6} f'''_i + \dots \quad (9.5)$$

با توجه به (۵.۵) و با در نظر گرفتن (۹.۵)، داریم

$$\frac{f_{i+1} - f_i}{h} = f'_i + \frac{h}{2} f''_i + \dots \quad (10.5)$$

از این رو،  $\frac{f_{i+1} - f_i}{h}$ ، به عنوان تقریبی از  $f'_i$ ، عبارت است از

$$\frac{f_{i+1} - f_i}{h} - f'_i = \frac{h}{2} f''_i + \frac{h^2}{6} f'''_i + \dots$$

با توجه به این که  $h$  کوچک گرفته می شود جمله غالب در سمت راست  $\frac{h}{2} f''_i$  است که اصطلاحاً گفته می شود خطا متناسب با  $h$  است و یا نوشته می شود:

$$\frac{f_{i+1} - f_i}{h} - f'_i = O(h) \quad (11.5)$$

## تعریف (اوی بزرگ) O

اگر  $f(h)$  ,  $g(h)$  دو تابع از  $h$  باشند، همواره  $g(h) \neq 0$  و داشته باشیم

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \frac{f(h)}{g(h)} = C \neq 0.$$

در این صورت می‌گوییم  $f(h) = O(g(h))$ .

در حالت خاصی که  $g(h) = h^p$ ، که در آن  $p$  عدد حقیقی مثبتی است، داریم

$$f(h) = O(h^p)$$

هرچه  $p$  بزرگتر باشد  $f(h)$  سریعتر به صفر میل می‌کند.

## تعریف (اوی کوچک) o

اگر  $f(h), g(h)$  دو تابع از  $h$  باشند، همواره  $g(h) \neq 0$  و داشته باشیم

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \frac{f(h)}{g(h)} = 0.$$

در این صورت می‌گوییم  $f(h) = o(g(h))$  و اگر  $g(h) = h^p$  آن‌گاه

$$f(h) = o(h^p)$$

به عبارت دیگر،  $f(h)$  سریعتر از  $h^p$  به صفر میل می‌کند.



$$f'(x_i + \frac{h}{2}) - \frac{f_{i+1} - f_i}{h} = O(h^2) \quad (12.5)$$

### مشتقات مراتب بالا

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان مشتق مرتبه دوم، سوم و... را نیز برآورد کرد. با توجه به مطالبی که در مورد خطای مشتقگیری عددی گفته شد تنها  $f''(x)$  را بررسی می‌کنیم. می‌دانیم که

$$f''(x) = \frac{df'(x)}{dx} \simeq \frac{dp'(x)}{d\theta} \times \frac{d\theta}{dx}$$

با استفاده از (3.5) و (4.5) داریم:

$$f''(x) \simeq \frac{1}{h^2} \left[ \Delta^2 f_i + (\theta - 1) \Delta^2 f_{i+1} + \left[ \frac{\theta^2}{2} - \theta + \frac{5}{12} \right] \Delta^4 f_i + \dots \right] \quad (14.5)$$

در اینجا هم می‌توان یک یا چند جمله از عبارت سمت راست را به عنوان تقریبی از  $f''(x)$  اختیار کرد. مثلاً، اگر  $\theta = 0$  آن گاه  $x = x_i$  و

$$f''_i = f''(x_i) \simeq \frac{1}{h^2} \left( \Delta^2 f_i - \Delta^2 f_{i+1} + \frac{5}{12} \Delta^4 f_i + \dots \right)$$

که از آن تقریبهای زیر حاصل می‌شود:

$$f''_i \simeq \frac{\Delta^2 f_i}{h^2} \quad (15.5)$$

و یا

$$f'_i \simeq \frac{\Delta^2 f_i - \Delta^2 f_{i+1}}{h^2} \quad (16.5)$$

همچنین، اگر  $\theta = 1$  داریم  $x = x_i + h$  یعنی  $x = x_{i+1}$  و در نتیجه

$$f''_{i+1} \simeq \frac{1}{h^2} \left( \Delta^2 f_i - \frac{1}{12} \Delta^4 f_i + \dots \right) \quad (17.5)$$

$$f''_{i+1} \simeq \frac{\Delta^2 f_i}{h^2} \quad (18.5)$$

$$f''_{i+1} \simeq \frac{\Delta^2 f_i - \frac{1}{12} \Delta^4 f_i}{h^2}$$

مثال

با استفاده از جدول تفاضلات مثال (۱-۱۵) و فرمولهای (۱۵.۵) و (۱۶.۵) تقریبهایی از  $f''_i$  حساب کنید.

حل: با توجه به فرمولهای مذکور داریم:

$x_i$	$f_i$	$f''_i$ از (۱۵.۵)	$f''_i$ از (۱۶.۵)
۰/۱	۱/۱۰۵۱۷	۱/۱۶۴	۱/۱۰۴
۰/۱۵	۱/۱۶۱۸۳	۱/۲۲۴	۱/۱۶۸
۰/۲	۱/۲۲۱۴۰	۱/۲۸	—

همان طور که قبلاً ذکر شد  $f_i$  مساوی  $e^{x_i}$  است. بنابراین، باید اعداد به دست آمده تقریباً با  $f_i$ ها مساوی باشند. ملاحظه می شود که  $\frac{\Delta^2 f_i - \Delta^4 f_i}{h^2}$  تقریب بهتری برای  $f''_i$  است تا  $\frac{\Delta^2 f_i}{h^2}$ . ضمناً، فرمول (۱۷.۵) و نتایج مندرج در ستون سوم جدول بالا نشان می دهند که  $\frac{\Delta^2 f_i}{h^2}$  تقریب بهتری برای  $f''_{i+1}$  است تا  $f''_i$ .

محاسبه انتگرالهای معین به شکل

$$\int_a^b f(x) dx$$

که در آن  $a$  و  $b$  متناهی و  $f(x)$  بر  $[a, b]$  معین باشد، به روشهای تحلیلی، یعنی با استفاده از تابع اولیه  $f(x)$ ، غالباً یا مشکل است یا غیر ممکن. بنابراین، حتی در صورت موجود بودن تابع اولیه برای  $f(x)$  نیز از انتگرالگیری عددی استفاده می شود. واضح است که انتگرال معین را می توان به عنوان مساحت سطح زیر منحنی  $y=f(x)$  که محصور به محور  $x$  و خطوط  $x=a$  و  $x=b$  است، تعبیر کرد و با تقسیم بازه  $[a, b]$  به زیر بازه ها و جمع کردن مساحت های مربوط به این زیر بازه ها آن را محاسبه کرد. با استفاده از این خاصیت و چند جمله ای درونیاب می توان تقریب های مناسبی برای  $\int_a^b f(x) dx$  به دست آورد.

ابتدا روشی را به کار می‌بریم که در آن  $[a,b]$  به  $n$  قسمت متساوی تقسیم می‌شود، یعنی  $[a,b]$  به زیر بازه‌های

$$[x_i, x_{i+1}] = h, \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

تقسیم می‌شود که در آن

$$x_{i+1} - x_i = h, \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

و در نتیجه

$$h = \frac{b-a}{n},$$

و بعد چند جمله‌ای درونیاب  $P_m(x)$  در نقاط  $x_{i+m}, \dots, x_{i+1}, x_i$  با استفاده از

$$P(x) = f_i + \theta \Delta f_i + \frac{\theta(\theta-1)}{2!} \Delta^2 f_i + \dots + \frac{\theta(\theta-1)\dots(\theta-k+1)}{k!} \Delta^k f_i$$

حساب می‌شود و بعد

$$\int_{x_1}^{x_{i+m}} P_m(x) dx$$

به دست می‌آید. با جمع کردن این مقادیر، تقریبی برای

$$\int_a^b f(x) dx = \int_x^{x_n} f(x) dx$$

به دست می‌آید. در زیر، حالت‌هایی را که  $m=1$  و  $m=2$  بررسی می‌کنیم.

در این قاعده چند جمله‌ای درونیاب تابع  $f$  را در نقاط  $x_i$  و  $x_{i+1}$  به دست می‌آوریم، که یک خط است. معادله این خط عبارت است از (با توجه به ۳۷.۴)

$$p_1(x) = f_i + \theta \Delta f_i \quad (۲۰.۵)$$

در نتیجه، با تغییر متغیر  $x = x_i + \theta h$

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} P(x) dx = \int_0^1 (f_i + \theta \Delta f_i) h d\theta$$

$$= h \left[ \theta f_i + \frac{\theta^2}{2} \Delta f_i \right]_0^1$$

$$= h \left( f_i + \frac{1}{2} \Delta f_i \right)$$

اگر به جای  $\Delta f_i$  قرار دهیم  $f_{i+1} - f_i$  به دست می‌آوریم:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} P(x) dx = \frac{h}{2} (f_i + f_{i+1})$$

بنابراین، قرار می‌دهیم

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \simeq \frac{h}{2} (f_i + f_{i+1})$$

فرمول قاعده ذوزنقه‌ای



برای پیدا کردن فرمول تقریبی برای  $\int_a^b f(x) dx$  می نویسیم


$$\int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \dots + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx$$

$$+ \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx \simeq \frac{h}{2}(f_0 + f_1) + \frac{h}{2}(f_1 + f_2) + \dots$$

$$+ \frac{h}{2}(f_i + f_{i+1}) + \dots + \frac{h}{2}(f_{n-1} + f_n) = \frac{h}{2}(f_0 + 2f_1 + \dots + 2f_{n-1} + f_n)$$

عبارت اخیر را، با توجه به حرف اول کلمه لاتین معادل ذوزنقه‌ای،  $T(h)$  می نامیم. بنابراین،

$$\int_a^b f(x) dx \simeq T(h) = \frac{h}{2}(f_0 + 2f_1 + \dots + 2f_{n-1} + f_n) \quad \text{قاعده ذوزنقه‌ای مرکب}$$



شکل نشان می دهد که هرچه  $h$  کوچکتر اختیار شود خطا کمتر است

مثال

تقریبهایی از  $\int_0^1 x^2 dx$  را، به روش ذوزنقه‌ای، و به ازای  $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$  حساب و خطای این مقادیر را نیز تعیین کنید.

حل: با توجه به اینکه  $a=0, b=1, f(x)=x^2$  و بنابر فرمول قاعده ذوزنقه مرکب یعنی

$$\int_a^b f(x) dx \simeq T(h) = \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + \dots + 2f_{n-1} + f_n)$$

داریم

$$T(1) = \frac{1}{2} (f(0) + f(1)) = \frac{1}{2} (0 + 1) = \frac{1}{2}$$

$$T\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \left( f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right) = \frac{1}{4} \left( 0 + 2 \times \frac{1}{4} + 1 \right) = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned} T\left(\frac{1}{4}\right) &= \frac{1}{8} \left( f(0) + 2f\left(\frac{1}{4}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) + f(1) \right) \\ &= \frac{1}{8} \left( 0 + 2 \times \frac{1}{16} + 2 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{9}{16} + 1 \right) = \frac{11}{32} \end{aligned}$$

مقدار واقعی چنین حساب می‌شود!

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

ملاحظه می‌شود که هرچه  $h$  کوچکتر می‌شود  $T(h)$  نیز به  $\frac{1}{3}$  نزدیکتر می‌شود. خطای مطلق مقادیر حساب شده عبارت است از

$$T(1) - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$T\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3} = \frac{3}{8} - \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$$

$$T\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{3} = \frac{11}{32} - \frac{1}{3} = \frac{1}{96}$$

مثال  
۱- تقریبی از  $\int_0^1 f(x) dx$  را با استفاده از جدول مقادیر زیر حساب کنید.

$x_i$	۰	۰/۲	۰/۴	۰/۶	۰/۸	۱
$f_i$	۱	۱/۲۲۱۴	۱/۴۹۱۸	۱/۸۲۲۱	۲/۲۲۵۵	۲/۷۱۸۳

حل: مشاهده می شود که در این مثال خبری از ضابطه تابع  $f$  نیست. با توجه به نقاط جدولی می توانیم قاعده دوزنقه ای را با فرض  $h=0.2$  به کار ببریم.

$$T(0.2) = \frac{0.2}{2} (f(0) + 2(f(0.2) + f(0.4) + f(0.6) + f(0.8)) + f(1))$$

که با توجه به جدول مقادیر، چنین نوشته می شود:

$$T(0.2) = 0.1 (1 + 2 \times 6.7608 + 2.7183) = 1.72399$$

اعداد جدول بالا مربوط به مقادیر تابع  $f(x) = e^x$  هستند، برای این تابع داریم

$$\int_0^1 e^x dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1 = 1.71828 \quad (5D)$$

ملاحظه می شود که خطا برابر است با

۲- تقریبی از  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$  را با استفاده از  $h = \frac{\pi}{8}$  حساب کنید و با مقدار واقعی انتگرال مقایسه کنید.

حل:

$$\begin{aligned} T\left(\frac{\pi}{8}\right) &= \frac{\pi}{16} \left( \sin 0 + 2 \sin \frac{\pi}{8} + 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{3\pi}{8} + \sin \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{\pi}{16} (0 + 2(0,38268 + 0,70711 + 0,92388) + 1) \\ &= \frac{\pi}{16} \times 5,0734. \end{aligned}$$

بنابراین،

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx \simeq T\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0,98712.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

مقدار واقعی انتگرال عبارت است از

$$T\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1 - 0,98712 = 0,01288 \text{ - مقدار واقعی}$$

### قضیه

خطای قاعده دوزنقه‌ای از فرمول زیر به دست می‌آید

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - \frac{h}{2} (f_i + f_{i+1}) = -\frac{h^3}{12} f''(\eta_i)$$

که در آن  $\eta_i$  بین  $x_i$  و  $x_{i+1}$  است، به شرط آن که  $f''(x)$  پیوسته باشد.

### قضیه

با توجه به علامات به کار برده شده در این فصل و پیوسته بودن  $f''(x)$  بر  $[a, b]$

$$ET(h) = \int_a^b f(x) dx - T(h) = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\eta),$$

که  $a \leq \eta \leq b$ .



### نتیجه

خطای قاعدهٔ دوزنقه‌ای مرکب متناسب با  $h^2$  است و این قاعده برای توابع چندجمله‌ای حداکثر از درجهٔ اول دقیق است.

### نتیجه

اگر  $M_2$  یک کران بالا برای  $|f''(x)|$  باشد، یعنی

$$\max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \leq M_2$$

آن‌گاه

$$|ET(h)| \leq \frac{(b-a)}{12} h^2 M_2$$

مثال

تقریبی از  $\int_0^1 x \sin x \, dx$ ، به قاعدهٔ دوزنقه‌ای، حساب کنید که خطای آن از  $10^{-2}$  کمتر باشد.

حل: ابتدا  $M_2$  را به دست می‌آوریم. برای این منظور مشتق مرتبهٔ دوم

$$f(x) = x \sin x$$

را حساب می‌کنیم.

$$f'(x) = \sin x + x \cos x, \quad f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

بنابراین، با توجه به این که  $0 \leq x \leq 1$ ،

$$|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x| \leq 2 |\cos x| + |x| |\sin x| \leq 2 + 1 = 3$$

پس،  $M_2 = 3$  و  $h$  را از نامساوی زیر به دست می‌آوریم.

$$\frac{b-a}{12} h^2 M_2 = \frac{h^2}{12} \times 3 = \frac{h^2}{4} \leq 10^{-2}$$

با محاسبهٔ جواب واقعی به طریق زیرخطای  $T(h)$  نیز حساب می‌شود.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \sin x \, dx &= (\sin x - x \cos x) \Big|_0^1 = \sin 1 - \cos 1 = 0.84147 - 0.54030 \\ &= 0.30117 (5D) \end{aligned}$$

بنابراین،

$$|ET(h)| = |0.30117 - 0.30578| = 0.00461$$

ملاحظه می‌شود که  $|ET(h)| < 10^{-2}$

که از آن نتیجه می‌شود

$$h \leq 0.2$$

از این رو، قرار می‌دهیم  $h = 0.2$  و  $T(h)$  را حساب می‌کنیم (اعداد میانی را تا چهار رقم اعشار گرد می‌کنیم).

$$\begin{aligned} T(0.2) &= \frac{0.2}{4} (0 + 2(0.2 \sin 0.2 + 0.4 \sin 0.4 + 0.6 \sin 0.6 + 0.8 \sin 0.8) + \sin 1) \\ &= 0.1(0 + 2(0.3973 + 0.15577 + 0.33879 + 0.57388) + 0.84147) \\ &= 0.30578 \end{aligned}$$

پایان