


# Colore




- Abbiamo studiato come funziona l'occhio e come il cervello elabora le informazioni ricevute.
- Adesso dobbiamo capire come è fatta la luce!



# Sir Isaac Newton, 1666


- Se un raggio luminoso bianco attraversa un prisma di vetro, ciò che si ottiene non è luce bianca, ma è uno spettro di colori che vanno dal violetto al rosso.
- Quindi la luce può essere decomposta in onde luminose di tipo differente.





# Lo spettro elettromagnetico


- Quello che il nostro occhio percepisce è solo una piccola porzione dello spettro elettromagnetico.






# Colore

I colori sono legati alle lunghezze d'onda (Newton-Huygens).




**L=Lunghezza d'onda**



| Lung. in nanometri  | Tipo radiazione       |
|---------------------|-----------------------|
| $10^{17} - 10^{13}$ | Osc.elettriche        |
| $10^{13} - 10^9$    | Onde radio            |
| $10^9 - 10^6$       | Micro-onde            |
| $10^6 - 10^3$       | Infrarosso            |
| $10^3 - 10^2$       | Visibile              |
| $10^2 - 10$         | Ultravioletto         |
| $10 - 10^{-3}$      | Raggi X               |
| $10^{-3} - 10^{-7}$ | Raggi gamma e cosmici |




**Un nanometro= 1 metro / 1.000.000.000**




- La luce è formata da tutte quelle lunghezze d'onda percepite dall'occhio umano.
- Lo spettro della luce visibile oscilla tra il violetto e il rosso.
- Per comodità lo spettro del visibile è diviso in sei regioni: violetto, blu, verde, giallo, arancio e rosso.
- Le bande di colore non sono tutte della stessa grandezza e degradano in quelle limitrofe.






- L'occhio umano percepisce come colore di un oggetto quella luce che l'oggetto stesso riflette.
- Se un oggetto riflette tutte le lunghezze d'onda luminosa, allora l'oggetto sarà percepito come bianco.
- Un oggetto che riflette le lunghezze d'onda da 500 a 570 nm ed assorbe tutto il resto, sarà percepito come di colore verde.



- Per descrivere la luce bastano i seguenti valori:
- *Radianza*: cioè la quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa;
- *Luminanza*: cioè la misure dell'energia percepita dall'utente;
- *Brillantezza*: è un valore soggettivo che indica la sensazione di colore.



# I coni

Nella retina ci sono tre tipi di coni:



**TIPO S:** Sensibili alle lunghezze d'onda corte (short, colori bluastri)

**TIPO M:** Sensibili alle lunghezze d'onda medie (middle, colori verdastri)


**TIPO L:** Sensibili alle lunghezze d'onda lunghe (long, colori rossastri)

Tutti i primati hanno questi tre tipi di cellule retinali. I non primati hanno solo due tipi di cellule retinali per i colori mentre gli uccelli ne hanno ben 5 tipi differenti!

# Spettro di assorbimento dei coni



Spettri di assorbimento per i tre tipi di coni, **rosso (L)**, **verde (M)** e **blu (S)**, normalizzati ai rispettivi massimi



Funzioni di efficienza luminosa per **visione fotopica e scotopica**



# Teoria del tristimolo (Young, 1802)


**Tutti i colori si possono ottenere  
“mescolando” tre colori fondamentali in  
proporzioni differenti.**

Dimostreremo che questa *ipotesi* è *FALSA* se  
non in prima approssimazione.

# Il colore

A differenza delle misure di lunghezza o di peso, **non esiste una scala fisica per misurare il colore.**

Il colore è una questione di **percezione** o di **interpretazione soggettiva**.



Il riconoscimento dei colori da parte dell'uomo è basato sulla **luce**, sugli **oggetti** che riflettono la luce e sugli **occhi** e il **cervello** dell'osservatore.

# Differenze di colore


**Differenze di sorgenti luminose**  
luce solare, lampade ad incandescenza, neon,...

**Differenze di osservatore**  
sensibilità, vista,...

**Differenze di dimensioni**  
Effetto area = colori che ricoprono vaste superfici appaiono più luminosi e vivaci

**Differenze di sfondo**  
Effetto contrasto = colori appaiono più cupi se lo è sfondo scuro

**Differenze di direzione**  
Caratteristiche direzionali di alcune vernici  
costanza degli angoli di osservazione e di illuminazione



**misure**

# Composizione dei colori

**Illuminando una superficie bianca (coefficiente di riflessione del 100%) con una o più luci monocromatiche si ottiene (per riflessione) una radiazione colorata per**


## Sintesi Additiva

**Qualsiasi luce di spettro complesso può essere ottenuta come “somma” di tre luci monocromatiche agenti simultaneamente.**


**La CIE, partendo dall’ipotesi che tutti i colori possono essere valutati in termini di tre componenti pure, ha scelto le tre radiazioni primarie in modo che le lunghezze d’onda siano il più possibile distanziate nello spettro.**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Rosso</b> | <b>700.0 nm</b> |
| <b>Verde</b> | <b>546.1 nm</b> |
| <b>Blu</b>   | <b>435.8 nm</b> |

# Colorimetria



- L'occhio è lo strumento umano per la misura del colore.
- La retina ha tre tipi di **coni**.



Sensibilità spettrale dell'occhio umano

valori del tristimolo X, Y, Z







$$X = \int_{380}^{780} L_{e,\lambda} \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = \int_{380}^{780} L_{e,\lambda} \bar{y}(\lambda) d\lambda = \int_{380}^{780} L_{e,\lambda} V(\lambda) d\lambda$$


$$Z = \int_{380}^{780} L_{e,\lambda} \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

**spazio colorimetrico CIE 1931.**

# Colore e riflettanza spettrale




# Dati colorimetrici




$(L^*, a^*, b^*)$

Distribuzione spettrale degli illuminanti più diffusi:



- 1. Distribuzione energetica della luce che lo illumina**
- 2. Curva spettrale dell'oggetto colorato,**
- 3. Sensibilità al colore dell'occhio umano.**


# Visione e misura



# Visione e misura

Figure 20

20a: Human eye




This is how I see color of the apple.



The human eye has a great ability for comparing colors, but there are problems with differences between individuals and memory characteristics.

20b: Tristimulus method





This is how I measure color. It's basically the same as the human eye.



Tristimulus instruments have the advantages of small size and portability. They are used mainly for color-difference measurement in the production and inspection areas.

# Visione e misura



- Una **luce** allo Xenon illumina il campione in maniera uniforme;
- La luce riflessa dalla superficie del **campione** viene raccolta da un **sistema di lenti** ed entra nel sensore spettrale principale
- La luce che entra in ciascun **sensore** viene divisa in lunghezze d'onda da un reticolo di diffrazione e convertita in segnale elettrico da una array di fotodiodi

# Illuminanti

**Illuminante** : Energia radiante con distribuzione spettrale di energia relativa definita nel campo di lunghezza d'onda capace di influenzare la visione del colore degli oggetti.

**Illuminante CIE** : Gli illuminanti colorimetrici A, B, C e D65 sono quelli le cui distribuzioni spettrali di energia relativa sono definite dalla CIE.




Figure 22a: Standard Illuminants

**1** Standard Illuminant Average daylight (including ultraviolet wavelength region) with a correlated color temperature of 6504K; should be used for measuring specimens which will be illuminated by daylight including ultraviolet radiation. **2** Standard Illuminant C Average daylight (not including ultraviolet wavelength region) with a correlated color temperature of 6774K; should be used for measuring specimens which will be illuminated by daylight in the visible wavelength range but not including ultraviolet radiation. **3** Standard Illuminant A Incandescent light with a correlated color temperature of 2856K; should be used for measuring specimens which will be illuminated by incandescent lamps.

| Nome | CIE 1931 2° |         | CIE 1964 10° |          | CCT (K) | Hue | Note   |
|------|-------------|---------|--------------|----------|---------|-----|--|
|      | $x_2$       | $y_2$   | $x_{10}$     | $y_{10}$ |         |     |  |
| A    | 0.44757     | 0.40745 | 0.45117      | 0.40594  | 2856    |     | Incandescente / Tungsteno                      |
| B    | 0.34842     | 0.35161 | 0.34980      | 0.35270  | 4874    |     | {obsoleta} luce diretta del sole a mezzogiorno |
| C    | 0.31006     | 0.31616 | 0.31039      | 0.31905  | 6774    |     | {obsolete} Average / North sky Daylight        |
| D50  | 0.34567     | 0.35850 | 0.34773      | 0.35952  | 5003    |     | Horizon Light. ICC profile PCS                 |
| D55  | 0.33242     | 0.34743 | 0.33411      | 0.34877  | 5503    |     | Mid-morning / Mid-afternoon Daylight           |
| D65  | 0.31271     | 0.32902 | 0.31382      | 0.33100  | 6504    |     | Luce diurna a mezzogiorno: Televisione, sRGB   |
| D75  | 0.29902     | 0.31485 | 0.29968      | 0.31740  | 7504    |     | North sky Daylight                             |
| E    | 1/3         | 1/3     | 1/3          | 1/3      | 5454    |     | Equal energy                                   |
| F1   | 0.31310     | 0.33727 | 0.31811      | 0.33559  | 6430    |     | luce diurna fluorescente                       |
| F2   | 0.37208     | 0.37529 | 0.37925      | 0.36733  | 4230    |     | Luce Fluorescente bianca fredde                |
| F3   | 0.40910     | 0.39430 | 0.41761      | 0.38324  | 3450    |     | luce fluorescente bianca                       |
| F4   | 0.44018     | 0.40329 | 0.44920      | 0.39074  | 2940    |     | Warm White Fluorescent                         |
| F5   | 0.31379     | 0.34531 | 0.31975      | 0.34246  | 6350    |     | luce diurna fluorescente                       |
| F6   | 0.37790     | 0.38835 | 0.38660      | 0.37847  | 4150    |     | Fluorescente bianco chiaro                     |
| F7   | 0.31292     | 0.32933 | 0.31569      | 0.32960  | 6500    |     | D65 simulatore, simulatore di luce diurna      |
| F8   | 0.34588     | 0.35875 | 0.34902      | 0.35939  | 5000    |     | D50 simulator, Sylvania F40 Design 50          |
| F9   | 0.37417     | 0.37281 | 0.37829      | 0.37045  | 4150    |     | Cool White Deluxe Fluorescent                  |
| F10  | 0.34609     | 0.35986 | 0.35090      | 0.35444  | 5000    |     | Philips TL85, Ultralume 50                     |
| F11  | 0.38052     | 0.37713 | 0.38541      | 0.37123  | 4000    |     | Philips TL84, Ultralume 40                     |
| F12  | 0.43695     | 0.40441 | 0.44256      | 0.39717  | 3000    |     | Philips TL83, Ultralume 30                     |

# Illuminanti

Figure 22b: Fluorescent Illuminants  
(recommended by JIS for measurements)

4 F6: Cool white

5 F8: Daylight

6 F10: Three narrow band daylight white






Figure 22c: Fluorescent Illuminants  
(recommended by CIE for measurements)

7 F2: Cool white

8 F7: Daylight

9 F11: Three narrow band cool white

# Misura




# Osservatori Standard e CMF

2° viewing angle



10° viewing angle



# CIE 1931 e 1964

## XYZ Tristimulus Values (CIE 1931)

$$X = K \int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{x}(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

$$Y = K \int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{y}(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

$$Z = K \int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{z}(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

$$K = \frac{100}{\int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{y}(\lambda) d(\lambda)}$$

Tristimulus values determined based on the color matching functions  $\bar{x}(\lambda)$ ,  $\bar{y}(\lambda)$  and  $\bar{z}(\lambda)$  defined in 1931 by CIE; also referred to as  $2^\circ$  XYZ tristimulus values. They are suitable for a viewing angle of  $4^\circ$  or less and are defined for reflecting objects by the following formulas:

where

$S(\lambda)$ : Relative spectral power distribution of the illuminant

$\bar{x}(\lambda)$ ,  $\bar{y}(\lambda)$ ,  $\bar{z}(\lambda)$ : Color-matching functions for CIE  $2^\circ$  Standard Observer (1931)

$R(\lambda)$ : Spectral reflectance of specimen

## X<sub>10</sub> Y<sub>10</sub> Z<sub>10</sub> Tristimulus Values (CIE 1964)

$$X_{10} = K \int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{x}_{10}(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

$$Y_{10} = K \int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{y}_{10}(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

$$Z_{10} = K \int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{z}_{10}(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

$$K = \frac{100}{\int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{y}_{10}(\lambda) d(\lambda)}$$


Tristimulus values determined based on the color matching functions  $\bar{x}(\lambda)$ ,  $\bar{y}(\lambda)$  and  $\bar{z}(\lambda)$  defined in 1964 by CIE; also referred to as  $10^\circ$  XYZ tristimulus values. They are suitable for a viewing angle of more than  $4^\circ$  and are defined for reflecting objects by the following formulas:

where

$S(\lambda)$ : Relative spectral power distribution of the illuminant

$\bar{x}(\lambda)$ ,  $\bar{y}(\lambda)$ ,  $\bar{z}(\lambda)$ : Color-matching functions for CIE  $10^\circ$  Supplementary Standard Observer (1964)

$R(\lambda)$ : Spectral reflectance of specimen



# Standard CIE

- Nel 1931 il CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) ha fissato le lunghezze d'onda standard per i tre colori primari:

Blue = 435,8 nm

Verde = 546,1 nm


Rosso = 700 nm

- Anche se nel 1964 i dati sperimentali hanno dimostrato che in realtà il valore reale è lievemente differente.


Blue = 445 nm


Verde = 535 nm

Rosso = 575 nm



# Standard CIE






# Diagramma cromatico CIE


- Se  $x$  è la quantità di rosso
- Se  $y$  è la quantità di verde
- $z$  è la quantità di blu ottenuta come  
$$z = 1 - (x + y)$$
- La rappresentazione grafica al variare di  $x$  e  $y$  da origine al diagramma cromatico CIE



# Diagramma cromatico CIE


- Tutti i colori delle lunghezze d'onda visibili sono disposti lungo i bordi.
- Il punto di uguale energia è il bianco.
- Qualsiasi colore lungo il bordo non ha bianco, quindi è puro.






# Diagramma cromatico CIE


- Unendo due colori con una linea, tutti i colori nella linea sono quelli ottenibili mischiando i due colori.
- Unendo un colore con il bianco si ottengono tutte le tonalità di quel colore






# Diagramma cromatico CIE


- Unendo tre colori con un triangolo, tutti i colori lungo il bordo e nel triangolo sono quelli ottenibili mischiando quei tre colori.






# Color gamut


- Unendo R G e B si ottiene un triangolo che contiene tutti i colori che si possono produrre.
- Da notare che il triangolo non copre tutta l'area, quindi non tutti i colori si ottengono unendo R G e B.






# Color gamut

- L'area irregolare dentro il triangolo rappresenta tutti i colori che una stampante può ottenere.
- Questi sono in numero minore rispetto a quelli dei monitor perché è differente il modo di mischiare i colori (additivo vs sottrattivo).







# Spazio CIE xyz

Un colore può essere specificato mediante dei coefficienti tricromatici. I valori di tristimolo necessari a rappresentare il colore corrispondente ad una certa lunghezza d'onda possono essere determinati da curve, tabelle e diagrammi determinati sulla base di una estesa sperimentazione, condotta in particolare negli anni'60. Uno di essi è il diagramma CIE di cromaticità, che mostra la composizione di un colore in funzione di  $x$  e  $y$ , mentre il corrispondente valore di  $z$  è calcolato direttamente dalla  $z = 1 - (x + y)$ . Il diagramma di cromaticità CIE 1931, è solo una "fetta" di uno spazio più completo, lo spazio dei colori CIE 1931 al quale si assegnano le coordinate XYZ.


La sua proiezione su un piano è un diagramma di cromaticità xy. Le relazioni per passare dalle coordinate tridimensionali XYZ alle coordinate xy sono:  $x = X/(X+Y+Z)$ ,  $y = Y/(X+Y+Z)$ .





# Modelli del Colore

- Scopo di un modello del colore (o *spazio dei colori* o *sistema dei colori*) è di consentirne la specificazione dei colori con modalità standardizzate, che fanno normalmente riferimento ad un sistema di coordinate 3-D (dato che tre sono comunque le caratteristiche che definiscono un colore), o meglio ad un suo sotto-spazio, nel quale ogni colore è rappresentato da un punto.
- I modelli del colore più utilizzati in image processing sono orientati o all'hardware di acquisizione (RGB) e restituzione (RGB, CMY) delle immagini o alla loro trasmissione (YUV, YIQ), compressione (YCbCr), elaborazione (od analisi) mediante trattamento del colore (RGB, HSI, HSV, LUV, ...).
- Alla poca chiarezza derivante dalla abbondanza di modelli dello stesso tipo, si aggiunge l'uso ambiguo delle lettere nei nomi dei modelli (I o V significano cose diverse in modelli diversi), e soprattutto il fatto che in letteratura esistono differenti versioni delle equazioni di conversione dall'uno all'altro dei modelli indicati.



## CIE L\*a\*b\*

- Il principale difetto del sistema CIE (e di tutti i modelli del colore da esso derivati mediante trasformazioni lineari o non lineari di coordinate) è che esso non è dotato di uniformità percettiva.
- **In altre parole, dati due colori  $C1$  e  $C2$ , consideriamone le distanze  $\Delta C$ , rispettivamente, dal colore  $C3 = C1 + \Delta C$  e dal colore  $C4 = C2 + \Delta C$ . Supponendo che le due distanze siano quantitativamente uguali, sarebbe desiderabile che i due colori  $C3$  e  $C4$  fossero percepiti come ugualmente distanti da  $C1$  e  $C2$ . Dato che il sistema non è percettivamente uniforme, in generale le due distanze, benchè uguali, saranno percepite come differenti.**
- Dopo molti anni di elaborazione, la CIE ha standardizzato nel 1976 due spazi di colore percettivamente uniformi, chiamati rispettivamente CIE  $L^*u^*v^*$  e **CIE L\*a\*b\*** ( $u$  e  $v$  non hanno alcuna relazione con le componenti video  $U$  e  $V$ )




## Formule

- Attraverso le seguenti formule, si può passare dallo spazio colore CIE XYZ allo spazio colore CIELAB, e viceversa

$$L^* = 116 \left( \frac{Y}{Y_n} \right)^{\frac{1}{3}} - 16 \quad a^* = 500 \left[ \left( \frac{X}{X_n} \right)^{\frac{1}{3}} - \left( \frac{Y}{Y_n} \right)^{\frac{1}{3}} \right] \quad b^* = 200 \left[ \left( \frac{Y}{Y_n} \right)^{\frac{1}{3}} - \left( \frac{Z}{Z_n} \right)^{\frac{1}{3}} \right]$$

- Dove  $X/X_n$ ,  $Y/Y_n$ , e  $Z/Z_n$ , sono maggiori di 0.01 e  $X_n$ ,  $Y_n$  e  $Z_n$  definiscono il punto bianco. Lo spazio colore CIELAB in confronto al CIE XYZ rispetta maggiormente la risposta non lineare dell'occhio umano alle radiazioni elettromagnetiche.
- La metrica CIELAB si ottiene dalla seguente formula:

$$\Delta E_{ab}^* = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$



## $\Delta E^*$ <sub>a,b</sub> CIELAB

La metrica  $\Delta E^*$ <sub>a,b</sub> CIELAB lavora sullo spazio colore CIELAB. Differentemente da altri spazi colore, lo spazio colore CIELAB, è ***percettivamente uniforme***. I parametri che lo determinano sono: L\*, a\*, b\*.

L\* rappresenta la **luminanza** mentre a\* e b\* rappresentano la **crominanza**.


L\*, a\* e b\* sono le trasformazioni dei tre valori di tristimolo X, Y e Z dello spazio colore CIE XYZ.

# Differenze di colore

Nello spazio CIELAB le differenze di colore sono definite come distanza tra due punti dello spazio  $L^*a^*b^*$





$$\Delta E_{ab}^* = \sqrt{\Delta L^{*2} + \Delta a^{*2} + \Delta b^{*2}}$$




- Uguali differenze corrispondono a uguali differenze di percezione.
- Questo è un pregio di questo sistema.
- Delta E=1 accettato nell'industria dei cosmetici
- Delta E=0,01 accettato nella Ferrari
- Tra zero e 1 per il packaging o negli indumenti Benetton

# L\*a\*b\* color space



|        |          |
|--------|----------|
| 001    | L 43.31  |
| +47.63 | b +14.12 |

# Spazio CIELAB L\*a\*b\* (1976)




**L\* = luminosità**

**L del nero è = 0**

**L del bianco è = 100**


**a\* e b\* = coordinate di cromaticità**

# Spazio CIELAB L\*a\*b\* (1976)




**Piano cromatico  
a  $L^*=50$**

# L\*C\*h color space



# L\*C\*h color space



# Il bianco e il nero

**Quali sono le coordinate del nero ?**

**Il nero matematico è rappresentato dal tristimolo X=0,Y=0,Z=0.**

**Nessun corpo reale possiede questa specificazione.**

**Il nero "fisico", cioè quello di un corpo di cui si misura il fattore di riflessione spettrale e si calcola il tristimolo è diverso e dipende dal corpo:**

- Il fattore di riflessione spettrale di un corpo nero è dell'ordine di un qualche per cento (3-5%)
- Il nero più nero è del velluto nero
- La tavoletta nera standard dell'NPL ha un fattore di riflessione 0.15% - 4.00% nell'intervallo 320nm - 780nm (geometria 8/d). La corrispondente specificazione colorimetrica per osservatore CIE 31 ed illuminante D65 è:

$$(x,y,Y\%)=(0.2940, 0.3258, 0.47) \text{ e } (L^*,a^*,b^*)=(4.2,-0.9,-0.5)$$

**e questi dati cambiano se si cambia geometria...**

# Il bianco e il nero

Analogamente per il bianco si pone la stessa domanda, quale bianco?

Bianco equienergetico, per il quale la distribuzione spettrale di potenza è 1 ed a cui corrisponde  $(X=1, Y=1, Z=1)$ ,  $(x=1/3, y=1/3, Y=1)$ .

Diversamente il bianco è quello associato all'illuminante scelto, la cui specificazione colorimetrica, per gli illuminanti standard CIE, è data (vedi Oleari, 2008).

Per quanto riguarda i corpi reali si considera il fattore di riflessione:

- la tavoletta ideale lambertiana ha un fattore di riflessione uguale per tutte le lunghezze d'onda, vale 1 o 100%, e la sua specificazione colorimetrica è uguale a quella dell'illuminante considerato.
- la tavoletta standard bianca NPL ha il fattore di riflessione che varia tra 78.71%@400nm e 86.11%@700nm nella geometria 8/d e la sua specificazione per l'osservatore CIE 31 e l'illuminante D65 vale

$$(x, y, Y\%) = (0.3145, 0.3318, 85.56) \text{ e } (L^*, a^*, b^*) = (94.1, -0.4, +1.3)$$

# Il bianco e il nero

**L'osservatore e l'illuminante devono essere scelti, perché diversamente non c'è misurazione del colore**


**Quale osservatore scegliere?**

- Per oggetti da vedersi in modo analitico, cioè quasi tutti gli oggetti che rientrano tra i beni culturali, l'osservatore è il CIE 1931.
- Per oggetti di grandi superfici, quali oggetti architettonici e forse anche affreschi destinati ad essere visti da lontano, l'osservatore è il CIE 64.


**L'illuminante classico per tutti gli usi è il D65.**

**L'atlante di Munsell è definito per l'osservatore CIE 64 e l'illuminante D65.**  
Le sue proprietà dal punto di vista percettivo non valgono più se si opera in condizioni differenti

**Le comparazioni visive vanno fatte in situazione visiva controllata**



# Gli spazi di colore




## In realtà:

Raramente vediamo in natura colori puri. Ma piuttosto vediamo miscele di radiazione luminosa in ogni lunghezza d'onda.

Il nostro cervello non è uno “spettrometro”:

- spettri differenti producono sensazioni cromatiche eguali;
- manteniamo una percezione costante del colore di una superficie anche se cambia la luce che la illumina.





- **Ogni lunghezza d'onda trasporta differenti quantità di energia.**
- **La energia totale della radiazione è la somma di tutti i contributi di energia dalle diverse lunghezze d'onda.**
- **Lo “spettro” di un illuminante è il diagramma dei contributi di energia che esso apporta per ciascuna differente lunghezza d'onda.**



# Spettro


- Il disegno mostra uno spettro “discretizzato” con una convenzione grafica del tipo visto in una applicazione di “equalizzazione” nello stereo.






# Metameri

Spettri diversi possono produrre colori eguali: coppie di spettri con questa reciproca proprietà si chiamano **metameri**.




*Lo spettro tratteggiato e quello continuo producono (nel cervello) il medesimo colore!*

Tra i vari metameri di un dato spettro se ne può sempre individuare uno assai importante che è alla base del modello dei colori detto “del pittore”.



# Modello del pittore: basi fisiche

Ogni spettro ha un metamero della seguente forma:




La lunghezza d'onda in cui si ha il picco è responsabile del “colore percepito” (detto anche in inglese **HUE**).

Il rapporto  $(\text{epicco}-\text{emedia})/(\text{epicco}+\text{emedia})$  è la **SATURAZIONE**, cioè quanto il colore è puro. Meno luce bianca equivale ad un maggiore valore del rapporto.


**emedia** è proporzionale al contenuto energetico della radiazione: essa può essere considerata una misura della “luminosità” di una radiazione (detto anche **VALORE**). Esso dà un contributo “bianco” al colore percepito.

# Modello del pittore






# Mettere assieme i triangoli...




**Tutte le linee verticali tratteggiate sono la rappresentazione della medesima “linea dei grigi”.**

**IDEA! Attacchiamo tutti i triangoli in una “girandola” facendo coincidere le linee dei grigi.**




# Spazio HSV (oppure HSI)



**H = hue (colore);**  
copre tutti i colori ordinati in sequenza

**S = saturazione;**  
da un minimo (centro) pari al bianco puro  
ad un massimo (periferia) colore puro.

**V = valore o luminosità;**  
da un minimo (nessuna energia emessa)  
ad un massimo.







# Rappresentazione del colore


- ❖ **Ruota dei colori** organizza lo spazio colorato in uno schema simmetrico.

- ❖ **Munsell** collocamento dei colori in uno spazio tridimensionale.


MUNSELL



NEWTON





BLANC



CHEVREUL

- ❖ **Nascita di colorimetria e sistemi CIE** per una misura fisica del colore.





# Il solido dei colori

Figura 4

Solido tridimensionale  
(tinta, luminosità, saturazione)





Figura 5: Solido dei colori




**Tinta** = identifica il rosso, il blu, il giallo,... e forma la ruota dei colori

**Luminosità** = colori chiari e colori scuri e cambia verticalmente

**Saturazione** = colori brillanti e colori opachi; cambia a partire dal centro





# Munsell System



(H,C,V)

H = Hue  
C = Chroma  
V = Value








# Discussione del modello del pittore


## ■ **PRO:**

- Intuitivo;
- Percettivamente significativo: i parametri HSV hanno una perfetta interpretazione nelle nostre percezioni.

## ■ **CONTRO:**

- Modello non lineare;
- Perché una piramide esagonale?
- Quanti sono i “colori base”?





Color Checker Chart

Dark Skin  
R=115  
G= 82  
B= 68

Light Skin  
R=194  
G=150  
B=130

Blue Sky  
R= 98  
G=122  
B=157

Foliage  
R= 87  
G=108  
B= 67

Blue Flower  
R=133  
G=128  
B=177

Bluish Green  
R=103  
G=189  
B=170

Orange  
R=214  
G=126  
B= 44

Purple Red  
R= 80  
G= 91  
B=166

Moderate Red  
R=193  
G= 90  
B= 99

Purple  
R= 94  
G= 60  
B=108

Yellow Green  
R=157  
G=188  
B= 64

Orange Yellow  
R=224  
G=163  
B= 46

Blue  
R= 56  
G= 61  
B=150

Green  
R= 70  
G=148  
B= 73

Red  
R=175  
G= 54  
B= 60

Yellow  
R=231  
G=199  
B= 31

Magenta  
R=187  
G= 86  
B=149

Cyan  
R= 8  
G=133  
B=161

White  
R=243  
G=243  
B=242

Neutral 8  
R=200  
G=200  
B=200


Neutral 65  
R=160  
G=160  
B=160

Neutral 5  
R=122  
G=122  
B=121

Neutral 35  
R= 85  
G= 85  
B= 85


Black  
R= 52  
G= 52  
B= 52

X-Rite



| Index                                      | Description   | Munsell Notation | CIE xyY'         | Manufacturer's sRGB color values <sup>[6]</sup> |
|--|---------------|------------------|------------------|---|
| <b>Row 1: Natural colors</b>               |               |                  |                  |   |
| 1  | Dark skin     | 3 YR 3.7/3.2     | 0.400 0.350 10.1 | #735244   |
| 2  | Light skin    | 2.2 YR 6.47/4.1  | 0.377 0.345 35.8 | #c29682   |
| 3  | Blue sky      | 4.3 PB 4.95/5.5  | 0.247 0.251 19.3 | #627a9d   |
| 4  | Foliage       | 6.7 GY 4.2/4.1   | 0.337 0.422 13.3 | #576c43   |
| 5  | Blue flower   | 9.7 PB 5.47/6.7  | 0.265 0.240 24.3 | #8580b1   |
| 6  | Bluish green  | 2.5 BG 7/6       | 0.261 0.343 43.1 | #67bd44   |
| <b>Row 2: Miscellaneous colors</b>         |               |                  |                  |   |
| 7  | Orange        | 5 YR 6/11        | 0.506 0.407 30.1 | #d67e2c   |
| 8  | Purplish blue | 7.5 PB 4/10.7    | 0.211 0.175 12.0 | #505ba6   |
| 9  | Moderate red  | 2.5 R 5/10       | 0.453 0.306 19.8 | #c15a63   |
| 10   | Purple        | 5 P 3/7          | 0.285 0.202 6.6  | #5e3c6c   |
| 11   | Yellow green  | 5 GY 7.1/9.1     | 0.380 0.489 44.3 | #9dbc40   |
| 12   | Orange Yellow | 10 YR 7/10.5     | 0.473 0.438 43.1 | #e0a32e   |
| <b>Row 3: Primary and secondary colors</b> |               |                  |                  |   |
| 13   | Blue          | 7.5 PB 2.9/12.7  | 0.187 0.129 6.1  | #383d96   |
| 14   | Green         | 0.25 G 5.4/9.6   | 0.305 0.478 23.4 | #469449   |
| 15   | Red           | 5 R 4/12         | 0.539 0.313 12.0 | #af363c   |
| 16   | Yellow        | 5 Y 8/11.1       | 0.448 0.470 59.1 | #e7c71f   |
| 17   | Magenta       | 2.5 RP 5/12      | 0.364 0.233 19.8 | #bb5695   |
| 18   | Cyan          | 5 B 5/8          | 0.196 0.252 19.8 | #0885a1   |
| <b>Row 4: Grayscale colors</b>             |               |                  |                  |   |
| 19   | White         | N 9.5/           | 0.310 0.316 90.0 | #f3f3f2   |
| 20   | Neutral 8     | N 8/             | 0.310 0.316 59.1 | #c8c8c8   |
| 21   | Neutral 6.5   | N 6.5/           | 0.310 0.316 36.2 | #a0a0a0   |
| 22   | Neutral 5     | N 5/             | 0.310 0.316 19.8 | #7a7a79   |
| 23   | Neutral 3.5   | N 3.5/           | 0.310 0.316 9.0  | #555555   |
| 24   | Black         | N 2/             | 0.310 0.316 3.1  | #343434   |


# Sintesi Additiva



## RGB

**Composizione additiva dei colori partendo dai tre colori primari RGB.**

**Dalla loro sovrapposizione si ottiene il *bianco* (W), dalla sovrapposizione di due luci si ottengono *giallo* (Y), *magenta* (M) e *ciano* (C).**



**Su questo principio si basa il funzionamento di monitor e schermi televisivi.**

# I colori complementari


**Colore Complementare = quando la somma di un dato colore ad un altro dà il Bianco (W)**

$$R + G + B = W$$

$$R + G = W - B = Y$$

$$R + B = W - G = M$$

$$B + G = W - R = C$$



Il **Giallo** è complementare del **Blu**  
Il **Magenta** è complementare del **Verde**  
Il **Ciano** è complementare del **Rosso**

**Il colore può essere ottenuto anche come mescolanza di sostanze colorate (pigmenti, coloranti, ecc.) il cui comportamento può essere simulato considerando dei *filtri colorati*.**

# Sintesi sottrattiva

**Filtro Ottico Colorato = mezzo a facce piane e parallele che attraversato dalla luce bianca ne assorbe selettivamente una porzione.**

Il filtro assume il colore prodotto dalla radiazione complementare di quella che viene assorbita come accade alle **sostanze colorate**.


Sovrapponendo tre filtri di colore **giallo (Y)**, **magenta (M)** e **ciano (C)** su un visore luminoso bianco si ottengono i colori per

## Sintesi Sottrattiva

Sovrapponendo tutti e tre i filtri viene assorbita tutta la radiazione visibile per cui si ottiene il **Nero (K)**.


Sovrapponendo due filtri si ottiene il colore corrispondente alla componente luminosa che non viene assorbita da nessuno dei due.

# Sintesi sottrattiva



**Composizione sottrattiva dei colori** partendo dai tre colori primari **YMC** ottenuti ponendo i tre filtri sul cammino di un fascio di luce bianca.

Dalla loro sovrapposizione si ottiene il *nero* (K), dalla sovrapposizione di due filtri si ottengono **rosso (R)**, **verde (G)** e **blu (B)**.



**Sintesi Sottrattiva = aggiunge un filtro viene “sottratta” una componente che modifica il colore della luce.**

# Immagini in sintesi sottrattiva



Nella sintesi sottrattiva si ottengono le seguenti combinazioni cromatiche (+ = sovrapposizione di filtri) :

$$\mathbf{Y} + \mathbf{M} = \mathbf{R}$$

$$\mathbf{Y} + \mathbf{C} = \mathbf{G}$$

$$\mathbf{M} + \mathbf{C} = \mathbf{B}$$


$$\mathbf{Y} + \mathbf{M} + \mathbf{C} = \mathbf{K}$$



I pigmenti colorati si basano sulla sintesi sottrattiva.




**Su questo principio si basa la riproduzione delle immagini colorate nella fotografia a colori e nella stampa con inchiostri.**




# Modello sottrattivo


- I colori sottrattivi sono usati nei sistemi passivi, nei quali la luce viene assorbita selettivamente alle diverse lunghezze d'onda, riflettendone solo alcune che comporranno i colori desiderati.
- I colori sottrattivi sono utilizzati principalmente nell'industria della stampa. Tre colori (e a volte un quarto) vengono impressi in una superficie riflettente come la carta. Gli inchiostri, tipicamente ciano (un blu-verde), magenta, e giallo (CMY), assorbono selettivamente una certa gamma di lunghezze d'onda della luce. L'occhio percepisce la luce riflessa, che non viene assorbita; da qui il termine "sottrattivi".



# Modello sottrattivo

- Quando non c'è inchiostro nella carta la luce riflessa è bianca; quando sono presenti tutti e tre i colori, la luce viene (in linea di principio) assorbita e la carta appare nera.
- In pratica, l'assorbimento completo è difficile da ottenere quindi si utilizza un quarto inchiostro, il nero (CMYK, dove K sta per black).






# Colori primari e secondari


Nel modello **RGB** con sintesi additiva:

- I colori Rosso R, Verde G e Blue B sono detti colori primari.
- Combinandoli tra di loro **NON** si ottengono tutti i colori visibili.
- Combinandoli a due a due si ottengono i colori secondari: Magenta M, Giallo Y e Ciano C.




# Colori primari

- L'uso del termine primario è stato **ampiamente frainteso** nel senso che i tre colori primari standard, mescolati in varie proporzioni di intensità, venivano considerati capaci di produrre tutti i colori visibili. Come si vedrà a breve, questa interpretazione non è corretta a meno che si permetta anche alla lunghezza d'onda di variare, ma in questo caso non si avrebbero tre colori primari standard fissi.




# RGB

- Nel modello RGB ciascun colore è ottenuto mischiando i tre colori fondamentali.
- Se ogni componente di colore è intesa come una coordinata cartesiana, allora il modello RGB può essere graficamente descritto da un cubo.




# Descrizione geometrica



I contributi del **RED**, **GREEN** e **BLUE** sono assunti indipendenti l'uno dall'altro (e quindi rappresentanti da direzioni perpendicolari tra loro).

Ogni colore è un punto contenuto dentro il cubo.

La retta che congiunge nero e bianco è la retta dei grigi.





# Discussione

- **PRO:**  
semplice da usare e implementare in software e hardware.  
De facto è uno STANDARD.
- **CONTRO:**  
percettivamente poco comodo: difficile capire guardando un colore in natura in quale proporzione vi contribuiscono l'R, il G e il B.

***CUBO RGB e piramide HSV si trasformano l'un l'altro mediante semplici algoritmi (non lineari).***




# Relazione tra RGB e HSV







# CMY

- Il modello complementare a RGB è CMY, Ciano, Magenta e Giallo.





Full color




Cyan



Magenta



Yellow



Black




Red



Green



Blue





Hue



Saturation




Intensity




R




G





B




Interazione & Multimedia






Colore giallo (255,255,0)





Colore ciano (0, 255, 255)








Colore bianco (255,255,255)




Interazione & Multimedia






# Riepilogando

- Le rappresentazioni dei colori nello spazio RGB (o CMY il duale) non sempre sono le più convenienti.
- Sono disponibili altre rappresentazioni che usano componenti che sono specificatamente relazionate al criterio usato per descrivere la luminanza, la tinta e la saturazione (HSV).
- La tinta descrive che colore è presente (rosso, verde, giallo, ecc.) e può essere correlato alla lunghezza d'onda dominante della sorgente di luce.
- La saturazione, invece, esprime quanto è vivo il colore (molto forte, pastello, vicino al bianco) e può essere correlato alla purezza o alla distribuzione dello spettro della sorgente.
- La luminanza è la grandezza che tende a valutare la sensazione luminosa ricevuta dall'occhio, è legata quindi all'intensità della luce (quanto il colore è bianco, grigio o nero) e può essere correlata alla luminosità della sorgente.






# Colori sicuri per il web

- Si sa che 40 dei 256 colori usati tipicamente per il web, vengono processati in modo diverso da vari tipi di sistemi operativi, mentre 216 colori sono comuni alla maggior parte dei sistemi. Questi 216 colori sono diventati gli standard di fatto dei colori sicuri, specialmente nelle applicazioni Internet. Essi vengono utilizzati quando si vuole che i colori visti dalla maggior parte delle persone siano gli stessi.
- Ognuno dei 216 colori sicuri è formato come sempre da tre valori RGB, ma ogni valore può essere solo i numeri in esadecimale 00, 33, 66, 99, CC, FF.
- Quindi sono colori sicuri tutti quelli che in esadecimale sono scritti usando terne con questi 6 possibili lavori: ad esempio #33CCFF è sicuro mentre non lo è il colore #12A3FE.




# Colori sicuri per il web





# Rappresentazioni luminanza-crominanza

- Gli spazi colore, nei quali una componente è la luminosità e le altre due componenti sono legate alla crominanza, vengono chiamate rappresentazioni luminanza-crominanza.
- La luminanza fornisce una versione a scala di grigi dell'immagine mentre la crominanza fornisce le informazioni "extra" che trasformano l'immagine in scala di grigi in un'immagine a colori.
- Le rappresentazioni luminanza-crominanza sono particolarmente importanti nella compressione delle immagini.
- L'occhio umano è più sensibile alla luminanza che ai colori. Posso dunque "spendere" molti bit per registrare la luminanza e risparmiarne un po' sulle crominanze.



# Lo spazio YUV

- Lo spazio YUV viene spesso utilizzato per la codifica di immagini o video analogici, tenendo separate la luminanza dalla crominanza. ATTENZIONE! Con YUV ci si riferisce NON ad uno specifico spazio, ma ad una famiglia di spazi con le caratteristiche sopracitate. Come esempio riportiamo lo spazio YUV definito nello standard ITU-R BT.601-4.
- Tra le possibili controparti digitali degli spazi YUV troviamo gli spazi  $YC_bC_r$ .



# Da RGB a YUV


- La *luminanza* può essere ottenuta mediante una combinazione lineare delle intensità luminose dei canali rosso, verde e blu di RGB. Un'approssimazione abbastanza fedele della luminanza  $Y$  si ottiene attraverso la somma pesata:

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

- Il termine *crominanza* è definito come la differenza tra il colore e un bianco di riferimento alla stessa luminanza opportunamente pesato:

$$U = 0.564(B - Y) \rightarrow U = -0.169R - 0.331G + 0.5B$$

$$V = 0.713(R - Y) \rightarrow V = +0.5R - 0.419G - 0.081B$$




# Da RGB a YUV

Nel caso in cui R, G e B siano compresi tra **0 e 1**, si ottengono valori di Y compresi tra 0 e 1 e valori di U e V compresi tra -0.5 e 0.5.

Nella figura sono rappresentati i colori al variare di U e V con Y fissato a 0.5 (luminanza media).

Quando R=G=B, U e V valgono 0 e si ottengono solo grigi (nessuna crominanza)





# La luminanza



Immagine RGB

$$Y = a \text{ } R + b \text{ } G + c \text{ } B$$

$$a = .3$$

$$b = .6$$

$$c = .1$$




Canale LUMINANZA

I tre canali RGB non danno eguale contributo alla luminanza.  
Il valore di “luminanza” è mantenuto massimamente nel canale G.



# Lo spazio YUV





# Da YUV a YC<sub>b</sub>C<sub>r</sub>

- Gli spazi YC<sub>b</sub>C<sub>r</sub> si possono ottenere facilmente normalizzando ed eventualmente quantizzando i canali di YUV.
- Nel caso in cui R, G e B siano interi compresi tra **0 e 255**, si possono ottenere C<sub>b</sub> e C<sub>r</sub> shiftando U e V. La Y è la stessa di YUV. In questo modo tutti e 3 i canali Y, C<sub>b</sub> e C<sub>r</sub> saranno compresi tra 0 e 255.

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$C_b = U + 128$$

$$C_r = V + 128$$

- **Lo spazio YC<sub>b</sub>C<sub>r</sub> è largamente utilizzato nella compressione. Noi lo ritroveremo nel formato JPEG.**




# Lo spazio $YC_bC_r$


## $YC_bC_r$ :

$Y$  rappresenta la *luminanza*  
mentre  $C_b$  e  $C_r$  rappresentano la  
*crominanza* del blu e del rosso.






# Colori e memoria



# Colori e memoria

Schema assunto in RAM per mostrare i colori:  
**8 bit Red + 8 bit Green + 8 bit Blue = 24 bit**  
(circa 16 milioni di colori o true color)

Questo costoso schema **NON E'** lo schema con  
il quale i colori vengono conservati in  
memoria di massa e compressi nelle tecniche  
JPEG, GIF o altro!



# Più colori che pixel!

Una immagine “grande” è di  
 $2400 \times 1800 = 4.520.000$  pixel.

Una immagine “media” è di  
 $1600 \times 1200 = 1.920.000$  pixel.

Una immagine “piccola” è di  
 $800 \times 600 = 480.000$  pixel.


**In ogni caso ho più colori  
che pixel!**

**Inoltre le immagini “naturali”  
hanno una proprietà di  
coerenza interna per cui  
raramente si ha un colore  
differente per ogni differente  
pixel.**

**Questo porta ad adottare la modalità a  
COLORI INDICIZZATI (indexed color) o a  
PALETTE o a LOOK-UP-TABLE (LUT).**



# Palette: l'idea



Dovrei  
ricordare:

|           |               |           |
|-----------|---------------|-----------|
| 255, 0, 0 | 255, 0, 0     | 0, 255, 0 |
| 255, 0, 0 | 255, 0, 0     | 0, 255, 0 |
| 0, 0, 255 | 255, 255, 255 | 255, 0, 0 |


Totale (9 pixel x 3 byte)= 27 byte = 216 bit

|    |    |    |
|----|----|----|
| 00 | 00 | 01 |
| 00 | 00 | 01 |
| 11 | 10 | 00 |

Ricordo queste “etichette” e  
questa tabella


|                      |
|----------------------|
| 00 = (255, 0, 0)     |
| 01 = (0, 255, 0)     |
| 10 = (255, 255, 255) |
| 11 = (0, 0, 255)     |

Totale  
18 bit (9 pixel x 2  
bit) per l'immagine  
+ 12 byte per la  
palette  
= 114 bit



# La palette

La tabella che lega “etichette” con le corrispondenti componenti RGB si chiama:  
“tavolozza”,  
“palette”, -  
“tabella di indicizzazione dei colori”, “tabella di sbirciata”,  
“look up table”,  
“LUT”.



# Indicizzazione di una immagine true color

I software commerciali e alcuni formati di compressione (GIF) adottano una paletta di **256 colori**.

Se si usa una paletta **custom (adattata all'immagine)**:

- **se nell'immagine true color (16 milioni di colori) ci sono meno di 256 colori**, alcuni di essi vengono replicati.
- **se nell'immagine true color ci sono più di 256 colori**, essi vengono “ridotti” scegliendo 256 rappresentanti che garantiscano una buona qualità visiva (esistono numerosi algoritmi, anche proprietari per tale scopo).

Esistono anche palette “**standard**”: MAC, WINDOWS, WEB\_SAFE, OTTIMIZZATE eccetera.


**Se si usa una paletta standard** di 256 colori, alcuni di questi potrebbero non essere utilizzati nell'indicizzare un'immagine true color (anche se questa presenta più di 256 colori).




## Matrice degli indici




## Palette






# Palette 256 colori






# Palette 16 colori







# Palette 8 colori






# Palette 4 colori





# Palette: una schermata di Photoshop






# Confronti tra palette




Palette di sistema di Windows



Palette di sistema di Macintosh



Palette Web Safe (216 colori)




Palette ottimizzata per l'immagine (Photoshop)


Le differenze percettive tra le varie palette ci sono ma non sono evidenziabili via proiettore e quindi sono qui trascurate



**Palette a 256 colori, ottimizzata per l'immagine (Photoshop)**



**Palette a 16 colori, ottimizzata per l'immagine (Photoshop)**







# Il re-indexing




Cambiare la posizione della palette e quindi anche l'indice corrispondente in modo da creare una matrice di indici che abbia l'entropia minima.






Cambiare la posizione della palette e quindi anche l'indice corrispondente in modo da creare una matrice di indici che abbia l'entropia minima.

- L'idea generale è che se ai colori **di pixel adiacenti** associo **indici numericamente vicini**, la differenza tra tali indici diventa più piccola.
- Questo permette di diminuire l'entropia dell'immagine, garantendo un miglior rapporto di compressione quando si utilizzano formati che usano la codifica differenziale (che vedremo più avanti nel corso)
- Purtroppo, trovare la disposizione ottimale (quella ad entropia minima) è un problema NP-hard. Per una palette con **M** colori, bisogna cercare tra **M!** possibili ordinamenti.
- Pertanto, gli algoritmi di reindexing si basano sulla ricerca di soluzioni che si avvicinano a quella ottima.




# Minimizzare l'entropia





Luminance



Random



Good



5.25

5.85


4.65




(a)



(b) Entropy=5,762



(c) Entropy=6,860



(d) Entropy=5,010